



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.


Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche


Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.











**ANNALEN**  
**DER**  
**PHYSIK UND CHEMIE.**

---

**B A N D CXXIII.**



ANNALS

OF

THE CHURCH

**ANNALEN**  
**DER**  
**PHYSIK**  
**UND**  
**CHEMIE.**

---

**FÜNFTE REIHE.**

---

**HERAUSGEGEBEN ZU BERLIN**

**VON**

**J. C. POGGENDORFF.**

---

**DRITTER BAND.**

---

**NEBST DREI FIGURENTAFELN.**

---

**LEIPZIG, 1864.**

**VERLAG VON JOHANN AMBROSIOUS BARTH.**



THE UNIVERSITY OF

CHICAGO

LIBRARY

1900

CHICAGO

1900

**ANNALEN**  
**DER**  
**PHYSIK**  
**UND**  
**CHEMIE.**

---

**HERAUSGEGEBEN ZU BERLIN**

**VON**

**J. C. POGGENDORFF,**

**HUNDERT DREIUNDZWANZIGSTER BAND.**

**DER GANZEN FOLGE HUNDERT NEUNUNDNEUNZIGTER.**

---

**NEBST DREI FIGURENTAFELN.**

---

**LEIPZIG, 1864.**

**VERLAG VON JOHANN AMBROSIOUS BARTH.**

3

111568

# **I n h a l t**

**des Bandes CXXIII der Annalen der Physik und Chemie.**

---

## **Erstes Stück.**

	<b>Seite</b>
<b>I. Untersuchungen über die Abänderungen der elektromotorischen Kräfte durch die Wärme; von F. Lindig . . . . .</b>	<b>1</b>
<b>II. Ueber das lange Spectrum des elektrischen Lichtes; von G. G. Stokes . . . . .</b>	<b>30</b>
<b>III. Ueber das Magnetisiren der Stahlstäbe; von L. Frankenheim</b>	<b>49</b>
<b>IV. Ueber den Agat; von E. Reusch . . . . .</b>	<b>94</b>
<b>V. Thermometrische Versuche; von G. Recknagel . . . . .</b>	<b>115</b>
<b>VI. Ueber das Kreuz, das gewisse organische Körper im polarisirten Lichte zeigen, und über die Haidinger'schen Farbenbüschel; von V. v. Lang . . . . .</b>	<b>140</b>
<b>VII. Einiges zur Erklärung der Erscheinungen beim Durchgang der Wärmestrahlen durch raue und trübe diathermane Körper; von C. G. Jungk . . . . .</b>	<b>148</b>
<b>VIII. Bemerkungen über die Form des Horopters; von H. Helmholtz . . . . .</b>	<b>158</b>
<b>IX. Zur Frage über den Pulshammer; von F. J. Pisko . . . . .</b>	<b>162</b>
<b>X. Beitrag zur Fluorescenz des Lichtes; von Demselben . . . . .</b>	<b>167</b>
<b>XI. Ueber die Fluorescenz der Auszüge aus den verschiedenen Theilen der Pflanzen; von C. B. Greifs . . . . .</b>	<b>171</b>

# V1

	Seite
XII. Ueber Erregung des Magnetismus durch Drehung; von Dem- selben . . . . .	176
XIII. Ueber den Einfluss der Temperatur auf die Doppelbrechung; von F. Pfaff . . . . .	179
XIV. Ueber die doppeltbrechenden Eigenschaften und die Krystall- form des Amblygonits; von Des Cloiseaux . . . . .	182
XV. Ueber die Krystallform des Wiserins; von G. vom Rath . . . . .	187
XVI. Ueber den Siedpunkt einiger bixären Gemische von Flüssigkei- ten, die einander in allen Verhältnissen lösen; von Alluard . . . . .	190
XVII. Farbenveränderung eines Minerals bei starker Erhitzung; von Jannettas . . . . .	192
(Geschlossen am 17. October 1864)	

## Zweites Stück.

Untersuchung über die Wärme-Entwicklung galvanischer Induc-



## VII.

	Seite
XI. Ueber das Astro-Chromatoskop; von A. Claudet . . . . .	382
XII. Ueber die Anfertigung astatischer Nadelpaare; von L. C. Le- voir . . . . .	384

(Geschlossen am 17. October 1864.)

## Drittes Stück.

I. Ueber Depolarisation; von A. Kundt . . . . .	385
II. Ueber die physikalische Ursache der Eiszeit; von E. Frankland	418
III. Ueber eine neue Klasse von Inductions-Erscheinungen; von J. C. Poggendorff . . . . .	448
IV. Ueber das lange Spectrum des elektrischen Lichts; von G. G. Stokes (Schluß) . . . . .	472
V. Neue Bestimmung der Länge der Lichtwellen, nebst einer Methode, auf optischem Wege die fortschreitende Bewegung des Sonnensy- stems zu bestimmen; von A. J. Ångström . . . . .	489
VI. Thermokette von großer Wirksamkeit; von R. Bunsen . .	505
VII. Ueber Interferenz-Erscheinungen im prismatischen und im Beu- gungsspectrum; von J. Stefan . . . . .	509
VIII. Untersuchung über die Ausdehnung und Doppelbrechung des erhitzen Bergkrystalls; von H. L. Fizeau . . . . .	515
IX. Zur Klangfarbe der Vocale; vorläufige Notiz von F. C. Donders	527

(Geschlossen am 11. November 1864.)

## Viertes Stück.

I. Ueber die Eigenschaften der Kieselsäure und anderer analoger Colloïdsustanzen; von Th. Graham . . . . .	529
II. Ueber die Doppelbrechung des Lichts in tönenden Stäben; von A. Kundt. . . . .	541
III. Ueber ein System von geradlinigen Fransen, welche gleichzeitig mit den Newton'schen Ringen zu beobachten sind; von V. S. M. van der Willigen. . . . .	558

# VIII

	Seite
IV. Neue Methode, den Brechungsindex von Flüssigkeiten zu messen; von Ch. Montigny . . . . .	581
V. Ueber den Einfluss der atomistischen Zusammensetzung C- H- und O- haltiger flüssiger Verbindungen auf die Fortpflanzung des Lichts; von H. Landolt . . . . .	595
VI. Nachtrag zu dem Aufsatz: Neue Methode, das Wärmeleitungs- vermögen der Körper zu bestimmen; von A. J. Ångström . . . . .	628
VII. Ueber Mohr's Hageltheorie; von A. Krönig . . . . .	641
VIII. Ueber eine Erscheinung am Newton'schen Farbenglas; von J. Stefan . . . . .	650
IX. Ueber die erhöhte Wärmestrahlung einer mit kohlensaurem Na- tron überzogenen Platinplatte; vom Fürsten Salm-Horstmar . . . . .	653
X. Einfaches Mittel, um den Ort eines optischen Bildes zu bestim- men; von A. Krönig . . . . .	655
XI. Geissler's Maximumthermometer . . . . .	657
XII. Musikalische Töne, erzeugt durch Holzkohle . . . . .	658
XIII. Lithionreiche Mineralquelle . . . . .	659

## Nachweis zu den Figurentafeln.

---

**Taf. I. —** Lindig, Fig. 1, S. 5; Fig. 2, S. 13; Fig. 3, S. 24. — Reusch, Fig. 4, S. 104; Fig. 5, S. 105. — Recknagel, Fig. 6, S. 116. — Jungk, Fig. 7, S. 149. — V. v. Lang, Fig. 8, S. 141; Fig. 9, S. 143; Fig. 10, S. 144; Fig. 11, S. 147. — W. v. Bezold, Fig. 12, S. 248; Fig. 13, S. 259; Fig. 14, S. 261; Fig. 15, S. 267; Fig. 16, S. 269.

**Taf. II. —** Edlund, Fig. 1, S. 198, Fig. 2, S. 227; Fig. 3, S. 228; Fig. 4, S. 236; Fig. 5, S. 237. — Stokes, Fig. 6, S. 42; Fig. 7, S. 48. (Diese Figuren sind im Texte irrthümlich als Fig. 1 und 2 aufgeführt worden). — Ångström, Fig. 8, S. 498. — Geissler, Fig. 9 und 10 S. 658.

**Taf. III. —** Kundt, Fig. 1, S. 544; Fig. 2, S. 550; Fig. 3, S. 551; Fig. 4, S. 553; Fig. 5, S. 554. — Van der Willigen, Fig. 6, S. 559; Fig. 7, S. 560; Fig. 8, S. 568; Fig. 9, S. 571; Fig. 10, S. 575. — Montigny, Fig. 11, S. 582; Fig. 12, S. 584; Fig. 13, S. 586.

---

## Berichtigungen.

Zum Aufsatz von C. Jessen, Bd. 122.

S. 484 lies: Unser Verfasser hat sicherlich, statt Dieser Verfasser hat sich

Zum Aufsatz von A. Krönig, Bd. 122.

S. 172 Z. 8 v. u. lies: Neigen, statt Steigen

S. 595 Z. 18 v. u. lies: dieselbe, statt die

S. 596 Z. 1 v. u. lies: zu leisten, statt geleistet

S. 598 Z. 5 v. u. lies: neun, statt neuen

S. 600 Z. 11 v. o. lies: nicht öffnen, statt öffnen

S. 600 Z. 18 v. u. lies: Dennoch, statt Demnach

S. 601 Z. 2 v. u. lies: der Reihe nach rückwärts, statt rückwärts

1864.

A N N A L E N

No. 9.

**DER PHYSIK UND CHEMIE.**  
**BAND CXXIII.**

---

**I. Untersuchungen über die Abänderungen der elektromotorischen Kräfte durch die Wärme;**  
**von Dr. Franz Lindig.**

---

**O**bgleich sich über das Wesen der elektrischen Spannkraft vielfach streiten läßt, so kann doch darüber wohl schwerlich ein Zweifel herrschen, daß sie mit der molecularen Constitution der Elektromotoren in engem Zusammenhange steht. Es scheint daher die Vermuthung nicht ungerechtfertigt, daß die elektromotorische Kraft von solchen Umständen nicht unabhängig sey, welche ihrerseits den Zustand der Materie bedingen; und es läßt sich demnach sehr wohl voraussetzen, daß sie unter Anderem auch zur Temperatur — etwa in ähnlicher Weise wie der Magnetismus zur Wärme — in naher Beziehung stehe und mit derselben nach irgend einem Gesetze sich ändere. Eine derartige Abänderung der elektrischen Spannkraft mit der Temperatur der Erreger ist indessen bisher durch das Experiment noch nicht festgestellt worden; es hat sich vielmehr durch die versuchten Nachweise das scheinbare Resultat der vollkommenen Constanz ergeben. Dabei darf man jedoch nicht übersehen, daß die in dieser Hinsicht angestellten Versuche nur in geringer Zahl vorliegen.

Meines Wissens sind es überhaupt nur Peclet, Petruschewsky und Poggendorff gewesen, die derartige Versuche und zum Theil nur ganz beiläufig, angestellt haben. Die des Erstern (*Ann. de chim. et phys. T. III p. 233*) sind überdies nur mit Hülfe eines Elektroskopes an der ungeschlossenen einfachen Kette und zwar in der Weise




angestellt, daß in eine Zinkschale zuerst kalte und hernach siedende Schwefelsäure hineingethan und jedesmal die elektrische Spannung nach den Ausschlägen der divergirenden Goldblättchen berechnet wurde. Auf diese Weise ergab sich allerdings kein Unterschied der elektrischen Spannkraft des Zinks und der kalten Schwefelsäure vor der des Zinks und der warmen Schwefelsäure. Denn es blieb der Ausschlagswinkel in beiden Fällen derselbe. Man muß indessen bemerken, daß das angewendete Meßinstrument ein gewöhnliches Goldblattelektroskop war und keine große Genauigkeit und Schärfe der Versuche gestattete. Aus den von Peclet am angeführten Orte angegebenen Zahlenwerthen ergibt sich nämlich, daß er eine Aenderung der Spannkraft nur dann zu messen im Stande war, wenn sie mehr als  $\frac{1}{37}$  der Gesamtwirkung betrug, und es bleibt also noch immer die Möglichkeit offen, bei Anwendung von empfindlicheren Apparaten eine jenseits dieser Gränze liegende Abänderung nachzuweisen. Auch wäre es über

Inhalte der Arbeit, in welcher er seine beiläufigen Untersuchungen veröffentlicht, mit Sicherheit hervor, daß er die elektromotorische Kraft nach der Fechner'schen Methode bestimmte; im Uebrigen fehlt uns aber bei seinen Angaben ein nöthiger Anhaltspunkt und Maassstab, um die Zulänglichkeit und Sicherheit derselben bemessen zu können.

Weit sachgemässer, so wie auch einfacher, erscheint dagegen das Verfahren, dessen sich Poggendorff bedient hat, um die Abhängigkeit der elektromotorischen Kraft von der Temperatur der Erreger zu untersuchen. Dieser schloß (Pogg. Ann. Bd 50, S. 264) zwei gleiche galvanische Ketten von Kupfer und amalgamirtem Zink in Kochsalzlösung oder verdünnter Schwefelsäure einander entgegen und führte in den Schließungsbogen ein empfindliches Galvanometer ein. Wie zu erwarten stand, zeigte dies bei wirklich gleicher Beschaffenheit der Elemente keinen Ausschlag. Während nun ein Tropfen Säure zu dem einen derselben hinzugehan, sofort eine Ablenkung der Nadel zur Folge hatte, mithin die elektromotorische Kraft abänderte, blieb dieselbe bei der Erwärmung der einen Kette bis zur Siedehitze der Flüssigkeit in der Ruhelage. Poggendorff schloß daraus, daß die Temperatur keinen merkbaren Einfluß auf die elektromotorische Kraft der Hydroketten ausübe, wenigstens solcher, worin kein Contact heterogener Metalle stattfindet. Man hat allerdings keinen Grund einen Zweifel in die Beobachtungen eines Physikers, wie Poggendorff, zu setzen. Dennoch schien es wünschenswerth diesen Gegenstand von Neuem zu untersuchen und ich bin Hrn. Prof. Magnus zu großem Danke verpflichtet, daß er mir die erforderlichen Versuche in dem von ihm geleiteten Laboratorium auszuführen gestattet hat.

Von den verschiedenen Arten die elektromotorischen Kräfte zu bestimmen, schien mir für die fragliche Untersuchung die von Bosscha abgeänderte Poggendorff'sche Compensationsmethode, obwohl sie keine absoluten Werthe liefert, dennoch ausreichend und bequem — ausreichend insofern es mir nur auf die relative GröÙe einer

etweigen Veränderung der elektromotorischen Kraft ankommen, bequem insofern sie bei beliebiger Genauigkeit die Winkelmeßinstrumente entbehrlich machte. Bekanntlich besteht diese Methode darin, daß man zwei constante Elemente, welche man mit einander vergleichen will, in demselben Sinne in einen Stromkreis einschaltet, denselben durch einen Brückendraht mit einem Galvanometer verbindet und diesen so lange verschiebt, bis die Nadel aus ihrer anfänglichen Ruhelage nicht mehr verrückt wird.



Bezeichnet dann  $i$  die Intensität und  $w$  den Widerstand

$$\varepsilon_1 (\varepsilon_2 + b) = \varepsilon_2 (\omega_1 + a).$$

Wie man sieht, ergibt sich leicht aus den beiden gefundenen Relationen zwischen  $\varepsilon_1$  und  $\varepsilon_2$  die Endgleichung

$$\varepsilon_2 = \varepsilon_1 \frac{b}{a}.$$

Meine Versuche stellte ich nun nach dieser Methode unter Anwendung Daniell'scher Elemente an, da diese, wie es erforderlich war, von der Polarisation frei sind. Ich stellte zwei solche Elemente  $E_1$  und  $E_2$ , in deren äußern und inneren Zellen Thermometer standen und deren elektromotorische Kräfte  $\varepsilon_1$  und  $\varepsilon_2$  waren, in kleine Wasserrannen und führte einen Schließungsbogen von mäßig großem Widerstande ein. Um in demselben eine möglichst bequeme Einschaltung der betreffenden Widerstände  $a$  und  $b$  vornehmen zu können, bediente ich mich eines einfachen Rheochords Fig. 1 Taf. I, den ich mir zu diesem Zwecke dadurch herstellte, daß ich auf einem schmalen mit Millimeter-Eintheilung versehenen Brettchen zwei sehr feine gleichmäßig gezogene Platindrähte  $AB$  und  $CD$  parallel ausspannte und auf sie zwei beweglich parallelepipedische Holzklötzchen  $F$  und  $G$  mit Platin-Belegung und mit Klemmschrauben setzte. Die beiden Drähte  $AB$  und  $CD$  hingen überdies mit den beiden Enden  $A$  und  $C$  zusammen, während von den Klötzchen  $F$  und  $G$  Leitungen nach zwei ungleichnamigen Polen der Elemente  $K_1$  und  $Z_2$  führten, deren beide andere Pole  $K_2$  und  $Z_1$  gleichfalls durch einen Draht  $Z_1HK_2$  verbunden waren. Auf diese Weise waren die beiden Ketten vollkommen geschlossen und, wie man sieht, in demselben Sinne in den Stromkreis eingeschaltet. Um daher die für die Bosscha'sche Methode erforderliche Verbindung der beiden Elemente ganz herzustellen, brauchte ich bloß das eine Ende eines Galvanometerdrahtes nach einem Punkte  $L$  der Leitung  $AC$ ; das andere dagegen nach einem Punkte  $H$  der Leitung  $Z_1K_2$  zu führen.

Nach den Untersuchungen von Petruschefsky ist bekannt, daß selbst die constanten Ketten bei anhaltender Dauer des Stromes ohne äußeres Zuthun allmählich abän-

dern. Bei der Daniell'schen Kette ist das allerdings noch am wenigsten der Fall, indessen läßt sich doch auch an dieser nach einiger Zeit ein Schwanken beobachten. Um diesem Uebelstande, soweit wie möglich zu begegnen, brachte ich in der angegebenen Verbindung einen Stromunterbrecher an, vermittelt dessen die Leitungen, sowohl die durch *HC* als auch die durch *HK*, jeden Augenblick unterbrochen oder wiederhergestellt werden konnten.

Auf diese Weise war ich in Stand gesetzt, die Elemente immer nur auf Augenblicke wirken zu lassen, also jegliche Aenderung der elektromotorischen Kraft durch unnöthigen Gebrauch gänzlich zu vermeiden und ich konnte mithin sicher seyn, die letztere von Unregelmäßigkeit ziemlich frei gemacht zu haben, sehr geringe Zufälligkeiten etwa abgerechnet, die das durch die Thonzelle allmählich vor sich gehende Durchdringen der Flüssigkeiten zur Folge hatte.

Bei der Bestimmung der elektromotorischen Kräfte der Elemente mit denen ich manipilirte, und deren Tempera-



stimmung für  $\frac{b}{a}$  ein von dem früheren differirender Werth. Natürlich ging die Erwärmung oder Abkühlung durch das Glasgefäß, die Kupfervitriollösung und die Thonzelle bis zur verdünnten Schwefelsäure nur langsam vor sich, so daß ich dadurch in Stand gesetzt war, die elektromotorische Kraft  $\varepsilon$ , bei den verschiedenen Temperaturen des Elementes  $E$ , zu bestimmen. Ich hatte dabei zu gleicher Zeit Gelegenheit, die etwaige Wirkung kennen zu lernen, welche eine ungleichmäßige Erwärmung der beiden Flüssigkeiten zur Folge hatte. Es ist dies ein höchst wichtiger Punkt, über den indessen die in Frage stehenden Untersuchungen noch nicht zu einem vollkommen sichern Resultate führen konnten. Es stellte sich nämlich so lange die Temperatur in beiden Zellen verschieden und der Wärmezustand kein stationärer geworden war, der Beobachtung eine doppelte Schwierigkeit in den Weg. Denn da in diesem Falle der Widerstand in der Kette fortwährend abänderte, so war einerseits die Nadel schwer zum Einstehen zu bringen; anderseits war aber auch das  $w$ , während einer Bestimmung von  $\varepsilon$ , nicht genau dasselbe, konnte also auch nicht aus den beiden Formeln

$$\varepsilon_1 w_2 = \varepsilon_2 w_1 \text{ und } \varepsilon_1 (w_2 + b) = \varepsilon_2 (w_1 + a)$$

eliminiert werden. Um aber dennoch trotz der sich darbietenden Schwierigkeiten ein wenigstens annäherndes Resultat zu gewinnen, stellte ich die Bestimmung von  $\varepsilon$ , bei der ein im Laboratorium des Hrn. Prof. Magnus beschäftigter Freund — Hr. Dr. Zehnder — hilfreiche Hand leistete, so an, daß die Holzklötzchen zuerst am Anfange dann am Ende und hierauf nochmals am Anfange der Scale bis zur Ruhelage der Nadel eingestellt wurden. Je weniger Zeit während dieser ganzen Manipulation verstrich, je weniger sich also während derselben die Temperaturen und der Widerstand veränderten, um so genauer stimmten dabei die bei der ersten und dritten Ruhelage der Nadel erhaltenen Werthe der Scalentheile mit einander überein.

Für die Rechnung wählte ich aber als sicherste Werthe die sich als Mittel ergebenden.

Von den auf die beschriebene Art und Weise in großer Anzahl angestellten Beobachtungen will ich nur einige wenige in der folgenden Tabelle mittheilen. In dieser bezeichnen  $\theta$  die Temperatur des Element  $E$ ,  $t_1$  die äußere und  $t_2$  die innere Temperatur des Elementes  $E$ , und  $\beta$  und  $\alpha$  die Zahlen der Theilstriche, bei denen die Holzklötzchen eingestellt werden mußten, damit kein Strom durch das Galvanometer ginge. Die Größen  $b$  und  $a$  die sich einfach aus den Differenzen der verschiedenen für  $\beta$  und  $\alpha$  gefundenen Werthe ergeben, sind nicht besonders bemerkt; dagegen enthält die Rubrik unter  $\epsilon$ , die elektromotorische Kraft von  $E$ , bei den verschiedenen Temperaturen in Einheiten von  $\epsilon_1 = 100$  ausgedrückt:

## 1.

$\theta$	$\beta$	$\alpha$	$t_1$	$t_2$	$\epsilon$
19,7	11	10	19,7	19,7	

9

II

$\theta$	$\beta$	$\alpha$	$t_1$	$t_2$	$t_3$
19	14	14,5	7	12	100,1
	963	963			
	954,8	960	7	11	100,1
	15	21			
	15	21	8,5	8,5	
	955	961			100,0
	15	22	36,5	34,5	
	963	935			104,0
	15	25	37	36	
	963	938			104,0
	15	24,5	37	37	
	963	940			103,6
	956	930			
	22	30			103,7
	948	940	19	21	
	15	32			102,7

III.

20	20	62	20,8	20	
	934	970			101,2
	14	24	43	33	
	961	940			103,4
	14	28	44	40	
	965	950			103,2
	15	15	27	34	
	968	950			101,9
19	15	25			
	952	945	25	27	101,8
	15	26			

$\theta$	$\beta$	$\alpha$	$t_s$	$t_e$	$\epsilon$
19	953	945	24,8	26	
	15	26			102
	921	960	21	24	
	15	65			101,3
	921	960			
	15	66			

Schon eine oberflächliche Betrachtung vorstehender Ergebnisse zeigt, daß die elektromotorische Kraft eines Daniell'schen Elementes im Allgemeinen mit der Temperatur zunimmt und sich bei Erniedrigung derselben verringert. Dabei ist es selbstverständlich, daß die beobachtete Zunahme nicht bloß scheinbar ist und nicht etwa in einer bei der Erwärmung der Flüssigkeit auftretenden Verringerung des Leitungswiderstandes ihren Grund hat. Wenn sich bei der Erwärmung eines Elementes in dem Schließungsbogen eine grössere Stromintensität zeigt, so soll freilich dieselbe nach Petruschefsky's Ansicht allein von

schen Kraft veranlaßt seyn könne. Es mußte jedoch in diesem Falle das Eintauchen eines indifferenten Körpers z. B. eines Glasstabes in die Flüssigkeit durch das bewirkte Ansteigen derselben eine gleiche Folge haben, was, wie leicht zu beobachten war, nicht stattfand. Man könnte überdies auf den Gedanken kommen, daß durch die Erwärmung des Elementes Polarisation erzeugt werde, und daß diese vielleicht jene Aenderungen in der elektromotorischen Kraft bedinge. Indessen würde die Polarisation jedenfalls dem primären Strome entgegenwirken und es müßte also Erwärmung eines Elementes Schwächung der Kraft zur Folge haben, was nicht der Fall ist. Daß überdies in Daniell'schen Elemente bei nicht allzu großer Erwärmung keine merkbare Polarisation auftrat, ergab sich im Uebrigen direct daraus, daß die Kraft durch Schütteln des Elementes, wodurch jedenfalls die Polarisation geändert wäre, nicht influirt wurde.

Dabei darf man jedoch nicht übersehen, daß die Spannkraft des Daniell'schen Elementes keine einfache, sondern vielmehr eine aus verschiedenen einzelnen zusammengesetzte ist. Wie bekannt wirken in demselben außer der elektrischen Kraft von Zink gegen Kupfer die von Kupfer gegen Kupfervitriol und die von Zink gegen Schwefelsäure und zwar dergestalt, daß sich jene von dieser als der größeren subtrahirt. Demnach können die Vorgänge die bei der beobachteten Zunahme der elektromotorischen Kraft statthaben, mehrfacher Art seyn, und es kann dieselbe eben sowohl durch eine Vergrößerung als auch durch eine Verringerung der einzelnen Spannkraften zu Stande kommen. Denn bezeichnen wir die Kraft eines Daniell'schen Elementes mit  $\varepsilon$ , so erhalten wir die Gleichung:

$$\varepsilon = \text{Zk} / \text{Cu} + \text{Zk} / \text{SO}_3 - \text{Cu} / \text{CuOSO}_3$$

und wir sehen hieraus, daß  $\varepsilon$  bei unverändertem Werthe von  $\text{Zk} / \text{Cu}$  wachsen würde, eben sowohl durch Vergrößerung des Minuendus  $\text{Zk} / \text{SO}_3$ , als auch durch Verminderung des Subtrahendus  $\text{Cu} / \text{CuOSO}_3$ . Woher nun aber beim Daniell'schen Element die Zunahme der Kraft in

Wirklichkeit rührt, läßt sich weder *a priori*, noch aus den vorstehenden Versuchen mit Sicherheit bestimmen. Indessen scheint doch wenigstens das aus letzteren hervorzugehen, daß die Erwärmung von Schwefelsäure geringern Einfluß auf die Aenderung der Kraft ausübe als die der Kupfervitriollösung, und hieraus würde dann folgen, daß jene Zunahme bei der Erwärmung vorzugsweise durch die Abnahme der Spannkraft von Kupfer und Kupfervitriol bedingt sey.

Um die Sache mit Sicherheit zu entscheiden, mußte ich von dem bisher eingeschlagenen Wege abgehen und sie nunmehr von einer andern Seite angreifen. Wie man sieht kam es darauf an, die Aenderung der betreffenden elektrischen Spannkraft unter weniger complicirten Verhältnissen als beim Daniell'schen Elemente sichtbar zu machen, d. h. also die einzelnen elektromotorischen Kräfte zu sondern und für sich auf ihr Verhalten zur Wärme zu untersuchen. Ich ging zu dem Ende von der Spannkraft von Kupfer und Kupfervitriol aus und zwar in der Weise

dem Galvanometer, falls es sehr empfindlich war. Für die nachfolgenden Untersuchungen benutzte ich nun ein Wiedemann'sches Spiegelgalvanometer mit 12,000 Windungen und magnetisirtem Spiegel, dessen Ablenkungen durch ein 2,5<sup>m</sup> entferntes Fernrohr an einer Scale mit Millimetertheilung abgelesen wurde. Für geringere Ausschläge wurde die Intensität des ablenkenden Stromes der Anzahl der Scalentheile, um welche der Spiegel abgelenkt ward, proportional gesetzt; für grössere Abweichungen (über 400<sup>mm</sup>) dagegen den Tangenten derselben.

Wenn die im vorhergehenden angegebene einfache Kupfer-Kupfer-Kette längere Zeit geschlossen gewesen war, so daß der etwa vorhandene geringe Strom constant geworden, so wurde das eine Luftbad langsam erbitzt, während das andere bei gleicher Temperatur blieb. Es zeigte sich in diesem Falle sofort ein Strom von bedeutender, allmählich zunehmender Intensität, welcher scheinbar mit der Temperatur proportional wuchs. Was die Richtung desselben anbelangte, so ergab sich nach der Ampère'schen Regel, daß die positive Elektricität vom kalten Kupfervitriol durch das Heberrohr nach dem warmen strömte. Nun ladet sich aber, wie Kohlrausch am Elektrometer nachgewiesen hat, wenn Kupfer mit Kupfervitriol in Berührung gebracht wird, ersteres mit negativer, letzteres mit positiver Elektricität. Bezeichnen wir also die Grösse der bei der Berührung beider Körper freiwerdenden Elektricität (Fig. 2 Taf. I) mit  $e$  so ist die elektrische Ladung in der obigen Kette, so lange der Zustand der beiden Berührungsstellen un geändert bleibt, an den Metallen  $-e$ , in der Flüssigkeit  $+e$  und es kann daher keine stationäre Strömung der Elektricitäten stattfinden. Sobald indessen die eine der beiden Berührungsstellen der Metalle und Flüssigkeiten z. B.  $B$  erwärmt wird, so wird sich im Allgemeinen in Folge davon die daselbst auftretende Spannkraft vergrößern oder verringern, d. h. es wird die elektrische Ladung der Flüssigkeit bei  $B$ ,  $(+e) + x$  oder  $(+e) - x$  und die des Metalles bei  $B$ ,  $(-e) + x$  oder  $(-e) - x$ . Bei der Erwärmung

von *B* indicirte aber, wie oben angeführt ist, das Galvanometer eine Strömung einer positiven Elektricität von *A* durch das Heberrohr nach *B*. Dies kann aber nur dann der Fall seyn, wenn bei *B* weniger positive Elektricität vorhanden ist als bei *A*. Weil nun aber bei *A* nichts geändert, folglich auch die dort vorhandene positive Elektricität nicht vermehrt ist, so muß die bei *B* auftretende positive Elektricität vermindert, mithin die elektromotorische Kraft durch das Erwärmen geschwächt seyn.

Um nun die Größe dieser Verminderung festzustellen, kam es zuerst darauf an, sie in irgend welchen Einheiten auszudrücken. Zu diesem Zwecke wurde diejenige Stromintensität als Einheit angenommen, welche den Spiegel bei der obengenannten Stellung des Fernrohres um die Größe eines Scalentheiles ablenkte; als Einheit des Leitungswiderstandes dagegen der Widerstand der ganzen Schließung, welchen ich so groß machte, daß die Erwärmung der flüssigen Leitung keinen abändernden Einfluß ausübte.

Ich lasse jetzt einige Beobachtungen folgen, aus denen



15

I.

<i>R</i>	<i>i</i>	<i>t.</i>	<i>b</i>	<i>'d</i>
515	517	14	14	2
	520		20	5
	529		25	11
	535		29	20
	540		31	25
	545		34	30
	546		35	31
516	560	15	41,5	41
	570		46,7	53
	575		50	58
	580		52	61
517	581	16	52	64
	583		53,25	66
	582		53	65
	580		52	63
510	585	16,5	57	75
	590		59,5	80
	630		77	120
	633		79,75	123
	631,5		79,5	121
	630		78,5	120
	635		80	125
	650		86,5	140
	660		91,25	150
	661		92	151
511	658	17	91,7	148
	656		91	146
	616		74	105
	615		72,5	104
	610		70	99
	588		46,0	77
	565		47,5	54
512	541	17	30	29
513	525		25	13

16

II.

<i>R</i>	<i>i</i>	<i>t.</i>	<i>h</i>	<i>h</i>
514	520	16,75	16,75	16
	585		55	71
	588		"	74
	585		"	71
	590		60	76
	657		88	143
	640		80	126
	637		78	123
	630		75	116
	619		71,7	105
	612		68	98
	591		55	77
	577		51,7	63
	573		49	59
	570		47	56
	565		44	51
	547		34,5	33

geringe, indessen ist sie doch nicht ganz verschwindend, und ziehen wir dieses in Betracht, so folgt, daß die obigen Werthe von  $i$  im Allgemeinen zu klein seyn werden.

Ganz ähnliche Versuche, wie die mit Kupfervitriol und mit Kupferstreifen, stellte ich hierauf auch mit verdünnter Schwefelsäure und amalgamirtem Zink an. Hierbei ergab sich das überraschende Resultat, daß eine Erwärmung fast gar keine Aenderung der Spannkraft zur Folge hatte. Die Versuche wurden mit verschiedenen Verdünnungen der Säure wiederholt, doch wurde auch hierdurch kein wesentlich anderes Resultat erzielt. Fast in allen Fällen wurde das amalgamirte Zink mehr oder weniger heftig von der Säure bei der Erwärmung angegriffen, und die sofortige Folge davon war, daß es sich ganz und gar mit Bläschen überzog; wurden dann diese durch die bei der Erwärmung in Bewegung gerathende Säure abgelöst, so zeigte sich allerdings mitunter eine ganz plötzliche Aenderung in der elektromotorischen Kraft, die aber durchaus als von zufälliger Natur erschien. Ueberdies war sie in den meisten Fällen sehr geringe und bei weitem nicht so bedeutend, wie die bei dem Kupfervitriol beobachtete.

Weit günstiger stellten sich die Beobachtungen dar, als ich die Schwefelsäure in meinem einfachen Elemente durch Zinkvitriollösung ersetzte. Auch fiel hier der große Uebelstand weg, welcher beim Kupfer und Kupfervitriol störend war, nämlich die Polarisation.

Wie Regnault und Matteucci <sup>1)</sup> nämlich zuerst nachgewiesen haben, tritt an amalgamirten Zinkelektroden in einer Zinkvitriollösung durchaus keine Polarisation auf. Die aus den beobachteten Intensitäten abgeleiteten Werthe der elektromotorischen Kräfte waren daher in diesem Falle ganz genau und sicher, und es ließ sich deshalb an ihnen die interessante Frage entscheiden, ob die Veränderungen der Spannkraft denen der Temperatur in aller Strenge proportional waren. Was zunächst den Sinn dieser Aenderung der Spannkraft bei Erhöhung der Temperatur anbelangte,

1) *Compt. rend. T. XLIII, p. 234 und T. XXXVIII, p. 891.*

*Poggendorff's Annal. Bd. CXXIII.*

es ergab sich dieser, da der positive Strom wiederum beim Erwärmen der einen Berührungsstelle von der nicht erwärmten durch das Heberrohr zum erwärmten ging durch eine ganz ähnliche Deduction, wie beim Kupfer und Kupfervitriol als genau derselbe.

Es werden nun die nachstehenden Versuchsreihen einen Begriff von der Größe der Abänderungen der elektromotorischen Kraft von Zink gegen Zinkvitriol geben und zugleich zeigen, wie sich dieselbe zur Wärmezunahme verhält.

Es ist aber klar, daß wenn die Abnahme der Kraft der zugeführten Wärme proportional ist, daß dann die Einheiten ersterer dividirt durch die Einheiten letzterer stets denselben Quotienten ergeben müssen. Daß diese in Wirklichkeit der Fall ist, werden die in der Column *Q* berechneten Werthe jener Quotienten ausweisen. Da nun bei den nachfolgenden Versuchen der Widerstand des Schließungsbogens größerer Ausschläge wegen, nicht so groß gemacht war wie früher, so blieb der Widerstand der Schließung bei der Erwärmung der Flüssigkeit nicht vollkommen con-

19

$\bar{R}$	$i$	$i_1$	$i_2$	$i_3$	$i_4$	$Q$
12	152	98,5		36,4	116	6,0
36	36	36	17	18		
	125	80		33	88	6,0
37	240	143		52	218	6,4
37	37	37	18	19		
	240	143		53	224	6,36
34	337	190		69	322	6,44
35	440	240		83	420	6,56
40	17	27,5	15	10,5	— 27	
	63	63		23	+ 49	5,9
	137	90		32	103	6,0
	13	25,6	15,7	10,2	— 29	
42	260	155	16	53	236	6,21
	376	215	16,7	72	351	6,30
41	460	258	17	85	442	6,41
49	57	53	1,5	—2	+ 8	
50	134	95	1,6	16	97	6,3
	236	150		33	205	6,4
	308	188		44	294	6,8
	256	215		52	367	7,0
	510	295		74,5	525	7,1

II. Concentrierte Lösung mit 4 Th. H<sub>2</sub>O.

142	81	108	15	3	— 77	
	254	204		37	136	6,18
	330	245		51,2	229	6,39
	397	292		62,5	310	6,50
	511			81,5		
		340		80,8	441	6,64
140	81	108		3	70	
	296	227		45	196	6,33
142	475	325		75	406	6,61
	518 — 520	346 — 347		82	456	6,65

$R$	$i$	$i_1$	$t_1$	$t_2$	$A_1$	$Q$
183	183	183	1	3	0	
	295	214		26,8	131	5,54
	332	261		34	177	5,68
	420	313		49,5	288	6,20
184	547	383		72	443	6,42
	629	726		85	528	6,44
184	184	184	1	3		
	327	263		33	176	5,87

III. 2 Theile Zinkvitriol und 67 Theile Wasser.

40	38	39	1,5	0,5		
	125	106		25	150	6,4
47	201	147		45,46	283	
	373	248		82	555	6,9

IV. 6 Theile Zinkvitriol und 64 Theile Wasser.

40	62	52	2,3	1	30	
	176	117		25	177	6,15
41	240	156	3	38	226	6,3

Um jetzt  $a$  und  $b$  zu finden, braucht man nur aus den vorstehenden Beobachtungen zwei bezüglich zusammengehörige Werthe von  $\Delta t$  und  $\Delta \varepsilon$  aus der Columnne  $t$   $b$  und  $\varepsilon$  in die Gleichung  $\Delta \varepsilon = a \Delta t + b \Delta t^2$  einzusetzen und die beiden entstehenden Gleichungen nach  $a$  und  $b$  aufzulösen. Setzt man z. B. für  $\Delta \varepsilon$  und  $\Delta t$  die aus der ersten Beobachtungsreihe genommenen Werthe  $\Delta \varepsilon = 192$ ,  $\Delta \varepsilon = 424$  und  $\Delta t = 32$ ,  $\Delta t = 66$ , so findet man für  $a$  und  $b$  die Werthe  $a = 5,608$  und  $b = 0,0123$ , so daß also  $\Delta \varepsilon$  ausgedrückt wird durch die Formel:

$$\Delta \varepsilon = 5,608 \Delta t + 0,0123 \Delta t^2$$

Es fragt sich nun, ob die nach dieser Formel berechneten Werthe mit den beobachteten vollständig übereinstimmen. Ich habe die Rechnung für einige Temperaturen ausgeführt und gefunden, daß die Formel anwendbar ist für die Beobachtungsreihe, aus welcher  $\Delta \varepsilon$  und  $\Delta t$  zur Bestimmung von  $a$  und  $b$  entnommen sind. Es wurde z. B. gefunden:

$\Delta t$	beobachtete Intension	berechnete Intension
15	88	87
31,4	122	124
56	353	352

Für die übrigen Beobachtungsreihen paßt indessen obige Formel nicht, und es wäre also für jede derselben eine eigene zu berechnen. Ich habe jedoch dieses unterlassen, weil es von keiner besondern Wichtigkeit seyn möchte. Dagegen scheint es mir von Interesse zu seyn — obwohl es mich von dem beabsichtigten Gange meiner Untersuchungen ein wenig abführen mußte — beiläufig zu untersuchen wie sich das amalgamirte Zink in einer Chlorzinklösung bei der Erwärmung verhält. Auch hierbei tritt bekanntlich keine Polarisation auf, so daß also von dem etwaigen Resultat Zuverlässigkeit zu erwarten stand. Durch mehrere Beobachtungsreihen, die überdies mit verschiedenen Concentrationen angestellt wurden, erhielt ich nun das Ergebnis, daß die Spannkraft von Chlorzink und amalgamirtem Zink gleichfalls bei der Erwärmung abnimmt. Was aber die

Größe der Abnahme anbetrifft, so gehen davon folgende Reihen den besten Aufschluss, in welchen die Zeichen

$$R, i, i_1, i_2, i_3, i_4, Q$$

dieselbe Bedeutung haben wie früher.

I.  $44\text{H}_2\text{O} - 39\text{ZnCl}_2$

$R$	$i$	$i_1$	$i_2$	$i_3$	$i_4$	$Q$
39	21	30	2,5	3,8	— 18	
37	176,5	109			+ 148	5,2
	397	223		80 — 79	+ 407	5,6
40	21	30	3	3,5	— 21	
	252	147		52,6	+ 216	4,2
	343	190		71 — 70	+ 300	4,7
	400	220	3,7	82	366	4,9
	410	226		84	374	4,9
40	20	30	5	3	— 20	
41	250	143	53,8		200	4,6

II.  $107\text{H}_2\text{O} - 23\text{ZnCl}_2$



III. 84 H<sub>2</sub>O 10 Zn Cl.

R	s	s <sub>1</sub>	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	ε	Q
40,5	49	45	5	52	+ 9	
	141	95		30,1	+ 122	4,5
40	255	153	5,5	56	238	4,6
	218	134		47,6	392	4,5
	355	305	6,5	77,5 — 77	347	4,7
	378	217	7	81,8 — 81	372	4,8

Die vorstehenden Zahlenwerthe zeigen uns nun erstens, dass die Abnahme der Spannkraft von Zn / ClZn nicht so groß ist als die der Spannkraft von Zn / ZnOSO<sub>4</sub>, und zweitens, dass auch diese Abnahme der Temperaturzunahme nicht in aller Strenge proportional ist.

Nachdem ich durch die im Vorhergehenden beschriebenen Versuche das Verhalten der einzelnen Spannkräfte, welche in Daniell'schen Elemente zusammenwirken, in ihrer Beziehung zur Wärme näher untersucht hatte, hielt ich es durchaus für nicht überflüssig, noch einmal die Versuche am Daniell'schen Elemente zu wiederholen und dann zu gleicher Zeit für die verdünnte Schwefelsäure auch Zinkvitriol und auch andere Flüssigkeiten anzuwenden. Ich ging jedoch zu diesem Ende auf das frühere Verfahren nicht wieder zurück, weil dies wenig Interesse darbieten konnte, sondern construirte mir ein Daniell'sches Element eigener Beschaffenheit, an dem sich die Erscheinungen nicht so compliciren konnten, und nahm dann an diesem die Bestimmungen der elektromotorischen Kraft in etwas modificirter Weise vor. Es wurden nämlich zwei rechtwinklich gebogene Glasröhren *ABC* und *DEF* mit einer Oeffnung von etwa 25 Millimeter durch einen Schlauch verbunden, nachdem das eine der zu verbindenden Enden — *A* — mit thierischer Blase verschlossen war. Hierauf wurden die beiden nicht verbundenen Schenkel der Glasröhren *CB* und *EF* durch Korke in zwei unten und oben offene weite glockenförmige Glasgefäße geführt, so dass sie von diesen als Wasserbädern umgeben wurden. Durch Stativ wurden die Schenkel in aufrechter Richtung gehalten.

ten, während der andere Theil des Apparates, wie die Fig. 3 Taf. I zeigt, in eine mit Wasser gefüllte Blechwanne tauchte. In die eine der beiden verbundenen Röhren *ABC* wurde hierauf Kupfervitriol hineingethan in die andere *DEF* dagegen bald verdünnte Schwefelsäure, bald Zinkvitriol, bald Kochsalzlösung; und während nun in erstere ein Kupferstreifen als metallischer Erreger eingeführt ward, vertrat in letzterer amalgamirtes oder auch gewöhnliches Zink die Stelle eines solchen. Zu gleicher Zeit konnte man an Thermometern, welche sich in den Flüssigkeiten möglichst dicht an den metallischen Erregern befanden, die Temperaturen der beiden Berührungstellen der Metalle und Flüssigkeiten bestimmen. Letztere standen wiederum mit den Enden des Galvanometerdrahtes in Verbindung, so daß der Strom des auf diese Weise hergestellten Daniell'schen Elementes direct durch das Meßinstrument ging. Um aber die Empfindlichkeit desselben so weit zu schwächen, daß man die Intensität des Stromes messen konnte, mußten die Windungen des angewandten Spiegelgalvanometers von dem

bei stellte sich heraus, daß eine Erwärmung der Schwefelsäure in *DEF* völlig gleichgültig war und gar keine Aenderung zur Folge hatte, wie dies nach den früheren Untersuchungen ebenfalls zu erwarten stand. War dagegen das Daniell'sche Element statt mit verdünnter Schwefelsäure mit Zinkvitriollösung zusammengesetzt, so wurde durch die Erwärmung des Zinks bei unveränderter Temperatur der Kupferlösung die elektromotorische Kraft der Kette um ein Bedeutendes geschwächt. Wurde aber endlich statt Schwefelsäure Kochsalzlösung mit nicht amalgamirtem Zink angewendet, so stieg wiederum die elektromotorische Kraft des Elementes beim Erwärmen der Kochsalzlösung an, was bei Anwendung von amalgamirtem Zink nicht der Fall war. Einige Zahlenwerthe werden die Belege zu diesen Angaben liefern. In nachstehenden Beobachtungsreihen bedeutet *R* wieder den Stand des Spiegels in der Ruhe, *α* den beim Hindurchgange des Stromes, *i* dessen Intensität und *ε* die elektromotorische Kraft, wobei zu bemerken, daß die anfängliche der Uebersichtlichkeit wegen stets gleich 100 gesetzt ist; *tk* und *tz* bezeichnen die Temperaturen der respectiven Flüssigkeiten.

I. 1 CuOSO <sub>3</sub> + 4H <sub>2</sub> O    1 SO <sub>3</sub> + 16H <sub>2</sub> O					
<i>R</i>	<i>α</i>	<i>i</i>	<i>tk</i>	<i>tz</i>	<i>ε</i>
45	496	451	16	16	100
	530	488	71		107,5
	500	455	21		
43	476	433	16,5	16	100
	509	466	74		107
	478	435	20		
	475	432	17		100
44	512	470	78		108
	496	452	46,5		104
38	515	477	17	16	100
	549	511	75		107
39	515	476	17		100
	537	499	56		105
	514	475	17		100
	537	499	56		105
	515	476	17		

R	$\sigma$	$\delta$	$\eta$	$\tau$	$\rho$
45	491	446	15	16	100
	528	483	72	11	107
	491	446	15	11	100

II. Concentrirtes Kupfervitriol, Concentrirtes Zinkvitriol.

51	505	454	3	2,5	100
	481	430		79	94,6
50	505	455		1	100
	479	429		84	94
	505	756		1,8	100
	510	490	81		108
	506	456	9		
	502	452	1		100
	538	488	78		108
	503	453	2		100

III. Concentrirte Kochsalzlösung und concentr.  $\text{CaCl}_2$ .

50	511	161	1	6	100
----	-----	-----	---	---	-----

heblicher zeigt. Vergleicht man nämlich in den Columnen  $\epsilon$  die elektromotorischen Zunahmen mit den vorhandenen Kräften, so ergibt sich für Kupfer im Kupfervitriol bei einer Temperaturerhöhung von  $80^\circ$  eine Kraftzunahme von ungefähr 8 Proc. und ebenso für Zink in Zinkvitriol eine Abnahme von 6 Proc.

Bei dieser nicht unbedeutenden Grösse der Aenderungen, welche selbst im Verhältnisse zur gesammten Kraft nicht unerheblich sind, stand von vornherein zu erwarten, daß dieselben nicht blos am Galvanometer, sondern auch am Elektrometer wahrnehmbar und meßbar seyn würden und es schien mir daher der Mühe werth am Schlusse meiner Beobachtungen auch noch am Letzteren einige Versuche auszuführen. Es bot sich mir hierzu insofern eine günstige Gelegenheit dar, als gerade im Laboratorium des Hrn. Professor Magnus Hr. M. Avenarius mit elektromotorischen Messungen beschäftigt war und auf meinen Vorschlag, im Verein mit mir einige Beobachtungen an seinem Kohlrausch-Dellmann'schen Elektrometer zu unternehmen, mit großer Freundslichkeit und Bereitwilligkeit einging. Die von uns darauf gemeinschaftlich angestellten Versuche will ich nur in der Kürze und soweit es zum Verständniß nöthig ist, mittheilen und auseinandersetzen. Unser erster Versuch bestand darin, daß wir nach der Kohlrausch'schen Bestimmungsart die elektrische Spannung des von mir construirten aus Kupfer- und Zinkvitriol zusammengesetzten Daniell'schen Elementes ermittelten. Dazu ließen wir einmal die Spannkkräfte der Condensatorplatten  $C$  und des Elementes  $D$  in gleichem und das andere Mal in entgegengesetztem Sinne auf die Elektrometernadel wirken. Es ergab sich dabei für  $D + C$  als Mittel aus vier Beobachtungen eine Ablenkung von  $41,50$  und ebenso als Mittel aus fünf Beobachtungen für  $D - C$  eine Ablenkung von  $21,5$ . Nach besonders von M. Avenarius für sein Elektrometer berechneten Tabellen entsprechen diesen Ablenkungen die ablenkenden Kräfte:

$$D + C = 421 \text{ und } D - C = 209.$$

Mithin war

$$D = 315 \text{ und } C = 107.$$

Jetzt wurde die Kupfervitriollösung um etwa  $60^\circ$  erwärmt und sofort die Spannkraft des Elementes nochmals in derselben Weise bestimmt. Nunmehr ergaben sich für  $D + C$  und  $D - C$  als Mittelwerthe aus fünf Beobachtungen die Ablenkungen  $42''$  und  $23''$ , für welche sich nach den Tabellen folgende Kräfte ergeben:

$$D + C = 428 \text{ und } D - C = 214.$$

Hieraus folgt:

$$D = 321 \text{ und } C = 106.$$

Die Kraft des Daniell'schen Elementes hatte sich demnach durch die Erwärmung des Kupfervitriols um  $60^\circ$  von 315 auf 321 gesteigert, d. h. um etwa 2 Proc.

Bei einem zweiten Versuche, den wir demnächst anstellten, um die Veränderung der Kraft durch die Erwärmung des Zinkvitriols kennen zu lernen, bestimmten wir nur die Summe der Spannkraft des Condensators und des Elementes. Es fand sich für  $D + C$  bei vier Beobachtun-

Daniell'schen Elementes verglichen. Wir fanden zunächst für  $D + C$  und  $D - C$  die Ablenkung  $53''$  und  $45''$  oder die ablenkenden Kräfte  $D + C = 597,1$  und  $C - D = 468$ .

Hieraus folgt  $D = 532,5$  und  $C = 64,5$  und da nun  $\Delta\epsilon + C = 81$  war, so ergibt sich:

$$\Delta\epsilon = 9,95 \text{ oder } \Delta\epsilon = 0,037 D.$$

Es betrug mithin die Ablenkung von  $\text{Zn} / \text{ZnOSO}_3$  bei einer Erwärmung um  $60''$  etwa 3,7 Proc. was nahezu mit der am Galvanometer gefundenen Verringerung jener Spannkraft übereinstimmt, wenigstens so genau, wie dies bei elektromotorischen Untersuchungen zu erwarten steht.

So weit meine Untersuchungen.

Es wird nun zum Schlusse nicht überflüssig seyn, wenn ich der Uebersichtlichkeit wegen, die aus ihnen hervorgehenden Ergebnisse in der Kürze nochmals wiederhole und sie so zusammenstelle, wie sie sich am natürlichsten aneinanderreihen.

1. Von den elektrischen Spannkraften sind einige von der Temperatur des Erregers abhängig und ändern mit ihnen oft mehr oft weniger ab. So zeigt z. B. Kupfer in Kupfervitriol, amalgamirtes Zink in Zinkvitriol und Chlorzink und nicht amalgamirtes Zink in Kochsalzlösung eine Aenderung der Kraft bei der Erwärmung, während dies bei amalgamirtem Zink in Schwefelsäure und in Kochsalzlösung mit den gewöhnlichen Messinstrumenten nicht sicher nachzuweisen ist.

2. Die Aenderung der Kraft geht nicht immer in demselben Sinne vor sich; während sie z. B. bei Kupfer in Kupfervitriol und amalgamirtem Zink in Zinkvitriol und Chlorzink mit der Erwärmung abnimmt, nimmt sie mit derselben bei nicht amalgamirtem Zink in Kochsalzlösung zu.

3. Die Aenderung ist nicht in allen Fällen zwischen den Temperaturen  $+2''$  und  $85''$  der Temperaturveränderung proportional, wie das die Beobachtung am Zink in Zinkvitriol und Chlorzink deutlich zeigen.

4. In Uebereinstimmung mit No. 1 und No. 2 zeigt auch das Daniell'sche Element keine Constanz bei ver-

änderten Temperaturen sobald das Zink mit verdünnter Schwefelsäure oder Kochsalzlösung umgeben ist.

Bei Anwendung von Zinknitrat heben sich jedoch die in Folge der Erwärmung auftretenden Aenderungen nahezu auf.

## II. *Ueber das lange Spectrum des elektrischen Lichtes; von G. G. Stokes.*

(*Philosoph. Transact. f. 1862, p. 599.*)

Die in einem früheren Aufsatz <sup>1)</sup> beschriebenen experimentellen Untersuchungen führten mich indirect zu dem Schluss, daß der elektrische Funke, mag er vom Conductor einer gemeinen Elektrirmaschine oder von der Entladung einer Leydener Flasche erhalten werden, einen Strahl



Sonnenspectrum nach der brechbareren Seite hin erreicht worden sey. In der That, dieselbe Vorrichtung, die, mittelst Fluorescenz, das Daseyn von Strahlen einer offenbar höheren Brechbarkeit im Lichte des elektrischen Funkens nachwies, zeigte nichts der Art, wenn sie auf das Sonnenspectrum angewandt wurde. Das Einzige wenigstens, was noch durch directe Versuche zu beweisen übrig blieb, betraf die Reflexion der Strahlen von hoher Brechbarkeit durch den Metallopiegel des Heliostats, der zur Reflexion der Sonnenstrahlen in passender Richtung angewandt worden war, und dies geschah kurz hernach durch directe Versuche an Lichtstrahlen einer elektrischen Entladung, die durch prismatische Refraction gesondert worden.

Bei den Vorbereitungen zu einer im Februar 1853 in der *Royal Institution* zu haltenden Vorlesung über den Gegenstand, bei denen ich mich der gütigen Hülfe des Hrn. Faraday zu erfreuen hatte, kam ich natürlich auf das elektrische Licht zurück, wegen des darin gefundenen außerordentlichen Reichthums an Strahlen von hoher Brechbarkeit. Obgleich zur Genüge vorbereitet, darin Strahlen von viel höherer Brechbarkeit als im Sonnenspectrum gefunden anzutreffen, war ich doch sehr erstaunt, als ich eine kräftige Entladung einer Leydener Flasche der prismatischen Analyse mit dem Quarz-Apparat unterwarf, ein Spectrum zu finden, welches das sichtbare Spectrum nicht weniger als sechs bis acht Mal an Länge übertraf, und ich konnte anfangs nicht den Verdacht unterdrücken, daß es ein Irrthum sey, entstanden aus der Reflexion von diffusen (*stray*) Licht. Ein ähnlich ausgedehntes Spectrum wurde mittelst des Volta'schen Bogens erhalten und war hell genug um es den Zuhörern zu zeigen. Der Bogen ging zwischen Kupfer-Elektroden über und das vom Quarzapparat gebildete reine Spectrum wurde mit einem zu dem Ende geschnittenen Uranglase aufgefangen. Das so gebildete Spectrum erwies sich ganz aus hellen Linien bestehend <sup>1)</sup>, wogegen das Spectrum von der Entladung der Leydener Fla-

1) *Proceedings of the Royal Institution Vol. I, p. 264.*

sche (vielleicht weil es nicht genau im Brennpunkt war) continuirlich oder wenigstens nicht ganz discontinuirlich zu seyn schien.

Die Methode der Absorption des Lichts durch farbige Lösungen, wie sie durchs Prisma beobachtet wird, liefert in vielen Fällen schätzbare Charaktere gewisser Substanzen, welche, seltsam genug, trotz der leichten Beobachtung bis in sehr neuere Zeit gänzlich von den Chemikern vernachlässigt worden sind. Nachdem ich das oben erwähnte lange Spectrum erhalten hatte, mußte es mich natürlich interessieren, zu sehen, wie sich besonders reine, aber sonst unvollkommen bekannte organische Substanzen in Bezug auf die Absorption sehr brechbarer Strahlen verhalten würden. Allein die Schwierigkeiten, die mit dem gewöhnlichen Gebrauch einer Salpetersäure-Batterie von 30 bis 40 Zellen verknüpft sind, schreckten mich von dieser Untersuchung ab und ich beschloß mich auf das Sonnenspectrum zu beschränken.

Wegen einiger aus dem Anlaufen meines Helio-stat-Spiegels entspringenen Uebelstände, liefs ich kleine Quarz-

diger Schnelligkeit ab, und für die brechbareren Strahlen des Sonnenspectrums ist es eher mit dem einer glasigen Substanz als mit dem eines Metalls zu vergleichen. Stahl, Gold, Zinn usw. zeigten nichts der Art, sondern reflectirten die unsichtbaren Strahlen reichlich.

Vor etlichen Jahren, als Hr. Dr. Robinson mir einige Versuche mit dem Inductionsapparat zeigte, schien es der Mühe werth, zu untersuchen, ob der Funke, der bei Verbindung der Pole des Apparates mit dem Belegen einer Leydener Flasche erhalten wird, nicht stark genug sey, das lange Spectrum des elektrischen Lichts durch Projection zu erhalten. In der That zeigte sich das lange Spectrum als das durch ein Prisma und eine Linse von Quarz gebildete Spectrum auf ein Stück Uranglas projecirt wurde. Es war indess nicht so hell als das durch eine mächtige Volta'sche Batterie erzeugte, jedoch hell genug um damit zu arbeiten. Es war discontinuirlich, aus hellen Linien bestehend. Die Linien änderten sich je nach den Metallen, zwischen denen die Funken überschlugen, zum deutlichen Beweise, daß sie von den Metallen herrührten.

Damit war ein weites Feld zur Untersuchung geöffnet für Jeden, der sich der sehr mäßigen Mühe unterziehen wollte, die mit dem Gebrauch des Inductionsapparats verknüpft ist. Es war nur übrig, die von verschiedenen Metallen und Gasen gelieferten Linien, sowie die absorbirende Wirkung verschiedener Substanzen in Bezug auf die unsichtbaren Strahlen von verschiedenen Brechbarkeiten zu studiren.

Von Zeit zu Zeit wurden verschiedene Beobachtungen über diesen Gegenstand angestellt. Was die Metall-Linien betrifft, so ist es sehr leicht sie sichtbar zu machen, aber ein Anderes ist es, getreue Abbildungen von ihnen zu erhalten. Selbst ein vollendeter Künstler würde Schwierigkeit darin finden, nach bloßem Anblick ein treues Bild von einem Gegenstand zu entwerfen, der im Dunklen gesehen werden muß. Ich versuchte verschiedene Methoden ohne mich hinsichtlich der Genauigkeit der Zeichnungen

zu befriedigen und ich dachte oft zur Photographie zu greifen.

Mittlerweile beobachtete ich die Absorptionsweise sehr brechbarer Strahlen durch eine gute Anzahl von Substanzen. Für den, der eine Zelle mit parallelen Quarzflächen besitzt, ist nichts leichter als mittelst Fluorescenz die Absorptionsweise dieser Strahlen durch eine gegebene Lösung zu beobachten; allein sichere Schlüsse zu ziehen hinsichtlich des optischen Charakters der in der Lösung vermeinten Substanz ist nicht so leicht als es scheinen möchte; denn die Strahlen von hoher Brechbarkeit sind fähig von einer außerordentlich kleinen Menge einer Unreinigkeit absorbirt zu werden, deren Gegenwart der Beobachter nicht ahnt. So fand ich, daß etwa ein Viertel-Quadratzoll von reinem Filtrirpapier das in einer kleinen Zelle enthaltene Wasser hinreichend verunreinigte, um dessen Durchsichtigkeit merklich zu trüben. Wäre die Lösung durchsichtig, so entspränge daraus keine Schwierigkeit, denn der Effect einer Unreinigkeit bestände nicht darin, eine sonst opake Flüssigkeit

den könnte als durch ein mühsames System von Umkry-  
stallisierungen.

Nachdem ich diese Resultate erhalten, erfuhr ich durch eine Unterredung mit meinem Freunde, dem Dr. Miller, daß er bei photographischen Arbeiten ebenfalls mit diesem Gegenstand beschäftigt gewesen sey, daß er eine Anzahl Photographien von Metall-Spectren dargestellt, und auf dieselbe Weise die Absorption sehr brechbarer Strahlen durch eine große Mannigfaltigkeit von Substanzen, hauptsächlich unorganischen Säuren, Basen und Salzen, auch von gewöhnlicheren organischen Stoffen, studirt habe. Obgleich somit ein großer Theil der Aufgabe, die ich mir gestellt hatte, in anderer Weise gelöst worden, so gab es doch unter den mir vorgekommenen Erscheinungen manche, die nicht durch Photographien erlangt werden können, und ich habe es daher für gut gehalten, sie in einem Aufsatz zusammenzufassen, der somit als Ergänzung von dem des Dr. Miller dienen kann.

#### Bereitung eines Schirms mittelst eines Uransalzes.

Wenige Substanzen fluoresciren kräftiger als verschiedene Salze des Uransesquioxides. Ein wenigstens auf zwei gegeneinander rechtwinklichen Flächen polirtes Stück Uranglas ist, wegen seiner kräftigen und anhaltenden Fluorescenz, ungemein als Schirm zur Aufnahme eines Spectrums geeignet. Dessenungeachtet ist ein solcher Schirm, welcher, um den stärksten Effect zu geben, in besonderen Richtungen betrachtet werden muß, in vielen Fällen weniger bequem als einer, der wie eine Wasserfarbe aus einem stark fluorescirenden Pulver bereitet worden ist, da derselbe in jeglicher Richtung betrachtet werden kann. Besonders ist dies der Fall beim Messen nach einer Methode, die ich gegenwärtig beschreiben will. Außerdem finde ich ein vortreffliches Stück eines solchen Glases mangelhaft in fluorescirender Kraft rücksichtlich der äußersten Linien des Aluminiums; einige Stücke sind, wahrscheinlich wegen Unreinigkeiten, noch *viel mangelhafter*. Daher habe ich es längst

als ein Desideratum betrachtet, durch Fällung ein unlösliches oder sehr schwerlösliches Uranaesquioxid-Salz zu erhalten, welches so fluorescirend, wie die besten Salze dieser Base wäre und wie eine Wasserfarbe behandelt werden könnte. Es ist mir nun gelungen, ein solches Salz darzustellen, obwohl nicht durch directe Fällung.

Das gewöhnliche, durch Fällung erhaltene Phosphat, das außer dem Hydratwasser, die Zusammensetzung  $\text{PO}_4(\text{U}, \text{O}_3)_2\text{HO}$  hat, fluorescirt nur schwach. Wenn man indeß dieses Salz, mit so viel Wasser als es beim Waschen durch Decantation behält, in ein Schälchen thut, etwas freie Phosphor- oder Schwefelsäure, und darauf Krystalle von phosphorsaurem Natron, phosphorsaurem Ammoniak, mikrokosmischem Salz oder Borax in Ueberschuß hinzufügt, so wird das ursprüngliche Salz allmählich in eins verwandelt, welches kräftig fluorescirt. Am schnellsten scheint diese Veränderung mit Borax einzutreten; allein da ein Ueberschuß dieses Salzes im Stande ist, das anfangs gebil-

des Wassers eine gesättigte Lösung von Borax wenigstens in solcher Menge hinzufügt, daß dadurch die saure Reaction zerstört wird. Dann wird dieses Salz von allen ungelösten Krystallen des angewandten alkalischen Phosphats abgeschwemmt und auf einem Filtrum gesammelt. Ein gepresster Kuchen von diesem Salze oder ein poröser Ziegel auf welchem, nach Befeuchtung mit einer Boraxlösung, das Salz ausgebreitet worden, bildet einen bewundernswürdigen Schirm, den ich späterhin hauptsächlich angewandt habe. Er zeigt natürlich sowohl die sichtbaren, als die unsichtbaren Strahlen, erstere durch gewöhnliche Ausbreitung, letztere durch Fluorescenz.

Vermöge seiner Bildung ist das Salz wahrscheinlich (abgesehen vom Hydratwasser) das ursprüngliche Phosphat, worin ein Aequivalent des Bestandtheilswasser durch ein Aequivalent eines Alkalis ersetzt ist, was es dem stark fluorescirenden natürlichen gelben Uranit analog machen würde. Jedenfalls leitet uns diese Hypothese zu einer wirksamen Bereitung desselben, da deren Bedingung nicht leicht durch Beobachtung allein ermittelt seyn würde. Ohne den Gebrauch von freier Säure wird die Fluorescenz nicht vollständig entwickelt; dies erklärt sich durch die Unlöslichkeit des ursprünglichen Phosphats und des fluorescirenden Salzes, welche der vollständigen Verwandlung des einen in das andere ein Hinderniß entgegensetzt.

#### Metall - Linien.

Diese sind, wie schon erwähnt, wahrzunehmen, wenn man den Funken eines Inductoriums zwischen zwei aus dem zu untersuchenden Metall gebildeten Elektroden überschlagen läßt (unter respectiver Verbindung derselben mit den Belegen einer Leydener Flasche von paßlicher Größe), mittelst eines Quarzprismas, dessen Seiten gegen die Axe des Krystalls gleiche Neigung haben, und einer Quarzlinse, die winkelrecht gegen die Axe geschnitten ist, ein reines Spectrum bildet und dieses mit einem geeigneten Schirm auffängt, wobei, wenn dazu eine fluorescirende Flüssigkeit an-

gewandt wird, dieselbe in einem Gefäße mit Quarzwänden enthalten seyn muß, in Ermangelung dessen auch ein Stück Fließpapier mit der Flüssigkeit gesättigt werden kann.

Ausgenommen das sichtbare Spectrum und das Vorderste des unsichtbaren, variiren die so gesehenen Linien von Metall zu Metall und sie sind daher dem Metall und nicht der Luft zuzuschreiben. Sie unterscheiden sich auch dadurch von den Luft-Linien, daß sie nur in einem fast unmerklichen Abstände von den Spitzen der Elektroden erscheinen, wogegen die Luft-Linien sich über den ganzen Zwischenraum ausbreiten. Das Spectrum ist zu ausgedehnt, als daß man es auf einmal ganz übersehen könnte, wenn das Prisma sich in der Lage der Minimum-Ablenkung befindet; und wenn dasselbe den Elektroden sehr nahe ist, ohne welche Nähe man verhältnißmäßig wenig Licht hätte, ist der Effect der verschiedenen, von der Linse in Convergenz übergeführten Divergenz der Strahlen in der primären und secundären Ebene sehr groß. Um ein reines Spectrum zu erhalten, muß der Schirm rücksichtlich der pri-



wie leicht zu sehen, wenn die Elektroden nicht zu nahe sind. In einem Abstände von  $P$ , bei welchem die Länge der primären Focallinie gleich wird der des Funkenbildes, treffen die beiden Linien, welche, für Strahlen von einer diesem Abstände entsprechenden Brechbarkeit, die Bilder der Elektrodenspitzen sind, in der Mitte des Spectrums zusammen, und jenseits dieses Abstandes übergreifen sie einander, so daß eine Linie quer durch das Spectrum zu laufen scheint, obgleich sie zu Strahlen gehört, welche nur von der unmittelbaren Nachbarschaft der Elektrodenspitzen ausgehen, wie man sieht, wenn man das Prisma dreht bis jener Theil das Spectrum im Ablenkungs-Minimum ist, und aufs Neue in den Brennpunkt einstellt.

Außer den hellen, offenbar von den Metallen herrührenden Linien, welche erwähnt wurden, nimmt man ein schwächeres Licht gewahr, das für die genaue Beobachtung zu schwach ist. Ein Theil von diesem gehört wahrscheinlich der Luft an.

Der Haupttheil des sichtbaren durch Projection zu sehenden Spectrums scheint offenbar der Luft anzugehören; denn die Linien erstrecken sich quer durch den Zwischenraum der Elektroden, während die den Metallen angehörigen Linien, selbst in dem sichtbaren Spectrum, sich nur auf eine kurze Strecke ausdehnen; die ersteren kommen auch bei Vertauschung der Elektroden zum Vorschein. Bei einigen Metallen erscheinen indess im sichtbaren Spectrum Metall-Linien, die an Stärke vergleichbar sind den unsichtbaren Linien von hoher Brechbarkeit; allein im Allgemeinen ist merkwürdigerweise das sichtbare Spectrum und selbst das unsichtbare auf einer guten Strecke jenseits arm an starken charakteristischen Metall-Linien, verglichen mit dem Spectrum-Theil von noch höherer Brechbarkeit.

Ich habe neuerlich zur Festsetzung von Stellen im unsichtbaren Spectrum eine Methode angewandt, die ungemein einfach und bequem ist und Resultate liefert, die gut mit einander übereinstimmen. Sie könnte angewandt werden um Karten von den Metall-Linien zu entwerfen; allein

dieses ist unnöthig, da es bereits vom Dr. Miller geschehen ist. Sie ist jedoch auch nützlich zur Feststellung der Lagen von Absorptionsstreifen und giebt sie bequemer und genauer als durch Schätzung in Bezug auf bekannte Metall-Linien.

Die Methode ist folgende. Auf einen Klotz von zweckmäßiger Höhe, der auf einem langen Reifsbrett festgeschraubt ist, stellt man das Quarzprisma und befestigt es nach Belieben durch eine von oben auf dasselbe drückende Schraube. Die Linse wird befestigt in einem geschwärzten Brett, das auf der hohen Kante nahe am Prisma festgeschraubt ist, so daß sie die Strahlen aller Brechbarkeit nach der Brechung durch das Prisma aufnehmen kann. Die angewandte Linse hatte eine Brennweite von 12 Zoll und einen Durchmesser von  $1\frac{1}{4}$  Zoll. Nachdem das Prisma in zweckmäßigen Abstand (ich nahm 30 Zoll) von dem Funken gebracht worden, wurde das Reifsbrett so gedreht, daß, wenn man das Prisma für die Mitte des langen Spectrums in die Lage des Ablenkungs-Minimum eingestellt hatte, die diesem Theil angehörigen Strahlen ganz oder nahe unbel-

Winkel zusammengeklemt werden konnten. Das kürzere Lineal trug eine lothrechte Nadel, die, sowie dasselbe gedreht wurde, vor dem Brennpunkt der verschiedenen Strahlen vorüberging in einem Abstand von etwa einem Viertelzoll. Das längere Lineal trug eine Pfrieme, bestimmt um auf einem temporär auf dem Reissbrett befestigten Stück Papier die Lage irgend eines beobachteten Gegenstandes anzugeben. So behielten Prisma, Linse, Bewegungsaxe der Nadel und der Pfrieme, so wie der Stift zur Fixirung des Einfallswinkels eine unveränderliche relative Lage, wenn das Reissbrett bewegt wurde. Bei dem Beobachten stellte man die Elektroden in den geeigneten Abstand und drehte das Reissbrett bis der Rand des Schattens auf den Stift fiel. Die Lineale wurden dann zusammen gedreht bis eine helle Linie oder ein anderer Gegenstand durch die Nadel verdunkelt ward, und dann wurde ihr Ort durch Herabstechen bezeichnet. Um einen festen Vergleichspunkt zu haben bezeichnete ich auf solche Weise die Lage des äussersten sichtbaren Roths auf einem Schirm, z. B. einem Stück Papier; wenn aber eine grosse Genauigkeit erfordert wäre, würde es besser seyn, eine wohl markirte grüne Luft-Linie anzuwenden.

Die Metalle, deren Spectra ich bisjetzt beobachtet habe, sind Platin, Palladium, Gold, Silber, Quecksilber, Antimon, Wismuth, Kupfer, Blei, Zinn, Nickel, Kobalt, Eisen, Cadmium, Zink, Aluminium und Magnesium. Einige derselben zeigen unsichtbare Linien von ausserordentlicher Stärke. Besonders gilt dies vom Zink, Cadmium, Magnesium, Aluminium und Blei, welches letztere, in einem sonst nicht merkwürdigen Spectrum, eine Linie enthält, die vielleicht die aller übrigen Metalle übertrifft. Andere Metalle zeigen in gewissen Theilen des Spectrums Linien, die sowohl hell als zahlreich sind, so dass, bei roher Ansicht des Ganzen, gewisse Theile des Spectrums hell und leidlich continuirlich, andere dagegen vergleichungsmässig schwach sind. Diese Gruppierung der Linien ist besonders merkwürdig beim Kupfer, Nickel, Kobalt, Eisen und Zinn. Von den erwähnten Metallen giebt das Magnesium bei weitem das

kürzeste Spectrum; es endigt in einer sehr hellen Linie, jenseits welcher jedoch ein ungemein schwaches Licht wahrgenommen werden kann bis zu einem Abstand eben so groß, wie die Ausdehnung der längeren Spectra. Das Aluminium andrerseits steht in Reichthum an Strahlen von sehr hoher Brechbarkeit an der Spitze der obigen Metalle; und es ist dieser Theil des Spectrums, zu welchen die oben erwähnten starken Linien gehören. Indem ich diese Linien starke nenne, ist dabei selbstverständlich einige Rücksicht auf ihre sehr hohe Brechbarkeit genommen. Denn wenn sie wie oben beschrieben beobachtet werden, erscheinen sie nicht absolut ganz so stark als die groben (*bold*) Linien des Zinks oder Kadmiums. Diefs rührt zum Theil von der mangelhaften Durchsichtigkeit des Quarzes her, welche sich für diesen Theil des Spectrums keineswegs vollkommen erweist. Und in der That kann die höchste Aluminium-Linie, welche eine Doppellinie ist, nur gesehen werden durch Strahlen, welche nahe am Rande durch das Prisma gehen.

Das Fig. 1, Taf. II zeigt die Hauptlinien des Aluminiums.

Außer der schon erwähnten Linse, wandte ich zuweilen in anderer Weise eine andere von  $\frac{1}{2}$  Zoll Durchmesser und  $2\frac{1}{2}$  Zoll Brennweite an, also eine große für ihre Brennweite. Diese gebrauchte ich zur Herstellung eines Bildes von dem Funken, welches von der zu untersuchenden oder zur Untersuchung des Funkens dienenden Substanz aufgenommen wurde. Der Unterschied der Brennweite ist bei den verschiedenen Strahlen so ungeheuer, daß wenn ein Theil des Spectrums im Brennpunkte ist, andere Theile ganz außerhalb desselben liegen, und so kann man einigermaßen die Brechbarkeit der Strahlen beurtheilen, durch welche irgend ein besonderer Effect hervorgebracht wird. Auf diese Weise kann man die Strahlen so concentriren, daß sich Effecte studiren lassen, die keine Untersuchung durch prismatische Analyse vertragen würden. Ich werde diese Linse, wegen ihrer Brennweite, die 2,5zöllige Linse nennen.

**Absorption der unsichtbaren Strahlen durch Alkaloide, Glucoside usw.**

Ehe man diese Substanzen untersucht, hat man sie aufzulösen und dabei zunächst auf die Durchsichtigkeit des Lösemittels zu sehen. Glücklicherweise ist das nützlichste aller Lösemittel, das Wasser, im Zustande der Reinheit durchsichtig; und, was Reagentien betrifft, so kann man Schwefel- oder Chlorwasserstoffsäure als Säuren anwenden, da sie durchsichtig sind, und Ammoniak als Alkali. Wenn ich eine Substanz durchsichtig nenne, so meine ich damit nur, daß ihre Durchsichtigkeit vergleichbar sey mit der des Quarzes. Was das Ammoniak betrifft, so absorbt es zwar, in Menge angewandt, die brechbareren Strahlen (wenn nicht die beobachtete Absorption von einer Unreinigkeit herrührte), aber in der kleinen Menge, in der allein man es anzuwenden braucht, kann es für durchsichtig gehalten werden. Selbst Alkohol, welcher in dem Zustande, in dem er zu haben ist, eine mangelhafte Durchsichtigkeit besitzt, ist hinreichend durchsichtig, um für die in Rede ste-

henden Substanzen als Lösemittel angewandt zu werden, sobald man denselben nur in geringer Dicke nimmt.

Die von mir untersuchten Alkaloide und Glucoside sind fast ohne Ausnahme intensiv opak, wenigstens für eine Portion der unsichtbaren Strahlen, welche sie mit einer Energie absorbiren, die meistens derjenigen vergleichbar ist, mit welcher Farbstoffe, wie Alizarin usw., die sichtbaren Strahlen absorbiren. Die Absorptionsweise ist auch häufig, ich möchte sagen gemeiniglich, höchst charakteristisch, so daß sie durch diese einzige Eigenschaft von einander unterschieden werden könnten. Ueberdies ändert sich häufig die Absorptionsweise entschieden, je nachdem die Lösung sauer oder alkalisch ist, was ebenfalls zu deren Unterscheidung dient.

Bei der Untersuchung gebrauchte ich gewöhnlich eine kleine Zelle mit Quarzwänden, zuweilen auch ein keilförmiges Gefäß, dessen gegeneinander geneigten Wände ebenfalls von Quarz waren. Nachdem die Zelle mit dem Lösemittel gefüllt worden, wurde eine kleine Menge der Substanz hineingeschüttet und unter bisweiligem Umrühren

man deren Absorption verwechselte mit der der untersuchten Substanz.

Alle metallischen Spectra sind discontinuirlich, was verhindert, die Absorptionsweise einer starren oder flüssigen Substanz ganz so gut zu beobachten, wie im Sonnenspectrum, abgesehen von dessen größerer Intensität; es stört sehr die Beobachtung schmaler Streifen, wie sie sich durch die Absorption gewisser Gase im sichtbaren Spectrum zeigen und von welchen das Chlorigsäure-Gas ( $\text{ClO}_2$ ) ein glänzendes System im unsichtbaren Theil des Sonnenspectrums darbietet. Fände in einem Theil des Spectrums, wo zuvor eine helle Liniegruppe mit schwächerem Licht an beiden Seiten bis zu gewissem Abstände sichtbar war, eine allgemeine Absorption statt, so ist klar, daß auf einer gewissen Stufe der Absorption die helle Gruppe isolirt gelassen würde, und man dann den Effect mit einem Maximum von Durchsichtigkeit verwechseln könnte. In zweifelhaften Fällen dieser Art ist es nöthig die Elektroden von einem anderen Metall zu nehmen und dessen Spectrum zu gebrauchen, doch ist practisch die Schwierigkeit nicht so groß, als man glauben könnte.

Es ist wünschenswerth ein Metall zu wählen, dessen Spectrum hell und mäßig continuirlich ist in der Region, in welcher die unterscheidenden Charaktere der Absorption am wahrscheinlichsten auftreten werden. Im Allgemeinen ziehe ich zur Untersuchung der hier betrachteten Substanzen das Zinn vor, und zwar als breite Elektroden (oder wenigstens einer breiten) aus folgenden Gründen. Das Zinn nämlich ist in der brechbarsten Region schwach, obwohl es nach einer langen Strecke von Schwäche eine ziemlich starke Linie zeigt, zwischen der zweiten und dritten starken Aluminiumlinie. Bei combinirter Stärke und Continuität eignet sich das Kupfer gut für die sehr brechbare Region, in welcher das Zinn schwach ist. Dagegen ist das Quecksilber, welches in der Form von amalgamirtem Zink angewandt werden kann, das reichste Metall für

die unsichtbare Region eben jenseits des sichtbaren Spectrums; doch habe ich fast ausschließlich Zinn angewandt.

Die Fig. 2 Taf. II giebt die in den Lösungen verschiedener Alkalotide und Glucoside beobachteten Absorptionsstreifen.

Es bezeichnet darin:

*a* die Hauptlinien des Zinks

*b* die Streifen im Strychnin

*c* " " " Brucin

*d* " " " Morphin

*e* " " " Codein

*f* " " " Narcotin

*g* " " " Narcein

*h* " " " Papaverin

*i* " " " Caffein

*k* " " " Corydalin

*l* " " " Piperin, in Alkohol

*m* " " " Aesculin

*n* " " " Phlorizin

gelöst in verdünnter Schwefelsäure

in verdünntem

Ammoniak



Die Messungen wurden genommen an den Punkten, wo das Licht aufhörte merklich zu seyn und in der Figur repräsentirt sind durch die Gränze des gleichförmigen Schwarz und schattirten Weisses. Die Schattirung repräsentirt nur den allgemeinen Effect; da die Abstufung der Helligkeit nicht aufgezeichnet worden ist. Sie dehnt sich in der Figur im Allgemeinen zu sehr gegen die Linke des Randes des ersten schwarzen Streifen aus, und repräsentirt demgemäfs die Absorption an jener Gränze nicht hinlänglich bestimmt.

Ein Blick auf die Figur zeigt, wie verschiedenartig die Strahlen von hoher Brechbarkeit durch die untersuchten Substanzen absorbirt werden. In der That würde dieses eine Kennzeichen zur Unterscheidung jeder dieser Substanzen von den andern dienlich seyn, nur nicht Morphin von Codein und Caffein von Salicin. Die punktirte Linie in der Figur fürs Aesculin bezeichnet den Anfang der Fluorescenz, welche bei der Linie *G* des Sonnenspectrums liegt. Eine Brucinlösung schneidet das unsichtbare Ende des Sonnenspectrums ungefähr mitten zwischen den Linien *S* und *T* ab, und demgemäfs nicht weit von dem Ende derjenigen Region, die, um gesehen zu werden, ein Prisma und eine Linse von Quarz erfordert. Wenn demgemäfs diese Substanzen im Sonnenlicht untersucht werden, sind ihre unterscheidenden Kennzeichen fast ganz unwahrnehmbar, indem die Lösungen einiger ganz durchsichtig erscheinen und die von andern nur die äufsersten Strahlen bis zu gröfserem oder geringerem Abstände fortnehmen. Nur beim Aesculin liegt das Maximum der Opacität innerhalb des Sonnenspectrum; allein selbst in diesem Fall erhalten wir nur eine schwache Idee von der grofsen Zunahme der Durchsichtigkeit aufserhalb desselben.

Die in der Figur abgebildete Wirkung der Säuren und Alkalien auf die Glucoside ist eine gleichförmige. Wenn eine zuvor neutrale Lösung alkalisch gemacht wird, beginnt die Absorption etwas früher, wenn sie sauer gemacht wird, etwas später. Beim Salicin ist nur eine Andeutung von

dieser Veränderung, die innerhalb der Grenzen der Beobachtungsfehler fällt; allein in anderen Fällen ist sie ganz wahrnehmbar, und beim Phlorizin ist die durch eine Säure bewirkte Verschiebung des Absorptionsstreifen sehr groß. Das Frasin (oder Pavin) stimmt in allen seinen optischen Eigenschaften merkwürdig mit dem Aesculin. Nur liegt das Absorptionsmaximum dem Roth etwas näher und die Farbe des fluorescirenden Lichts entspricht einer etwas geringeren mittleren Brechbarkeit.

Das Chinin zeigt kein entschiedenes Durchsichtigkeitsmaximum. Bei dieser und, mit einer Ausnahme, bei allen übrigen beobachteten Basen, wird die Absorption, wenn überhaupt verändert, in umgekehrter Weise wie bei den Glucosiden verändert, sobald man die Base durch Ammoniak in Freiheit setzt.

Absorptionsstreifen kommen auch bei neutralen Substanzen vor, z. B. beim Cumarin und Paranaphthalin; welches letztere ein System solcher Streifen in dem unsichtbaren Theil des Sonnenspectrums zeigt.

Aconitin, Atropin und Solanin zeigen keine Absorptionsstreifen, sondern nur eine allgemeine Opacität für die brechbareren Strahlen. Freilich ist das letztere, gelöst in verdünnter Schwefelsäure, merkwürdig transparent für diese Klasse von Körpern, während die Lösung, wenn die Base in Freiheit gesetzt ist, entgegen dem Verhalten bei anderen Basen, viel opaker wird, allein die Absorption ist

### III. Ueber das Magnetisiren der Stahlstäbe; von M. L. Frankenheim.

---

Bei den Mitteln, die man anwendet um einen Stahlstab vermittle eines Magnets zu magnetisiren, hat man vornehmlich zwei Punkte berücksichtigt: daß ein jeder Punkt des Stabes der zersetzenden Wirkung beider Pole ausgesetzt werde, und daß der dadurch erregte Magnetismus nicht wieder verloren gehe, wenn der magnetisirende Stab entfernt wird. Ein dritter, ebenfalls zu beachtender Punkt ist die Zeit. Man nimmt nun zwar fast allgemein an, daß der Magnetismus um so kräftiger sey, je länger der Stab der Wirkung des Magnets ausgesetzt war; aber über das Verhältniß der Wirkung zur Dauer der Erregung fehlt es bisher an jeder Beobachtung.

Um diese Frage zu beantworten haben die HH. Herrmann und Scholtz auf meine Veranlassung gemeinschaftlich eine Reihe von Beobachtungen gemacht und die Resultate in zwei Abhandlungen veröffentlicht:

*De naturali magnetismo in chalybem inducendo quanto momento sit tempus, auctor Rich. Herrmann. August 1863.*

*Quanti sit momenti tempus in magnetismo inducendo, certa quadam fluidi galvanici intensitate adhibita, auctor Rob. Scholz. December 1863.*

Die folgende Abhandlung beruht zum großen Theil auf diesen Untersuchungen. Indessen sind darin viele, theils von andern in meinem Laboratorium arbeitenden jungen Männern, theils von mir selbst gemachte Beobachtungen mit verarbeitet.

#### Das Verfahren.

Die magnetischen Untersuchungen an Stahlstäben werden durch die Unmöglichkeit, eine Beobachtung mit demselben Stabe zu wiederholen, sehr erschwert. In einem Eisenstabe, der aus der galvanischen Spirale genommen ist,

stellt sich der frühere Zustand in kurzer Zeit fast vollkommen wieder her. Ein Stahlstab wird dadurch auf die Dauer verändert. Wenn ihm durch eine vorsichtige Behandlung mit dem Anker und mit schwachen Magneten die Wirkung nach Außen auch fast vollständig genommen ist, so bleibt seine Fähigkeit Magnetismus anzunehmen dennoch von der anfänglichen sehr verschieden. Und wird er durch Erhitzung von allem Magnetismus befreit, so reicht der geringste Unterschied in der Härtung oder dem Anlassen hin, um ihn zu einem magnetisch andern Stabe zu machen.

Statt also, wie in weichem Eisen, die Beobachtungen an einem und demselben Stabe zu wiederholen und dadurch von individuellen Einflüssen zu befreien, muß man zu jeder Beobachtung an Stahl einen neuen oder neugeglühten Stab nehmen und um mittlere Werthe mit einiger Zuversicht aufstellen zu können, stets ihrer mehrere von möglichst gleicher Beschaffenheit besitzen.

Die magnetische Kraft der Stäbe wurde an einem mit Dämpfer versehenen Stahlspiegel gemessen. Die Entfer-

der Tangenten ankam, wurden die Scalen-Theile mit Hülfe einer Corrections-Tabelle auf die Tangential-*Verhältnisse* reducirt. Wo in der Folge von Ablenkungen die Rede ist, sind immer die *bereits reducirten*, den Tangenten proportionalen Größen gemeint.

Andere Correctionen, die sonst bei Spiegel-Ablesungen angewendet werden, sind den Fehlern gegenüber, welche aus der Ungleichförmigkeit der magnetischen Vertheilung und der Verschiedenheit der Stäbe selbst hervorgehen, ganz überflüssig.

Die Entfernung des Stabes vom Spiegel betrug je nach den Dimensionen und der Intensität zwei bis sieben Decimeter. Sie war bei allen zusammengehörigen Beobachtungen, deren Verhältnisse bestimmt werden sollten, genau dieselbe. Um eine angenäherte Vergleichung auch bei ungleicher Entfernung möglich zu machen, wurde bei gleichen Kräften die Ablenkung den Stäben der Entfernung proportional gesetzt, also die Kräfte dem Producte der Ablenkung und des Cubus der Entfernung. Ich habe mich überdies durch viele unmittelbare Versuche überzeugt, daß bei den Dimensionen der Apparate dadurch eine für den vorliegenden Zweck vollkommen genügende Annäherung erreicht wird.

Von den Stäben waren vier aus Gußeisen, cylindrisch, 62 Millim. lang, etwa 11,3 Millim. dick. Alle übrigen aus Rundstahl gleicher Art geschnitten, 11 Millim. dick und von verschiedener Länge, nämlich 50, 79, 100 und 150 Millim. Länge. Die Stäbe von 150 waren wahrscheinlich blau angelassen, von den übrigen besaß ich drei Arten: *weiche*, die nach dem Glühen langsam abgekühlt waren, *blau angelassene* und *glasharte*. Sie wurden entweder durch einen Hufeisen-Magnet oder eine galvanische Spirale magnetisirt

In dem letzten Falle wurde eine Tangenten-Busssole und ein Rheostat eingeschaltet; und da der Strom für die Busssole zu stark war, so wurde diese in eine Nebenleitung

gebracht, deren Verhältnisse zur Hauptleitung, in welcher sich die Spirale befand, bei allen zusammengehörigen Versuchen unverändert blieb. In die Spirale kam der immer etwas kürzere Stab, und die Kette wurde entweder geschlossen und geöffnet, während der Stab in der Spirale lag; oder der Stab wurde, während die Kette geschlossen blieb, in die Spirale eingeschoben und aus ihr entfernt. Die Zeit seines Verweilens in der geschlossenen Kette wurde genau gemessen.

Die hufeisenförmige Lamelle, deren wir uns gewöhnlich bedienten, trug etwa  $1\frac{1}{2}$  Kilogr., und wurde durch ein Blättchen Papier von etwa 0,044 Millim. Dicke, das ihr vorlag und ihre Berührung durch den Stab verhinderte, noch beträchtlich geschwächt. Aber ihre Wirkung war für die Versuche hinreichend und wurde durch das Papier, welches die Bewegungen des Stabes gleichförmiger machte, vor störenden Erschütterungen geschützt. Zu stärkerer Erregung diente ein kräftiger Hufeisen-Magnet, der gegen 25 Kilogr. trug.

Die Kraft, welche die Lamelle mit Papier durch wiederholtes Anlegen eines 50 oder 79 Millim. langen Stabes ertheilen konnte als Einheit gesetzt, war die Kraft, welche die Lamelle ohne Papier unter gleichen Umständen erregte,  $= 1,38$ .

Die cylindrischen Stäbe wurden der Lamelle, wenn nicht eine andere Lage angesetzt ist, wie ein Anker vorgelegt

Ein einmaliges Anlegen an einen Magneten oder eine Spirale mag ein *Impuls* heißen. Die Impulse unterscheiden sich also durch die Beschaffenheit des Erregers, der in Galvanismus oder in Stahl-Magnetismus bestehen konnte, durch dessen Intensität, durch die Art des Anlegens und besonders durch die *Dauer* desselben.

Der durch einen Impuls magnetisirte Stahlstab wurde an dem Spiegel beobachtet und dann in der Regel sogleich einem zweiten, dem ersten ganz gleichen Impuls unterworfen, dessen Wirkung ebenfalls am Spiegel beobachtet und damit so lange fortgeföhren, bis der Magnetismus nicht weiter stieg. Dieses von der Beschaffenheit der Impulse abhängige *Maximum* konnte natürlich durch Drehen oder Schieben des Stabes an der Lamelle oder Anwendung eines stärkern Magneten erhöht werden; als *absolute Maximum* wollen wir das magnetische Moment bezeichnen, welches durch Streichen an dem oben erwähnten starken Hufeisen-Magnete hervorgebracht werden konnte.

#### Die Wirkung des ersten Impulses.

Der erste Impuls war immer der kräftigste, die folgenden wirkten immer schwächer und in der Nähe des Maximums wurde der Erfolg unsicher, indem ein neuer Impuls den Magnetismus bald schwächer bald stärker machte, aber beides in so geringem Maafse, daß die Höhe des Maximums nur innerhalb sehr enger Gränzen unsicher blieb. Zuweilen hatten die Stahlstäbe, noch ehe sie dem Versuch unterworfen wurden, ein gewisses magnetisches Moment erlangt. Betrug dieses nicht über 0,02 von demjenigen, welches sie durch den ersten Impuls erlangten, so wurde als Wirkung des ersten Impulses die Differenz der vor und nach ihm gefundenen magnetischen Momente betrachtet. War der anfängliche Magnetismus größer, so wurde der Stab verworfen.

In der folgenden Tabelle sind die Stäbe nach ihrer Länge und ihrer Härte geordnet.

Die erste Spalte enthält die Nummer des Stabes,

die auch in den später anzuführenden Beobachtungen bleibt.

Die zweite Spalte enthält den Härte-Grad in den drei Stufen, weich (*w*), blau angelassen (*bl.*) und glashart (*h*).

Die dritte, die Art der magnetischen Erregung, (*G*) durch Galvanismus, (*L*) durch die Lamelle.

Die vierte, die Dauer der magnetischen Einwirkung in Sekunden; (*M*), wo sie momentan war.

Die drei (*a*) (*a<sub>1</sub>*) und (*m*) überschriebenen Spalten sind die Größen der reducirten Ablenkung, (*a*) für den ersten Impuls, (*a<sub>1</sub>*) für den zweiten, (*m*) die durch Wiederholung dieses Impulses erlangte höchste Intensität. Die Ablenkungen bei verschiedenen Stäben beziehen sich aber nicht immer auf dieselbe Entfernung, sind also nicht vergleichbar. In einigen Fällen, wo die Wirkung schon beim zweiten Impulse unregelmäßig war, oder das Maximum durch schnelle Wiederholung der Impulse, deren Wirkung nicht immer gemessen wurde, erreicht wurde, ist *a<sub>1</sub>* weggelassen.



No.	Härte	Erregungs- weise	Dauer	$\alpha$	$\alpha_1$	$m$	$\alpha : m$	$\alpha_1 : m$
7	M	L	1"	4,17	4,83	1,04	0,74	0,83
8	"	"	1	1,40	1,61	1,81	77	91
9	"	"	M	2,07	2,27	2,48	84	92
10	"	"	"	2,82	2,65	3,28	77	80
11	"	G	10"	1,83	—	2,31	79	—
12	"	"	M	2,14	—	2,70	79	—
13	A	L	2"	2,74	2,99	3,65	0,75	0,82
14	"	"	2	2,37	2,82	3,07	82	91
15	"	G	M	1,60	1,75	2,01	80	87
16	"	"	"	3,21	3,38	3,67	87	93
17	"	"	"	0,44	0,52	0,57	77	91

## 79 Millim. lange Stäbe.

1	"	G	M	2,32	2,54	2,80	0,80	0,88
2	"	"	"	2,05	2,24	2,51	82	90
3	"	"	"	2,22	2,51	2,73	81	92
4	M	G	3"	4,91	5,71	6,28	0,78	0,92
5	"	L	2	5,82	6,29	7,86	74	80
6	"	"	M	6,73	6,78	7,68	75	88
7	"	"	2"	8,43	9,58	10,80	78	89
8	"	G	M	2,46	2,79	3,31	74	84
9	A	G	M	4,31	4,76	6,37	0,80	0,89
10	"	"	"	5,54	6,12	6,73	82	90
11	"	"	5"	5,29	5,84	6,43	82	91

## 100 Millim. lange Stäbe.

1	"	G	5"	2,14	2,27	2,61	0,76	0,81
2	"	"	M	1,96	—	2,73	72	—
3	"	L	"	6,66	7,00	8,07	76	79
4	"	"	"	6,64	7,14	8,67	77	86
5	"	"	"	6,74	7,56	8,81	71	86
6	M	L	5"	5,20	5,64	6,37	0,82	0,89
7	"	G	5"	6,83	8,10	9,06	75	89
8	"	"	M	7,07	8,17	9,32	70	88
9	A	G	5"	8,83	9,76	11,03	0,91	0,89
10	"	"	M	8,39	8,94	10,15	83	92
11	"	"	"	5,87	6,18	7,18	82	90

## 150 Millim. lange Stäbe.

1	A	G	5"	7,07	7,74	8,62	0,82	0,90
2	"	"	5"	7,05	7,72	8,79	81	88
3	"	"	M	6,78	7,42	8,28	82	90

No.	Härte	Erre- gungs- weise	Dauer	$\alpha$	$\alpha_1$	$m$	$\alpha : m$	$\alpha_1 : m$
4	A	Q	M	7,06	7,78	8,53	0,83	0,91
5	"	"	5"	7,23	7,96	8,82	82	93
6	"	"	5"	7,65	—	9,32	82	—
7	"	"	M	7,90	—	9,81	82	—
8	"	"	"	7,56	0,26	9,57	75	83

Gusseiserne Stäbe, 61 Millim. lang.

1	A	L	5"	5,22	5,98	6,43	0,81	0,93
2	"	"	5"	3,72	—	4,76	78	—
3	"	"	5"	4,96	—	5,61	78	—
4	"	"	M	3,79	4,02	4,93	77	82

Resultate der Tabelle.

Ordnet man die Werthe von  $\alpha : m$  nach der Länge und Härte der Stäbe, der Art und Dauer ihrer Magnetisirung, so ergeben sich folgende *mittlere Werthe*.

Die mittlere Wirkung des ersten Impulses,  $\alpha : m$

Einfluss der Länge	Anzahl der Stäbe	Mani- mum	Mini- mum	Mittel
Stäbe von 50 Millim.	17	0,87	0,74	0,797
" " 79 "	11	82	74	761
" " 100 "	11	83	71	774
" " 150 "	8	83	75	811

Aus diesen Tabellen ergibt sich das interessante Resultat, daß das Verhältniß zwischen den magnetischen Wirkungen des ersten Impulses und des durch Wiederholung desselben erreichbaren Maximums nur innerhalb sehr engen Gränzen schwankt. Bei den durch Galvanismus magnetisirten Stäben ist diese GröÙe zwar  $\frac{1}{2}$  größer als bei den übrigen, aber dieser Unterschied rührt vermuthlich von dem Umstande her, daß die vielen Berührungen, welche zu dem durch die Lamelle hervorgebrachten Maximum nothwendig sind, in der Regel nicht genau dieselbe Kante des Stabes getroffen haben, so daß das Maximum dadurch etwas zu groß und der Einfluß des ersten Impulses, der natürlich nur eine Kante traf, verhältnißmäßig zu klein sind; und ich möchte daher den für die galvanisch magnetisirten Stäbe angegebenen Coëfficienten, vorausgesetzt, daß er für beide Methoden dieselbe GröÙe hat, für richtiger halten.

Was die Beschaffenheit der Stäbe betrifft, so findet zwischen Stäben verschiedener *Dimensionen* kein merklicher Unterschied statt; daß die Stäbe von 150 Millim. einen höhern Coëfficienten haben, rührt von ihrer Magnetisirung durch galvanische Spiralen her, da sie wegen ihrer Länge nicht füglich an die einander nahe stehenden Arme der Lamelle gelegt werden konnten.

Auch die *Härte* ist ohne entscheidenden Einfluß. Denn daß der Unterschied zwischen glasharten und weichen Stäben kein constanter ist, ergibt sich aus den blau angelassenen, deren Coëfficient kleiner ist, als die der übrigen, sowohl härteren als weicheren Stäbe. Für das spröde Gufseisen ergibt sich derselbe Werth.

Am merkwürdigsten ist jedoch das Resultat der letzten kleinen Tabelle. Das Verweilen des Stabes am Magneten oder an der Spirale bringt genau dieselbe Wirkung hervor es mag 5 Sekunden oder nur einen Moment, d. h. höchstens  $\frac{1}{2}$  Sekunde betragen haben. Es ist dieses um so auffallender, als die Zeit für den Magnetismus unleugbar

von großem Einflusse ist. Ich werde auf diesen Umstand noch später zurückkommen.

Ähnliche Resultate ergeben sich auch aus der Größe des zweiten Coëfficienten  $a_2 : m$ , nur daß hier, wo die Fehler bei der Beobachtung von  $a_1$  zu denen von  $a$  noch hinzutreten, die Abweichungen beträchtlicher sind.

Tabelle über die mittlere Wirkung des zweiten Impulses  $a_2 : m$ .

Einfluß der Länge.	Anzahl der Stäbe	Maxi- mum	Mini- mum	Mittel
Stäbe von 50 Millim.	14	0,93	0,86	0,871
„ „ 79 „	11	92	80	885
„ „ 100 „	10	92	79	869
„ „ 150 „	6	93	83	88
Einfluß der Härte.				
Weiche Stäbe	8	0,92	0,79	0,867
Blau angelassene Stäbe	16	92	80	865
Harte Stäbe	11	93	82	895
Guß Eisen	2	93	82	876

Papier angewendet. Allein in einigen Fällen war die Lamelle ohne Papier, also kräftiger und einige Male auch der Magnet stärker. Das Verhältniß der durch die erste Berührung erlangten Intensität zum Maximum, welches durch Wiederholung derselben Erregungsweise erlangt werden konnte, blieb stets innerhalb der Gränzen der in den Tabellen mitgetheilten Beobachtungen. Die magnetischen Kräfte der beobachteten Stäbe, man mochte die durch die kleine Lamelle oder die durch ein sehr kräftiges System von Hufeisen-Lamellen erregten Wirkungen vergleichen, verhielten sich etwa wie 1 : 40. Es hat daher die Annahme eine hohe Wahrscheinlichkeit für sich, daß die magnetischen Momente, welche der erste und der zweite Impuls in einem bisher nicht magnetisirten Stahl- oder Gufseisen-Stab erregen, zu dem Maximum, welches durch Wiederholung dieser Impulse zu erreichen ist, in einem constanten Verhältnisse stehen, welches unabhängig ist von den Dimensionen und der inneren Beschaffenheit der Stäbe und von der Beschaffenheit der Impulse, was ihre Dauer und Intensität betrifft und vermuthlich auch von der Art der Erregung; sie mag durch Magnete oder durch Galvanismus bewirkt werden.

In den Tabellen sind bloß zwei Impulse angegeben. Aber die Anzahl der beobachteten war weit größer, und mehrmals wurde die Wirkung eines jeden Impulses beobachtet, bis man überzeugt war, sich dem Maximum bis auf eine nicht mehr wahrnehmbare GröÙe genähert zu haben. Aber es war unmöglich die Reihe von Zahlen, die man dadurch erlangt, zu irgend einer brauchbaren Formel zu verwerthen. In Versuchen, bei denen alle Sorgfalt beobachtet war, fanden sich für die ersten und die folgenden Impulse die reducirten, d. h. den Momenten selbst proportionalen Ablenkungen:

8,39 9,34 9,66 9,71 9,90 . . . 10,15 Maxim.

7,07 8,17 8,84 8,73 9,15 . . . 9,32 Maxim.

8,88 9,76 10,08 10,43 10,27 10,31 . . . 11,03 Maxim.

In der ersten Reihe nahm die Intensität immer zu, aber die Differenzen

8,39 0,95 0,32 0,05 0,19 0,25

zeigen, daß die Regelmäßigkeit bald aufhört. In der zweiten und dritten Reihe wird das magnetische Moment durch neue Impulse bald vermehrt, bald vermindert, und namentlich da, wo man sich dem Maximum bis auf einige Tausendstel des Ganzen genähert hat, fehlt dieser Wechsel niemals und ist bei der großen Wirkung, den eine kleine Abänderung in der Art der Erregung hervorbringt, auch nicht zu vermeiden. Die Beobachtungsfehler, welche bei dem ersten und allenfalls auch bei dem zweiten Gliede verschwinden, gewinnen, je kleiner die Wirkung ist, welche ein neuer Impuls hervorbringen kann, einen größern Einfluß und machen bald jede Messung, wenigstens nach der von uns angewendeten Methode, vergeblich. Dieser Fehler trifft übrigens die Beobachtungen jeder Art von Stäben auf gleiche Weise, und der durch galvanische Spiralen erregte Magnetismus ist nicht regelmäßiger als der, welcher durch Anlegen an die Pole eines Magnets erregt wird.

Ueber das Verfahren beim Magnetisiren herrscht die

melle gebracht, und dieses so oft wiederholt als die Ablenkung noch dadurch vergrößert wurde.

Die folgende Tabelle enthält die Beobachtungen an den beiden ersten Impulsen und dem dadurch erreichten *entgegengesetzten* Maximum. Ihre Einrichtung ist der der vorhergehenden Tabelle gleich.

Die *vier* ersten Spalten enthalten die *Nummer* des Stabes, welche mit den oben gegebenen übereinstimmt, die *Härte*, die *Art* des Impulses, *G* oder *L*, je nachdem der Stab durch eine galvanische Spirale oder einen Stahl-Magneten magnetisirt war, und die *Dauer* der magnetischen Einwirkung.

In der *fünften* Spalte ist *m* die unmittelbar vor der Anwendung des ersten entgegengesetzten Impulses stattfindende *Intensität*.

Die *sechste* und *siebente* Spalte enthalten die Werthe *b* und *b<sub>1</sub>*, d. h. die reducirten Ablenkungen, welche die beiden ersten Impulse von entgegengesetzter Richtung aber sonst gleicher Beschaffenheit, hervorbrachten. *n* ist das durch die Fortsetzung dieser Impulse entstandene Minimum oder das Maximum in entgegengesetzter Richtung.

*b*, *b<sub>1</sub>* und *n* haben, wie die Beobachtungen zeigten, immer eine der von *m* entgegengesetzten Richtung und sind daher als negativ bezeichnet.

Wenn diese Beobachtungen sich denen der ersten Tabelle unmittelbar anschlossen, so war  $m_1 = m$ , das durch die angewandten Impulse erreichbare Maximum. Wurden sie jedoch Stunden oder Tage später angestellt, so war ein Theil des Magnetismus verloren gegangen und *m<sub>1</sub>* ist alsdann kleiner als *m*. Wo *m<sub>1</sub>* größer war als *m*, ist der Stab in der Zwischenzeit neuen magnetischen Erregungen ausgesetzt gewesen, die aber niemals bedeutend genug waren, um auf das Vorzeichen von *b* einzuwirken.

No	Härte	Erre- gungs- weise	Dauer	$m'$	$b$	$b_1$	$n$	$\frac{m'-b}{m'-n}$	$\frac{m'-b_1}{m'-n}$
----	-------	--------------------------	-------	------	-----	-------	-----	---------------------	-----------------------

## 50 Millim. lange Stäbe.

1	<i>w</i>	<i>G</i>	2"	1,67	-0,79	-0,96	-1,11	0,88	0,86
2	<i>M</i>	<i>L</i>	2	4,29	-0,28	—	-1,02	0,86	—
4	"	"	2	3,37	1,27	—	-2,59	79	—
5	"	"	2	5,10	1,66	-2,74	-3,95	75	0,87
8	"	"	1	2,10	1,30	—	-1,90	85	—
9	"	"	<i>M</i>	2,46	1,55	-1,75	-2,09	88	93
10	"	"	"	3,26	1,87	-2,17	-2,72	86	90
13	<i>k</i>	<i>L</i>	2"	3,66	-2,06	-2,44	-3,11	0,84	0,85
15	"	<i>G</i>	<i>M</i>	2,01	0,60	—	-1,07	85	—
16	"	"	"	3,61	1,10	-1,21	-1,81	87	■

## 79 Millim. lange Stäbe.

1	<i>w</i>	<i>G</i>	<i>M</i>	2,80	-1,36	-1,60	-1,81	0,90	0,96
2	"	"	"	2,51	-1,28	-1,70	2,00	84	93
3	"	"	"	2,73	-1,40	-1,62	1,66	90	95
4	<i>M</i>	<i>G</i>	5"	6,28	-2,80	-3,46	-3,67	0,91	0,98
5	"	<i>L</i>	2	7,86	-3,75	-4,30	-5,47	87	91
6	"	"	<i>M</i>	7,68	-2,46	-3,34	-4,28	84	92



No.	Härte	Erre- gungs- weise	Dauer	$m'$	$b$	$b_1$	$n$	$\frac{m'-b}{m'-n}$	$\frac{m-b_1}{m'-n}$
1	A	L	5''	6,43	-4,07	-4,77	-5,98	0,85	0,90
2	»	»	5	4,76	2,25	—	3,39	87	—
3	»	»	5	5,61	3,33	—	4,80	86	—
4	»	»	M	4,93	2,54	3,19	4,02	83	91

#### Resultate der Tabellen.

Es war längst bekannt, daß der durch Streichen erregte Magnetismus weit leichter zerstört wird als er erzeugt war, und daß wenige Striche hinreichen sogar eine entgegengesetzte Polarität hervorzubringen. Dieses wird durch die Tabelle in so weit bestätigt, als ein einziger Impuls hinreicht die Polarität in Stäben umzukehren, welche durch eine beliebige Anzahl entgegengesetzter Impulse erregt worden war. Es versteht sich, daß dieser Impuls, wenn er schwächer war wie die frühern, diese Wirkung nicht in gleichem Maasse hervorbringen konnte. Ob der Impuls in der Wirkung eines Stabmagneten oder einer Spirale besteht, ist gleichgültig.

Die folgenden Impulse erhöhen natürlich die Intensität dieses Magnetismus, aber niemals liefs sich durch die Wiederholung derselben eine der früheren gleiche Kraft erlangen. Ueber das Verhältniß dieser beiden Maxima  $m$  und  $n$  läfst sich bei der grossen Verschiedenheit derselben kein brauchbares Resultat aus der Berechnung der mittleren Werthe erwarten. Dasselbe gilt auch von den Verhältnissen  $b:n$  und  $b_1:n$ .

Einen besseren Erfolg gewährte die Berechnung von  $\frac{m'-b}{m'-n}$  und  $\frac{m'-b_1}{m'-n}$ . Ich ging dabei von folgender Ansicht aus. Wenn ein noch nicht magnetisirter Stab einen Impuls empfängt, so erlangt er einen Magnetismus, der zu dem durch solche Impulse erreichbaren in einem constanten Verhältnisse steht, das wir beinahe  $= 0,80$  setzen können. Bei der Umkehrung der Polarität ist die gesammte erreichbare Veränderung  $m' - n$ , wenn  $n$  in derselben Richtung,

also bei entgegengesetzter Polarität negativ genommen wird. Durch den ersten Impuls wird die Veränderung  $m' + b$  bewirkt, das Verhältniß ist also  $\frac{m' + b}{m' + n}$ . Durch den zweiten Impuls steigt die Veränderung auf  $m' + b_1$ , und das Verhältniß auf  $\frac{m' + b_1}{m' + n}$ . Diese Größen entsprechen also den Größen  $\frac{a}{m}$  und  $\frac{a_1}{m}$  der vorhergehenden Tabellen.

Es finden sich für  $\frac{m' - b}{m' - n}$  folgende mittlere Werthe:

Einfluß der Länge.	Anzahl der Stäbe	Maximum	Minimum	Mittel
Stäbe von 50 Millim	10	0,88	0,75	0,843
" " 79 "	8	91	84	880
" " 100 "	9	91	74	839
" " 150 "	8	93	82	881
Einfluß der Härte				
Weiche Stäbe	8	0,90	0,76	0,840
Blau angelassene Stäbe	12	91	74	835
Glasharte Stäbe	7	91	84	876
Gußeiserner Stäbe	4	83	87	852
Einfluß der Magnetisirung				
Durch Galvanismus	20	0,93	0,74	0,860

Einfluss der Härte.	Anzahl der Stäbe	Maxi- mum	Mini- mum	Mittel
Weiche Stäbe	8	0,95	0,80	0,899
Blau angelassene Stäbe	9	98	84	916
Glasharte Stäbe	6	95	89	920
Gusseiserne Stäbe	2	91	90	905
Einfluss der Magnetisirung.				
Durch Galvanismus	21	0,95	0,83	0,920
Durch Stahl-Lamellen	11	93	80	892
Einfluss der Dauer.				
5 Sekunden	11	0,98	0,88	0,922
2 Sekunden	4	95	87	905
2 Sekunden und darüber	15	95	87	917
momentan	17	95	80	904
Alle Stäbe, mittl. Werth	32	0,98	0,80	0,905

Die mittleren Werthe für  $\frac{m' - b}{m' - n}$  und  $\frac{m' - b_1}{m' - n}$  führen also insofern zu denselben Resultaten, wie die in der früheren Tabelle mitgetheilten von  $\frac{a}{m}$  und  $\frac{a_1}{m}$ , als auch bei ihnen die Dauer des magnetischen Impulses, von der momentanen an bis zu der von 10 Sekunden, ganz ohne Einfluss ist. Der Unterschied zwischen Stäben von verschiedenen Dimensionen und Härte-Graden ist in Betracht der grossen Differenz zwischen den Extremen sehr klein; er würde noch kleiner geworden seyn, wenn ich die von den mittleren Werthen entfernten Beobachtungen hätte weglassen wollen.

Nur die Art der Magnetisirung hat dem Anscheine nach einigen Einfluss, indem die Werthe  $\frac{m' - b}{m' - n}$  und  $\frac{m' - b_1}{m' - n}$  für Galvanismus etwas grösser sind als für den Magnetismus durch Stahl, wie es auch bei  $\frac{a}{m}$  und  $\frac{a_1}{m}$  der Fall war. Aber auch dieser Unterschied würde vielleicht verschwinden, wenn die Stäbe immer genau mit derselben Kante an den Magneten gelegt, und vor jeder Drehung geschützt werden könnten.

Ich will die hierher gehörigen mittleren Werthe der vier bisher betrachteten Gröſsen noch einmal zusammenstellen.

	Erste Magneti- sation		Umkehrung der Pole	
	$a : m$	$a_1 : m$	$\frac{m'-b}{m'-n}$	$\frac{m'-b_1}{m'-n}$
Durch die Spiralen	0,801	0,885	0,880	0,920
Durch die Lamellen	0,777	0,861	0,841	0,892
Für sämtliche Stäbe	0,789	0,873	0,851	0,906

Diese Werthe sind, von kleinen Störungen abgesehen, wahrscheinlich unabhängig von den Dimensionen und der Beschaffenheit der Stäbe, so wie von der Intensität und Art des Impulses.

Der erste Impuls bringt also etwa  $\frac{1}{2}$  der Wirkung hervor, welche überhaupt durch die Wiederholung dieser Impulse zu erreichen ist. Ein durch seine Einfachheit sich auszeichnendes Gesetz für die Wirkung späterer Impulse

noch einen Rest von 0,127 und 4 bis 5 Impulse reichen zu einer genügenden Annäherung an das Maximum nicht hin.

Ferner würden  $\frac{m'-b}{m'-n} = \frac{a}{m}$  und  $\frac{m'-b_1}{m'-n} = \frac{a_1}{m}$  seyn müssen, was ebenfalls nur sehr entfernt mit den Beobachtungen übereinstimmt.

Zur Thätigkeit des Magnetismus, wenn sie auch im Wesentlichen auf jenem Gesetze beruhen sollte, treten also jedenfalls noch andere Einflüsse hinzu, welche die Wirkung beträchtlich modificiren. Wir glauben sie in einer Art *molecularer* Bewegung der magnetischen Theile zu finden, die ganz im Gegensatz zu der bisher betrachteten im hohen Grade von der Zeit und von andern auf die Anordnung der Theile einwirkenden Ursachen abhängig ist.

#### **Einfluß von Erschütterungen auf den Magnetismus der Stahlstäbe.**

Dafs die Hindernisse, welche moleculare Kräfte der Herstellung eines mechanischen Gleichgewichts eines Körpers bereiten, durch Erschütterung desselben leichter beseitigt werden, ist eine alte Erfahrung. Aehnliches ist auch im Gebiete des Magnetismus bekannt. Wertheim, Wiedemann und Andere haben interessante Versuche über den Einfluß der Torsion und anderer Arten von Erschütterungen angestellt, auch solcher, welche den Molecularzustand des Eisens bleibend verändern.

Die Erschütterungen, die wir untersucht haben, liefsen keine bleibenden Veränderungen im Stabe zurück. Es waren Schläge mit einem hölzernen Hammer, deren Intensität ich der Kraft eines von etwa 30 Centimeter herabgefallenen Gewichtes von 400 Grammen gleich schätze. Sie folgten auf einander in Perioden von  $\frac{1}{2}$  Sekunde, also in 5 Sekunden fielen ihrer zehn.

Ein auf sein *Maximum* magnetisirter Stab, der, während er der Lamelle anlag, erschüttelt wurde, *veränderte sich nicht*. War er aber nicht gesättigt, so stieg sein Magnetismus.

Ein 50 Millim. langer Stab, dessen Kraft = 35,9 war,

erhielt, während er wie ein Anker an den Polen der Lamelle lag, 10 Schläge binnen 5 Sekunden; er stieg auf 37,0, also um 0,031.

Von neuem erschüttert stieg er auf 37,4, also im Ganzen um 0,042.

Bei einem andern Stabe von 50 Millim. Länge und einer Kraft  $= 39,9$  betrug das Steigen 0,022.

Ähnliche Verstärkungen wurden bei mehreren andern Stäben ohne Unterschied der Härte gefunden. Die Erschütterungen erhöhten zwar nicht das Maximum, welches auch durch bloßes Anlegen an die Lamelle erreicht worden wäre; aber sie beschleunigten es, indem eine Wirkung, welche sonst erst nach einer längern Zeit eintreten würde, durch die Erschütterung sogleich hervorgerufen wird. Je langsamer das Maximum erreicht wird, desto wirksamer ist die Erschütterung. Dieses ist z. B. bei dem Umkehren der Polarität, wo das Maximum später eintritt, als bei der ersten Magnetisirung der Fall; hier sind daher die Schläge, welche auf den Stab geführt werden, während er der La-

In den folgenden Versuchen trafen die Erschütterungen einen Stab, der abwechselnd der Lamelle bald anlag, bald davon entfernt war. Die Wirkung war, wie erwähnt, namentlich da beträchtlich, wo die anfängliche Polarität umgekehrt war.

Ein Stab von 50 Millim. hatte die Kraft	50,4;	
an der Lamelle liegend erschüttert	51,0	Diff. +0,06;
in entgegengesetzter Lage angelegt	—30,0;	
stieg durch Schläge auf ein Polende	—34,6	„ +0,46;
Von der Lamelle entfernt und auf einem Holzblock liegend je 8mal geschlagen sank er nach und nach auf:		
30,3 28,3 27,5 26,4 26,0		
von neuem angelegt . . . . .	—34,0;	
erschüttert . . . . .	—37,0.	
Ein anderer Stab von 39,9 Kraft. gab		
umgekehrt angelegt . . . . .	—24,0;	
nach 4 Erschütterungen am Magnet	25,8	Diff. + 1,8;
angelegt und nicht erschüttert . .	26,4	„ 0,6;
angelegt und erschüttert . . . .	27,7	„ 1,3;
vom Magnet entfernt, erschüttert .	20,8	„ — 6,9;
angelegt und erschüttert . . . .	31,7	„ +10,9.

Man sieht an diesen Versuchen, wie bedeutend die Erschütterung sowohl stärkend als schwächend wirken kann, und wenn bei ihnen auch immer 8 bis 10 Schläge angewendet wurden, so haben einige Versuche mich überzeugt, daß auch ein einziger schon eine für unsere Apparate merkliche Wirkung hervorbringen kann.

Um den Einfluß der *Drehung* des Stabes an den Polen kennen zu lernen, wurde der Stab entweder (a) an eine Seitenlinie gelegt, oder er wurde (b) am Magneten gedreht.

Durch das erste Anlegen erlangte er die Kraft 10,0, also:

a	b	a	b	a	b
18,0	19,2	19,2	20,6	20,4	21,2.

Obgleich das bloße Anlegen zuweilen keine Stärkung, ja eine Schwächung hervorbringt, hat die Drehung stets eine beträchtliche Stärkung des Magnetismus zur Folge.

Die Maxima beim Anlegen mit einer Kante und beim Drehen verhielten sich wie 1 zu 1,25 bis 1,27 und sogar ein geringes, etwa  $\frac{1}{10}$  des Umfanges betragendes Drehen erhöht das Maximum schon um 1,04 bis 1,07.

Auch wenn man bei wiederholtem Anlegen die Kante wechselt, erhält man ein größeres Maximum, als wo dieses unterbleibt. Man muß also, wenn man die Wirkung eines einmaligen Anlegens mit dem diesem entsprechenden Maximum vergleichen will, sehr sorgfältig verfahren und ich habe schon oben erwähnt, daß die Unterschiede der Coefficienten  $\frac{a}{m}$  usw. (S. 56 und 65) zwischen Stäben, die durch die Spirale und durch die Lamelle magnetisirt sind, wahrscheinlich von diesem Umstande herrühren.

Auch das *Schieben* des Stabes an den Polen der Lamelle bringt eine Erhöhung des Magnetismus hervor. Sie betrug bei Stäben von 50 Millim. Länge 1,4 bis 1,5.

Daß es bei diesen Versuchen nicht bloß die Annäherung aller Theile eines Querschnitts an die Pole der Lamelle, sondern auch die während der magnetischen Wir-



und schiebt ihn an dem Magneten hin und her. Aber mit dieser Manipulation, welche jeden Punkt der Oberfläche den Polen des Magnets möglichst nahe bringt, erfüllt man zugleich unbewusst eine zweite zum Gelingen führende Bedingung. Man bringt eine Erschütterung hervor, welche, wenn sie das Maximum auch nicht erhöht, doch das Eintreten desselben beschleunigt.

Bei dem Magnetisiren durch einen Elektromagneten, bei dem das Streichen gewöhnlich nicht zulässig ist, ist es daher zweckmäßig, den Stab, während er den Polen anliegt, stark zu erschüttern und die Wirkung durch wiederholtes Oeffnen der Kette zu unterbrechen.

Die spontanen Veränderungen in dem Magnetismus von Stahlstäben.

Neben den raschen Veränderungen, welche ein Magnet durch seine Annäherung oder Entfernung im Stabe hervorbringt, und den ebenfalls schnell eintretenden Wirkungen einer Erschütterung findet noch eine andere Steigerung oder Schwächung des Magnetismus statt, deren laugsames Fortschreiten in einem schroffen Gegensatze steht zu der fast gänzlichen Bedeutungslosigkeit der Zeit beim Magnetisiren.

Es ist, seitdem man Hufeisenmagnete mit starker Belastung construirt, bekannt, daß ihre Anker nach und nach bis zu einer gewissen Gränze stärker belastet werden können. Die Anziehungskraft zwischen Magnet und Anker nimmt also mit der Zeit zu. Es erlangt ferner ein Stab von Stahl oder Eisen einen stärkeren Magnetismus, wenn er an einem Magnete Tage, als wenn er ihm Stunden angelegen hatte.

Eine andere nicht minder bekannte Beobachtung ist an den zur Sättigung magnetisirten Stahlstäben gemacht worden, welche durch bloßes Liegen, ohne daß eine Störung durch Temperatur-Wechsel oder durch die Erde oder andere Magnete hatte stattfinden können, einen Theil ihrer Kraft allmählich verlieren und erst nach längerer Zeit ein constantes magnetisches Moment erlangen. Aber über die

Länge dieser Zeit im Verhältniß zur Abnahme fehlen alle Beobachtungen. Auch ist bei allen hierher gehörigen Beobachtungen nicht untersucht worden, welcher Theil der Abnahme der bloßen Zeit und welcher der weit kräftigeren Ursache, den Erschütterungen, angehört. Man pflegt auch anzunehmen, daß bei einem nicht gesättigten Stabe dieser Verlust weniger zu fürchten sey.

Wenn Magnete mit ihren gleichnamigen Enden auf einander gelegt werden, so tritt eine starke Schwächung ihrer Kraft ein. Sind es z. B. Hufeisen-Lamellen, welche zur Bildung eines kräftigen Magneten über einander geschichtet werden, so wird eine Lamelle um so mehr an Kraft verlieren, als sie mehr nach innen liegt. Diese Schwächung ist jedoch größtentheils eine der momentan auftretenden Wirkungen der Magnete.

Beobachtungen über den allmählichen Verlust an Kraft, den Magnetstäbe bloß durch innere Ursachen erleiden, wurden auf die Weise angestellt, daß man den Stab in eine passende Entfernung vom Magnetspiegel brachte und

Die *Zeiten* sind von dieser ersten Beobachtung an gerechnet, die so schnell als möglich auf die Magnetisirung selbst, etwa 2 bis 3 Minuten später, erfolgte.

Die Beobachtungen sind in zwei Tabellen vertheilt. Die *erste* enthält zunächst diejenigen, welche in den ersten Minuten nach der Magnetisirung angestellt sind. Der Uebersicht wegen sind dieser auch einige Angaben über längere Intervalle beigelegt. Die *zweite* Tabelle enthält die Decremente für Stunden und Tage. Diese längeren Zeiträume sind nur angenähert, so daß für 45 und 80 Minuten eine Stunde, für 20 und 30 Stunden ein Tag gesetzt ist.

Das Zeichen *m* in der zweiten Tabelle bedeutet, daß der Stab an einem sehr starken Magneten zur *Sättigung* magnetisirt war.

Die *Härte* ist wie früher in drei Stufen angegeben: *weich* (*w*), *blau* angelassen (*bl*) und *glashart* (*h*). Der weichen sind zufällig sehr wenige.

Einen Unterschied zwischen den durch *Spiralen* oder *Lamellen* erregten Stäben hervorzuheben zeigte sich hier als ganz überflüssig. Sie verhielten sich vollkommen gleich.

Die Ablesungen selbst bestehen in Zahlen zwischen 20 und 100, fast immer zwischen 40 und 70. Die Einheit bedeutet also schon einen Unterschied von etwa 0,002. Treten dazu die noch aus andern Quellen herrührenden Beobachtungsfehler, so darf man sich über beträchtliche Abweichungen nicht wundern. Ich habe keine Beobachtung bloß deshalb ausgeschieden, weil sie von den übrigen zu sehr abgewichen wäre.

Für eine jede Beobachtungs-Reihe ist in der *Kraft* überschriebenen Spalte die Intensität verzeichnet, welche der Stab bei der ersten Beobachtung hatte. Wenn ein Stab in mehreren Reihen vorkommt, war sein Magnetismus durch das Anlegen an eine Spirale oder Lamelle verstärkt oder geschwächt worden. Die in der Reihe angegebene Kraft ist immer diejenige, welche unmittelbar nach jener Veränderung beobachtet wurde und dann weiter abnahm.

Tabelle I.

Decremente in Minuten und Stunden.

No.	Kraft	Zeit 4-6 Minut.	De- cre- mente	Zeit 7-12 Minut.	De- cre- mente	Zeit 12-20 Minut.	De- cre- mente	Zeit 1 Stunde	De- cre- mente
50 Millim. lange Stäbe									
■	22,5	5'	0,001	—	—	—	—	—	—
	24,9	5	001	—	—	—	—	—	—
	47,4	—	—	—	—	—	—	1	0,015
14	29,4	4'	—	7'	0,004	—	—	2	0,015
	32,3	4	0,000	11	004	19	0,018	2	025
	34,0	4	007	12	007	—	—	1	014
	34,5	4	003	—	—	—	—	1	017
	35,4	4	003	7	003	—	—	5	013
	39,6	4	003	—	—	—	—	24	013
18	27,4	6'	0,004	—	—	—	—	24	0,031
	29,8	—	—	7'	0,000	14'	0,004	1	020
	36,0	—	—	■	008	■	008	1	011

Tabelle II.

Decremente in Stunden und Tagen.

No.	Härte	Kraft	Sättigung	Decremente in Stunden			Decremente in Tagen	
				1	2	3	1	2
50 Millim lange Stäbe.								
2	W	14,1	—	—	—	—	0,012	—
		26,9	—	0,016	—	—	—	—
1	W	7,75	—	—	—	—	0,009	—
		47,4	—	—	—	—	015	—
3	M	47,4	—	0,015	—	—	—	—
		62,1	—	046	—	—	—	—
		60,8	—	—	0,015	—	—	—
6	M	27,6	—	—	—	0,013	—	—
		29,5	—	—	—	—	0,075	—
9	M	18,5	—	—	—	—	0,038	—
		27,0	—	—	—	0,026	028	—
		32,4	—	—	—	—	020	—
18	M	27,6	—	—	—	0,026	0,031	0,031
		29,8	—	0,020	—	0,026	—	—
		31,2	—	—	—	—	019	—
		32,1	—	—	—	016	018	—
		32,3	—	022	—	—	028	—
		36,0	—	015	—	—	015	—
		120,8	—	—	0,027	—	—	—
		53,1	—	—	—	—	018	—
13	A	43,5	—	—	—	—	0,021	—
		43,3	—	0,021	—	—	024	—
		53,5	—	—	—	—	020	0,022
		31,2	—	—	0,019	—	016	—
		36,3	—	—	—	—	—	022
		90,3	—	—	012	—	—	—
		53,5	—	—	028	—	013	016
14	A	30,4	—	—	0,015	—	—	—
		31,2	—	—	—	—	0,016	—
		32,3	—	—	025	—	032	—
		34,0	—	0,014	017	—	024	033
		34,5	—	017	—	—	—	023
		35,0	—	—	—	—	—	013
		30,4	—	—	—	—	—	013

No.	Härte	Kraft	Sätti- gung	Decrements in Stunden			Decrements in Tagen	
				1	2	3	1	2
70 Millim. lange Stäbe.								
5	H	41,0	—	—	—	—	0,050	—
		54,1	—	—	—	—	040	—
		90,3	—	0,023	—	—	—	—
		125,0	—	—	—	—	013	—
7	H	106,0	—	—	—	—	0,030	—
		236,5	—	—	—	—	015	—
13	H	90,3	—	—	0,027	—	0,027	—
		97,0	—	—	013	—	013	—
		99,9	—	—	—	—	022	0,023
		103,3	—	0,014	—	—	011	—
		104,5	—	—	013	—	014	—
		106,7	—	—	—	—	013	—
		108,2	—	—	—	—	026	—
		82,5	—	0,036	—	—	035	—
14	H	82,5	—	—	—	—	0,037	—
		90,3	—	—	—	—	027	—
		91,0	—	—	—	—	033	—

No	Härte	Kraft	Sätti- gung	Decremente in Stunden			Decremente in Tagen	
				1	2	3	1	2

## 100 Millim. lange Stäbe.

1	m	228,8	m	0,008	—	—	—	—
7	M	125,2	—	—	—	—	0,014	—
15	M	158,6	—	—	—	0,014	—	—
		468,9	m	—	—	—	0,019	—
		— 45,7	—	—	—	014	028	—
		— 92,0	—	—	—	—	017	—
18	M	127,9	—	—	—	—	0,021	—
		418,6	m	—	—	—	020	—
		— 41,8	—	—	0,023	—	—	—
9	A	549,4	m	0,015	—	—	—	—
10	A	521,6	m	022	—	—	—	—
11	A	193,9	—	—	—	—	0,032	—
		538,2	m	013	—	—	—	—
13	A	524,5	m	—	0,034	—	0,028	—
		— 42,7	—	—	—	—	036	—
		418,3	—	—	—	—	020	—
14	A	410,6	—	—	0,023	—	0,020	—
		427,9	—	—	—	—	020	—
		525,8	m	0,030	—	—	—	—

## 150 Millim. lange Stäbe.

1		1143	m	0,032	—	—	—	—
3		1046	m	034	—	—	—	—
5		903	m	018	—	—	0,030	—
6		1096	m	017	—	—	—	—
7		1192	m	015	—	—	—	—
8		1238	m	015	—	—	020	—

## Resultate aus den Tabellen.

Aus diesen Beobachtungen ergibt sich also für einen keiner Erschütterung ausgesetzten Stab eine nur sehr geringe Abnahme der Kraft. Wenn man einen von einem Magneten neu erregten Stab, wie einen neuen betrachtet und demnach den mittleren Werth des Decrementes berechnet, so beträgt dieses nach der ersten Tabelle, von der ersten nach der Magnetisirung gemachten Beobachtung an gerechnet

Zeit	Zahl der Beobachtungen	Maximum	Minimum	Mittlerer Werth
4 — 6'	III	0,007	0,000	0,0028
7 — 12'	18	0,009	0,000	0,0045
12 — 19'	II	0,018	0,003	0,0070
1 Stunde	9	0,020	0,000	0,0177
2 Stunden	6	0,013	0,027	0,0178

Diese Tabelle enthält nur sieben Stäbe, ein jeder mit einer bis sieben Beobachtungs-Reihen. Das Resultat wäre jedoch nicht sehr verschieden gewesen, wenn man das Gesamtmittel aus den Mittelwerthen der Stäbe berechnet hätte.

Aus der zweiten Tabelle ergeben sich folgende Werthe:

	1 Stunde	2 Stunden	3 Stunden	1 Tag	2 Tage
weich	0,012 <sup>2</sup>	—	—	0,012 <sup>3</sup>	—
	11	7	7	30	4



Gesamtmittel enthaltenden Reihe sind für die Zeiträume von einer Stunde bis zwei Tage

0,020 0,023 0,019 0,028 0,021,

obgleich ein längerer Zeitraum nicht kleinere Zahlen haben kann als ein kürzerer. Auch stimmt die zweite Tabelle in den Decrementen für die ersten beiden Stunden mit der ersten nicht überein: hier 0,018 für beide Stunden, dort 0,020 und 0,022. Die Anzahl der Beobachtungen reichte offenbar nicht hin, um die individuellen Unterschiede in den Mittelwerthen auszugleichen.

Die Beobachtungen können ferner leicht durch Erschütterungen fehlerhaft werden, welche zwar nie so bedeutend werden können, wie bei den oben angeführten Versuchen mit Hammerschlägen, jedoch hinreichen, die Verhältnisse der schwachen Decremente in merklicher Weise zu verändern. Unstreitig rühren einige sehr hohe Decremente, besonders nach längeren Zeiträumen, von dieser Ursache her.

Die Decremente steigen von dem Moment der Magnetisirung an allmählich bis zum Intervall von 20 Minuten. Die Veränderungen, welche der Stab in den ersten 2 bis 3 Minuten erfährt, bleiben natürlich unbekannt; aber nach dem Gange, den sie nehmen, ist es wahrscheinlich, daß das Decrement anfangs der Zeit proportional, allmählich constant wird, daß also die Curve, welche die Zeit als Abscisse und die Decremente als Ordinate genommen, den Gang der Veränderungen ausdrückt, sich anfangs zur Abscissen-Linie in einem, wie wir sehen werden, unter vielen Umständen gleichen Winkel neigt und ihr bald parallel wird. Dieses ist schon am Ende der ersten Stunde beinahe vollständig der Fall. In der ersten Tabelle ist die Decrescenz nach zwei Stunden nicht größer als nach der ersten Stunde und in der zweiten Tabelle finden sich für die längeren Zeiträume fast eben so oft kleinere als größere Werthe, ein Zeichen, daß sie nahe constant sind und zwar etwa  $\approx 0,05$  der Kraft betragen.

Die Härte der Stäbe scheint nur geringen Einfluß auf die Decremente zu üben. Von weichen Stäben sind die

Beobachtungen nicht zahlreich genug. Die *blat angelassenen* haben zwar nach zwei Stunden eine kleinere Abnahme erfahren, aber nach zwei Tagen eine grössere als die harten Stäbe. Auch die 150 Millim. langen Stäbe zeigten keinen entscheidenden Unterschied.

Was die *Sättigung* betrifft, so sollte man erwarten, daß je näher der Stab seinem Maximum steht, desto größer der Verlust seyn müsse. Aber was wir schon bei anderen Gelegenheiten haben nachweisen können, bestätigt sich auch hier. Die Sättigung übt keinen durch unsere Beobachtungen nachweisbaren Einfluß aus. Die mit *m* bezeichneten Stäbe der zweiten Tabelle waren durch Streichen mit einem sehr kräftigen Magneten so stark magnetisirt wie möglich, und dennoch weicht die Decrescenz nur wenig von derjenigen der übrigen Stäbe ab, die meistens von der Sättigung weit entfernt waren. Wenn also die Abnahme der magnetischen Kraft von dem Grade der Sättigung oder der Härtung abhängen sollte, so beträgt der Unterschied höchstens 0,1 bis 0,2 von der Abnahme selbst.

$\frac{1}{2}$  seiner Kraft verloren hatte, einen fast constanten Zustand annimmt: so sollte man erwarten, daß der Magnetismus nunmehr so fest haften müßte, daß, wenn er durch Anlegen an einen Magneten auch etwas verstärkt wird, das Decrement allenfalls nur den geringen Gewinn treffen könnte, den es durch den neuen Impuls erlangt haben mochte, aber keineswegs die ganze schon seit mehreren Stunden in ihm befestigte magnetische Kraft. Aber so ist es nicht. Der Stab hat jetzt ein Decrement, das dem frühern nicht nachsteht, und sein Magnetismus zeigt keine höhere Festigkeit als bei der ersten Magnetisirung.

Man könnte glauben, daß durch den neuen Impuls, so gering auch seine endliche Wirkung seyn mochte, der gesamte magnetische Zustand des Stabes aufgeregt und erneuert wurde. Es würde dann auch die seltsame Erscheinung erklärt seyn, daß ein durch wiederholte Impulse zu seinem relativen Maximum gelangter Stab durch einen neuen Impuls, statt verstärkt zu werden, gar nicht selten geschwächt wird.

Die Stäbe, deren Decremente in den Tabellen mitgetheilt sind, waren alle so magnetisirt, daß der Indifferenzpunkt fast genau in der Mitte lag, indem die kleineren Stäbe symmetrisch an die Lamelle gelegt waren und die Stäbe von 150 Millim. entweder durch galvanische Spiralen oder auf gewöhnliche Weise durch Streichen an einem kräftigen Magneten magnetisirt waren. Um das Verhalten von Stäben, in denen der Magnetismus sehr ungleich vertheilt war, kennen zu lernen, wurden einige 200 oder 250 Millim. lange Stäbe von derselben Stablart und Dicke wie die kleineren mit einem Ende an den Nord-Arm des Magneten in dessen Verlängerung gelegt, nachher mit dem andern Ende oben so an den Süd-Arm. Wurde dieses öfter wiederholt, gelangt der Stab zu einem constanten Maximum, mit dem Indifferenzpunkt in der Mitte. Aber anfangs war er ungleichförmig magnetisirt.

		Nach 1 Tage	Decrement
Mit einem Ende	3,73	3,46	0,072;
mit dem andern Ende	1,97	1,83	071;
Mittel - Werth	2,85	2,64	072.

Ein 250 Millim. langer Stab gab unter ähnlichen Umständen

		Nach 24 Stunden	Decrement
mit einem Ende	6,18	5,24	0,152;
mit dem andern Ende	2,50	2,13	148;
Mittel - Werth	4,34	3,68	150.

Die Kräfte, je nachdem man das dem Indifferenzpunkte nähere oder fernere Ende dem Spiegel darbot, verhielten sich wie 1,9 im ersten und 2,5 im zweiten Versuche. Man hätte glauben können, daß die stärkern einen verhältnißmäßig größern Verlust hätten erleiden und der Magnetismus sich einer normalen Vertheilung hätte nähern müssen. Aber dieses war der Fall nicht; die Decremente waren dieselben.

Die ungewöhnliche GröÙe der Decremente, welche in

rasche Wiederholung eines Impulses gewisser Art erreichen konnten, bereits besaßen, und dennoch nach einiger Zeit durch einen neuen Impuls eine höhere Intensität erlangten als es ihnen früher möglich war. Dieses konnte sogar mit demselben Stabe mehrmals wiederholt werden. Der Stab hatte also einige Zeit nach seiner ersten Magnetisirung die Fähigkeit erlangt einen stärkern Magnetismus anzunehmen als früher. Seine Capacität für Magnetismus war also größer geworden, und die Verluste, welche der Stab durch die Zeit und durch Erschütterungen erfahren hatte, wurden durch einen einzigen Impuls mehr als ersetzt.

Ein Stab No. 9 von 50 Millim. Länge, *blau angelassen*, hatte durch wiederholtes Anlegen an die Lamelle ein Maximum erlangt, das ich  $\equiv 1$  setzen will. Nach 24 Stunden war die Kraft um 0,022 gesunken. An die Lamelle gelegt wurde ein Maximum von 1,034 erlangt und so einige Tage hindurch fortgefahren. Es ergaben sich an den auf einander folgenden Tagen die Werthe:

1,000 1,034 1,046 1,062 1,088 1,092 . . . 1,135

der letzte Werth ist 5 Tage nach dem vorletzten gefunden.

No. 13 von 50 Millim. Länge, *hart*, ganz ebenso behandelt, und jeden Tag so oft angelegt, bis ein Maximum eintrat, was jedoch hier, wie bei den übrigen betrachteten Stäben in der Regel schon nach dem ersten Anlegen bis auf eine verschwindende Größe geschah, gab die Verhältnisse der Zunahme der Capacität:

1,000 1,090 1,149 1,158 1,166 1,180 . . . 1,186.

In No. 10 von 79 Millim. Länge, *blau angelassen*, stieg die Capacität für Magnetismus in 22 Tagen auf 1,341 der anfänglichen.

Stab No. 7 von 79 Millim. Länge, *blau angelassen*, hatte durch Anlegen an die Lamelle ein Maximum  $\equiv 1,000$  erlangt. Nach 13 Minuten wiederum angelegt, hatte er das Maximum von 1,083. Das Anlegen nach 30 Stunden wiederholt  $\equiv 1,115$ .

Stab No. 13 von 79 Millim. Länge, *blau angelassen*, hatte an auf einander folgenden Tagen die Maxima:

1,000 1,082 1,106 1,144 1,157 1,182 1,202(\*) 1,210 1,218  
 Zwischen den durch (\*) getrennten Angaben waren drei Tage verlossen.

Stab No. 14 von 79 Millim., *blau angelassen*, gab die Maxima nach Intervallen von 24 Stunden:

1,000 1,033 1,093 1,137 1,147 1,148 1,165 1,180 1,209

Stab No. 9 von 79 Millim. Länge, *glashart*, Maximum 1,000, stieg nach 24 Stunden durch einen Impuls, der durch Wiederholung verstärkt wurde, auf 1,037. Zwei andere Impulse, 1 und 2 Tage später, ergaben 1,115 und 1,124.

Stab No. 4 von 100 Millim. Länge, *weich*, hatte das Maximum = 1,000, nach 24 Stunden dagegen 1,031.

Diese Angaben sind zwar quantitativ sehr verschieden, bestätigen aber die Zunahme der Capacität für Magnetismus und zwar in einer Weise, welche den Einfluss der Härte und der Dimension in sehr enge Grenzen verweist, wenn er überhaupt vorhanden ist.

Es ist nicht zu übersehen, dass die Beobachtungen an zehn und mehr auf einander folgenden Tagen zwar für

Dafs übrigens stark gesättigte Stäbe ähnlicher Veränderungen fähig sind, geht aus den Erfahrungen mit Stahlmagneten hervor, deren Tragkraft und also auch das magnetische Moment zunimmt, so lange der Anker vorliegt, was sich aber, wenn der Anker abgerissen wird, grösstentheils wieder verliert. Indessen sind genaue Beobachtungen auch über diese Erscheinung noch nicht angestellt worden. Es steht auch nicht fest, dafs diese Magnete in der That vollkommen gesättigt waren.

#### Ueber die Wirkung der Anker.

Ein magnetisirter Stahlstab, der in den vorbergehenden Versuchen angewendet war, wurde vor den Stahl-Spiegel so gelegt, dafs sein Mittelpunkt etwa 300 Millim. davon entfernt war und seine Längen-Axe und das Centrum des Spiegels in eine gerade, auf den magnetischen Meridian perpendiculäre Linie fielen. In die Verlängerung des Stabes und in Berührung mit ihm kam ein weicher Eisenstab zu liegen. Wenn der Anker zwischen Magnetstab und Spiegel lag, so wurde er durch die Wirkung des Stabes selbst vorübergehend zu einem Magneten und lenkte den Spiegel weit stärker ab, als der entferntere Magnet es für sich allein vermocht hätte.

In den folgenden Versuchen hatte jedoch der Anker die entgegengesetzte Stellung, an dem dem Spiegel abgewendeten Ende des Stabes, der, wenn auch der Anker gewechselt wurde, in seiner Lage keine Veränderung erlitt. Ich hoffte, dafs die Wechselwirkung von Anker und Magnet diesen so langsam verändern würde, dafs das Gesetz der Veränderung sich in einer Function der Zeit würde bestimmen lassen. Sie war jedoch hier nicht schneller, als wenn der Magnetstab allein vor dem Spiegel lag. Aber die Intensität der Wirkung veränderte sich je nach der Beschaffenheit der Anker in einer Weise, die kurz mitgetheilt werden mag, obgleich die Untersuchung noch nicht beendigt ist.

Die Anker hatten verschiedene Dimensionen:





dafs aber der Einflufs der Länge sich einem Maximum nähert, welches bei dem kürzesten Stabe mehr als das dreifache der Kraft beträgt, welche der Stab für sich allein besitzt.

Die *Härte* und der *Grad* der *Sättigung* üben keinen merklichen Einflufs aus.

Der Einflufs der Dimensionen zeigt sich in der beträchtlich geringern Wirkung der längeren Stäbe. Der Stab von 200 Millim. Länge ist wegen der Unsymmetrie der magnetischen Vertheilung in ihm weniger zu berücksichtigen. Aber die Wirkung des Ankers auf den Stab von 79 Millim. Länge, welche nur 1,53 beträgt, während die entsprechende des Stabes von 50 Millim. = 2,02 ist, zeigt deutlich den Einflufs der Länge.

Wurde der Anker entfernt, so hatten alle Stäbe, wenn die Berührung nicht über einige Minuten gedauert hatte, fast genau den frühern Zustand wieder erlangt. Bei längerem Anliegen schien eine geringe Verstärkung eingetreten zu seyn, die sich auch schon während des Liegens nachweisen liefs. Jedoch sind die Versuche darüber noch nicht entscheidend.

Die Ursache dieser grossen Vermehrung des magnetischen Momentes liegt unstreitig nicht in der Vermehrung der freien magnetischen Kraft selbst, sondern nur in ihrer Vertheilung. Durch das Vorlegen von Ankern kann das Grundgesetz des Magnetismus, nämlich die Gleichheit der magnetischen Nord- und Südkräfte, nicht verändert werden. Aber auch jede dieser Kräfte für sich genommen wird nicht verändert. Wenn z. B. der Anker an das Südende des Magnets gelegt wird, so wird der Nord-Magnetismus an der Berührungsstelle theilweis gebunden und der freie Süd-Magnetismus von dem dem Spiegel zugekehrten Nordende entfernt. Das System von Anker und Magnet, obgleich mit derselben magnetischen Kraft begabt, hat also einen grossen Theil seines freien Magnetismus in grösserer Entfernung vom Spiegel als der Stab allein und wirkt daher stärker mit seinem Nordende.

Es ist daher auffallend, obgleich nicht im Widerspruch damit, daß ein Magnetstab, den an einem Ende ein Anker vorliegt, mit dem andern Ende einen Anker anfangs weit weniger stark anzieht, bis er nach einiger Zeit, besonders nach einiger Erschütterung, wieder seine normale Vertheilung angenommen hat. Ueberhaupt haben mehrere seltsame Erscheinungen an den Ankern der Stahl- und Elektromagnete ihre Erklärung bisher noch nicht gefunden.

#### Magnetismus und Cohäsion.

In einem kräftigen Elektromagneten nimmt man beim Oeffnen und Schliessen der Spirale Erschütterungen wahr, die man fühlen und hören kann. Unter minder günstigen Umständen ist dieses zwar der Fall nicht. Man kann aber nicht füglich bezweifeln, daß die Ursache, aus welcher diese stärkeren Erschütterungen hervorgehen, sich auch bei schwächern magnetischen Processen finden werden, wenn sie auch für unsere Hilfsmittel nicht wahrnehmbar sind und daß überhaupt zwischen den Veränderungen der Polarität,

nung wirken auf beide in gleicher Weise. Durch Erschütterungen wird der dem Magneten anliegende Stahlstab stärker magnetisch, und vom Magneten entfernt verliert er einen Theil seines Magnetismus leichter. In beiden Fällen wird ganz wie bei mechanischen Kräften das Eintreten der ihnen entsprechenden Bewegungen und also die Herstellung des stabilen Gleichgewichts durch die Erschütterung erleichtert.

Zu diesen Analogieen tritt noch die *moleculare Bewegung*, eine zwar nur selten wissenschaftlich beobachtete, aber dennoch sehr verbreitete Erscheinung der festen Körper. Denn Krystalle und vielleicht Krystall-Aggregate ausgenommen, ist keiner dieser Körper in einem vollständig stabilen Zustande. Ein stabiler Zustand ist nur da möglich, wo nicht nur der Körper als Ganzes gegen fremde Kräfte im Gleichgewicht ist, sondern auch jeder seiner Theile es für sich ist, wo z. B. ein aus der Masse gelöster Würfel seine Gestalt nicht verändern würde. Aber in diesem normalen Zustande befinden sich nur sehr wenige Körper. Bei den Glas- und Stahlstücken, die zerbrochen werden, passen die Fragmente niemals vollkommen auf einander und wo es, wie beim Glase, optische Mittel giebt, das Daseyn eines gespannten Zustandes zu entdecken, ist dieser nur sehr selten vergeblich gesucht worden.

Die aus dem Streben nach diesem Gleichgewichte hervorgehenden Bewegungen sind zwar in der Regel sehr klein, weil die Kräfte, die hier thätig sind, in sehr mannigfaltigen Richtungen auseinandergehen; und zuweilen läßt sich die Wirkung nur nach langen Zeiträumen, oder durch Vermittelung einer höheren Temperatur wahrnehmen. Aber was in einem Jahrzehnt deutlich wird, muß schon in einer Minute eine gewisse Wirkung hervorbringen.

Am raschesten tritt diese moleculare Bewegung der materiellen Theile in Fäden oder Drähten auf. Durch irgend eine Kraft, die nur kein Zerreißen hervorbringen darf, gedehnt, gebogen oder gedreht nehmen sie, wenn sie dieser nur ein Moment ausgesetzt waren, ihren früheren Zustand fast

vollständig wieder an. Dauert jedoch diese Spannung länger, so wird ein Theil der durch die fremde Kraft hervorgerufenen Veränderung bleibend; sie wird sogleich durch eine neue, ihr entsprechende Spannung ersetzt, und dieser Proceß schreitet so lange vor, bis der Draht entweder zerissen ist, oder einen härtern, den Veränderungen besser widerstehenden Zustand angenommen hat.

Wird die fremde Kraft entfernt, so geht die von ihr abhängige und ihr gewöhnlich fast proportionale Drehung sogleich verloren. Dann aber setzt der Draht langsam die Veränderung in derselben Richtung fort und nähert sich dadurch seinem frühern Zustande.

Die Körper nehmen also fremden Kräften gegenüber zwei Arten von Bewegungen an, die, obgleich auf denselben Cohäsions-Kräften beruhend, dennoch in sehr ungleicher Weise auftreten. Die eine Art, welche auf der *Elasticität* beruht, geht aus dem Streben hervor, sich mit den äußeren Kräften in Gleichgewicht zu setzen, und besteht, da alle partielle Spannungen im Körper, auch ohne parallel

seinem Entstehen als Verschwinden. Das weiche Eisen, welches an einen Magneten oder in eine Spirale gebracht wird, der Magnetstab, dem ein Anker anliegt (oben S. 87), beide erlangen ihre volle magnetische Kraft in einem bis jetzt noch nicht gemessenen Zeitraum und verlieren sie eben so schnell wieder, wenn der erregende Körper entfernt wird.

Zu dieser schnellen, an die Elasticität erinnernden Thätigkeit gesellt sich nun die zweite, sehr langsame, welche der molecularen analog ist. Der einem Magneten anliegende Stahlstab nimmt je nach der Dauer dieser Anlage an Intensität zu, und der von der Spirale oder dem Magneten abgenommene Stab verliert allmählich einen Theil seiner Kraft. Aber diese Veränderungen sind sehr träge und im Vergleich zu der ersten auch nur schwach. Wenn man annimmt, daß die Veränderung der magnetischen Polarität bloß in der Drehung von Theilchen bestehe, in denen die Pole eine feste Lage haben, so beruhen diese magnetischen Veränderungen auf einer wahren Molecular-Bewegung.

Die Analogie ist jedoch in zwei Punkten nicht vollständig, nämlich in der *Intensität*, mit welcher in einem Magnetstab, während seines Verweilens an einem Magneten oder einer Spirale, eine bleibende magnetische Veränderung hervorgebracht wird, und in der *Schnelligkeit* mit der dieses geschieht. Ein Moment reicht hin, dem Stabe  $\frac{1}{3}$  der ganzen magnetischen Kraft zu geben, die er überhaupt durch wiederholtes Aulegen erlangen kann. Bei mechanischen Kräften findet nichts ähnliches statt, die Veränderungen sind bei momentaner Wirkung in der Regel fast Null und auch bei einer länger dauernden Wirkung weit kleiner und von der Dauer der Einwirkung der fremden Kraft abhängig.

Eine solche in einem Moment entstandene und dennoch andauernde Wirkung in dem Gebiete des Magnetismus ist bloß bei der *Induction* bekannt. Diese ist zwar bis jetzt nur da beobachtet, wo ein Leiter anwesend ist, in welchem ein elektrischer Strom entweder schon entstanden ist, oder

noch entstehen kann, und die bekannten Gesetze der Induction, auch wenn man von der Ansicht ausgeht, daß der Magnetismus in der Rotation eines elektrischen Fluidums bestehe, reichen nicht hin um dadurch die Entstehung der magnetischen Polaritäten durch Magnete zu erklären. Indessen hat nach der Analogie zwischen elektrischen Strömen und der magnetischen Polarität eine solche Wirkung auch da nichts unwahrscheinliches, wo zwei Magnete oder ein Magnet und ein Eisen- oder Stahlstab in Wechselwirkung treten.

Nehmen wir nun vorläufig an, daß es bei der Annäherung eines Stahlstabes an einen Magneten oder eine Spirale ein der Induction ähnlicher Proceß sey, welcher die Polarität im Stabe hervorbringt: so würde bei der Entfernung des Stabes vom Magneten oder der Spirale eine entgegengesetzte Polarität eintreten müssen. Diese würde in einem Stabe, in welchem die Theilchen keine bestimmte Lage angenommen haben, eben so groß seyn, wie die erste Polarität. Aber der Stab hat sich beträchtlich verändert, die magnetischen Theilchen liegen nicht mehr indifferent

Zeit vor, wo ich eine Fortsetzung des experimentellen Theiles dieser Arbeit werde liefern können. Manches bleibt allerdings noch dunkel. Man würde vieles anscheinend leichter erklären können, wenn man die Polarität eines Stahl- oder Eisenstabes nicht bloß auf die Lage der elementaren Magnete, aus denen sie bestehen sollen, zurückführt, sondern auch noch eine Verschiedenheit in der Intensität dieser Theilchen annehmen wollte. Man würde jedoch eines scheinbaren Gewinnes wegen den Hauptvorzug der Hypothese, ihre Einfachheit, aufopfern.

Man kann sich demnach den Magnetisations-Process des Stabes durch einen Magneten oder eine Spirale folgendermaßen vorstellen:

Bei dem Anlegen des Stabes an den Magneten findet eine kräftige Induction statt, welche die Theilchen, so weit es ihre Verbindung mit den übrigen (ihr Coërcitiv-Vermögen) erlaubt, so wendet, daß ihre Axen von nun an einen kleineren Winkel mit der Kraftlinie des Magneten machen, wie früher. Die Induction selbst hört, so wie der Stab in Ruhe ist zwar auf, aber ein Theil seiner Wirkung dauert, so lange der Stab seine Lage behält unverändert fort. Die magnetische Polarität wird sogar durch die moleculare Bewegung der magnetischen Theile noch um ein Geringes verstärkt. Wird der Stahlstab nun abgenommen, so tritt eine neue Induction in entgegengesetzter Richtung ein, welche die frühere Wirkung wohl vermindern aber nicht ganz aufheben kann, und auch dieses setzt sich nachher eine Zeitlang in einer molecularen Bewegung der magnetischen Theile, aber mit geringer Intensität fort.

Zum Schluß will ich noch an den gewichtigen Umstand erinnern, daß zwischen den materiellen Theilen, deren Drehung die Ursache aller magnetischen Erscheinungen ist, also zwischen den elementaren Magneten und den molecularen Krystallen gar keine Verbindung nachzuweisen ist. Das Eisen und der Magnet-Eisenstein krystallisiren tesserale, jener mit würfliger, dieser mit octaëdrischer Grundform; der Magnetkies ist hexagonal, alle drei ohne das geringste

Zeichen einer Hemiëdrie, welche man als die Ursache der magnetischen Polarität ansehen könnte. Unter den paramagnetischen Stoffen gibt es auch flüssige und gasförmige. Aber solche Räthsel findet man überall, wo man an das Gebiet der Molecüle herantritt.

---

#### IV. *Ueber den Agat; von E. Reusch.*

---

**D**er Agat gehört, nach den Krystallen, sicher zu den reizendsten Gebilden des Mineralreichs. Seit unvordenklicher Zeit bekannt und geschätzt, in grossen Quantitäten noch heute verarbeitet und in allen Sammlungen durch die mannigfaltigsten Prachtstücke vertreten, hat dieses Mineral die Aufmerksamkeit der Physiker und Geologen doch nicht in dem Grade auf sich zu lenken vermocht, wie es die Schönheit der Objecte und die Eigenthümlichkeit der optischen



verdanken wir Max Schultze, welcher in seiner Untersuchung über die Structur der Diatomeenschale<sup>1)</sup> eine auf diese Schichtung zurückführbare Doppelbrechung dieser Stoffe, sowohl an Schliffen derselben als an künstlichen Präparaten von analoger Structur, nachgewiesen hat. Ich bin durch Hrn. Prof. Valentin auf diese werthvolle Arbeit aufmerksam gemacht worden. Diese von inneren Spannungen herrührende Doppelbrechung in Verbindung mit dem Umstand, daß diese Mineralien eine zu der Schichtung senkrechte Durchsplitterung zeigen, führt, wie ich im Folgenden nachzuweisen suchen werde, zu einer genügenden Einsicht in das optische Verhalten der Agate.

Während meines längeren Umgangs mit dem Agat hat sich mir die Frage nach der Entstehungsweise dieses Minerals so unwillkürlich dargeboten, daß ich versucht habe, sie zu lösen. Die durch unmittelbare Anschauung hierüber gewonnene Ansicht habe ich später, nachdem mir durch Colloge Quenstedt die einschlägige Literatur, namentlich Nöggerath's Sendschreiben an W. Haidinger „Ueber die Achatmandeln in den Melaphyren“<sup>2)</sup> bekannt geworden war, weiter auszubilden gesucht und werde mir erlauben, dieselbe nach Besprechung der optischen Eigenschaften des Agats auseinanderzusetzen. Das Material zu meinen Untersuchungen verdanke ich theils verschiedenen Freunden, theils der hiesigen Mineraliensammlung, namentlich aber der Liberalität des Hrn. August Veek in Idar, der mir auf ein Schreiben an Hrn. Oberförster Tischbein eine beträchtliche Anzahl sehr charakteristischer brasilianischer und obersteiner Agats zur Verfügung stellte. Die Präparate habe ich zum größern Theil aus passenden Splittern, die sich beim Zerschlagen ergaben, vielfach aber auch mit nicht geringer Mühe aus dickeren Schlagstücken selbst geschliffen.

1) Verhandlungen des naturhist. Vereins d. pr. Rheinlande. Jahrgang XX, S. 14

2) Aus den naturw. Abhandlungen, gesammelt und herausgegeben von W. Haidinger. III. Band erste Abth. S. 93.

## Die optischen Eigenschaften des Agate.

## §. 1.

Die Agate, von welchen zunächst die Rede seyn wird, gehören zu der, wie es scheint, sehr häufig vorkommenden Varietät des gestreiften Chalcedons, welche ein bläuliches Licht reflectirt, ein gelbliches opalisirendes Licht durchläßt, und in dünnen senkrecht zu den Schalen geschnittenen Platten oft einen hohen Grad von Durchsichtigkeit zeigt. Die Schalen regelmäfsig gebildeter Agate können im Allgemeinen als ein System äquidistanter Flächen angesehen werden, wobei sehr häufig die aufeinanderfolgenden Schichten sich durch regelmäfsigen Wechsel im Grade der Färbung und Durchsichtigkeit unterscheiden. Die Dicke der einzelnen Schichten ist an demselben Stücke und von Stück zu Stück sehr veränderlich und scheidt von 1<sup>mm</sup> und mehr bis zu der äufsersten Feinheit herab wechseln zu können. Die Messungen Brewster's an irisirenden Agaten führen auf Dicken von 0,00046 bis 0,0015<sup>mm</sup>. Die Leichtigkeit, mit der die Schichten als gesonderte Züge erkannt werden, ist

gleichheit durch den Act des Polirens verwischt war. Manchmal sieht man die Trennungsfläche zweier Schichten als einen glänzenden sprungartigen Zug, was entweder mit Absonderung parallel den Schalen oder mit einer erheblichen Differenz im Brechungsvermögen zusammenhängt, und wahrscheinlich verdankt der irisirende Agat seine Schönheit dem Umstande, daß hier eine stark entwickelte tangentielle Absonderung oder ein regelmäßig wiederkehrender Wechsel des Brechungsvermögens zusammentrifft mit sehr kleiner und sehr constanter Dicke der Schalen.

Die Durchsichtigkeit einer Agatplatte hängt wesentlich ab von der Orientirung der angeschliffenen Flächen.

*Radialschliffe*, d. h. planparallele Platten, deren polirte Flächen zu den Schalen senkrecht stehen, zeigen den größtmöglichen Grad von Durchsichtigkeit, dagegen sind *Tangentialschliffe*, deren Flächen mit den Schalen möglichst zusammenfallen, selbst bei ganz farblosen Stücken, *allezeit matt und trüb*. Durch eine Platte brasilianischen Agats von 0,4<sup>m</sup> Dicke, welche dicht ans Auge gehalten wurde, konnte ich bei normaler Incidenz die Sprossen eines hellbeleuchteten Fensters nicht erkennen; eine gleich dicke Platte des viel feiner organisirten obersteiner Agats zeigte die Umrisse des Fensters schon ziemlich deutlich. Neigt man die Platte gegen das einfallende Licht, so tritt beim brasilianischen Agat einige, beim obersteiner eine sehr merkwürdige Klärung der Umrisse ein. Unter dem Mikroskope macht ein solcher Tangentialschliff den Effect von Papier, dessen Filz man durch eine schwache Lupe betrachtet. Im polarisirenden Mikroskop tritt in jedem Azimuth der Platte Aufhellung des Sehfeldes und somit Depolarisation ein.

Bemerkenswerth ist noch eine traubige, wolkige Absonderung, ohngefähr in der Richtung der Schalen verlaufend, die besonders an dickeren Tangentialschliffen oft schon mit bloßem Auge erkannt wird. Diese Absonderung ist wohl dieselbe, die man oft an der äußeren Fläche von Agatmandeln als narbige Stellen in meist verwittertem Zustande findet. In Verbindung mit einer zweiten die Schalen senk-

recht durchbrechenden Absonderung, von der sogleich die Rede seyn wird, bildet diese tangentielle traubige Absonderung die Angriffspunkte für eine ins Innere fortschreitende Verwitterung des Agats.

### §. 2.

Von besonderer Wichtigkeit für das Verständniß des Agats ist eine zu den Schalen senkrechte oder kürzer *radiale Durchsplitterung* der ganzen Masse. Mit ihr hängen manche Eigenthümlichkeiten des Agats zusammen: einmal spaltet und schleift sich derselbe in radialer Richtung leichter als in jeder anderen; dann hängt mit dieser Absonderung das Opalisiren zusammen, denn ohne Zweifel ist, wie bei allem Opalisiren, der bläuliche Farbton im reflectirten, und der gelbliche im durchgelassenen Licht, eine Mischung von Farben dünner Blättchen, welche wohl der ersten Ordnung angehören. Bei den brasilianischen Agaten scheint diese Splitterung namhaft gröber als bei denen von Oberstein, sie ist nicht an die Dicke der einzelnen Schalen gebunden, und man kann eine Absonderungsfläche oft durch

Hält man einen dünnen Radialschliff vertical, so in die Schweite, daß vom Fenster Licht auf ihn fällt, aber daß die Richtung nach der man ihn betrachtet auf dunkeln Hintergrund weist, so ist der bläuliche dioptrische Schiller im Maximum, wenn die Radialabsonderungen horizontal liegen, im Minimum wenn sie vertical stehen. Bietet die Platte starke Wechsel in Richtung und Krümmung der Adern dar, so hat dies entsprechende Wechsel in der Richtung der Radialabsonderungen zur Folge; die Platte erscheint jen- und diesseits gewisser Linien verschieden hell, und die Helligkeit ist mit der Orientirung der Platte veränderlich. Das Gesagte gilt für alle nicht irisirenden Agate; bei den irisirenden kommt aber Reflexion und Beugung an den Schalen hinzu, und gegen diese intensiven Erscheinungen tritt der schwache Schiller zurück.

Betrachtet man eine Lichtflamme durch einen Radialschliff, so sieht man außer dem gewöhnlichen Bild der Flamme einen Nebelstreifen senkrecht zu den Radialabsonderungen, also in der Richtung der Adern verlaufend. Bei den brasilianischen Agaten durchsetzt der Nebelstreifen die Flamme und hat in deren Nähe die größte Breite; ein braunrother Saum umgiebt denselben namentlich gegen die Enden hin; beim obersteiner Agat, dessen Radialsplitterung viel feiner und regelmäßiger zu seyn scheint, divergiren von der Flamme zwei wohlbegrenzte Büschel von weißlichem Lichte. Bei dünnen Schliffen (0,5<sup>mm</sup> und darunter) glaubt man oft Spuren von Beugungsspectren in dem Nebelstreifen zu erkennen; im ganzen ist jedenfalls diese so charakteristische Erscheinung als eine rohe von der Radialsplitterung herrührende Beugungserscheinung zu bezeichnen; sie ist von derselben Art, wenn auch nicht derselben Regelmäßigkeit wie diejenige, welche man am schillernden Adular durch den zweiten Blätterbruch sieht und welche, wie ich gezeigt habe <sup>1)</sup> von denselben Absonderungen herührt, die auch den katoptrischen Schiller hervorbringen. Im Agat haben die radialen Absonderungen keine feste

1) Diese Ann. Bd. 118. S. 262 und 277.

Richtung gegen die angeschliffenen Flächen; daher das Diffuse der Beugungserscheinung.

Die Adern eines Radialschliffs von 1 bis 1,5<sup>mm</sup> Dicke, durch den man eine Flamme betrachtet, seyen horizontal; neigt man nun die Platte um eine horizontale Axe, so trübt sich das gewöhnliche Flammenbild und verschwindet bei einer gewissen Schiefstellung vollständig, während gleichzeitig der Nebelstreifen trüber und seine Färbung mehr röthlich wird. Bei einer Drehung der Platte um eine verticale Axe erleidet das Flammenbild keine merkliche Aenderung<sup>1)</sup>. Brewster hat beobachtet, daß bei der Drehung um eine horizontale Axe die Winkel, um welche die Platte von der verticalen Stellung aus in der einen und andern Richtung bis zum Verschwinden der Flamme gedreht werden muß, verschieden sind; auch habe ich dasselbe gefunden. Da jedoch die Schliffe wohl nie genau senkrecht zu den Schalen sind, da ferner ein vollständiges Verschwinden der Flamme nur in dickeren Platten beobachtet werden kann, wo also die Richtung der Radialsplitt-

die Annahme erklären, daß die Vibrationen selber gleich beim Eintritt regellose Reflectionen an den Absonderungen erleiden, in deren Folge der Agat von einem Chaos von Wellen durchzogen wird. Aus gleichem Grunde wird aber auch eine Welle polarisirten Lichts, in welcher die Vibrationen senkrecht zu Radialabsonderungen geschehen, einen regelmäßigen Durchgang durch den Agat nicht finden können.

Schiefe Schliffe habe ich nicht besonders untersucht; die Resultate der Beobachtungen Brewster's in dieser Richtung enthalten jedoch, wie ich glaube, nichts, das sich nicht aus dem bisher Gesagten verstehen ließe.

### §. 3.

Die polarisirenden Eigenschaften des Agats hat Brewster schon so vollkommen untersucht, daß es genügen wird, seine Resultate hier kurz zusammenzustellen:

1. Ein Radialschliff von etwa 1<sup>mm</sup> Dicke kann in erträglicher Weise als polarisirendes oder analysirendes Medium dienen. Die Richtung senkrecht zu den Schalen entspricht der optischen Axe einer Turmalinplatte oder der kleinen Diagonale eines Nikols. Eine gehärtete Glasplatte zeigt das schwarze Kreuz, wenn die Schalen des analysirenden Agats senkrecht zur Reflexionsebene des polarisirenden Spiegels stehen.

2. Das regelmäßige Bild einer Flamme und der Nebelstreifen zeigen, mit Turmalinplatte oder Nikol geprüft, entgegengesetzte Polarisationszustände; ist das erste im Maximum, so ist der Nebelstreifen im Minimum, und wenn der letzte am dichtesten erscheint, ist das regelmäßige Bild verschwunden. Ein Glimmer- oder Gypsplättchen werde im gewöhnlichen Polarisationsinstrument mit Hülfe eines Nikols auf höchste Farbe in dunklem Feld z. B. roth gestellt und nun der Nikol durch einen Agat ersetzt, dessen Adern senkrecht zur Polarisationssebene des Spiegels stehen: das Plättchen erscheint ebenfalls roth, der Nebelstreifen aber grün, also complementär. Es ist passend das Plättchen

mit einem durchlöcherten Carton zu bedecken und durch ein aufgesetztes Rohr das Seitenlicht abzuhalten.

Brewster hat in richtigem Tacte geahnt, daß es sich hier um eine ganz eigenthümliche Art von Doppelbrechung handle; mit voller Bestimmtheit und klarer Einsicht in die bedingenden Ursachen hat dies aber erst Max Schultze in seiner im Eingang citirten Schrift ausgesprochen.

Durch irgend eine der bekannten Methoden zur Bestimmung des Charakters der Doppelbrechung einer Substanz erkennt man an jedem dünnen Radialschliff, daß die optische Elasticität senkrecht zu den Schalen, also in der Richtung, welche als optische Axe aufzufassen ist, größer ist als in der Richtung der Schalen. In Folge hiervon zerfällt eine Lichtwelle bei senkrechtem Eintritt in einen Radialschliff in zwei rechtwinklich polarisirte Wellen. In der einen erfolgen die Vibrationen senkrecht zu den Schalen oder parallel den Absonderungen, und einer regelmäßigen Transmission dieser Welle stehen keine Hindernisse im Wege; ein kleiner Theil des Lichts erfährt die beugende Wirkung der Radialabsonderungen: dieser Welle entspricht nothwendig das helle und ziemlich klare, mäßig umnebelte dioptrische Bild. In der anderen Welle stehen die Vibrationen senkrecht zu den Radialabsonderungen, eine regelmäßige Transmission ihrer Vibrationen ist nach dem Früheren unmöglich. Würden die Absonderungen nur wirken, wie im Glassatz, so könnten allerdings auch diese Vibrationen regelmäßig durchgelassen werden; so aber wirken sie auf den größten Theil dieser Welle wie ein unregelmäßiges Gitter, das Licht erfährt eine regellose Beugung in einer zu den Gitterstäben senkrechten Ebene und verbreitet sich dadurch zum größten Theil über einen gewissen Raum außerhalb des gewöhnlichen dioptrischen Bildes. Nach dem unter No. 1 dieses Paragraphen Gesagten fällt die Polarisationsebene des regelmäßig durch den Agat gehenden Lichts mit den Schalen zusammen; nach der eben gegebenen Erläuterung sind die Schwingungen dieses Lichts nothwendig senkrecht zu den Schalen: daher erfolgen über-



haupt die Schwingungen des polarisirten Lichts senkrecht zu der sogenannten Polarisationsebene. Der Agat führt somit zu demselben Resultate, zu dem ich auch durch die Gesamtheit meiner Beobachtungen über den Krystallschiller gelangt bin <sup>1</sup>).

Es ist mir nicht unwahrscheinlich, daß die stark polarisierende Kraft mancher wenig gefärbter Turmaline auf einem ähnlichen Hergang beruht wie beim Agat. Aus Nörrenberg's Nachlaß besitzt die hiesige Sammlung eine der Axe parallel geschliffene Platte, welche zwischen zwei bräunlichen Partien einen graulichen Streifen von 7<sup>mm</sup> Breite enthält, der bei einer Dicke von 0,35<sup>mm</sup> Dicke das Licht aufs Vollständigste polarisirt. Sieht man durch die Platte nach einer Flamme, so erkennt man deutlich einen feinen Nebelstreifen, der auf Absonderungen parallel der Axe hinweist. Die geringe Durchsichtigkeit der Turmaline nach der Axe erklärt sich wohl am einfachsten wie beim Agat durch Absonderungen parallel den hexagonalen Säulenflächen, welche ohnehin Spaltungsflächen sind <sup>2</sup>).

Ueber die Ursache der Doppelbrechung des Agats und ähnlicher Gebilde spricht sich Max Schultze auf S. 20 der oben citirten Schrift, sowie im Archiv für Anatomie und Physiologie von Reichert 1861, S. 238 u. f. so klar und bestimmt aus, daß ich es für überflüssig halte, hierauf an dieser Stelle näher einzugehen, während ich allerdings bei Besprechung der Entstehung der Agate Gelegenheit haben werde darauf zurückzukommen.

#### Die Entstehung des Agats.

##### §. 4.

Was dem geometrischen Auge bei Betrachtung regelmäßiger Agate vor Allem entgegentritt, das ist der Umstand, daß die Grenzen der aufeinander folgenden Schichten im Allgemeinen als ein System äquidistanter Flächen eines oft sehr unregelmäßigen Hohlraums erscheinen. Nun giebt es

1) Diese Ann. Bd. CXX, S. 117.

2) Des Cloizeaux, *Manuel de Minér.* p. 506.

einen technischen Proceß, das sogenannte *Stürzen*, durch welchen derartige Gebilde ohne große Mühe hergestellt werden können: gießt man nämlich geschmolzenes Wachs, Zinn, Zink <sup>1)</sup> oder einen dünnen Gypsbrei <sup>2)</sup>, oder noch besser Collodium in einen irgendwie gestalteten Hohlraum, läßt die Flüssigkeit überall im Innern herumlaufen und gießt den Ueberfluß aus, so bleibt von diesen Substanzen eine Schichte in Folge von Erstarren oder von Adhäsion an der inneren Wand hängen. Wiederholt man diesen Proceß mit Gypsbrei oder Collodium nach jedesmaligem Erstarren einer Schichte sehr oft in der Art, daß man abwechselnd verschieden gefärbte Masse anwendet, so erhält man endlich einen Körper, dessen Querschnitte Aehnlichkeit mit den Agaten darbieten. Je dünner und gleichförmiger die einzelnen Schichten sind, um so weniger werden die inneren Flächen von den geometrischen Aequidistanten des Hohlraums abweichen, während allerdings in der Natur dieses Processes liegt, daß in der Nähe scharfer Ecken und Kanten eine mit der Anzahl der Schichten zunehmende

liche Curven; sobald aber der Abstand grösser als  $a\alpha$  geworden ist, so erhält die geometrische Aequidistante vier Spitzen  $c, c, c', c'$ , welche auf der Evolute des Meridians liegen und es ist einleuchtend, dass die Partien  $cic'c$ ,  $c'ie'e$  bei der oben beschriebenen Entstehungsweise nicht zu Stande kommen, sondern dass nur ein linsenförmiger Raum  $idid'i$  übrig bleibt. Erinnert man sich aber, dass alle Agate senkrecht zu den Schalen in der ganzen Masse aufs Feinste durchsplittet sind, so begreift man, dass die ganze Strecke  $\alpha i$  in einem dünnen Meridianschliffe optisch ausgezeichnet seyn muss; an dieser Strecke treffen nämlich die Radialabsonderungen unter einem endlichen von  $\alpha$  gegen  $0$ , von  $0^\circ$  bis  $180^\circ$  wachsenden Winkel zusammen und hiermit hängen die Wechsel des dioptrischen Schillers zusammen, von denen schon in §. 2 die Rede war. An mehreren Schliffen von regelmässig gekrümmten obersteiner Mandeln habe ich die hier bezeichneten Erscheinungen beobachtet.

Bietet der ursprüngliche Hohlraum eine nach Innen oder Aussen springende Kante dar, so liegen die entsprechenden Kanten der äquidistanten Flächen auf einer bestimmten krummen Fläche, welche ich *Kantenzug* nennen will; ein Radialschliff (Fig. 5 Taf. I) bildet dann eine Ecke z. B.  $a$  und einen *Eckenzug*  $ac$  dar; jen- und diesseits eines Kantenzugs findet dann, wegen des plötzlichen Wechsels in der Richtung der Radialabsonderung, in dünnen Platten ein wechselnder dioptrischer Schiller statt. Tritt eine zweite Ecke  $b$  hinzu, so kann der neue Eckenzug  $bc$  den ersten  $ac$  treffen; vom Durchschnittspunkt  $c$  an hört das Flächenstück (2) auf sich an der Bildung der Aequidistanten zu betheiligen, dagegen treffen sich jetzt die Aequidistanten der Flächen (1) und (3) direct und bilden einen eigenen Eckenzug  $cd$ , gleichsam den Stiel der Gabel  $acb$ . Jeder grössere Radialschliff, namentlich aber die prächtigen Regenbogenagate vom Weisselberge bei Oberkirchen, bieten reichliche Beispiele für das oben Gesagte. Bei einem (wahrscheinlich brasilianischen) Agate habe ich über dies auf

einem Schliffe fast nach allen Eckenzügen feine Sprünge beobachtet; diese deutet auf Sprünge längs den Kantenzügen, welche ohnehin wegen des plötzlichen Wechsels in der Richtung der Radialabsonderungen Stellen geringerer Cohäsion seyn müssen.

#### §. 5.

So gut sich die Agate in der Hauptsache dem Aequidistantengesetz anschließen, so existirt doch wohl keiner, der nicht an mehreren Stellen sehr erhebliche Abweichungen von diesem Gesetz zeigte. Nicht bloß sieht man an durchgeschlagenen oder geschliffenen Stücken leere oder erfüllte Kanäle, die ins Innere führen, sondern man sieht auch wie Schichten, die an anderer Stelle dem Hohlraum concentrisch sind, in der Nähe dieser Kanäle deren Zug folgen, sich gegen den Umfang hin oft bis zum Verschwinden verdünnen und im Allgemeinen ein Bestreben zeigen sich nach Außen fortzusetzen. Ich verweise in dieser Beziehung auf die instructiven Abbildungen zu Nöggerath's Sandstreifen, besonders die Figuren 5, 7, 8, 9. Eine

**August Veeck** verdanke, setzten mich in den Stand dieß zu thun; die Mandeln waren von mäßiger Größe, mäßig rauher Oberfläche, bis tief hinein aufs Feinste geschichtet, die kleinen linsenförmigen Innenräume mit krystallinischer Masse dicht angefüllt. Beim systematischen Zerschlagen zeigte sich nicht nur, daß der krystallinische Kern an mehr als einer Stelle Ausläufer gegen den Umfang der Mandel hatte, sondern daß auch die anliegenden Schichten in der Nähe dieser Ausläufer mit Vehemenz umbogen und die Richtung derselben einschlugen. An etlichen dünnen Schliffen, welche nichts von der krystallinischen Masse an sich trugen, war der von dem Aequidistantengesetz vollkommen abweichende Zug der Schichten gegen eine Stelle des Umfangs mit größter Bestimmtheit zu verfolgen, und an einem Stücke unterschied ich deutlich einen innersten bandförmigen Kanal, der wohl zu allerletzt noch als Zuführungsweg gedient hatte.

Die Ansicht, daß die Ausfüllung der ursprünglichen Hohlräume durch ein successives Durchschwitzen der steinbildenden Flüssigkeit durch die Wände der Mandeln erfolgt sey, scheint daher mit der Wirklichkeit nicht übereinzustimmen, und ich möchte zu den von Nöggerath (S. 8 und 9) gegen dieselbe beigebrachten Argumente noch hinzufügen, daß auf diese Weise die wunderbare Feinheit der Schichten, der Wechsel in Farbe und Lichtbrechungsvermögen, der plötzliche Uebergang vom Amorphen ins Krystallinische, namentlich aber jene so charakteristischen Abweichungen vom Aequidistantengesetz nicht erklärbar sind. Auf der anderen Seite werden wir uns nicht verhehlen, daß auch die zweite Ansicht, nach welcher die kieselhaltige Flüssigkeit durch offene Wege und Thore in die Mandeln einzog, noch einer wesentlichen Ergänzung bedarf; denn so lange nicht gezeigt werden kann, daß unter diesen Umständen die Ablagerung in der bekannten regelmäßigen Weise geschehen mußte, hat diese Hypothese etwas Vages, ich möchte sagen Rohes, und ich erkläre mir damit, daß selbst Männer ersten Rangs, denen sicher die

sogenannten Infiltrationskanäle gar wohl bekannt waren, sich mehr zu der ersten Ansicht hinneigen, welche wenigstens die Befriedigung gewährt, daß bei ihr das oberste Gesetz der Agatbildung, das Aequidistantengesetz einigermaßen zur Geltung kommt.

#### §. 6.

Die große Analogie zwischen den Agaten und den Producten eines wiederholten Stürzens legt es nahe anzunehmen, die Agate seyen dadurch entstanden, daß Hohlräume von kieselerdehaltiger Flüssigkeit, nach längeren Perioden, abwechselnd gefüllt und entleert waren. Da von einer Füllung zur andern die Füllmasse sich möglicherweise geändert haben konnte, so würde die Differenz der Schichten begreiflich. Durch welches Spiel von Kräften wurde aber dieser Wechsel von Füllungen und Entleerungen unterhalten? Man könnte zunächst an heberartige Fortsätze der Hohlräume denken, welche eine Anfüllung bis zu gewisser Höhe zuließen, dann aber eine vollständige Entlee-

Was die andere nicht minder wichtige Frage betrifft: woher die gelöste Kieselerde komme, so glaube ich, daß sie durch die wichtigen Versuche von Daubrée <sup>1)</sup>, nach welchem Wasser bei hohem Druck und hoher Temperatur Kieselsäure aus Silicaten abzuscheiden vermag, ihre Erledigung findet.

Die Hohlräume in denen die Agate abgelagert sind, verdanken, nach den Untersuchungen von Lasius, L. v. Buch, Nöggerath (Sendschr. S. 2, 3), ihr Daseyn den Dampf- oder Gasblasen, welche in der zähflüssigen Melaphyrmasse aufgestiegen und festgehalten worden sind. Im Verlauf des Erstarrens erhielt ohne Zweifel die Masse zahllose Spalten und Sprünge, welche an den Hohlräumen als Stellen kleinsten Widerstands begonnen, sich von Hohlraum zu Hohlraum erstreckten, und so eine Communication derselben unter einander, sowie nach Oben und Unten vermittelten. Nun erst konnten die Tagwasser auf das jungfräuliche noch heiße Gestein einwirken, dasselbe auslaugen und endlich in tiefer liegende Dampfkessel zu weiterer Concentration gelangen. Diese Kessel erhielten nun theils vom anliegenden Gestein, theils und wohl reichlicher von dem in größere Tiefe hinabgesunkenen und in Dampfform von dort zurückgekehrten Wasser einen stetigen Wärmezufuß, durch welchen die untere Flüssigkeit allmählich auf ihren Siedpunkt erwärmt wurde. Die gespannten Dämpfe trieben alsdann die darüberstehende Flüssigkeitssäule durch die Spalten und Hohlräume in die Höhe, und fanden endlich nach oben einen Ausweg. Hiedurch aber, sowie in Folge des für die Arbeit der Hebung nothwendigen Wärmeverbrauchs, mußte eine Abkühlung des Kesselraums eintreten; die Flüssigkeit sank wieder zurück, die Hohlräume und Spalten in entgegengesetzter Richtung durchlaufend. Sank hierbei die Flüssigkeit zum größeren Theil in den Kessel zurück, so entleerten sich die Hohlräume bei der absteigenden Bewegung zum zweiten Male, und wir hätten so für viele der vorhandenen Hohlräume eine *aufsteigende* und

1) *Etudes et expér. synth. sur le métamorphisme. Paris 1860.*

eine *absteigende Entleerung*. Weil ferner bei der ersteren die Füllmasse wahrscheinlich concentrirter, wohl auch stärker gefärbt war als bei der zweiten, sofern das Auf- und Absteigen mit einem Absatz von Stoffen verbunden, wohl auch von einer Mischung mit dem Tagwasser begleitet war, so begreift man die Differenz der Schichten, welche bei der aufsteigenden und absteigenden Entleerung in den Hohlräumen zurückblieben, wozu noch der wesentliche Umstand kommt, daß die erste Schichte ihre Consistenz unter der Wirkung heißer Dämpfe, die zweite unter Berührung mit der Atmosphäre erhielt, wodurch selbst bei gleicher Färbung der Füllmasse eine physikalische Verschiedenheit der anstossenden Schichten gegeben war.

Dieser scheinbar so einförmige Proceß der abwechselnden Füllungen und Entleerungen enthält einen solchen Reichtum von Möglichkeiten, daß es ein vergebliches Unternehmen wäre, sie alle bezeichnen zu wollen: die Wege vom Kessel nach Oben konnten vom höchsten Punkte ausgehen oder von tiefer liegenden Stellen, in welcher letzterem



Die obersteiner Agate zeigen am Rande allezeit eine Art Schale von hellerer Farbe; die Schichtenbildung ist daselbst ziemlich unvollkommen, und namentlich im polarisirenden Mikroskope unterscheidet sich diese Partie sehr wesentlich von der regelmässig geschichteten Hauptmasse; während nämlich auf dünnen Radialschliffen die letztere lange zu den Schalen senkrechte farbige Streifen zeigt, bietet die erste nur schwache confuse Farben und wirkt in der Hauptsache depolarisirend. Ich erkläre mir diesen Umstand damit, dass die ersten Füllungen und Entleerungen mit grösserer Vehemenz und Unordnung vor sich gingen, und dass die noch wenig concentrirte und wenig gefärbte Masse bei zu hoher Temperatur fest wurde.

Chalcedon ist nach Fuchs ein Gemenge krystallinischen und amorphen Quarzes. An einem wahrscheinlich brasilianischen Agate habe ich an mehreren Schichten deutlich eine beginnende Krystallisation beobachtet. Die Möglichkeit hiervon begreift man, wenn man bedenkt, dass, bei jeder längeren Pause der Therme, die in gefüllten Hohlräumen befindliche Flüssigkeit ein Bestreben hatte, ihre Kieselerde krystallinisch abzusetzen, und wenn es nur selten hierzu kam, so ist das aus der Unruhe der Therme auch während der Pausen zu erklären. Eine spätere Schichte setzte sich dann auf die durch beginnende Krystallisation rauh gewordene Fläche nicht mit derselben Festigkeit an, wie die gewöhnlichen Schichten unter einander; in Wirklichkeit war der obige Agat nach einer solchen rauhen Schichte, die sich in der angeschliffenen Fläche verfolgen lässt, beim Zerschlagen gesprungen. Die sogenannte Fortificationsagate verdanken wohl ihre Entstehung dem Wiederbeginn der Pulsationen nach längerer Ruhe, während welcher die Krystallisation walten konnte.

Viele Agate sind durchweg mit Chalcedonmasse erfüllt; sie hatten Zeit sich ganz zu füllen, ehe die Therme ihre Intermittenzen eingestellt hatte. Blieben aber nach diesem Zeitpunkt noch Hohlräume übrig, so gab es keine Schichtung mehr, sondern nur noch krystallinischen oder sonsti-

gen Absatz. Aber auch während dieser letzten Epoche mußte noch Verbindung mit Außen stattfinden; die Flüssigkeit mußte durch einen wenn auch äußerst langsamen Strom von Unten oder Oben erneuert werden, um das für die Krystallisation nöthige Material bis zu partieller oder gänzlicher Erfüllung des Hohlraums zu liefern. Selbst bei Hohlräumen, die nur noch durch eine Oeffnung mit Außen communicirten, war ein solcher Austausch durch Wirbel und Diffusion denkbar.

Was die Spalten und Gänge betrifft, durch welche die Mandeln unter einander communicirten, so konnte von einem geschichteten Absatz in denselben nur an solchen Stellen die Rede seyn, wo dieselben eine gewisse Weite hatten oder allmählich erreichten; in den engen Partieen war die Geschwindigkeit der auf- und absteigenden Ströme zu groß, als daß überhaupt eine merkliche Ablagerung stattfinden konnte; im Gegentheil werden diese Spalten eher ausgewaschen worden seyn. Je nach der Natur des Ge-

**Erhärten der einzelnen Schichten.** Kieselgallerte ist ohne Zweifel eine Masse, die wie Collodium <sup>1)</sup> beim Verdunsten des Lösungsmittels eine sehr erhebliche Contraction erleidet. Nehmen wir an, es sey in Folge auf- oder absteigender Entleerung eines Hohlraums in demselben eine dünne Schichte von Kieselgallerte zurückgeblieben: nach Analogie mit der Collodiumhaut überzog sich die frische Schichte zuerst mit einer dünnen Membrane, welche sich unter Contraction gegen die ältere Schichte hin verdickte. Bei der Contraction in radialer Richtung konnten die Molecüle den ihrem natürlichen Gleichgewicht entsprechenden Abstand einnehmen; in tangentieller Richtung aber war dies nicht in gleichem Grade möglich, sofern die Adhäsion an der älteren Schichte dem freien Zusammentreten der Molecüle ein Hinderniß in den Weg legte. Jede neue Schichte legte sich so an eine frühere unter einer tangentiellen Spannung, und hierin liegt, wie M. Schultze (Archiv f. Physiol. 1861. S. 239 u. f.) in überzeugender Weise gezeigt hat, die Ursache der Doppelbrechung und weiterhin der optisch negative Charakter derselben für den Agat und alle Körper, bei welchen sich »aus flüssiger oder breiweicher Substanz erhärtend und dabei sich zusammenziehend, eine dünne Schichte einer Substanz auf die andere ablagert.«

Die erwähnte Bildung einer Membrane an der äußern Fläche einer frischen Schichte hatte wohl noch eine anderweitige Bedeutung: durch sie wurde der Act der Verdunstung verlangsamt, die regelmäßige Ablagerung der Schichten begünstigt und sogar ein Theil des Wassers zurückgehalten, dessen Gegenwart für die Durchsichtigkeit der Agate, so wie für das frische Aussehen der Farben bei den gefärbten wesentlich scheint. Alle durchsichtigen Agate verwandeln sich durch Glühen unter anfänglichem heftigem Spritzen in eine weiße undurchsichtige Masse, welche das Wasser später nicht wieder anzunehmen scheint; farbige

1) In Betreff der eigenthümlichen Erscheinungen, die ich an einer freien in Concentration begriffenen Collodiumhaut beobachtet habe, verweise ich auf das Univ.-Programm vom Herbst 1860, S. 23 bis 26.

Agate verlieren durch Glühen scheinbar an Intensität ihrer Farben.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß die frischen Agate ihre Räume längere Zeit als continuirliche Masse erfüllen und daß erst in Folge allmählicher Abkühlung und Entwässerung des Gesteins die radiale und die §. 1 besprochene traubige tangentielle Absonderung eintrat. Durch die erste Absonderung machte sich die tangentielle Spannung, unter deren Wirkung die Schichten als Continuum bis zu einem gewissen Grad von Consistenz gelangt waren, in zahllosen die ganze Masse radial durchsetzenden Sprüngen Luft; durch die traubige Absonderung lösten sich radiale Spannungen.

Das constante Auftreten der Radialsplitterung im geschichteten Chalcedon hat mich an das merkwürdige Phänomen der regelmäßigen Zerklüftung gewisser Basalte <sup>1)</sup> erinnert. Wenn es erlaubt ist, Kleines mit Großem zu vergleichen, so könnten die geschichteten Basalte ebenfalls von einem Sturzprocesse herrühren, durch welchen ein immenser Hohlraum sich rasendurch füllte und entleerte, wie

**V. Thermometrische Versuche;  
von Dr. Georg Recknagel in München.**

(Auszug aus der Habilitationsschrift des Verfassers.)

**I**n der vorliegenden Experimentalarbeit wird der Gang des aus gewöhnlichem Natronglase <sup>1)</sup> verfertigten Quecksilberthermometers zwischen 0° und 100° C. mit dem Gange eines Luftthermometers verglichen, welches nach dem Princip des constanten Volumens construirt und mit Luft gefüllt ist, deren Spannung bei 0° vom gewöhnlichen Barometerstande nicht weit abweicht. Zur Constatirung des Resultates sind zugleich Bestimmungen des Ausdehnungscoëfficienten der Luft und Studien über die Verrückungen des Nullpunktes an Quecksilberthermometern vorgenommen worden.

Seit Gay-Lussac's Vergleichen war die Meinung, daß beide Thermometer zwischen 0° und 100° übereinstimmen, so sicher, daß selbst Hr. Regnault <sup>2)</sup>, nachdem er jene Versuche mit Gewichtsthermometern aus ordinärem Glase wiederholt hatte, sich über seine Resultate in folgender Weise äußert:

» Aus diesen Versuchen ersieht man, daß zwischen 0° und 100° das Luftthermometer beinahe genau mit dem Quecksilberthermometer übereinstimmt, was die älteren Beobachtungen des Hrn. Gay-Lussac bestätigt. Es ist jedoch zu bemerken, daß bei meinen Versuchen das Luftthermometer gegen die Mitte seiner Scale beständig um etwa 0°,2 hinter dem Quecksilberthermometer zurückbleibt. Diefs scheint anzuzeigen, daß in dem Gange beider Ther-

1) Aus Untersuchungen von J. J. Pierre (*Annales de chim. et de phys.* T. VI 1842) geht hervor, daß sich für Quecksilberthermometer von verschiedenem Glase zwischen 0° und 100° ein merklich verschiedener Gang nicht nachweisen läßt.

2) Pogg. Annalen Bd. 57. — *Annales de chim. et de phys.* T. VI 1842. — *Mem. de l'Acad. roy. des sciences* T. XXI 1847.

meter wirklich ein kleiner Unterschied vorhanden ist, aber ein zu kleiner, als dass es nöthig wäre, darauf Rücksicht zu nehmen. Er fällt überdies zwischen die Unsicherheitsgränzen, welche von der Verrückung des Nullpunktes an Quecksilberthermometer abhängen\*.

In der That hat Hr. Regnault soweit von seinen Versuchsergebnissen abgesehen, dass man aus seinen Tabellen für die Ausdehnung des Quecksilbers und ordinären Glases die Temperaturangabe des Quecksilberthermometers bei  $+50^{\circ}$  um  $0^{\circ},17$  tiefer rechnet als die des Luftthermometers, während das Experiment sie um  $0^{\circ},2$  höher gegeben hatte. Es beträgt also die bei der Reduction des Quecksilberthermometers auf das Luftthermometer bestehende Unsicherheit in der Mitte der Scale zur Zeit noch mehr als  $0^{\circ},3$ , und diess scheint zuviel, als dass man sich dabei beruhigen müßte. Denu mit einigem Fleisse werden Quecksilberthermometer construirt, welche vorsichtig behandelt, in ihren Angaben durchaus bis auf  $0^{\circ},1$  übereinstimmen, und man überzeugt sich leicht, dass das Luftthermometer

stellung vermehrt. Zweitens werden die Druckhöhen über dem Niveau der Spitze in *S* mit einer innerhalb der Glasröhre *NM* durch den Trieb in *r* beweglichen Messingscale gemessen, welche in eine Stahlspitze ausläuft und in *f* eine Führung in der Röhre hat. Diese Einrichtung macht, wenn man die Meßröhre *NM* mit Hilfe des Senkels und der Fußschrauben in *F* vertical stellt, ein Kathetometer oder mindestens einen zweiten Ableser entbehrlich. Drittens erlaubt der Dreiweghahn in *H* die Communication der Quecksilbersäulen unter sich und mit der als Quecksilberreservoir dienenden Stopfbüchse *Q* beliebig herzustellen und zu unterbrechen, was auf mehrfache Art ausgenützt werden kann.

Das Instrument kann man auf folgende Weise für den Versuch vorbereiten. Man bestimmt das Größenverhältniß der Capillare (*c*) und des Raumes (*v*), in welchem sich die Spitze befindet, zu dem Inhalte des eigentlichen Luftbehälters *V* durch Wägung (wegen des umgekehrten Meniskus am besten mit Wasser), trocknet dann den Glasapparat *Vcs* vorläufig soweit aus, bis alle sichtbaren Spuren von Wasser entfernt sind, und kittet ihn, nachdem man die Capillare zweimal im Knie gebogen, in das Eisenstück *LH* ein, in welches auch die Meßröhre *NM* eingesetzt ist, die zur Vermeidung eines ungleichen Einflusses der Capillarität mit der Röhre *S* gleiches Kaliber hat (hier 18<sup>mm</sup> inneren Durchmesser).

Darauf wird der vordere Theil des Apparats mittelst der Ueberwurfschraube in *K* abgenommen und auf den Trocken-Apparat geschraubt, der bei den vorliegenden Versuchen schließlic in einer über 4 Fuß langen mit geschmolzenem Chlorcalcium gefüllten, mit der Luftpumpe in Verbindung gesetzten Röhre bestand. Man wird bei gut luftdichtem Verschluss unter beständiger Erhitzung des ganzen Glasapparats 20 bis 30 Mal evacuiren und trockene Luft möglichst langsam einströmen lassen, bis man das Geschäft des Austrocknens beendigt und, nach Abschließung des ausgetrockneten Raumes durch den Hahn *H*, den Apparat zurückbringt, um nun das Niveau zu bestimmen, d. i.

diejenige Ablesung in  $O$  zu ermitteln, bei welcher die beiden Spitzen,  $S$  und die der Scale, in horizontaler Linie liegen. Dies wird durch Einstellung beider auf den horizontalen Faden eines Fernrohrs bewerkstelligt, und dessen etwaige Abweichung von der Horizontalen in dem arithmetischen Mittel aus zwei Ablesungen vor und nach der Drehung des Luftthermometers oder Umlegung des Fernrohrs eliminirt.

2. Die zu messende Spannung der eingeschlossenen Luft ist nun theils durch die Höhe  $h$  der Quecksilbersäule über dem Niveau der Spitzen, theils durch den Barometerstand  $H$  bestimmt und die Summe aus beiden. Es ist somit die Zuverlässigkeit der Messungen durch die Güte des *Barometers* wesentlich bedingt. Das hier verwendete ist ein Gefäßsbarometer, welches wiederholt ausgekocht und mit einer Versicherung gegen aufsteigende Luftblasen versehen war. Der Durchmesser des Röhrenstückes, in welchem die Quecksilbersäule endigt, beträgt über 22<sup>mm</sup>, so



struirt werden, an welche man die Anforderung stellt, daß ihre Angaben unter günstigen Verhältnissen mit der Genauigkeit der Ablesung unter sich übereinstimmen. Da es mir nicht möglich war, sehr nahe cylindrische oder rein konische Röhrenstücke von mehr als 200<sup>mm</sup> bis 300<sup>mm</sup> Länge zu finden, so mußte jene Genauigkeit auf  $\frac{1}{70}$  bis  $\frac{1}{30}$  Grad beschränkt werden. Nachdem auf zwei solche ausgewählte Röhren eine willkürliche Theilung (Millimeter) aufgeätzt war, wurde ihr Kaliber und damit zugleich die Theilung in der gewöhnlichen Weise durch successiv eingelassene Quecksilberfäden von verschiedener Länge sorgfältigst untersucht, woraus sich folgende Tabelle von Correcturen ergab.

Therm. I.		Therm. II.	
Theilstrich	— Correctur.	Theilstrich	— Correctur.
35	+ 0,05	150	0
70	+ 0,10	194	+ 0,10
90	+ 0,05	240	+ 0,20
120	0	250	+ 0,32
140	— 0,05		
175	— 0,10	Th. I ist auf mittleres Kaliber zwischen 0 und 280,	
210	— 0,10		
280	— 0,05		
290	— 0,10	Th. II auf das gleichförmige Kaliber zwischen 0 und 150 reducirt.	
300	— 0,15		
310	— 0,20		
320	— 0,25		
325	— 0,30.		

Da das Intervall von 100° C. sich annähernd bei Th. I vom Theilstrich 16 bis 320, bei Th. II von 38 bis 256 erstreckt, so erhebt sich die Correctur wegen ungleichen Kalibers nur bei den höchsten Temperaturen auf 0°,1 C.

Den Thermometerröhren wurden cylindrische Gefäße von etwa 30<sup>mm</sup> Länge und 5<sup>mm</sup> Durchmesser angeblasen, die Thermometer bei der Füllung mit Quecksilber luftleer gemacht und verschlossen, und kurz darauf die Bestimmung der fixen Punkte vorgenommen.

Schon vor der Aufertigung dieser beiden Instrumente waren zwei mehre Jahre alte Thermometer von Fastré in Paris zur Vergleichung mit dem Luftthermometer verwendet worden, welche zwar nur das Intervall von  $-15^{\circ}$  bis  $+50^{\circ}$  umfaßten, aber direct in Zehntel Celsius'scher Grade getheilt waren und mehre Monate lang die größte Beharrlichkeit des Nullpunktes gezeigt hatten. Beide Instrumente weichen in der Nähe von  $50^{\circ}$  um  $0^{\circ},2$  von einander ab, sie wurden daher miteinander verglichen und eine Tabelle entworfen, welche die Angaben des einen auf die des andern Thermometers reducirt. Es war dann nichts übrig, als später eines von beiden noch an mehreren Stellen mit den Normalthermometern zu vergleichen, sowohl um den wahren Gradwerth der Theilstriche zu bestimmen als die etwa vorkommenden Ungleichheiten des Kalibers zu eliminiren; dann konnten die mit ihnen und dem Luftthermometer vorgenommenen Vergleichen so angesehen werden, als seyen sie mit den Normalthermometern selbst gemacht. Diese Vergleichung am 21. Mai 1862 jedesmal

von 0°,1 erhalten bleibt. Dabei setzt ein *Rührer*, dessen *Schaufeln* die Gruppe der *vertical* eingelassenen drei *Thermometer* fast ganz umschliessen, das Wasser des inneren Gefässes *fortwährend* so in Bewegung, dass locale *Temperaturdifferenzen* sich nicht ausbilden können. Den ganzen Kessel verschliesst ein Deckel, welcher Oeffnungen für *Rührer* und *Thermometer* enthält. Die Ablesung an den sorgfältig *vertical* gestellten *Quecksilberthermometern* geschieht zur Vermeidung der *Parallaxe* mittelst eines Fernrohrs.

Eine empfehlenswerthe Vorsichtsmaassregel für die Versuche mit dem *Luftthermometer*, insbesondere, wenn man durch mehrere Tage fortgesetzte Beobachtungen auf denselben Nullpunkt beziehen will, fand ich darin, dass man grössere Schwankungen der in *S* schliessenden Säule durch rechtzeitiges Abschliessen in *H* zu vermeiden sucht. Man überzeugt sich nämlich leicht, dass solche Schwankungen Verrückungen des Nullpunktes (in der Regel Sinken desselben) und sogar Eintritt von Feuchtigkeit aus dem mit der äusseren Luft communicirenden *Quecksilber* zur Folge haben, wie gut man auch dieses vor den Versuchen mag getrocknet haben. Dieselben Gründe lassen es, wenn man grosse Genauigkeit betont, überhaupt nicht ratsam erscheinen, länger als zwei bis drei Tage zu experimentiren, ohne den Apparat von Neuem mit trockener Luft zu füllen.

#### Rechnung der Temperaturen des *Luftthermometers*.

Aus dem vereinigten *Mariotte'schen* und *Gay-Lussac'schen* Gesetze

$$Pv = R(1 + \alpha x)$$

leitet man sich leicht die Formel ab zur Berechnung der Temperatur  $x$  des *Luftthermometers*. Bezeichnet nämlich  $H_0$  den auf 0° C. reducirten Barometerstand,  $h_0$  die ebenso reducirte Höhe der *Quecksilbersäule* über dem Niveau der Spitzen bei der Temperatur 0 des schmelzenden Schnees,  $t$  die bei der Nullpunktsbestimmung gerade stattfindende Temperatur der Umgebung, und haben  $H_s$ ,  $h_s$ ,  $t'$  analoge

Bedeutungen bei Messung der Temperatur  $x$ , ist ferner  $\beta$  der cubische Ausdehnungscoefficient des Glases,  $\alpha$  der Ausdehnungscoefficient der Luft, so ist:

$$(H_0 + h_0) \left(1 + \frac{v_0}{V_0} \frac{1 + \beta t}{1 + \alpha t}\right) = (H_x + h_x) \left(\frac{1 + \beta x}{1 + \alpha x} + \frac{v_0}{V_0} \frac{1 + \beta t'}{1 + \alpha t'}\right).$$

#### Einfluß der Fehler.

Um die Abhängigkeit der Genauigkeit einer Temperaturbestimmung von den einzelnen Bestimmungsstücken zu rechnen, kann man sich einer vereinfachten Formel bedienen:

$$1 + (\alpha - \beta)x = \frac{H_x + h_x}{H_0 + h_0}.$$

1. Der Einfluß des Beobachtungsfehlers in Bestimmung von  $H_x$  und  $h_x$  ist von der Temperatur nahezu unabhängig, um so geringer, je größer  $H_0 + h_0$  ist und beträgt bei  $H_0 + h_0 = 760^{\text{mm}}$  dann  $\pm 0^{\circ},1$  wenn der Fehler selbst von der Größe  $\pm 0,27^{\text{mm}}$  ist. Ebenso hat der Fehler von  $\pm 0,27^{\text{mm}}$  in der Nullpunktsbestimmung ( $H' + h''$ ) den

Es könnte auffallend erscheinen, daß hier noch von einer Unsicherheit im Ausdehnungscoëfficienten der Luft die Rede ist, da derselbe doch durch ausgedehnte Versuchsreihen der HH. Magnus <sup>1)</sup> und Regnault <sup>2)</sup> mit einer bis in die 6. Decimale reichenden Uebereinstimmung ( $\alpha = 0,003665$ ) bestimmt scheint. Es wird aber hier nicht zum ersten Male darauf aufmerksam gemacht <sup>3)</sup>, daß diese genaue Uebereinstimmung nur scheinbar ist, da Hr. Magnus, indem er die Temperatur des bei 28 Pariser Zoll siedenden Wassers  $= 100^\circ \text{C.}$  setzt, in der That die 100 Grade der Celsius'schen Scale auf ein kleineres Temperaturintervall bezieht, als Hr. Regnault, der den oberen fixen Punkt dieser Scale in die Temperatur des bei 760<sup>mm</sup> siedenden Wassers verlegt. Nun sind 28 Zoll nur 757,96<sup>mm</sup> und nach Regnault's Tafeln ist die Temperatur des bei diesem Drucke gesättigten Wasserdampfs um 0",08 tiefer als die Temperatur des Wasserdampfes von 760<sup>mm</sup> Spannung. Schließt man sich in der Wahl des Intervalls an Regnault an, so ist 99°,92 die Temperatur des Dampfes von 28" Spannung und demnach die von Hrn. Magnus zwischen 0° und dieser Temperatur beobachtete Spannungszunahme 0,366508 noch durch 99,91 zu dividiren wodurch man 0,0036679 für den Ausdehnungscoëfficienten erhält <sup>4)</sup>.

1) Sämmtliche Versuche Regnault's hierüber sind im 21. Bande der Memoiren der Pariser Akademie von 1847 zusammengestellt, die ersten schon 1842 in den *Annales de chimie et de phys.* veröffentlicht.

2) Pogg. Annalen Bd. 55, 1842.

3) Hr. Magnus selbst giebt die einschlägige Reduction S. 25 des 55. Bandes von Pogg. Annalen.

4) Es muß hier bemerkt werden, daß Hr. Regnault die nämliche Zahl als Mittel aus 12 Versuchen der 3. Reihe (S. 51 des 21. Bandes) findet, 0,0036650 als Mittel aus 6 Versuchen der 4. Reihe (S. 58 des 21. Bandes). In diesen beiden Versuchsreihen hat Regnault dieselbe Methode wie Rudberg und Magnus angewendet, nach deren Princip auch das hier verwendete Instrument construirt ist. Der Umstand, daß Hr. Regnault in den beiden ersten Versuchsreihen etwas kleinere Werthe findet, erklärt sich aus einem kleinen, aber bei den dort angewandten Methoden unvermeidlichen Beobachtungsfehler. Denn man wird Quecksilber in einer mit Luft gefüllten Glasröhre nicht aufsteigen

Es bleibt also in der That eine Differenz von 0,000003 zwischen den Mittelwerthen beider Forscher, was, je nachdem man den einen oder andern dieser Coëfficienten benutzt, eine Unsicherheit von 0°,04 bei 50°, von 0°,016 bei 20° .... hereinbringt.

Indessen bemerkt man wohl, daß Versuche wie die hier vorzulegenden erst dadurch den erforderlichen Grad von Zuverlässigkeit gewinnen, wenn der Ausdehnungscoëfficient der zu jeder Versuchsreihe verwendeten Luft selbstständig bestimmt wird. Denn erstlich wird man dadurch, daß man bei diesen nicht ganz leichten Versuchen Zahlen findet, welche von den Resultaten erprobter Forscher nicht bedeutend abweichen, mehr Vertrauen in die Güte der Instrumente und die Methode der Messung erwecken als durch jede Beschreibung, und zweitens gewinnt man den nicht unbedeutenden Vortheil, daß man durch Rechnung der Temperaturen mit dem eigens hierfür bestimmten Ausdehnungscoëfficienten die kleinen Fehler eliminirt, deren

stimmt (auch zu groß gefundenen) Ausdehnungscoefficienten rechnet, wieder um  $0^{\circ},085$  erniedrigt, so daß nur ein Fehler von  $-0^{\circ},02$  übrig bleibt.

4. Man verdankt es der großen Ueberlegenheit des Ausdehnungscoefficienten der Luft über den des Glases, daß die Unsicherheit, welche hinsichtlich der Ausdehnung eines einzelnen Gefäßes selbst nach vorausgegangenen Versuchen über die Ausdehnung von Glasgefäßen aus derselben Glassorte noch übrig bleibt, die Temperaturbestimmung mit dem Luftthermometer kaum um  $0^{\circ},01$  beeinflusst. Bei Berechnung der Temperaturen des Luftthermometers wurde

zwischen	$0^{\circ}$	und	$30^{\circ}$	. . . .	0,0000260
"	$30^{\circ}$	"	$60^{\circ}$	. . . .	0,0000265
"	$60^{\circ}$	"	$100^{\circ}$	. . . .	0,0000271.

als Ausdehnungscoefficient des Glases in Rechnung gebracht.

5. Dadurch, daß man die Temperatur, welche ein neben der Röhre *S* aufgehängtes Thermometer anzeigt, für die Luft im Volumen  $v_0$  in Rechnung bringt, darf man, wenn  $\frac{v_0}{V_0} = 0,003$ , einen Fehler von  $3^{\circ}$  begehen, bis dadurch die Temperaturbestimmung selbst um  $0^{\circ},01$  falsch wird. Zur Annahme eines solchen Fehlers ist kein Grund vorhanden, wenn man nur nicht versäumt, den Raum, in welchem sich die Spitze befindet, durch einen Schirm vor der Wärme des Bades zu schützen, und die Capillare sehr eng genommen hat.

Nach Allem, was im Vorausgehenden angeführt worden ist, wird man eine Sicherheit von  $0^{\circ},1$  für die aus mehreren Einstellungen resultirende Temperaturbestimmung nicht von vornherein für illusorisch halten dürfen, wenn man nur die Berechtigung zur Benutzung eines von dem oben erwähnten, nicht weit abweichenden Ausdehnungscoefficienten der Luft für den speciellen Fall nachgewiesen hat, und die zu messenden Temperaturen lange genug constant erhält, daß sie sich der gesamten Luftmasse im Ballon *V* mittheilen können.

Die Versuche selbst sind in drei Abtheilungen gemacht.

Die erste im Februar und April 1862 mit den alten Thermometern von Fastré, die zweite im Juli 1862 mit den kurz vorher construirten Normalthermometern, die dritte mit eben diesen Thermometern im Februar 1863. Von der zweiten Versuchsreihe an bis zum Schlusse wurde der gleiche Glasballon am Luftthermometer benutzt, dessen Ausdehnung zwischen  $0^{\circ}$  und  $100^{\circ}$  zahlreichen Versuchen gemäß, die im hiesigen physikalischen Cabinet mit derselben Glassorte von verschiedenen Beobachtern waren angestellt worden,  $100\beta = 0,00271$  angenommen ist.

Das Verhältniß  $\frac{v_0}{V_0}$  ergab sich durch Wägung der Zahl 0,003309 gleich, wovon 0,000102 auf die Capillare  $c$  trifft. In der ersten Beobachtungsreihe ist ein Glasapparat von der nämlichen Glassorte verwendet worden, dessen Capillare ( $c$ ) einen ziemlich großen Durchmesser hatte, so daß es nöthig schien, für die Rechnung das Volumen  $v_0$  zu trennen in das Volumen des Raumes mit der Spitze  $s$ , welches 0,005416, und das Volumen der Capillare, welches 0,0008546 vom Volumen  $V_0$  betrug. Für jenen Theil wurde die Temperatur der Umgebung, für diesen aber das arithmetische Mittel der Temperaturen in  $V_0$  und der Umgebung in Rechnung gebracht, was insofern annähernd gerechtfertigt schien, als ein Theil der Röhre (etwa  $\frac{1}{4}$ ) wirklich in das Bad miteintauchte, ein anderer über den Kessel hineinreichte, also der von demselben aufsteigenden warmen Luft ausgesetzt war. Ich suchte diese Annahme dadurch zu prüfen, daß ich unter Voraussetzung derselben den Ausdehnungscoefficienten der Luft bestimmte. Es ergab sich aus vier Einstellungen auf den Siedepunkt und zwei auf den Nullpunkt bei derselben Füllung im Mittel  $\alpha = 0,0036701$ , was so nahe an den von Hrn. Magnus gefundenen Werth fällt, daß jene Annahme zulässig schien.

Die folgenden Tafeln geben eine Zusammenstellung der Beobachtungsergebnisse mit allen Elementen der Rechnung für die Temperaturen des Luftthermometers. Sie bedürfen keiner weiteren Erklärung als vielleicht der Bemerkung,



No. des Versuches	Reduc. Barometerstand $H$	Temp. des Luftthermometers $T$	Temperaturangaben der Quecksilber-Thermometer (Th. I) & (Th. II)	Differenzen $\frac{t_1 + t_2}{2} - T$	
-------------------	---------------------------	--------------------------------	--	---------------------------------------	--

Reihe.

	mm	25,59	25,75	25,75	0,16	23. April
1	717,932	25,67	25,89	25,87	0,21	
2	717,956	36,41	36,63	36,63	0,22	24. April
3	717,887	36,43	36,64	36,65	0,21	
4	717,838	38,42	—	—	—	
5	717,465	meters ist hier aus dem Siedepunkt				
6	717,445	coefficient nach Magnus $\alpha = 0,003668$				
7	717,425					
8	717,378					
9	717,214					
10	717,202					

Reihe.

11	717,164					
12	717,108					
13	717,014					
14	712,281					
15	712,137	0	0	0	—	28. April
16	712,156	45,48	45,66	45,68	0,19	
17	712,121	45,43	45,68	45,70	0,26	
18	711,867	45,46	45,66	45,71	0,22	
19	711,889	45,53	45,74	45,76	0,22	
20	710,233	meters ist hier direct in schmelzendem				
21	710,179	coefficient nach Magnus $\alpha = 0,003668$				
22	710,170					
23	709,985					
24	710,417					
25	710,581	wurde einmal bei 0°,36, das zweite Mal				
26	716,279					
27	716,228					
28	714,659					
29	714,659	(Juli 1862.)				
30	714,362					
31	714,392	Reihe.				

Der N

Th. I.	Th. II		
--------	--------	--	--

educ.  
Baro-  
meter-  
stand  
 $H$ 

mm  
22,776  
23,210  
23,254  
23,304  
23,304  
23,941  
23,941  
23,967

Der  
No. 8  
Com-  
pensation

mm  
727,817  
727,827  
727,325  
727,175  
727,125  
727,159  
729,115

728,684  
727,416  
727,366  
727,126

Aus-  
ficient

(\*) Die Beobachtung No. 8 ist durch einen Punkt an bezeichnet; sie wurde bei einbrechender Dunkelheit gemacht; die Temperatur war abgelesen worden.

Reduc. Höhe über dem Niveau A	Tempe- ratur der Umge- bung $t'$	$v_0 \frac{1+\beta t'}{V_0 \frac{1+\alpha t'}}$	Temp des Luft- ther- mome- ters $T$	Temperatur- angaben der Quecksilber- Thermometer Th. I) t Th II)	Differenzen $\frac{t_1+t_2}{2} - T$	
123,645	8,1	0,0032143	19,19	19,30	19,24	0,08
145,553	8,4	0,0032109	26,98	27,13	27,16	0,16
212,626	9,8	0,0031951	50,34	50,50	50,53	0,17
212,101	"	"	50,17	50,37	50,39	0,21
212,126	"	"	50,18	50,40	50,39	0,21
242,841	9,4	0,0031996	61,14	61,36	61,38	0,23
243,000	9,2	0,0032019	61,19	61,39	61,38	0,19
67,542	8,9	0,0032053	0	0	—	

Nullpunkt des Th. I wurde in No. 16 ebenda gefunden, wo er lag.

binirt man die Beobachtungen 1, 2, 3, 16 zur Berechnung des Coefficienten der Luft, so erhält man

aus 1 und 2  $\alpha = 0,0036689$

aus 2 und 3  $\alpha = 0,0036702$

aus 1 und 16  $\alpha = 0,0036661$

aus 2 und 16  $\alpha = 0,0036674$

Mittel  $\alpha = 0,0036681$

#### XI. Reihe.

345,030	9,1	0,0032030	98,79	—	—	—	25. Febr.
62,925	7,7	0,0032189	0	—	0	—	
237,320	9,8	0,0031951	60,86	61,05	60,99	0,16	
237,670	9,8	"	60,93	61,22	61,13	0,24	
237,245	9,4	"	60,77	60,95	60,90	0,15	
266,438	9,4	0,0031996	71,00	71,17	71,07	0,12	Zweiter Tag 26. Febr.
344,090	6,8	0,0032291	98,835	—	—	—	
			100	100	—	—	
121,914	7,9	0,0032166	20,99	21,11	21,03	0,08	
202,858	9,2	0,0032019	48,83	49,02	49,05	0,20	
203,000	9,3	0,0032008	48,80	49,02	49,05	0,17	
63,286	8,9	0,0032053	0	0	0	—	

den Beobachtungen 1, 2, 7, 12 berechnet sich der Ausdehnungs-  
der Luft wie folgt:

aus 1 und 2  $\alpha = 0,0036634$

aus 1 und 12  $\alpha = 0,0036695$

aus 2 und 7  $\alpha = 0,0036669$

aus 7 und 12  $\alpha = 0,0036729$

dafs durch die in den Rubriken der Quecksilberthermometer eingetragenen Zeichen 0 und 100 Controlen des Nullpunkts und Siedepunkts angezeigt werden, welche in der bezeichneten Reihenfolge vorgenommen worden sind, und dafs jeder der 9 Beobachtungsreihen, welche mit den fortlaufenden römischen Ziffern bezeichnet sind, eine neue Füllung des Ballons mit Luft vorausging. Auszuschliessen wäre nur No. 8 der dritten Abtheilung gewesen, welche eilig bei noch steigender Temperatur gemacht wurde, hier der Vollständigkeit wegen eingetragen ist. Sie kann als Beleg dienen, dafs das Luftthermometer die Temperaturen früher annahm als die Quecksilber-Thermometer.

(Hier folgt Tafel I.)

Schon die Beobachtungen in den beiden ersten Abtheilungen schienen aufser Zweifel zu setzen, dafs Abweichungen des Quecksilberthermometers vom Luftthermometer in dem Sinne und von der Gröfse stattfinden, wie sie schon von Regnault beobachtet worden. Indessen waren die Beobachtungsfehler insbesondere in der Abtheilung II, in welcher die erst neu angefertigten Thermometer verglichen worden sind, noch viel zu grofs (Vergl. die Beobachtungen V<sub>3</sub> und VII<sub>3</sub>), als dafs man sich dabei hätte beruhigen können. Auch der Ausdehnungscoëfficient der Luft war in beiden Bestimmungen etwas gröfser ausgefallen als die Mittelwerthe von Magnus und Regnault <sup>1)</sup>, ein Umstand, welcher der Gröfse seines Einflusses gemäfs zwar das Resultat nur um wenige Hundertel von Graden unsicher machen kann, aber doch als eine Unvollkommenheit anzusehen war, von der man die Arbeit befreien konnte. Es wurde deshalb, nachdem einerseits die neuen Quecksilberthermometer abgelagert, andererseits der Trockenapparat verbessert und die etwas gekrümmte Meßröhre NM des Luftthermometers durch eine gerade ersetzt war, die Ar-

1) Sie liegen übrigens innerhalb der Gränzen der Beobachtungsfehler, da da der höchste Werth, den Regnault findet, 0,0036747, bei Magnus, 0,0036790 ist.

beit nochmals aufgenommen und führte durch die Beobachtungen der Abtheilung III zu Resultaten, womit man die Untersuchung für beendet halten durfte. Denn erstlich zeigten die Nullpunkte der Quecksilberthermometer bei den Controlen vor und nach den Vergleichen keine Verrückungen bis nach der endlichen Bestimmung des Siedepunktes; und wären wirklich solche Verrückungen momentan während der Vergleichung selbst vorgekommen, so daß sich der alte Nullpunkt erst nachher wieder hergestellt hätte, so müssen dieselben, da sie erfahrungsgemäß bei Temperaturerhöhungen vertical eintauchender Thermometer ausnahmslos als *Depressionen des Nullpunktes* auftreten<sup>1)</sup>, die Angaben der Quecksilberthermometer erniedrigt und also dem Luftthermometer näher gebracht haben. Würden daher solche Verrückungen nachtheiligen Einfluß auf die Resultate geübt haben, so müßte man die Abweichungen des Quecksilberthermometers und Luftthermometers in demselben Sinne, wie sie die Beobachtung ergiebt, nur noch *größer* annehmen, was aus andern Gründen unzu-

denen auf das Beste überein. Endlich steht unter den 19 Beobachtungen der letzten Abtheilung nur ein Resultat vereinzelt: No. 8 der ersten Reihe, welches dem Beobachtungsjournal gemäß auszuschließen ist. Vergleichen über 70° wurden vermieden, weil nach den Beobachtungen von Henrici hier schon merkliche Depressionen des Nullpunkts zu fürchten sind, denen ich die Thermometer nicht ohne Noth aussetzen wollte. Die Siedepunktsbestimmung gegen das Ende der neunten Reihe (Abth. III) war zur genauen Ermittlung des Intervalls nothwendig und die unmittelbar folgenden, zwischen Siedpunkts- und Nullpunkts-Bestimmung fallenden Vergleichen wurden hauptsächlich darum gemacht, daß von den Folgen

Siedepunkt — Nullpunkt — Messung

Nullpunkt — Messung — Siedepunkt

Siedepunkt — Messung — Nullpunkt

jede in diesen Beobachtungen vertreten sey. Ich kann zwar schon hier bemerken, daß meinen Erfahrungen gemäß die zweite Folge dann bei weitem den Vorzug verdient, wenn vor der Bestimmung des Nullpunkts mehrere Tage der Ruhe für die Thermometer (Zimmertemperatur) vorhergegangen sind, werde aber unten bei Gelegenheit der Bestimmung des mittleren Fehlers auf die Kritik dieser Methoden noch eingehender zurückkommen.

Die Temperaturangaben der Quecksilberthermometer sind hier so eingetragen, wie sie der Beobachtung unmittelbar entnommen sind. Sie müssen indessen, ehe man sie weiter und speciell zur Ableitung der scheinbaren Ausdehnung verwendet, noch eine Correctur <sup>1)</sup> erfahren, welche durch einen kleinen Unterschied zwischen dem definirten Grade und dem direct abgelesenen hereingebracht wird. Man nennt den hundertsten Theil des *Volumens Quecksilber*, welches bei der Erwärmung des Thermometers von der Temperatur des schmelzenden Schnees bis zu der Tempe-

1) Diese Correctur hat Hr. Poggendorff im 41. Bande seiner Annalen S. 372 gegeben.

ratur des bei 760<sup>mm</sup> Druck gesättigten Wasserdampfs über die Marke 0 herausgetreten ist, einen Grad, mißt aber dieses Volumen in einer cylindrischen Röhre, welche selbst die Temperatur hat, die bestimmt werden soll. Sie ist also nicht immer gleich weit, und es ist deutlich, daß sie wenn der Quecksilberfaden bei 50° steht, nicht gerade die Hälfte des Quecksilbers faßt, welches sie bei 100° enthalten hat, sondern weniger, so daß das Einstehen des Fadens auf 50° nicht die oben definirten 50 Grade anzeigt, sondern eine etwas tiefere Temperatur, die man allgemein erhält, wenn man die Anzahl der abgelesenen Grade  $t$  mit dem Factor  $\frac{1 + \beta t}{1 + \beta 100}$  multiplicirt, worin  $\beta$  den cubischen Ausdehnungscoëfficienten des Glases bezeichnet. Statt dieses Factors läßt sich mit hinreichender Annäherung der Subtrahend

$$\beta(100 - t)t$$

setzen, der an der abgelesenen Temperatur  $t$  zur Reduction auf die definitive Temperatur (des Quecksilberthermometers) angewandt wird.

**Reductionstafel der Temperaturangaben des Quecksilberthermometers  
auf die des Luftthermometers.**

Temperaturangabe des Luftthermometers	Temperaturangabe des Quecksilberthermometers	
	Corrigirte Ablesung	Directe Ablesung
10°	10°,06	10°,08
20	20 ,10	20 ,14
30	30 ,13	30 ,18
40	40 ,14	40 ,20
50	50 ,13	50 ,20
60	60 ,12	60 ,18
70	70 ,09	70 ,14
80	80 ,06	80 ,10
90	90 ,03	90 ,05
100	100 ,00	100 ,00

**Ableitung des mittleren Beobachtungsfehlers.**

Hiernach ergeben sich die Beobachtungsfehler in Hunderteln von Graden in der Reihenfolge der Beobachtungen aufgeführt:

I. Abtheilung.	II. Abtheilung.	III. Abtheilung.
$R - B$	$R - B$	$R - B$
— 4 0	— 2	+ 3
+ 2 — 1	— 19	+ 5
— 2 — 1	— 15	— 2
+ 1 — 8	— 3	— 5
— 1 — 5	+ 6	+ 5
+ 3 — 4	+ 6	+ 1
+ 2 — 5	— 12	+ 3
+ 2 — 2		— 1
+ 1 + 1		— 1
+ 3 + 1		— 5
+ 5 + 4		— 1
+ 3 + 6		+ 2
+ 2 0		— 6
+ 1 + 5		+ 3
— 1 — 3		+ 2
+ 5 — 2		+ 6
0 + 1		0
— 5 — 6		+ 3
— 8 — 2		
— 2		

Die Fehler der dritten Abtheilung, deren Beobachtungen nach vorausgegangener langer Ruhe der Thermometer so angestellt wurden, daß die zur genauen Ermittlung des Intervalls nöthige Siedepunktsbestimmung an das Ende der Vergleichen verlegt wurde, übertreffen um nichts die der ersten Abtheilung, in welcher mehre Jahre alte Thermometer von unveränderlichem Nullpunkte nur bis zu Temperaturen von 45° benutzt worden sind. Hingegen geben die starken Differenzen der II. Abtheilung ein abschreckendes Beispiel gegen die dort angewandte Methode. Die Normalthermometer sind hier bald nach ihrer Anfertigung verglichen, in welche Zeit bekanntlich ohnedies die bedeutendsten Verrückungen des Nullpunkts fallen. Dazu kommt, daß häufige Siedepunktsbestimmungen zwischen die Vergleichen eingeschoben wurden, welche jedesmal eine momentane Erniedrigung bewirken. (Vergl. den Anhang), so daß die Temperaturmessung stets in die Zeit der Hebung des Nullpunktes und folglich zu hoch ausfällt, wenn sie auf einen vor der Messung und nach dem Siedepunkt



dieser Gränze liegt. Was das Letztere betrifft, so wird wohl die Individualität des benutzten Thermometers entscheiden, denn es zeigten z. B. die Thermometer I. und II. nach Temperaturerhöhungen bis zu  $61^{\circ}$  keine Depression des Nullpunkts, während Henrici in diesem Falle eine solche im Betrage von  $0^{\circ},1$  an seinem Thermometer bemerkt hat.

Da man die großen Fehler der II. Abtheilung einer ungeschickten Behandlung der Quecksilberthermometer zuschreiben muß, so wird man, um ein genähertes Maass für die Sicherheit einer Temperaturbestimmung mit Prof. Jolly's Construction des Luftthermometers zu erhalten, nur die 57 Beobachtungen der I. und III. Abtheilung zur Ableitung des *mittleren Fehlers* benutzen. Dieser berechnet sich als Quadratwurzel aus der durch die Anzahl der Beobachtungen <sup>1)</sup> dividirten Quadratsumme der Fehler zu  $0^{\circ},035$  und daraus ergibt sich

$$0^{\circ},023$$

als *wahrscheinlicher Fehler* einer Beobachtung. Von den 57 beobachteten Fehlern fallen 30 zwischen 0 und den wahrscheinlichen Fehler (soll die Hälfte), 41 bis 51 (je nachdem man 0,05 mitrechnet oder nicht) zwischen 0 und das Doppelte dieses Fehlers (soll 46) und der dreifache Betrag desselben wird nur zweimal überschritten, so daß den Anforderungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung vorzüglich genügt ist.

#### Verbesserte Tafeln für die Ausdehnungscoëfficienten des ordinären Glases und des Quecksilbers.

Es ist schon oben erwähnt worden, daß die aus Regnaults Tafeln berechneten Temperaturangaben des Quecksilberthermometers, wie sie den einzelnen Scalenpunkten des Luftthermometers entsprechen sollen, von den Resultaten seiner Vergleichen zwischen  $0^{\circ}$  und  $100^{\circ}$ , mit welchen auch die von mir gewonnenen nahe übereinstim-

1) Es wird hier der Einfachheit wegen allen diesen 57 Beobachtungen das gleiche Gewicht beigelegt, obwohl denen der dritten Abtheilung offenbar die größte Zuverlässigkeit zukommt.

men, nicht unerheblich abweichen. Dies ist in noch höherem Grade über 100 der Fall<sup>1)</sup>. Es ist also eine Revision dieser Tafeln geboten.

Versteht man unter  $t$  die corrigirte Ablezung am Quecksilberthermometer, unter  $q_0$  das Volumen irgend einer Masse Quecksilber bei  $0^\circ$  und den cubischen Inhalt des dasselbe umschließenden Glases, unter  $q_t$  und  $Q$  das Volumen des Quecksilbers beziehungsweise bei  $t^\circ$  und  $100^\circ$ , unter  $v_t$  und  $V$  den cubischen Inhalt des Glases bei  $t^\circ$  und  $100^\circ$ , so ist

$$t = 100 \frac{q_t - v_t}{Q - V}.$$

Aus dieser Gleichung läßt sich  $q_t - v_t$ , als aliquoter Theil der Differenz  $Q - V$  rechnen, welche man durch einen leichten dilatometrischen Versuch erhält, und aus den Vergleichen beider Thermometer kennt man jene Temperatur des Luftthermometers, zu welcher die Volumina  $q_t$  des Quecksilbers und  $v_t$  des Glases gehören, deren Differenz man gefunden hat. Kennt man dazu noch die ab-

ist, sondern mit der Temperatur wächst. Setzt man daher in der einfachsten Form

$$\beta = a + b t$$

und bestimmt die Constanten  $a$  und  $b$  aus den angeführten Versuchsergebnissen, so erhält man

$$100\beta = 0,002531 + 0,0000023 t.$$

Benutzt man diese Formel zur Herstellung der Glasvolumina ( $v$ ) und verbindet damit die Resultate der thermometrischen Versuche, so läßt sich der Gang des Quecksilber-Ausdehnungscoefficienten zwischen  $0^\circ$  und  $200^\circ$  ermitteln. Das so Gewonnene ist in folgender Tafel zusammengestellt.

Tafel für die Ausdehnung des ordinären Glases und des Quecksilbers zwischen  $0^\circ$  und  $200^\circ$ .

Temperatur des Luft- thermo- meters $T$	Mittlerer Aus- dehnungscoëf- ficient des Glases $\beta$	Mittlerer Aus- dehnungscoëf- ficient des Quecksilbers $\gamma$	Differenzen von $\gamma$
10°	0,00002554	0,00018038	
20	0,00002577	0,00018047	9
30	0,00002600	0,00018057	10
40	0,00002623	0,00018068	11
50	0,00002646	0,00018079	11
60	0,00002669	0,00018091	12
70	0,00002692	0,00018104	13
80	0,00002715	0,00018119	15
90	0,00002738	0,00018135	16
100	0,00002761	0,00018153	18
110	0,00002784	0,00018174	21
120	0,00002807	0,00018198	24
130	0,00002830	0,00018222	24
140	0,00002853	0,00018246	24
150	0,00002877	0,00018270	24
160	0,00002900	0,00018295	25
170	0,00002923	0,00018321	26
180	0,00002946	0,00018348	27
190	0,00002969	0,00018376	28
200	0,00002992	0,00018405	29

Die in dieser Tafel verzeichneten Werthe von  $\beta$  und  $\gamma$  stellen die thermometrischen Versuche Regnault's und meine eigenen vollkommen dar und schliessen sich zugleich

besser an Regnault's Versuche über die absolute Ausdehnung des Quecksilbers an, als die von ihm gegebene empirische Formel und die nach derselben berechnete Tafel; außerdem hat der hier hervortretende Gang der Werthe von  $\gamma$  die Analogie der übrigen Flüssigkeiten für sich.

Versucht man diese Tafel über  $200^{\circ}$  hinaus auszudehnen, so kommt man, wenn man nicht das sonderbare Zugeständniß machen will, daß der Ausdehnungscoëfficient des Glases von da an langsamer zunehme und endlich gar abnehme, mit den Versuchsergebnissen Regnault's in Collision, und die Differenz beträgt mehre Grade. Man kann also nicht sagen, daß die wichtige Frage nach der Ausdehnung des Quecksilbers und des ordinären Glases über  $200^{\circ}$  hinaus schon in befriedigender Weise gelöst sey. (Eine ausführlichere Kritik findet man in der vollständigen Abhandlung).

#### Anhang.

des Punktes 100 der Celsius'schen Scale, womit zugleich der Werth des Intervalls von 100 Graden gegeben ist.

Zusammenstellung der Nullpunkte- und Siedepunktebestimmungen.

Th. I.

No.	Zeit	Nullpunkt	Siedepunkt	Temperatur	Punkt 100° C.
1	16. Mai 1862 Vorm.	—	312,10	98,26	317,85
2	" Nachm.	15,55	—	—	
3	17. Mai	15,95	—	—	
4	"	—	312,80	98,43	317,83
5	18. Mai 10 <sup>h</sup>	16,05	—	—	
6	" 10 <sup>h</sup> 33'	—	312,60	98,41	
7	" 11 <sup>h</sup> 50'	15,65	—	—	317,86
8	" 4 <sup>h</sup>	15,85	—	—	
9	19. Mai 11 <sup>h</sup>	16,05	—	—	
10	" 3 <sup>h</sup>	16,05	—	—	317,54
11	21. Mai 11 <sup>h</sup>	16,05	—	—	
12	23. Mai 4 <sup>h</sup>	16,25	—	—	
13	" 4 <sup>h</sup> 30'	—	312,60	98,36	317,65
14	" 5 <sup>h</sup>	15,44	—	—	
15	24. Mai 2 <sup>h</sup>	15,95	—	—	
16	25. Mai Vorm.	16,35	—	—	317,63
17	"	—	312,80	98,40	
18	"	15,80	—	—	
19	" 3 <sup>h</sup>	—	312,48	98,34	317,49
20	26. Mai Nachm.	16,10	—	—	
21	27. Mai	16,15	—	—	
22	3. Juni	16,45	—	—	317,52
23	25. Juni	16,65	—	—	
24	"	—	312,50	98,33	
25	"	16,75	—	—	317,54
26	26. Juni	16,15	—	—	
27	"	—	312,80	98,36	
28	27. Juni	16,05	—	—	317,53
29	"	—	311,60	98,10	
30	29. Juni	16,25	—	—	
31	30. Juni	—	312,5	98,31	317,60
32	"	16,75	—	—	
33	2. Juli	16,25	—	—	
34	"	—	312,65	98,40	317,47
35	3. Juli	16,15	—	—	
36	4. Juli	—	312,55	98,33	
37	13. Febr. 1863	16,35	—	—	317,68
38	24. Febr.	16,85	—	—	
39	26. Febr.	—	314,18	98,64	
40	"	16,20	—	—	

## Th. II.

No.	Zeit	Null- punkt	Siede- punkt	Tempe- ratur	Punkt 100° C.
1	25. Juni	38,25	—	—	256,16
2	"	—	252,52	98,33	
3	26. Juni	38,05	—	—	256,15
4	"	—	252,57	98,36	
5	27. Juni	38,0	—	—	256,47
6	"	—	252,32	98,10	
7	29. Juni	38,15	—	—	256,43
8	30. Juni	—	252,74	98,31	
9	"	38,0	—	—	256,33
10	2. Juli	38,17	—	—	
11	"	—	252,84	98,40	256,31
12	3. Juli	38,15	—	—	
13	4. Juli	—	252,67	98,33	256,24
14	5. Juli	38,25	—	—	
15	"	—	252,32	98,20	256,12
16	6. Juli	38,1	—	—	
17	7. Juli	38,3	—	—	256,13
18	23. Febr. 1863	38,65	—	—	
19	25. Febr.	38,65	—	—	256,12
20	26. Febr.	—	253,6	98,84	
21	"	38,0	—	—	256,13

voirs die Volumen- oder Gestaltänderung, welche der äussere Luftdruck im Laufe der Zeit hervorgebracht hat, erhalten bleibt, oder durch den mit der Wärme zusammenwirkenden Gegendruck der (beispielsweise bei einer Siedepunktsbestimmung) gehobenen Quecksilbersäule aufgehoben werden kann, um dann von neuem allmählich wieder Platz zu greifen. Im ersten Falle hat sich die Gleichgewichtslage des Nullpunkts verändert, während sie im zweiten Falle erhalten blieb.

Eine Erscheinung für sich bilden neben diesen sehr langsam im Laufe von Jahren vor sich gehenden Hebungen des Nullpunkts, diejenigen oscillations-artigen Verrückungen, welche man an den vertical eintauchenden Thermometern als Folge einzelner starker Temperaturerhöhungen wahrnimmt. So oft der Nullpunkt unmittelbar nach dem Siedepunkte untersucht wurde, zeigte sich, dass er gesunken war, und ebenso deutlich sieht man, dass er sofort wieder den Weg in seine frühere Lage einschlägt, um diese dann zu überschreiten. Besonders instructiv hierfür sind die Beobachtungen 5 bis 10 und 12 bis 16 am Therm. I. Im Allgemeinen bemerkt man, dass die alte Lage in etwa 24 Stunden weiter erreicht ist, doch verhalten sich dabei die verschiedenen Thermometer verschieden, ja dasselbe nicht immer gleich. Man wird sich also hüten, mit einer Messung in diese Oscillationen des Nullpunkts zu gerathen, da sie jede Sicherheit über den gegenwärtigen Stand desselben ausschliessen, während die allmähliche Hebung des Nullpunkts wegen ihres langsamen Fortschreitens nicht als Quelle der Unsicherheit zu betrachten ist, wenn man nur die Vorsicht gebraucht, den Nullpunkt vor der Beobachtung zu controliren.

Da die hier bemerkten regelmässigen Depressionen bei horizontal eintauchenden Thermometern nicht beobachtet werden, sondern vielmehr die grösste Unregelmässigkeit (Vgl. die cit. Abh. von J. J. Pierre), so ist wohl der Druck der aufsteigenden Quecksilbersäule theilweise für die Ursache der Ausweitung zu halten, nach dessen Besei-

tigung des Glas durch den combinirten Einfluß der Elasticität und des äußeren Luftdruckes allmählig wieder auf ein kleineres Volumen zurückgeführt wird. Daneben ist die Ansicht begründet, daß für Glas noch weit vom Schmelzpunkt entfernt eine Art von Elasticitätsgränze bezüglich der Ausdehnungen durch die Wärme existirt, nach deren Ueberschreitung das frühere Volumen durch Temperaturerniedrigung allein nicht wieder hergestellt wird.

---

*VI. Ueber das Kreuz, das gewisse organische Körper im polarisirten Lichte zeigen, und über die Haidinger'schen Farbenbüschel;  
von Victor von Lang.*

---



und ihr Verhalten zwischen einem gekreuzten Polarisirer und Analysirer betrachten. Die Krystalllinse besteht aus Fasern, welche im Allgemeinen um die Axe der Linse so angeordnet sind, daß sie von dieser Axe radial nach dem Rande der Linse verlaufen. Diese Fasern sind bekanntlich doppelbrechend, und zwar sind für die zwei senkrecht zur Längsrichtung derselben hindurchgehenden Lichtstrahlen die Polarisations Ebenen beziehungsweise parallel und senkrecht zu der Längsaxe. Betrachtet man daher eine Krystalllinse im polarisirten Lichte, so daß dasselbe parallel der Axe durch die Linse geht, so wird jeder Radius der Linse sich doppelbrechend erweisen, und zwar für den betrachteten Radius die eine Polarisations Ebene durch die Axe der Linse gehen, die andere Polarisations Ebene wird aber natürlich senkrecht zur ersteren seyn. Fig. 8 Taf. I giebt ein beiläufiges Bild der Polarisationsverhältnisse der einzelnen Radian der Linse; die Schenkel der kleinen Kreuze bedeuten eben die Richtung der Polarisations Ebenen der zwei von dem betreffenden Radius der Linse hindurchgelassenen Lichtstrahlen.

Bringt man nun die Linse zwischen zwei gekreuzte linear polarisirende Vorrichtungen, deren Polarisations Ebene parallel der Linsenaxe und den Linien  $AA'$  und  $PP'$  Fig. 8 seyen, so werden, wenn man durch den ganzen Apparat hindurchsieht alle jene Radian der Linse dunkel erscheinen müssen, deren Polarisations Ebenen mit denen des Analysirers und Polarisirers zusammenfallen; die dazwischen liegende Radian aber werden desto heller werden, je mehr sie sich von den ganz dunkeln Radian entfernen. Die ganze Erscheinung wird also die Form eines schwarzen Kreuzes auf lichtem Grunde haben, wie es in der Figur durch die Schraffirung angedeutet ist; der Mittelpunkt des Kreuzes muß in die Axe der Linse fallen und die Schenkel desselben müssen parallel den Linien  $AA'$  und  $PP'$ , d. h. parallel den Polarisations Ebenen des Analysirers und Polarisirers seyn.

Aus dem Gesagten geht aber hervor, daß die Ursache

des Kreuzes, welches wir an der Krystalllinse und ähnlichen Körpern im polarisirten Lichte wahrnehmen, wesentlich verschieden ist von dem Grunde, aus welchem Platten einaxiger Krystalle senkrecht zur optischen Axe geschnitten, eine ähnliche Erscheinung zeigen. Denn betrachtet man solche Krystallplatten im parallelen Lichte zwischen gekreuzten Polarisirer und Analysirer, so erscheint die ganze Platte dunkel und wir nehmen nur, wenn wir einen polarisirten Lichtkegel durch die Platten gehen lassen, ein Kreuz wahr, dessen Mittelpunkt dann immer in die Axe des Lichtkegels fällt, so daß eine Verschiebung der Krystallplatte ohne Einfluß ist auf den Ort, an welchem wir das Kreuz sehen. Bei der Krystalllinse jedoch und anderen Körpern mit ähnlichen Structurverhältnissen nehmen wir das Kreuz im parallelen Lichte wahr, und mit der Verschiebung des Objectes wird auch das Kreuz verschoben. Der Umstand, daß wir die letztere Erscheinung im parallelen Lichte am besten sehen, macht es auch, daß wenn wir die Krystalllinse ohne weitere Vorrichtung mit Hülfe eines Analysirers und

den kann. Die lichte Weite des Messingcylinders betrug ungefähr 19 Millim., hineinpafsten eine Glasscheibe und zwei dünnwandige hohle Holzcylinder, welche die Glasscheibe in einer zur Drehungsaxe senkrechten Lage festhalten. Auf die eine Seite der Scheibe wurde mit Glasleim eine doppeltbrechende Krystallplatte geklebt, während man die andere Seite mit schwarzem Papier belegte, aus welchem zwei Sectoren herausgeschnitten wurden, so zwar, daß die Halbirungslinie derselben parallel war mit einer Polarisationsebene des senkrecht durch die Krystallplatte gehenden Lichtes, wie dieß in Fig. 9 Taf. I dargestellt ist. Zur Reinheit des Versuches ist es nöthig, daß die Sectoren scharf ausgeschnitten sind und ihre Spitzen möglichst genau in den Mittelpunkt der Glasscheibe fallen. Bringt man nun vor und hinter der Scheibe ein feststehendes Nicol'sches Prisma an, und sieht durch dieselben auf eine gleichförmig erleuchtete Fläche, z. B. eine mit Strohpapier beklebte Feusterscheibe, so sieht man bei gekreuzten Prismen und rotirender Krystallplatte auf hellem Grunde concentrisch mit der Drehungsaxe ein schwarzes Kreuz, dessen Schenkel parallel den Polarisationsebenen der Nicol'schen Prismen sind.

Zur Erklärung dieses Versuches ist nach dem Vorhergesagten nichts hinzuzufügen, durch das Drehen der so vorgerichteten Glasscheibe wird eben eine radiale Anordnung doppeltbrechender Substanz nachgeahmt, wie wir sie in der Natur an der Krystalllinse antreffen.

Ich habe den Versuch mit den verschiedensten Krystallen mit gleichem Erfolge angestellt, das nächstliegende dürfte in den meisten Fällen ein nicht allzu dünnes Glimmerblättchen seyn.

Ich komme nun zu dem Haidinger'schen Farbenbüschel, welches Phänomen, wie ich glaube, ebenfalls der Krystalllinse seine Entstehung verdankt. Ich nahm nämlich an, daß die einzelnen Fasern der Linse nicht nur doppeltbrechend, sondern auch dichromatisch sind, und zwar muß der Strahl, welcher parallel der Längsrichtung der Fasern po-

larisirt ist gelblich, der andere senkrecht dazu aber bläulich gefärbt seyn. Diese Hypothese hat nichts besonders Unwahrscheinliches an sich, denn daß ein doppeltbrechender Körper auch dichromatisch sey, ist als der allgemeinere Fall auch der von vornherein wahrscheinlichere.

Fig. 10 Taf. I giebt nun für die einzelnen Radien der Krystalllinse die Polarisations Ebenen der zwei quer hindurchgehenden Lichtstrahlen, aber auch zugleich die Färbung, welche nach der eben ausgesprochenen Hypothese die beiden Strahlen haben müssen, indem die längeren Striche der einzelnen Kreuze die gelbliche Färbung des parallel dazu polarisirten Lichtstrahles bedeuten, der senkrecht dazu polarisirte Strahl ist dann der bläulich gefärbte. Geht nun Licht durch die Linse parallel ihrer Axe, und wird deshalb entweder vor der Linse oder nach derselben linear parallel der Linie  $AA'$  polarisirt, so werden die Radien der Linse, welche nahezu parallel  $AA'$  sind, gelblich gefärbt erscheinen müssen, indem für diese Radien der Strahl, welcher

nachher zu beschreibenden Versuche sprechen jedoch für einen ziemlich raschen Uebergang; dieß stünde in Uebereinstimmung mit den Farbenbüscheln, bei denen wir zwischen den gelben und blauen Sektoren kein dazwischenliegendes Weiß wahrnehmen können; doch mögen bei letzterer Erscheinung auch subjective Momente mitspielen, da wir dieselben nur wahrnehmen, wenn die Polarisationssebene des auf unser Auge fallenden Lichtes beständig ihr Azimut ändert.

Durch den Umstand, daß die Krystalllinse eben eine linsenförmige Gestalt hat, müssen die polarisirten Lichtstrahlen desto mehr gefärbt erscheinen, je näher sie der Axe der Linse hindurchgehen, indem sie eben alsdann mehr absorbirte Theilchen zu durchsetzen haben. Die in Fig. 10 Taf. I dargestellte Erscheinung muß sich daher an der Mitte der Linse am intensivsten zeigen, und gegen den Rand derselben allmählich unbemerkt werden.

Auch die Erscheinung der Farbenbüschel habe ich mit Hülfe des früher beschriebenen Rotationsapparates nachgeahmt, indem ich auf die wie früher vorgerichtete Glasscheibe eine dichromatische Krystallplatte befestigte, so daß wieder eine Polarisationssebene derselben mit der Axe der beiden Ausschnitte zusammenfiel. Nennen wir *P* den Farbenton des durch die Krystallplatte gehenden Lichtes, wenn es parallel der Axe der Sektoren polarisirt ist, *S* die Farbe der senkrecht dazu polarisirten Strahlen, so wird man, wenn die Glasscheibe mit dem Krystalle rotirt und dieselbe mit Hülfe eines Nicol'schen Prisma betrachtet wird, in der Polarisationssebene des Prisma zwei Sektoren von der Farbe *P* und senkrecht dazu zwei mit der Farbe *S* wahrnehmen, und dadurch bestätigt finden, was wir vorher über das Verhalten einer radial angeordneten dichromatischen Masse gesagt haben.

Was die Aehnlichkeit der mit Hülfe eines rotirenden dichromatischen Krystalles hervorgebrachten Erscheinung mit den Farbenbüscheln betrifft, so ist zu bemerken, daß man diese Versuche nur mit stärker dichromatischen Kry-

stellen anstellen kann, indem die gewöhnliche Unreinheit der Krystalle und sonstige Unvollkommenheiten des Apparates für die Beobachtung schwacher Lichteindrücke nicht günstig sind. Bei solchen stärker dichromatischen Krystallen sind aber die beiden Strahlen auch immer sehr ungleich hell. Ist z. B. der Farbenton *P* viel dunkler als *S*, so werden wir bei rotirender Scheibe auf einem lichten Grunde von der Farbe *S* zwei dunkle Sektoren von der Farbe *P* wahrnehmen, welche natürlich mit der Drehung des Nicol'schen Prisma ebenfalls ihre Stellung ändern. Diese zwei Sektoren bringen aber ersichtlich denselben Eindruck hervor wie die dunkleren, d. i. die gelben Büschel des von Haidinger entdeckten Phänomens; und zwar ist der Eindruck um so ähnlicher, je näher wir mit Prisma und Auge an die Scheibe gehen, in welchem Falle wir die bloße Lichtempfindung haben ohne den Krystall selbst zu sehen.

Zu den Versuchen dienten mir vorzüglich Krystalle zusammengesetzt aus den beiden isomorphen Verbindungen,

besonderer Form macht, wie dies in Fig. 11 Taf. I angedeutet ist. Offenbar wird dadurch den Stellen, die weiter vom Centrum der Scheibe entfernt sind, mehr weißes Licht beige-mischt und daher auch desto mehr die Färbung verringert.

Da für diese Krystalle die bräunlich gefärbten Sektoren in die Polarisationsebene des polarisierenden Prisma fallen, während sie in den Farbenbüscheln senkrecht dazu stehen, so ist es mir auch gelungen die Farbenbüschel meines Auges mit Hülfe eines solchen rotirenden Krystalles zu compensiren, d. h. unbemerkt für mich zu machen. Der Krystall muß natürlich in diesem Falle sehr dünn seyn um nur einen geringen Dichroismus auszuüben, welchen man nach Bedarf dadurch noch mehr vermindert, daß man aus der schwarzen Belegung der Glasscheibe größere oder kleinere Sektoren ausschneidet, welche dem weißen Lichte den ungehinderten Durchgang gestatten. In diesem Falle hat man nur etwas rascher zu drehen, um das Flimmern zu vermeiden, welches bei der Aufeinanderfolge von weiß und schwarz eintritt.

Krystalle bloß aus Kaliumkobaltcyanid bestehend und schwach gelblich gefärbt gaben, wie die frühern behandelt, zwei gelblich gefärbte Sektoren senkrecht zur Polarisations-ebene des Prisma. Ebenso ein etwas größerer Krystall von Santonin, der durch das Licht gelb gefärbt worden war. Sehr schön sah man das Phänomen auch an einer lichtbraun gefärbten Turmalinplatte, welche ziegelrothe Büschel auf lichtmeergrünem Grunde gab.

So viel über meine Versuche. Ich verzichte darauf zur Unterstützung meiner Erklärungsweise der Haidinger'schen Büschel auf solche Umstände hinzuweisen, wie die, daß sich nach dieser Erklärungsweise leicht einsehen läßt, warum verschiedene Menschen die Farbenbüschel verschieden, andere sie erst im späteren Alter sehen u. s. f., indem ja doch die endgültige Bestätigung meiner Hypothese nur von der Physiologie erwartet werden kann.

Graz den 2. August 1864.

**VII. *Einiges zur Erklärung der Erscheinungen beim Durchgange der Wärmestrahlen durch rauhe und trübe diathermane Körper;***

**von C. G. Jungk,**

Oberlehrer am Werderschen Gymnasium in Berlin.

Eine mündliche Mittheilung des Hrn. Prof. Knoblauch, daß rauhes Steinsalz nicht nur von den Sonnenstrahlen weniger durchläßt als von den Strahlen einer andern Wärmequelle, wie Forbes entdeckt hat, sondern auch von den Strahlen einer Argand'schen Lampe weniger als von denen einer dunklen Wärmequelle, veranlaßte mich zu der Bemerkung, daß der Abstand und die Größe der Wärmequelle einerseits und die Form der Rauigkeit des Steinsalzes andererseits die Ursache dieses Verhaltens seyn müsse, welches mit den sonstigen Durchstrahlungserscheinungen im Widerspruch zu stehen scheint. Durch die erschöpfende



einigermassen bestimmt werden, so kann man sagen, sie ist um so gröfser 1) je gröfser die aus der idealen Fläche heraustretenden Flächenelemente im Verhältnifs zu ihrer Projection auf jene sind, 2) je gröfser die Verschiedenheit ihrer Richtungen ist, 3) je mehr diese verschiedenen Richtungen sprungweise in einander übergehen und 4) je gröfser die Projection des Oberflächenstücks ist, in welchem alle vorkommenden Richtungen vertreten sind.

Um so verschiedenartigen Rücksichten bei der Bestimmung der Rauigkeit einer Ebene möglichst zu genügen, kann man sich diese mit Calotten besetzt denken, deren begränzende Kugelsphären in der idealen Ebene liegen und sich gegenseitig berühren, und die entweder ihre convexe oder ihre concave Seite nach aussen wenden, und kann eine solche Ebene um so rauher nennen, je gröfser diese Calotten im Verhältnifs zu ihren Halbkugeln sind. Von einer solchen Ebene kann nachgewiesen werden, dafs sie den Durchgang der Wärmestrahlen so zu verändern im Stande ist, wie es Hr. Prof. Knoblauch von rauhen Ebenen gezeigt hat.

2) Die Strahlen, welche von einem Punkte ausserhalb des Brennpunktes einer Kugelfläche ausgehen, werden an derselben so gebrochen, dafs jeder innerhalb der Kugel eine andere Richtung hat; unter allen ist also nur einer, der nach der Brechung einer gegebenen Richtung parallel ist.

In Fig. 7 Taf. I gehe die Ebene des Papiers durch den Mittelpunkt  $c$  einer Halbkugel und schneide die auf ihr senkrechte Basis derselben in  $ab$ , also die Halbkugel in dem auf  $ab$  stehenden Halbkreise;  $cf$  sey die Richtung, welcher die gebrochenen Strahlen  $d'e$  und  $d_1e_1$  parallel seyn sollen, wenn  $sd$  und  $s_1d_1$  die auffallenden Strahlen sind. Ist  $n$  der Brechungsexponent und  $\sin e d c = \sin e_1 d_1 c = \frac{1}{n}$ , so sind  $sd$  und  $s_1d_1$  Tangenten des Kreises, ihr Winkel  $sfs$  umfaßt also alle strahlenden Punkte, welche einen Strahl auf die Kugelfläche senden können,

der parallel  $cf$  gebrochen wird, und der Bogen  $dd_1$  enthält alle Punkte der Kugel, wo eine solche Brechung stattfinden kann. Für  $n = 1,5$ , wie es etwa bei Steinsalz und Glas der Fall ist, beträgt der Bogen  $dd_1$  etwa  $82^\circ$  und der Winkel  $s, fs$  etwa  $98^\circ$ , so daß innerhalb der Grenzen der Experimente alle Punkte der Wärmequelle, welche in der Ebene des Winkels liegen, sich auch innerhalb desselben befinden, selbst wenn  $cf$  von der auf  $ab$  senkrechten Linie  $ch$  bedeutend abweicht.

Ist  $qv$  die strahlende Linie, in welcher die Ebene des Papiers die Wärmequelle schneidet, so müssen alle Strahlen, welche von dieser Linie auf der rechten Seite von  $cf$  ausgehen und zu  $cf$  parallel gebrochen werden sollen, den Bogen  $di$  um so näher an  $i$  treffen, je näher ihr Ausgangspunkt an  $cf$  liegt, und alle Strahlen, welche von dieser Linie auf der linken Seite von  $cf$  ausgehen und nach der Brechung dieselbe Richtung haben sollen, müssen auf  $d_1i$  auch um so näher an  $i$  auffallen, je näher ihre Aus-

**Richtungen, welche die Thermosäule treffen, je kleiner und entfernter die Wärmequelle ist, also von parallelen Strahlen als Strahlen einer unendlich entfernten Quelle am wenigsten.**

Hierbei ist natürlich vorausgesetzt, daß die durchstrahlte **rauh** Ebene eine constante Entfernung von der Thermosäule hat.

Ist die Hinterfläche der diathermanen Platte ebenfalls mit solchen Kugelflächen besetzt, so wiederholt sich hier derselbe Vorgang, und auch hier muß die Schwierigkeit, Strahlen nach der Thermosäule zu senden, für die entferntere und kleinere Wärmequelle größer seyn. Denn obwohl hier die Strahlen aus einem dichteren Mittel in ein dünneres treten, so ergibt sich doch auch, daß eine Wärmequelle innerhalb des dichteren Mittels von den Strahlen, welche sie in gerader Richtung auf die Basis einer Kugelkappe senden kann, um so weniger nach einer bestimmten Richtung gebrochen durch die Kugelfläche schickt, je kleiner und je mehr sie von der brechenden Fläche entfernt ist. Für die Hinterfläche sind aber die Punkte der Vorderfläche, durch welche Strahlen verschiedener Richtung eindringen, strahlende Punkte und die Theile der Calotten, auf welchen solche Punkte liegen, Wärmequellen von einiger Ausdehnung, welche von ihren auf die Hinterfläche fallenden Strahlen um so weniger nach den Richtungen zur Thermosäule hindurchdringen, je geringer ihre Dimensionen sind. Diese sind nun aber um so geringer, je kleiner und entfernter die Wärmequelle ist. Also muß das Hinzutreten jener hypothetischen Rauhigkeit an der Hinterfläche der diathermanen Platte den Durchgang der auf die Vorderfläche fallenden Strahlen ebenfalls um so mehr vermindern, je kleiner und entfernter die Wärmequelle ist.

Diese Folgerungen sprechen sich schon in den Versuchen auf S. 199 und 200 der Knoblauch'schen Abhandlung in sofern aus, als die Sonne bei ihrer großen Entfernung als strahlender Punkt gilt, und die Argand'sche Lampe eine kleinere und gewöhnlich auch entferntere Wär-

mequelle ist, als der dunkle heiße Metallcylinder von ungefähr 6 bis 8 Zoll Höhe und 1 Zoll Durchmesser. Die Versuchsreihen von S. 239 bis 249 bestätigen dies aber ganz speciell; denn sie zeigen, 1) daß durch raubes Steinsalz von den Strahlen einer und derselben Wärmequelle um so weniger zur Thermosäule gelangen, je mehr jene entfernt wird, 2) daß von den Strahlen solcher Wärmequellen, welche verschiedene Ausdehnung und Entfernung haben, durch raubes Steinsalz gleich viel auf die Thermosäule fallen, wenn durch geeignete Vorrichtungen bewirkt wird, daß immer nur parallele Strahlen das Steinsalz treffen, also der Einfluß der Entfernung und Größe der Quelle beseitigt ist, und 3) daß selbst von den Strahlen einer kleinern Wärmequelle mehr als von denen einer größern durch raubes Steinsalz auf die Thermosäule wirken, wenn die größere angemessen entfernt wird.

Der Widerspruch, in welchem die Versuche auf S. 221 zur theoretischen Folgerung stehen, wird auf S. 252 gehoben.

je kleiner die wirksamen Theile dieser Calotten im Verhältniß zu deren Basis durch Entfernen oder Verkleinern der Wärmequelle werden. Dasselbe muß eintreten, wenn dieses Verhältniß ohne Veränderung der Wärmequelle sich in derselben Weise ändert, wie es der Fall ist, wenn die zu den Calotten gehörigen Centriwinkel zunehmen. Je größer ferner die wirksamen Theile der Calotten sind, desto weniger wird sich die von ihnen nach gewissen Richtungen gebrochene Strahlenmenge im Verhältniß zur Gesamtheit aller auffallenden Strahlen vermindern, wenn die Centriwinkel der Calotten wachsen. Hieraus folgt:

*Je rauher (No. 1) eine diathermane Platte wird, um so weniger läßt sie von den auffallenden Strahlen zur Thermosäule gelangen, dieser Einfluss macht sich aber um so weniger geltend, je größer und näher die Wärmequelle ist.*

Die Uebereinstimmung dieses Satzes mit der Erfahrung wird durch demnächst zu veröffentlichende Versuche des Hrn. Prof. Knoblauch erwiesen, findet aber auch schon ihre Bestätigung in der Versuchsreihe auf S. 261 der oben gedachten Abhandlung. Denn die durch Glimmer gebenden Strahlen bewahren sich den Charakter der aus unendlicher Ferne kommenden, während die aus dem zweiseitig rauhen Steinsalz austretenden Strahlen Richtungsunterschiede haben, wie Strahlen einer nahen Quelle, und die klare, rauhe und rauhere Steinsalzplatte lassen von den erstern bezüglich 0,82, 0,42 und 0,25, dagegen von den letztern bezüglich 0,82, 0,63 und 0,42 zur Thermosäule gelangen.

5) Befindet sich ein strahlender Punkt im Brennpunkt einer brechenden Kugelfläche, so sind alle eindringenden Strahlen parallel und man kann es so einrichten, daß sie alle die Thermosäule treffen. Bei zunehmender Entfernung des strahlenden Punktes nehmen aber die eindringenden Strahlen eine immer verschiedenere Richtung an, und immer weniger treffen sie die Thermosäule, vorausgesetzt, daß die brechende Fläche eine constante Entfernung von der Thermosäule hat. Ist aber die Entfernung so groß geworden, daß der Kugelradius dagegen verschwindet, die eindringen-

den Strahlen also nahe durch den Brennpunkt gehen, so wird eine weitere Zunahme der Entfernung keine merkbare Aenderung in der Wirkung auf die Thermosäule zur Folge haben. Wird dagegen in diesem Falle die Kugelfläche von der Thermosäule entfernt, so daß ihre Entfernung vom strahlenden Punkt im Vergleich zu ihrem Radius unendlich groß bleibt, so fallen von ihrem Strahlenbüschel immer weniger Strahlen auf die Thermosäule. Gegen die Radien der Kugelflächen, welche die Rauigkeit der hier in Betracht gezogenen Ebenen bestimmen, ist eine Entfernung von mehreren Zollen schon unendlich groß; daher ergibt sich:

*Durch eine diathermane Platte mit solchen rauhen Ebenen gelangen von den auffallenden Sonnenstrahlen nicht merklich weniger zur Thermosäule, wenn sie direct auffallen, als wenn sie vorher mittels einer Steinsalzlinse durch einen und denselben Punkt geführt sind, dessen Entfernung gegen die Kugelradien unendlich groß ist; dagegen um so mehr, je näher die Platte der Thermosäule rückt.*

wenn die erste Platte der zweiten näher rückt, und wenn zur Rauigkeit an der Vorderfläche noch dieselbe an der Hinterfläche hinzutritt und die Richtungsverschiedenheit der eintretenden Strahlen noch verwehrt. Hieraus folgt:

*Von den Sonnenstrahlen, welche durch eine diathermane Platte auf die Thermosäule fallen können, gelangen beim Durchgang durch eine zweite rauhe Platte um so mehr dahin, 1) je rauher die erste Platte und 2) je näher sie der zweiten steht, während diese von der Thermosäule eine constante Entfernung hat.*

Dieses Resultat ist in der Versuchsreihe auf S. 216 in Betreff der Rauigkeit des ersten Schirms vollständig ausgesprochen. Eine seitdem angestellte hat auch den Einfluß des verschiedenen Abstandes beider Schirme nach Erwarten bestätigt (vergl. No. 3).

7) Die erste rauhe diathermane Platte kann durch eine rauhe reflectirende Ebene ersetzt werden, die eben so mit Kugelflächen besetzt ist, ohne daß sich in der Betrachtung etwas Wesentliches ändert, und man kann daher auch analog zu No. 6 behaupten, daß eine rauhe diathermane Platte bei constanter Entfernung von der Thermosäule von reflectirten Sonnenstrahlen um so mehr zur Säule gelangen läßt 1) je rauher die reflectirende Ebene ist und 2) je näher diese der diathermanen Platte steht 1).

Diesem Satze entsprechen die Versuche auf S. 224 bis 229 vollkommen. Eine Ausdehnung derselben auf verschiedene Abstände der reflectirenden und der diathermanen Platte hat auch den letzten Theil desselben mit der Erfahrung in Uebereinstimmung gezeigt.

8) Wenn die Sonnenstrahlen senkrecht auf eine diathermane Platte fallen, welche mit Calotten besetzt ist, so

1) Die Analogie mit No. 4 würde schließen lassen, daß eine rauhe reflectirende Ebene von parallel auffallenden Sonnenstrahlen nicht merklich weniger auf die Thermosäule wirkt als von solchen, welche vor der Reflexion durch einen Punkt geführt sind, dessen Entfernung von den reflectirenden Calotten gegen deren Radius unendlich groß ist, dagegen um so mehr, je näher sie der Thermosäule ist.

treffen sie alle Theile der Vorderfläche, also auch diejenigen, welche zwischen den Calotten in der idealen Ebene liegen. Je grösser der Einfallswinkel in Bezug auf diese wird, desto weniger werden diese Theile von Strahlen getroffen, wenn nicht alle Calotten ihre concave Seite nach aussen kehren, d. h. desto geringer wird die Zahl der Strahlen, welche unter sich parallel in die Platte dringen, bis alle ebenen Flächenelemente, welche mit zunehmendem Einfallswinkel in den Schatten convexer Calotten treten können, dies auch gethan haben. Je grösser diese im Vergleich zu ihren Halbkugeln sind, bei desto kleinerem Einfallswinkel muss dies geschehen. Andererseits folgt, dass bei gleichem Einfallswinkel die grösseren Calotten von den dazwischen liegenden kleinen Ebenen mehr in den Schatten stellen als die kleinern. Da nun von den parallelen Strahlen nach No. 2 beim Durchgang durch eine raube diathermane Platte am wenigsten zur Thermosäule gelangen, so ergibt sich aus dem Vorigen:



welchen durch raube diathermane Platten so viel zur Thermosäule gelangen, wie von den durch klares Glas gegangenen (S. 222), daß dagegen polirtes Metall, welches ebenso bestäubt ist, Wärmestralen reflectirt, von welchen durch raube Platten mehr auf die Thermosäule fallen als von den Strahlen, welche an dem polirten nicht bestäubten Metall reflectirt sind, wird durch die obigen Betrachtungen auch erklärlich, da der Samenstaub von *Lycopodium* sich in rundlichen Formen mit körnigem Inhalt darstellt, welche zwar die Wärmestralen jenen Bedingungen gemäß zu reflectiren geeignet seyn können, aber wenig oder gar nicht diatherman seyn müssen.

10) Was die trüben Medien betrifft, welche von Hrn. Prof. Knoblauch einer ganz gleichen Untersuchung unterworfen worden sind und dabei dieselben Resultate gegeben haben, so ist zu bemerken, daß ihre hier in Betracht kommende Eigenschaft durch kleine durchsichtige Körperchen hervorgebracht ist, welche in der andersbrechenden Hauptmasse gleichmäßig vertheilt sind, und daß diese Körperchen beim Fluß der ganzen Masse auch kugelförmige Formen angenommen haben können. Bei dieser Annahme erklären sich dann die verschiedenen Erscheinungen in ganz ähnlicher Weise.

Obwohl nicht anzunehmen ist, daß die Formen, welche die dem Versuch unterworfenen Körper rauh oder trübe machen, mit den der theoretischen Betrachtung zu Grunde gelegten vollkommen gleich sind, so berechtigt doch die Uebereinstimmung der theoretischen und experimentellen Resultate zu der Annahme, daß die hypothetische Rauhigkeit alle Bedingungen enthält, welche für die besprochenen Erscheinungen wesentlich sind, wenn sie auch außerdem regelmäßiger ist als die Formen der Rauhigkeit, welche man durch verschiedene Schleifmittel hervorzubringen im Stande ist.

Es dürfte hier noch die Bemerkung am Orte seyn, daß durch die besprochene Untersuchung des Hrn. Prof. Knoblauch neue Bedingungen eingeführt sind, welche bei Ver-

suchen über strahlende Wärme erfüllt seyn müssen, wenn sichere Schlüsse über die qualitative Verschiedenheit der Wärmestrahlen daraus gezogen werden sollen, und dass Behauptungen, welche auf früheren Beobachtungen insbesondere an rauhen Körpern beruhen, jetzt nicht vollen Glauben verdienen, wenn nicht ausdrücklich bemerkt ist, dass nur parallele Strahlen zu den Beobachtungen dienten.

---

VIII. *Bemerkungen über die Form des Horopters;  
von H. Helmholtz.*

---

In einer Anmerkung zu Band CXXII, Seite 477 dieser Annalen ergreift Hr. E. Hering die Gelegenheit eine von ihm im vierten Hefte seiner Beiträge zur Physiologie aufgestellte Behauptung zu wiederholen, dass ich nämlich irr-

Die gerade Linie ist bei der von mir an der genannten Stelle eingeschlagenen Behandlung des Problems die Schnittlinie der beiden Ebenen, welche in den Knotenpunkten beider Augen senkrecht zu den Gesichtslinien errichtet sind. Hr. Hering hat nun bemerkt, daß diese gerade Linie nicht Horopter ist, obgleich sie bei der analytischen Behandlung des Problems den gefundenen Gleichungen der Horopterlinie genügt, aber er hat nicht bemerkt, daß auch ein Theil der Curve nicht Horopter ist.

Diese Curve geht nämlich durch die Knotenpunkte beider Augen, und läuft mit ihren beiden Enden nach entgegengesetzten Richtungen in das Unendliche aus. Diejenigen Stücke der Curve nun, welche zwischen Unendlich und je einem Knotenpunkte liegen, bilden den Horopter; das zwischen den Knotenpunkten liegende Stück der Curve ist aber nicht Horopter. Wenn also auch die krumme Schnittlinie der Hyperboloide eine Curve von einem Zweige ist, so hat doch die Horopterlinie zwei vollständig von einander getrennte Zweige.

Wenn der Fixationspunkt in der Primärlage der Visirebene oder in der Medianebene des Kopfes liegt, stoßen die beiden Zweige der Horopterlinie in einem Punkte zusammen, und verwandeln sich in zwei sich schneidende ebene Curven, nämlich in eine gerade Linie und einen ebenen Kegelschnitt, der in dem ersten der eben genannten Fälle ein Kreis, der von J. Müller schon gefundene Horopterkreis ist, dieser Kreis geht bekanntlich durch den Fixationspunkt und die Knotenpunkte beider Augen.

Es ist aber evident, daß von diesem Müller'schen Horopterkreise derjenige Bogen, welcher zwischen den Knotenpunkten beider Augen liegt, und nicht durch den Fixationspunkt geht, ebenfalls nicht Horopter ist. Denn abgesehen davon, daß bei der gewöhnlichen Gesichtsbildung gar kein Theil dieses Bogens, der durch die Nasenwurzel hindurchgeht, von beiden Augen gleichzeitig gesehen werden kann, würden auch selbst bei so platter Nase und so hervorragenden Augen, welche dies möglich machten, die

Punkte dieses Bogens sich auf den beiden Aulseren, also nicht identischen Seiten beider Netzhäute abbilden. Und auch bei gewöhnlicher Gesichtsbildung erkennt man ja leicht, daß Objecte, die diesem Bogen nahe liegen, wie zum Beispiel unser Nasenrücken selbst, beiden Augen an gerade entgegengesetzten Seiten des Gesichtsfeldes erscheinen.

Was nun in dem speciellen Falle von dem genannten Bogen des Müller'schen Kreises gilt, gilt in dem allgemeineren Falle, wie leicht ersichtlich, gerade ebenso von demjenigen Stücke der Curve, welches zwischen den beiden Knotenpunkten liegt. In diesem Stücke der Curve schneiden sich zwar auch identische Richtungslinien, aber es ist das nach hinten über die Netzhaut hinaus verlängerte Stück der einen, welches das vordere Stück der entsprechenden Richtungslinie im andern Auge schneidet, während ein reelles Object, was einfach gesehen werden soll, im Schnittpunkte der vor dem Auge gelegenen Theile identischer Richtungslinien sich befinden muß.

lichen ausführlichen Redaction meiner Untersuchungen habe ich diese vereinfachte Darstellung noch vor Hrn. Hering's entsprechenden Untersuchungen gegeben und veröffentlicht.

Was die vielen andern Ausstellungen betrifft, die Hr. Hering an meinen Arbeiten über Augenbewegungen und Horopter zu machen findet, so behalte ich mir vor, diejenigen, wo sachliche Erläuterungen oder die Beseitigung von Mißverständnissen nöthig erscheinen, in meinem nun bald vollendeten Handbuche der Optik zu berücksichtigen.

Nur einen Punkt noch muß ich gleich erörtern. Ich habe in meinem Aufsatze über die Augenbewegungen<sup>1)</sup> gesagt, Hr. Hering habe »die richtige Behauptung aufgestellt, daß der Horopter immer linienförmig sey.« In diesen Worten findet Hr. Hering die Insinuation, er habe es zwar behauptet, aber nicht erwiesen, und vertheidigt sich dagegen. Ich bedaure sehr, daß meine in ganz unverfänglicher und wohlmeinender Absicht geschriebenen Worte eine solche Deutung erleiden konnten, und erkläre daher hier ausdrücklich, daß auch meiner Meinung nach Hr. Hering im dritten Hefte seiner Beiträge einen vollkommen genügenden Beweis für diesen von ihm selbstständig und unabhängig von meiner gleichzeitigen Arbeit gefundenen Satz gegeben habe.

1) Archiv für Ophthalmologie IX, 2. S. 159.

*IX. Zur Frage über den Pulshammer;  
von Dr. Prof. Franz Joseph Pisko in Wien.*

---

Die Erscheinungen im Pulshammer (=in den franklinischen Kugeln\*) sind in letzterer Zeit einiger Aufmerksamkeit gewürdigt worden. Wenn beide Kugeln des Instrumentes nach oben gekehrt sind und eine leicht verdunstende Flüssigkeit in beiden Kugeln und der verbindenden Röhre enthalten ist, so tritt bekanntlich in einer der Kugeln ein Aufwallen der Flüssigkeit ein, wenn man die andere Kugel durch Bedecken mit der Hand erwärmt. Scoppewer (Pogg. Ann. CXV, S. 654) meint nun, dieses Aufwallen der Flüssigkeit rühre von der durch die Erwärmung bewirkten Ausdehnung jener Luft her, die über der Flüssigkeit in der erwärmten Kugel sich befindet, und hat darin vollständig geirrt, wie J. Schabus (Pogg. Ann. CXXII,

Es zeigt sich kein Sieden, sondern nur ein schwaches Ueberdestilliren der Flüssigkeit nach der kälteren Kugel.

Erst bei Erwärmung mittelst einer Weingeistflamme tritt *sehr bald* wirkliches Sieden ein. Der Vorgang im Pulshammer und in allen ähnlichen Geräthen ist demnach folgender: Wenn man die Kugeln, welche theilweise mit Flüssigkeit gefüllt sind, nach aufwärts kehrt und eine derselben mit der Hand erwärmt, so bilden sich neben den schon vorhandenen Dünsten, noch neue Dünste aus der Flüssigkeit. Diese Dämpfe nun entweichen zum Theil in die andere Kugel, welche minder gespannte Dämpfe enthält, und verursachen dabei das Aufwallen der Flüssigkeit. Für die Richtigkeit dieser Erklärung sprechen alle von J. Schabus angeführten Versuche (Pogg. Ann. Bd. CXX, S. 175 und 176) und auch noch folgende Erfahrungen, die ich alljährlich bei Gelegenheit der Demonstration der betreffenden Experimente machte.

1) Wenn man die eine *nach aufwärts gerichtete Kugel* so lange mit der Hand bedeckt hält, bis das *siedenähnliche* Aufwerfen der Flüssigkeit aufhört und hierauf die andere Kugel in irgend einer Weise *rasch abkühlt*, so tritt wegen der Condensation der Dämpfe in der erkalteten Kugel, augenblicklich das Aufwallen der Flüssigkeit ein und zwar um so heftiger, je mehr abgekühlt wurde. Die Abkühlung bewirkte ich durch Aufgießen von kaltem Wasser, durch Auflegen von Eisstückchen, durch Beträpfeln mit rasch verdunstenden Flüssigkeiten, wie Schwefeläther, Schwefelkohlenstoff und dergl. Dieser Versuch ist jenem ähnlich, wo man durch Aufgießen von kaltem Wasser auf das geschlossene gläserne Siedegefäß unter dem Siedepunkte erwärmtes Wasser zum Sieden bringt; aber die Umstände sind darin verschieden, daß die Flüssigkeit nicht unmittelbar an den erwärmten Glasstellen anliegt.

2) Wenn das im vorigen erwähnte Gleichgewicht eingetreten ist, und man erkaltet die zweite Kugel nicht, erhöht aber die Wärme an der Hand dadurch, daß man sie rasch am Körper reibt und schnell wieder an die erste Kugel

anlegt, so tritt abermals, wenn auch schwaches und nicht lange dauerndes Aufwerfen der Flüssigkeit in der zweiten Kugel ein. So schwach auch diese Bewegung ist, so ist sie augenfällig viel bedeutender als man voraussetzen könnte, wenn man nur annehmen wollte, die erste Kugel sey indess erkaltet, und durch die Wiederaufuhr der verlorenen Wärme trete die Erscheinung ein. Wenn man für die gleiche Zeit der Unterbrechung die ungeriebene Hand auflegt, ist die Bewegung schwächer.

3) Wenn man je eine der Kugeln gleichzeitig von zwei verschiedenen Individuen mittelst der Hand erwärmen läßt, so tritt nur eine schwache Bewegung der Flüssigkeit nach der etwas kälteren Handoberfläche auf. In der That hat man dann nichts als ein Differential-Thermoskop, wo die schon bestehenden und sich bildenden Dämpfe die thermoskopische Substanz abgeben.

4) Bei Pulshämmern, welche gefärbten Weingeist- oder gar Schwefeläther enthalten, treten die aufwallenden Erscheinungen in den letzten Versuchen heftiger auf, als bei



6) Scoppewer hat richtig bemerkt, daß die Handfläche bald erkaltet, aber das kommt eben durch die beim Verdunsten der Flüssigkeit latent werdende Wärme.

Daß keine dieser Erscheinungen durch Ausdehnung der Luft in der erwärmten Kugel und Zusammenziehung derselben in der abgekühlten Luft bewirkt wird, hat schon Schabus gezeigt. Ich betone nur noch, was längst bekannt ist, daß das Instrumentchen nahezu *luftleer* ist. Die Luft wird nämlich bei der Anfertigung derartiger Apparate von dem beim Sieden der Flüssigkeit aufsteigenden Dämpfen nahezu gänzlich ausgetrieben. Für den luftleeren Zustand dieser Apparate spricht noch 1) das unmittelbare Anschlagen („Klingen“) der Flüssigkeiten an die Glaswände, wenn man die Geräte entsprechend rasch bewegt; daher eben der Name „*Wasserhammer*“! 2) die Handwärme reicht freilich nicht hin die Flüssigkeiten ins Sieden zu bringen, wenn die letzteren unter jene Bedingungen versetzt werden, wie sie sich gewöhnlich beim Sieden befinden, also z. B. wenn man die beiden zum Theil gefüllten Kugeln nach unten bringt und die eine derselben mit der Hand bedeckt; aber das wahre Sieden tritt sehr schnell ein, sobald man eine der Kugeln mittelst einer Weingeistflamme erwärmt. Diefß hat auch schon Scoppewer gesehen (Pogg. Ann. Bd. CXV, S. 656, Versuch 6), aber daraus keinen richtigen Schluss gezogen. Wenn im merklichen Grade Luft im Instrumente wäre, so könnte unter diesen Umständen nie ein Sieden eintreten; es wäre ja ein Papin'scher Topf in anderer Form!

Ich bemerke nur noch, daß das Sieden unter den letzt angeführten Umständen unter heftigem Stossen der Flüssigkeit auftritt und zwar bei jeder Form des Geräthes (Pulshammer, Kryophor, Wasserhammer, Geißler'scher Wasserhammer mit langem und kurzem Schenkel und je einer Kugel an den Enden), und sowohl wenn es Wasser als auch wenn es Weingeist enthält.

Die siedeähnliche Erscheinung bei aufwärts gerichteten

Kugeln tritt aus folgenden Ursachen früher ein als das eigentliche Sieden bei abwärts gerichteten Kugeln:

a) Bei der Erwärmung der aufwärts gerichteten Kugeln finden sich schon über der Flüssigkeit fertige Dünste vor, deren Spannkraft nur durch die Handwärme zu erhöhen ist, wenn das Aufwerfen der Flüssigkeit erfolgen soll; bei der Erwärmung der abwärts gerichteten Kugeln hingegen müssen die blasenwerfenden Dämpfe erst erzeugt werden, was jedenfalls mehr Wärme in Anspruch nimmt.

b) Wenn die Kugeln abwärts gerichtet sind, haben die zu erzeugenden Dünste die Spannkraft *aller* fertigen, über der zu erwärmenden Flüssigkeit befindlichen Dämpfe zu überwinden, während bei den aufwärts gerichteten Kugeln ein Theil dieser fertigen Dämpfe beim Blasenwerfen sogar unterstützend wirkt (vergleiche a), d. i. jener Dampf, welcher in der von der Hand erwärmten Kugel sich befindet.

c) Wenn man die abwärts gekehrte Kugel mit der Hand erwärmt, umfasst man *nolens volens* auch jenen oberen

neuer Dünste und durch die erhöhte Spannkraft ein Aufwerfen der Flüssigkeit, wenn eine der Kugeln mit der Hand erwärmt wird.

Bei *abwärts gerichteten Kugeln* haben nur neu entstehende Dünste das Aufwerfen der Flüssigkeit zu bewirken; es ist hierzu eine Wärmequelle erforderlich, welche den unteren Theilen der Kugel mehr Wärme zuführt als den oberen. Dazu ist die Erwärmung mit der Hand nicht tauglich, wohl aber eine kleine Weingeistflamme.

Die Familie der *„Pulshämmer“* wird daher nach wie vor ganz gut zur Demonstration des Siedens im luftleeren Raume bei Erwärmung mittelst der Hand dienen können, da es sich ja nur darum handelt zu zeigen, wie das Sieden durch die aufsteigenden Dunstblasen durch die ganze Flüssigkeit zu Stande kommt, und dies um so eher, je geringer der Druck ist, welcher auf der siedenden Flüssigkeit lastet. Es wird aber gut seyn aufmerksam zu machen, inwiefern sich die Erscheinung bei aufwärts gerichteten Kugeln von jener bei der entgegengesetzten Lage des Instrumentes unterscheidet.

---

*X. Beitrag zur Fluorescenz des Lichtes;  
von Dr. Prof. Franz Joseph Pisko in Wien.*

---

Das *Platin-Cäsium-Sulfür* in etwa 100 Theilen Schwefelkohlenstoff gelöst stellt eine Flüssigkeit dar, welche im durchfallenden Tageslicht *tief rümbraun*, im auffallenden Licht aber *schön olivengrün* ist; beides im auffallendsten Grade. Ich vermuthete daher gleich beim ersten Anblicke, daß dieser Stoff wahrscheinlich zu den empfindlichst fluorescirenden gehören möge, und hielt es für gut einige eingehende Versuche in dieser Richtung anzustellen. Nachdem ich ein neues Spectrum vom Sonnenlicht in der Dun-

kelkammer erzeugt hatte, und die Lösung des Platin-Cassium-Sulfür durch dasselbe mittelst eines parallelepipedischen Glaströghens durchführte, zeigte sich die Oberfläche der Flüssigkeit in den zurückgeworfenen Farben wie folgt: Im Roth, Orange und Gelb nahezu mit den empfangenen Farben; von da an aber bis zum Violett grün und zwar um so dunkler, je weiter die Farbe gegen das Violett hinglag. Im Ueberviolett blieb alles schwarz.

Die Lösung mittelst eines reinen Malerpinsels auf einen weissen Papierschirm in Form eines langen, schmalen Gürtels aufgetragen hinterließ, als der Schwefelkohlenstoff verdunstet war, einen Streifen, der im Tageslicht gelbbraun erschien. Als diese gelbbraune Zone vom Sonnenspectrum beschienen war, konnte man sie erst vom Grün an bis zum Violett wahrnehmen, und zwar zeigte sie sich mit grünem Lichte, welches ebenfalls gegen das Violett hin stets dunkler wurde. Im Roth bis zu Ende des Gelb sah man nur die etwas dicker aufgetragenen Ränder des Bandes mit einer dunkeln, nicht bestimmbaren (schmutzig braunen)

Ein *hellgelbes* Glas liefs den Lichtkegel für die erste Stellung *gelb* und für die zweite Stellung *heller gelb*.

Ein *grünes* Zwischenglas ergab bei der ersten Stellung *grüngelb*, ein *blaues* Glas gab *erbsengrün*, ein *violettes* Glas *mattgrün*. Die letzten drei Gläser ergaben in der zweiten Stellung beziehungsweise *intensivgrün*, *berlinerblau*, *schwach rosa*.

Flüssige Zwischenmittel wurden folgende angewendet: Die Lösung von doppeltchromsaurem Kali (dunkelgelb), von einfach chromsaurem Kali (hellgelb), von Kupferchlorid (grün) und schwefelsaurem Kupferoxyd-Ammoniak (tiefblau). Das Ergebnifs für beide Stellungen war fast so wie bei den gleichfarbigen Gläsern; nur in der Nüance der Färbungen war einiger Unterschied merklich.

Nun wurden mannigfache Verdünnungsgrade an der Lösung des Platin-Cäsium-Sulfür mittelst Schwefelkohlenstoff hervorgerufen. Die Flüssigkeit wurde mit dem Maafse der Verdünnung im durchgelassenen Tageslichte stets *heller braun*, im auffallenden Lichte ein *lichter Grün*; hierbei zeigte sich der Stoff ebenfalls als sehr empfindlich bezüglich der Fluorescenz. Mit den farbigen Zwischenmitteln untersucht ergaben die verdünnten Auflösungen nahezu das nämliche Resultat, wie die concentrirte Flüssigkeit; nur waren die Farben heller und minder kräftig bei jenen als bei letzterer.

Im Ganzen und Grofsen zeigt diese Lösung eine auffallende Aehnlichkeit bezüglich der Fluoresceuz mit der syrupbraunen Naphtha aus Krasne in Galizien, auf deren Fluorescenz-Empfindlichkeit ich in meinem Schriftchen „die Fluorescenz des Lichtes“ hingewiesen habe.

Es erübrigt nur noch einige Worte über die angewendeten Zwischenmittel zu sagen. Die flüssigen Zwischenstoffe waren die nämlichen, deren ich mich bei meinen früheren Fluorescenz-Studien bedient hatte. Ihre Eigenschaften bezüglich des Sonnenspectrums habe ich in dem angeführten Werkchen angegeben. Die Gläser hingegen waren andere als dort. Das *rothe* Glas hatte vom Sonnen-

spectrum die meisten grünen und fast alle gelben, blauen und violetten Strahlen zurückbehalten und das Roth und etwas Orange durchgelassen.

Die *gelben* Gläser ließen fast alle Farben bis auf das Violett und einen Theil Blau durch; das *heller gelbe* Glas hatte die durchgelassenen Farben minder geschwächt als das dunkelgelbe Glas.

Das *grüne* Glas ließ etwas Roth, eine Spur von Orange, das Grün, etwas Blau und wenig Violett durch.

Das *blaue* Glas ließ etwas Dunkelroth, etwas Gelb und wenig Grün und fast alles Blau und Violett durch. Das Hellroth, Orange und Gelb waren mit schwarzen Gürteln bedeckt; ebenso zeigte sich zwischen Gelb und Grün ein schwarzer Gürtel. Eine sehr interessante Erscheinung.

Das *violette* Glas ließ einen großen Theil Roth, Grün und Violett durch.

Sowohl im gewöhnlichen Gaslichte als auch, wenn es mittelst der Brennlinsen concentrirt wurde, zeigten sich die

**XI. Ueber Fluorescenz der Auszüge aus den  
verschiedenen Theilen der Pflanzen;  
von C. B. Greifs.**

**Zweiter Artikel.**

---

**U**nter obigem Titel habe ich im Jahre 1861 in dem 114<sup>ten</sup> Bande dieser Annalen S. 327 bis 333 eine Arbeit veröffentlicht, in welcher ich nachwies, daß die Extracte aus den Blüthen, Blättern, der Rinde und dem Holze oder den Stengeln der verschiedensten Pflanzen fluorescirende Stoffe enthalten. Da ich damals meine Versuche noch nicht auf die Samen und Wurzeln ausgedehnt hatte, und doch nach den damals gewonnenen Resultaten eine gewisse Wahrscheinlichkeit vorlag, daß wohl in allen Theilen der Pflanzen solche fluorescirende Stoffe vorhanden seyn möchten, so nahm ich in diesem Frühjahr meine Arbeit wieder auf. Ich hatte früher unterlassen, die extrahirenden Flüssigkeiten zuvor auf ihre Fluorescenz zu untersuchen, und holte deswegen jetzt diese Versäumnis nach. In der That erhielt ich im Weingeist und im Aether, wenn ich die Sonnenstrahlen durch eine stark gekrümmte Convexlinse concentrirte, einen grauen, doch so äußerst schwachen Lichtkegel, daß ich mich überzeigte, es könne durch denselben keine Irrung in den Beobachtungen herbeigeführt werden. In dem destillirten Wasser war dagegen natürlich keine Spur von einem Lichtkegel zu entdecken. Ich habe mich daher bei den folgenden Versuchen fast ausschließlich des destillirten Wassers bedient, und nur wenn andere Umstände es erheischten, Alkohol oder Aether in Anwendung gebracht. Was nun zunächst die Samen betrifft, die selbstverständlich im zerquetschten Zustande extrahirt wurden, so wurden folgende einer Prüfung unterzogen: Bärlappsaamen, Erbsen, Mohnsamen, Bohnen, Carottensamen, Samen von *Tropaeolum*, Kaffeebohnen, Stechapfelsamen, *nuæ vomica*, Hanfsamen, *semen Cubebæ*, *Anacardium orientale*,

*semen Psylli*, Cacaobohnen, *semen canariense*, *semen Sabadillae*, Pomeranzen, Pistacien, *semen Cumini*, Fenchelsamen, *fructus Amomi*, Lupulin, *fabas Tongko*, *fructus Mezerei*, Senfsamen, *Conium*, *Secale cornutum*, *semen Lini*, *semen Staphidis agriae*, *fructus Juniperi* und *fructus Rhamni catarrthici*. Alle 31 Extracte ohne eine einzige Ausnahme zeigten einen farbigen Lichtkegel. Der grossen Mehrzahl nach waren diese Lichtkegel grau oder blau oder zeigten eine Nüancirung dieser beiden Farben; Weiss oder weiss mit einer Nüancirung ins Bläuliche oder Röthliche waren die Lichtkegel bei dem Hanfsamen, den Cacaobohnen, dem *semen canariense*, den Pistacien, dem Fenchelsamen, *fructus Mezerei*, *Secale cornutum* und *semen Lini*; hellgrün bei *semen Sabadillae*, den Pomeranzen und dem *semen Cumini* und orangefarben bei der *fabas Tongko*. Den intensivsten Lichtkegel und zwar von sehr schöner blauer Farbe gab der alkoholische Extract von Bärlappsamen. Der alkoholische Extract des Samens von *Tropaeolum* zeigte einen



orangefarbenen, derjenige aus *radix Rhei* einen gelbgrünen, und derjenige aus *radix Curcumae* einen hellgrünen Lichtkegel, während wieder die Lichtkegel, welche in den übrigen Auszügen hervorgerufen wurden, grau oder blau waren. Da ich mit meinen Versuchen zu der Zeit beschäftigt war, in welcher die geschnittenen Weinreben thränen, so fing ich mir in einem Fläschchen eine hinreichende Menge des secernirten Pflanzensaftes auf. Aber auch in dieser Flüssigkeit erzeugten die durch eine Convexlinse concentrirten Sonnenstrahlen einen blauen Lichtkegel. Von anderen lebenden Pflanzen wußte ich mir keinen Pflanzensaft zu verschaffen. Mit Rücksicht aber darauf, daß Opium sowohl, als auch die verschiedenen Harze ihre Entstehung Pflanzensäften verdanken, glaubte ich auch Körper dieser Klasse prüfen zu müssen. In dem Extract des Opium erhielt ich einen ganz hellgrünen Lichtkegel, in der Lösung des *Gummi arabicum* entstand ein intensiver bläulich-weißer Lichtkegel, in der festen Masse des Colophoniums und des Bernsteins waren die Lichtkegel grün, doch drangen sie nicht sehr tief in die Masse ein. Als das Colophonium zerstoßen und, mit destillirtem Wasser übergossen, einige Zeit lang stehen gelassen wurde, zeigte es einen grauen, und zerstoßener und mit Weingeist übergossener Bernstein einen blauen Lichtkegel.

Ich habe also bei allen untersuchten Körpern kein einziges negatives Resultat erhalten, und wenn ich meine in der früheren Abhandlung veröffentlichten Ergebnisse mit den hier beschriebenen zusammenstelle, und wenn darauf Rücksicht genommen wird, in welcher bunten Reihe die untersuchten Körper ausgewählt waren, so glaube ich den Satz aussprechen zu können: *Alle Theile aller Pflanzen enthalten fluorescirende Stoffe.* Es lag nun aber auch der weitere Gedanke nahe, ob dies nicht auch der Fall sey bei allen organischen Körpern, zu deren Bildung der Pflanzenorganismus mitgewirkt hat. Auch nach dieser Seite hin habe ich eine große Reihe von Versuchen angestellt, deren Mittheilung vielleicht einiges Interesse haben dürfte. Hier

und Wein zeigten einen hellgrünen und Zuckerwasser einen bläsvioletten Lichtkegel, der aber bei Wein und bei Zuckerwasser verhältnißmäßig schwach war. In den Lösungen von Mannit sowohl, wie von Traubenzucker waren die entstehenden Lichtkegel blau. Amylum, in heißem Wasser gelöst, fluorescirte bläulich-weiß, und Inulin, ebenso behandelt, grauweiß. Olivenöl giebt einen hellblauen, Terpentinöl, wenn wasserhell, einen grauen, aber wenn es schon harzig geworden ist, einen hellblauen, Wachholderöl einen schönen hellgrünen, Rübsamenöl einen blauen, Baumöl einen bläsvioletten, Bittermandelöl und *oleum Gaultherias* einen gelbgrünen Lichtkegel. Vor allen Oelen aber zeichnet sich das Petroleum aus, das schon bei gewöhnlichem Tageslichte schön blau schillert, und wenn die Sonnenstrahlen durch eine Convexlinse in dasselbe concentrirt werden, einen prächtigen blauen Lichtkegel zeigt. Von Alkaloiden wurden geprüft: Coniin, Nicotin, Morphin, Salicin und Atropin. In den beiden ersten entstand ein schön

leriansäure, die ein negatives Resultat gegeben hatten, konnte ich ferner bei den folgenden Körpern keine Spur von Fluorescenz nachweisen: Trimethylamin, Propylamin, Chloramyl, Iodmethyl, Iodallyl, Chlorelayl, Iodamyl, Essigäther, *aether hydrobromatum*, Holzgeist, Amylen, Benzol, Chloroform, buttersaures Aethyloxyd, baldriansaures Amyloxyd und ameisensaures Amyloxyd. Die Versuche haben demnach meine Vermuthung, es möchten auch alle organischen Körper, zu deren Bildung der Pflanzenorganismus mitgewirkt hat, fluorescirend seyn, keineswegs bestätigt. Aber dessenungeachtet geht eine gewisse Gesetzmäßigkeit aus denselben hervor. Während bei einzelnen Reihen, z. B. bei den Oelen, den Alkaloiden, alle in Untersuchung gekommene Körper Fluorescenz zeigen, gehören sehr viele derjenigen Körper, bei welchen eine Fluorescenz nicht nachgewiesen werden konnte, der Alkoholreihe an.

Zum Schlusse sey es mir noch erlaubt einer einzeln stehenden Thatsache zu erwähnen. Als ich eine Anzahl durchsichtiger fester Körper ohne Erfolg auf Fluorescenz untersucht hatte, entdeckte ich zufällig in einem 1,5 Centim. dicken, farblosen, quadratförmigen Stück Spiegelglas einen schön grünen Lichtkegel. In allem übrigen Spiegelglas, dessen ich habhaft werden konnte, war ich nicht im Stande, denselben nachzuweisen, ausser in dem einen meiner beiden Crownglasprismen.

---

*XII. Ueber Erregung des Magnetismus durch  
Drehung; von C. B. Greifs.*

---

Auf einer kleinen Reise in diesem Frühjahr besuchte ich auch die Centralwerkstätte der Nassau'schen Staatsbahnen zu Limburg, weil ich von der vortrefflichen Einrichtung derselben schon so vieles gehört hatte. An den Drehbänken erregten die Drehspäne von Gußstahl wegen ihrer vollkommenen Windung, so daß sie ganz das Aussehen eines dünnen Seiles hatten, meine Aufmerksamkeit. Ich wurde durch dieselben auch an die schönen Resultate erinnert, welche vor mehreren Jahren Prof. Wiedemann bei seinen exacten Versuchen über die gegenseitige Einwirkung von Magnetismus und Torsion erzielt hatte. Da es bei den Versuchen Wiedemann's vorzugsweise darauf ankam, festzustellen, inwieweit der bereits vorhandene

del in Anwendung kommen, um seine Polarität ganz unzweideutig nachzuweisen. Sie hatten also alle durch das Drehen permanenten Magnetismus erhalten, selbst diejenigen fünf unter ihnen, welche von weichem Eisen waren, dem doch weder durch das Bestreichen mit einem Magnete, noch durch den galvanischen Strom permanenter Magnetismus ertheilt werden kann. Von den Eisenspänen wurde von einem, der 7 Fufs lang war, ein zwei Fufs langes Stück abgebrochen, und nun die beiden Theile untersucht. Sie zeigten sich beide als vollständige Magnete mit vollkommen ausgebildeten Polen, und verhielten sich gerade wie die Theile einer entzwei gebrochenen magnetisirten Stricknadel. Als hierauf auch ein Span von Puddelstahl entzwei gebrochen wurde, zeigte sich insofern ein Unterschied, als zwar die alten Pole in ihrer bisherigen Stärke blieben, die an der Bruchstelle neu auftretenden Pole aber verhältnißmäßig nur schwach ausgebildet waren. Von einem der Stücke wurde nun wieder ein Stückchen von nur zwei Windungen abgebrochen. Dieses noch nicht einen halben Zoll lange Stückchen hatte zu meiner Ueberraschung seine beiden Pole mindestens ebenso stark, wie sie an dem ursprünglich ganzen Span gewesen waren. Unter den Spänen von Gufstahl ist einer 105 Fufs lang von  $2\frac{1}{3}$  Pfund Gewicht, der sich wie ein Seil in vielen Windungen aufwinden läßt. Es dürfte dieß wohl der längste existirende Magnet seyn.

Mein nächstes Augenmerk richtete sich nun darauf, zu untersuchen, ob sich nicht ein bestimmtes Gesetz auffinden lasse, nach welchem man im Voraus bestimmen könnte, was für ein Pol an einem gegebenen Ende eines solchen Drehspans auftreten müsse. Ich vermuthete zuerst, es möchten wohl, wenn man das Ende, wo der Nordpol, oder dasjenige, wo der Südpol auftritt, bei allen Drähten die Windungen beziehungsweise nach derselben Richtung verlaufen, so daß sich hier etwas Aebuliches herausstellen würde, wie bei den nach Ampère's Theorie die Magnete umkreisenden galvanischen Strömen. Es zeigte sich aber gar bald, daß diese Voraussetzung eine irrige war. An

dem einen Nordpol verliefen die Windungen in der Richtung, in welcher sich der Zeiger einer Uhr bewegt, an einem andern gerade in der entgegengesetzten Richtung. Ich wurde dann auf einen andern Umstand aufmerksam; ich fand nämlich, daß die gewundenen Streifen alle auf der einen Seite einen scharfen Rand hatten, aber auf der entgegengesetzten Seite mehr oder weniger gezackt waren. Der scharfe Rand entsteht offenbar da, wo der Meißel der Drehbank an dem abzdrehenden Eisen oder Stahl angreift, so daß sich bei jedem Span mit Leichtigkeit beurtheilen läßt, wo die Drehung angefangen, und wo sie aufgehört hat. *Mit Beachtung dieses Umstandes zeigte sich nun, daß bei allen Drehspänen ohne Ausnahme da, wo die Drehung angefangen hatte, der Südpol, und da, wo die Drehung aufgehört hatte, der Nordpol entstanden war.*

Es war mir endlich auch noch aufgefallen, daß bei fünf bis sechs der untersuchten Drehspäne der auftretende Magnetismus im Verhältnisse zu demjenigen der übrigen nur schwach war. Ich überzeugte mich bald, daß diese Er-

**XIII. Ueber den Einfluss der Temperatur auf die Doppelbrechung; von Dr. Fr. Pfaff in Erlangen.**

**B**ekanntlich war es bisher nicht gelungen an den Krystallen des rhombischen Systems und an den optisch einaxigen eine Veränderung der Doppelbrechung durch Temperaturveränderung nachzuweisen, obwohl die groſse Empfindlichkeit der übrigen Krystalle mit Doppelbrechung gegen Temperaturwechsel eine solche erwarten lieſs. Auch die feinsten Messungen an den Ringsystemen der Krystallplatten im polarisirten Lichte lieſsen keine Spur von Enger- oder Weiterwerden erkennen, wenn man die Krystalle erhitze.

Neuerdings hat nun Fizeau durch Beobachtung der Beugungserscheinungen des Lichtes am Kalkspath und Bergkrystall die Veränderungen des Brechungsindex beider Strahlen durch Temperaturänderung nachgewiesen, und derartige weitere Versuche in Aussicht gestellt<sup>1)</sup>. Dieſs brachte mir wieder Versuche ins Gedächtniſs, die ich in derselben Beziehung vor zwei Jahren angestellt und hier in der physikalisch-medicinischen Societät mitgetheilt hatte. Aus Mangel an Meſsinstrumenten konnte ich das von Fizeau angewandte Verfahren nicht benutzen; durch ein anderes war es mir aber möglich, sehr leicht die Veränderungen nachzuweisen, die mit wechselnder Temperatur an optisch einaxigen Krystallen sich bemerklich machen. Da dieses Verfahren erlaubt, sehr leicht diese Aenderungen wahrzunehmen, so glaube ich, möchte es der Veröffentlichung werth seyn. Es liegt der Gedanke nahe, daſs man Platten senkrecht zur Axe geschliffen, in der ungünstigsten Lage untersucht, wenn man eine Veränderung der Brechungsverhältnisse finden will. Die Strahlen machen ja hier nur geringe Winkel mit der optischen Axe, ihre Differenz kann daher auch nur eine geringe seyn. Anders verhält es sich, wenn man parallel der Axe geschliffene Platten untersucht, hier findet sich das Maximum der Differenz der beiden

1) Ann. Bd. 119, S. 87 u. 297.

Strahlen. Ich schliff daher Platten keilförmig parallel der Hauptaxe und konnte an diesen nun sehr leicht eine Veränderung der Streifen im polarisirtem Lichte erkennen.

Ich brachte sie zu diesem Behufe auf den gewöhnlichen Nörrenberg'schen Polarisationsapparat, bemerkte mir den Stand der dunklen Streifen in homogenem Lichte und erwärmte die Platte dann auf dem Tischchen selbst unmittelbar oder in einem Gefäße von Glas mit ebenem Boden, in das Wasser gebracht wurde. Bei keinem Keile blieben die Streifen ohne Lageveränderung, alle zeigten eine zum Theil sehr beträchtliche Verrückung derselben.

Ich habe Untersuchungen an Vesuvian, Beryll, Apatit, Quarz, Zinnstein, Honigstein und Kalkspath von optisch einaxigen Krystallen, an Aragonit, Topas, Glimmer und Gyps von optisch zweiaxigen angestellt.

Die drei erst genannten sind optisch negativ; sie zeigen auch sämmtlich das gleiche Verhalten, nämlich mit der Temperatur-Erhöhung ein *Herabrücken der Streifen vom dickeren gegen das dünnere Ende der Platte*. Man könnte



eine *Verringerung der Differenz der beiden Strahlen* und zwar bei einem *optisch-positiven* Krystalle, dem Quarz. Eine keilförmige Platte dieses Minerals zeigte sehr deutlich ein Hinaufrücken der Streifen vom dünneren gegen das dickere Ende.

Leider führten ähnliche Versuche mit anderen positiven Krystallen zu keinem Resultate. Von Zirkon ist es nicht möglich so feine Keile zu schleifen, daß noch Streifen sichtbar werden, weil die Differenz der beiden Strahlen zu groß ist. Mit dem Zinnstein muß es sich ebenso verhalten, es gelang mir nicht an einem ganz dünnen Plättchen, Streifen zu erhalten; Apophyllit, der sich wohl dazu eignen würde, blätterte sich beim Schleifen so stark, daß ich keinen Keil erhielt, der breit genug zur Beobachtung gewesen wäre.

Wie Quarz verhielten sich noch von optisch zweiaxigen Krystallen Glimmer und Gyps. Ein keilförmig geschliffenes Stück Topas (die eine Fläche war eine natürliche Spaltungsfläche) verhielt sich wie die optisch negativen. Der Topas scheint unter den von mir bisher untersuchten Krystallen der gegen die Temperaturveränderungen empfindlichste; legt man ein Stück von ihm auf das Tischchen des Polarisationsapparates und fährt nur einmal mit einer Weingeistlampe unter ihm weg, so wird man sogleich eine Veränderung der Farben wahrnehmen. Er möchte sich wohl am besten, nächst dem Vesuvian, von optisch einaxigen Krystallen zur Demonstration dieser Verhältnisse eignen.

Daß beide Strahlen, der außerordentliche wie der ordentliche, eine Veränderung der Brechung erleiden, geht aus diesen Versuchen nicht hervor; ich konnte sie aber ebenfalls ohne Meßinstrumente nachweisen, indem ich die beiden Spectren eines Quarzprismas auf einen Schirm von Strohpapier auffing und die Lage der verschiedenen Farben vor und nach dem Erhitzen bezeichnete. Beim Kalkspath konnte ich es auch dadurch, daß ich ein Spaltungsstück auf ein Stanniolplättchen mit sehr feiner Oeffnung

legte und unter einem Oberhäuser'schen Mikroskop vor und nach dem Erwärmen die Lage der beiden Oeffnungen betrachtete. Es war eine Verrückung beider noch zu erkennen.

Es schien mir auch wichtig, zu vergleichen, wie sich die Veränderung durch Druck gegen die durch Temperaturerhöhung erzeugte verhielte. Leider konnte ich hier keine Keile anwenden und mußte meine Zuflucht wieder zu Platten senkrecht zur Axe geschliffen nehmen. Ich presste nun dieselben möglichst stark zwischen zwei eisenen in der Mitte mit einer feinen Oeffnung versehenen Platten. In der oberen war das durchbohrte Plättchen in der Mitte so angebracht, daß es sich um eine horizontale Axe in einem Ringe und dieser wieder in der äußeren Platte um eine auf der Axe des innern durchbohrten Plättchens senkrecht stehenden zweiten horizontalen Axe drehen konnte, um stets ein genaues Aufliegen der pressenden Platte auf beiden Krystallflächen zu erzielen.

Obwohl ich nun den Druck bis zum Zersprengen der

nach dem dünneren Ende zu. Der Seitendruck bewirkte also dasselbe, was die Steigerung der Temperatur verursachte, nämlich eine Verringerung in der Differenz der beiden Strahlen, ein Resultat, welches zusammengehalten mit der Thatsache, daß beide Strahlen eine Veränderung der Brechung erleiden, erkennen läßt, daß die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des außerordentlichen Strahles in diesem Falle also sowie die Elasticität des Aethers in der Richtung der Hauptmasse, durch Druck senkrecht auf die Hauptaxe in etwas beträchtlicherem Grade verringert wird, als die des ordentlichen Strahles.

#### XIV. *Ueber die doppeltbrechenden Eigenschaften und die Krystallform des Amblygonits; von Des Cloiseaux.*

(Mitgetheilt vom Hrn. Verf. aus d. *Compt. rend.*)

Der Amblygonit, eine sehr seltene Mineralspecies, ist bis in die letzten Jahre nur in der Umgegend von Penig in Sachsen in kleinen Massen oder Nieren eingewachsen in Granit, in violetten Lepidolith, mit Quarz, Turmalin und Granat vorgekommen. Neuerlich hat Hr. Brush <sup>1)</sup> veröffentlicht, daß man ihn auch in einer ganz ähnlichen Lagerstätte bei Hebron, Staat Maine, angetroffen habe, in ganz oder halb durchsichtigen lamellaren, violetten Lepidolith durchsetzenden Massen, begleitet von Albit, Quarz, rothen, grünen und schwarzen Turmalinen, Cassiterit und Apatit.

Nach Hrn. Breithaupt besitzt der Amblygonit von Penig zwei ziemlich leichte, um  $106^{\circ} 10'$  gegen einander geneigte Spaltungsflächen und eine dritte schwierigere, welche die scharfe Kante der beiden ersteren tangirt und mit jeder derselben einen Winkel von  $126^{\circ} 55'$  macht. An

1) *Journ. of Sciences and Arts Vol. XXXIV, Sept. 1862.*

zwei Exemplaren von Hebron, die Prof. Brush mir gütigst zusandte, beobachtete ich die beiden, einander unter  $105$  bis  $106^\circ$  schneidender Spaltungsflächen, konnte aber nicht die dritte in der von Hrn. Breithaupt angegebenen Richtung wahrnehmen.

Bisher hat man allgemein geglaubt, es sey die Krystallform des Minerals ein gerades oder schiefes Rhombenprisma, nach dessen Verticalflächen die beiden leichten Spaltbarkeiten lägen; allein das Studium seiner optischen Eigenschaften erlaubt diese Meinung nicht, sondern beweist, daß der Krystalltypus in Wirklichkeit das doppelt schiefe Prisma ist. In der That bemerkt man bei aufmerksamer Untersuchung der Exemplare von Hebron, daß die beiden Hauptspaltbarkeiten nicht gleich leicht sind, sondern daß die eine große Flächen von Perlmutterglanz liefert, während die andere kleinere Flächen von Glasglanz darbietet. Ueberdies findet man eine dritte, unterbrochene Spaltbarkeit, die indess kleine hinreichend ebene und spiegelnde Flächen liefert, um für das Reflexionsgoniometer brauchbar

Ringe ist auf der einen Seite etwas gröfser als auf der anderen. Die Messung der Divergenz in Oel beweist, dafs die Dispersion der optischen Axen schwach ist; sie gab mir

$$\begin{aligned} 2H &= 106^\circ 31' 30'' \text{ roth} \\ &= 106 \quad 19 \quad 30 \quad \text{gelb} \\ &= 106 \quad 6 \quad 30 \quad \text{blau.} \end{aligned}$$

Dieser Winkel ist der stumpfe, den die optischen Axen in Oel machen, und seine Mittellinie ist *positiv*.

Eine winkelrecht zur Durchschnittskante der beiden Haupt-Blätterdurchgänge geschnittene Platte, die bei Compensation mit einer Quarzplatte den *negativen* Charakter darbot, lieferte für den scharfen Winkel der Axen, gesehen in Oel:

$$\begin{aligned} 2H &= 96^\circ 37' 33'' \text{ roth} \\ &= 96 \quad 46 \quad \text{gelb} \\ &= 96 \quad 10 \quad 30 \quad \text{blau.} \end{aligned}$$

Ist die Ebene der Axen parallel der Polarisations-Ebene, so läfst diese Platte eine ziemlich starke *horizontale* Dispersion sehen, modificirt durch eine *geneigte* Dispersion, welche einen sehr merkbaren Unterschied in der Lebhaftigkeit der Farben ober- und unterhalb der Querstreifen beider Ringsysteme herbeiführt.

Da die beiden zu meinen Messungen gebrauchten Platten gut winkelrecht auf den beiden Mittellinien sind, so kann man sie, ohne grossen Fehler zu befürchten, zu dem Verfahren anwenden, welches ich in einer früheren Mittheilung angegeben habe <sup>1)</sup> und kann daraus für die wahre Divergenz der optischen Axen und für den mittleren Index (den Index des Oels für roth = 1,466, für gelb = 1,468, für blau = 1,478) folgende Werthe ableiten.

$$\begin{aligned} 2V &= 85^\circ 56' & \beta &= 1,606 \text{ roth} \\ &= 86 \quad 6 & &= 1,608 \text{ gelb} \\ &= 86 \quad 22 & &= 1,619 \text{ blau.} \end{aligned}$$

Einigen Versuchen mit der Varietät von Penig zufolge, schien mir dieselbe die nämlichen doppeltbrechenden Eigenschaften darzubieten wie die von Amerika.

1) *Compt rend.* 1861, T. LII, p. 784.

Was die Grundform des Amblygonits betrifft, so ist sie nach der Untersuchung der Varietäten von Hebron als ein schiefes Parallelepipedon  $\begin{smallmatrix} p \\ mt \end{smallmatrix}$  zu betrachten, dessen Neigungen sind:

$$mt = 135^\circ$$

$$pm = 105^\circ \text{ nach vorne}$$

$$pt = 98^\circ 30' \text{ nach vorne}$$

$$\text{Ebener Winkel der Base} = 137^\circ 40' 22''$$

$$\text{do. do. Fläche } m = 72 \quad 9 \quad 54$$

$$\text{do. do. Fläche } t = 113 \quad 6$$

Parallel der Base  $p$  findet sich der leichtere Blätterdurchgang mit Perlmutterglanz, parallel der linken Fläche  $m$  der weniger leichte Blätterdurchgang mit Glasglanz, und parallel der rechten Fläche  $t$  ein schwieriger und unterbrochener Blätterdurchgang. Fügt man zu diesen drei Blätterdurchgängen diejenigen, welchen Hr. Breithaupt an den Exemplaren von Penig in der Zone  $pm$  angiebt, und für welchen man eine Neigung von etwa  $127^\circ$  gegen  $p$

schneidend unter Winkeln von etwa  $135^\circ$ ,  $105^\circ$  und  $88^\circ 30'$ .

Die optischen Axen sind sehr divergent; ihre Ebene ist beinahe winkelrecht zu dem mässig leichten Blätterdurchgang von Glasglanz. Die Mittellinie ihres scharfen Winkels ist *negativ* und parallel der Durchschnittskaute des perlmuttrigen und des glasigen Blätterdurchgangs; ringsum diese Mittellinie zeigen die Ringe eine *horizontale* Dispersion, combinirt mit einer sehr beträchtlichen *geneigten* <sup>1)</sup>.

#### XV. *Notiz über die Krystallform des Wiserins; von Prof. G. von Rath.*

Die interessanten Mittheilungen des Hrn. Prof. Kenn-  
gott über das neue, von ihm Wiserin (zu Ehren des  
Hrn. D. F. Wiser in Zürich) genaunte Mineral vom  
St. Gotthardt (s. Neues Jahrb. f. Min. von Leonhard  
und Geinitz, 1864, S. 454 bis 456) erlaube ich mir durch  
Angabe der an diesem Mineral ausgeführten Messungen,  
welche für die Stellung desselben im krystallochemischen  
Mineralsystem nothwendig erschienen, zu ergänzen. Hr.  
Dr. Krantz hatte die Güte, von dem Handstücke, wel-  
ches ich bereits in einer früheren Arbeit (Zeitschr. deutsch.  
geol. Ges. 1862, S. 379 Anmerk.) erwähnte, einen der drei  
kleinen aufsitzenden Krystalle abzulösen, und bebufs der  
Messung mir zu übergeben.

Der Krystall stellte die Combination des Octaëders mit  
dem ersten quadratischen Prisma dar. Die Flächen erlau-

1) Ein Brief von Hrn. Brush belehrt mich, daß einer seiner Assisten-  
ten, Hr. Allen, ganz kürzlich zu Hebron einen Krystall von einem  
Zoll im Durchmesser gefunden, und Hr. Dana daran den triklinischen  
Charakter ganz unzweideutig erkannt hat.

ben ziemlich genaue Messungen. Es beträgt der Endkantenwinkel des Octaëders

$$124^{\circ} 30',$$

daraus das Axen Verhältniß  $a$  (Nebenaxe) :  $c$  (Verticalaxe) ==  
 $1 : 0,5261$  oder  $1,9008 : 1$ .

Ferner berechnet sich die  
 Seitenkante der Grundform =  $82^{\circ} 22'$   
 Combinationskante zwischen der Grundform und  
 dem ersten Prisma =  $131^{\circ} 11'$  gemessen:  $131^{\circ} 12'$   
 Neigung zweier in der Endkante gegenüberliegender  
 Flächen der Grundform =  $97^{\circ} 38'$  gemessen:  $97^{\circ} 36'$ .

Aus diesen Messungen folgt, daß der Wiserin in den Winkeln zwar nicht vollkommen mit dem Zirkou übereinstimmt, aber doch demselben so nahe kommt, daß beide als isomorph betrachtet werden müssen, eine Thatsache, welche auch durch das äußere Ansehen und die Ausbildungsweise des Wiserins in hohem Grade bestätigt wird.

Nachdem Deville gefunden, daß in dem Chlorzirkonium zwei Doppel-Atome Chlor vorhanden sind, folgte bekanntlich G. Rose (s. Ueber die Isomorphie der Zinnsäure, Kieselsäure und Zirkonsäure, diese Annalen 1859,



Zinnstein	$\ddot{\text{Sn}}$	121° 40'
Auerbachit	$\ddot{\text{Zr}} \ddot{\text{Si}} \frac{3}{2}$	122 43'
Rutil	$\ddot{\text{Ti}}$	123° 8'
Zirkon	$\ddot{\text{Zr}} \ddot{\text{Si}}$	123° 19 $\frac{1}{2}$ '
Wiserin	( $\ddot{\text{Ti}} \ddot{\text{Zr}} \ddot{\text{Si}}?$ )	124° 30'
Malakon <sup>1)</sup>	( $3 \ddot{\text{Zr}} \ddot{\text{Si}} + \ddot{\text{H}}?$ )	124° 40'.

Diese Zahlen zeigen, daß der Zinnsäure das spitzeste Octaëder unter diesen isomorphen Mineralspecies zukommt; das Octaëder der reinen Titansäure ist erheblich stumpfer. Weder von der reinen Zirkonsäure noch von der Kieselsäure kennt man die quadratische Form. Eine Vergleichung der Winkel des Auerbachits mit denjenigen des Zirkons lehrt indess, daß der Kieselsäure ein spitzeres Octaëder zukommen müsse als der Zirkonsäure. Da nun der Wiserin ein sehr stumpfes Octaëder besitzt, so ist vielleicht die Vermuthung nicht ganz unbegründet, daß derselbe viel Titan- und Zirkonsäure, weniger Kieselsäure enthalte. G. Rose (a. a. O.) sagt, „die Unterschiede die man im spec. Gewichte des Zirkons gefunden hat, können davon herrühren, daß bei ihm nicht überall Zirkonsäure und Kieselsäure in einem gleichen Verhältniß enthalten sind, vielleicht aber auch daher, daß in einigen noch Titansäure, oder wie Svanberg gefunden hat, Norerde enthalten ist. Im Oerstedtit giebt Oerstedt neben der Zirkonsäure und Kieselsäure noch Titansäure an.“

Der Wiserin unterscheidet sich von dem echten Zirkon durch das von Wiser und Kenngott ermittelte Verhalten vor dem Löthrobre, nämlich durch die Titan-Reaction, durch die, von Kenngott angegebene, geringere Härte, durch die etwas stumpfere Grundform. Im Uebrigen steht er in Bezug auf das äußere Ansehen, und namentlich durch die fehlende Zwillingsbildung dem Zirkon viel näher als

1) Die kleinen Krystalle aus dem Schriftgranit von Chantelonbe (Hte Vienne) von Des Cloizeaux gemessen.

dem Zinnstein oder dem Rutil, die spezifische Selbstständigkeit des Wiserins im krystallo-chemischen Mineralsystem hängt ab von dem Resultat einer quantitativen Analyse, der man mit größtem Interesse entgegensehen muß; zu welcher das Material nur in Zürich vorhanden ist.

Hr. Wiser besitzt von diesem neuen Mineral eine ausgezeichnete Reihe. Derselbe machte mich aufmerksam auf das stete Zusammenvorkommen des Wiserins mit dem Titansäure-haltigen Eisenglanz.

---

**XVI. Ueber den Siedpunkt einiger binären Gemische von Flüssigkeiten, die einander in allen Verhältnissen lösen.**

---

Schubert, J. (1874) Ueber den Siedpunkt binärer Gemische.

Grammen.		Gewichts- verhältnifs.	Siedpunkt		Temperatur- Unterschied.
			Druck 730 <sup>mm</sup>	Druck 760 <sup>mm</sup>	
Schwefel- kohlenstoff	Alkohol				
50,0	300	6	59°,10	61°,0	2°,10
37,5	300	8	62°,10	64°,0	2°,10
25,0	300	12	65°,70	67°,5	1°,80
15,0	300	20	70°,00	71°,5	1°,50
10,0	300	30	72°,60	74°,1	1°,50
5,0	300	60	75°,50	77°,0	1°,50
Alkohol allein			77°,06	78°,5	1°,54
Alkohol do. allein	Wasser				
300	450	1,5	77°,50	78°,50	1°,00
300	900	3,0	81°,85	82°,85	1°,00
200	1000	5,0	83°,10	84°,05	0°,95
125	1000	8,0	85°,20	86°,20	1°,00
100	1000	10,0	86°,20	87°,25	1°,05
50	1000	20,0	88°,90	89°,90	1°,00
60	1800	30,0	92°,20	93°,20	1°,00
15	900	60,0	93°,35	94°,45	1°,15
Wasser allein			96°,10	97°,20	1°,10
			99°,00	100°,00	1°,00

Hr. A. bemerkt, daßs, wie er zu seinem Erstaunen gefunden, der Aether durch eine Beimischung von 0,1 seines Gewichts an Schwefelkohlenstoff seinen Siedpunkt nicht ändert, und das ähnliche Gemische von Alkohol und Schwefelkohlenstoff, von Alkohol und Wasser sich ebenso verhalten. Er schließt daraus, daßs der Siedpunkt ein schlechtes Kennzeichen zur Erkennung der Reinheit einer Flüssigkeit sey. Er empfiehlt daher für solche Fälle das von Regnault angewandte Verfahren (*Mém. de l'acad. T. XXVI, p. 644*), darin bestehend, daßs man die Spannkraft des Dampfs der für rein gehaltenen Flüssigkeit successiv nach der statischen und der dynamischen Methode bestimme. Auf solche Weise erkannte Hr. R. noch ein Tausendstel einer flüchtigen Substanz, die dem Alkohol oder dem Schwefelkohlenstoff zugefügt worden war.

Hr. A. schließt ferner, in Uebereinstimmung mit älteren Versuchen, namentlich mit denen von Berthelot (*Compt. rend. T. LVII, p. 430*), daßs es zuweilen unnög-

lich ist, zwei gemischte Flüssigkeiten durch Destillation voneinander zu trennen, wenn das Gemisch nur einige Hundertel oder selbst ein Zehntel von einer der Flüssigkeiten enthält, indem das Gemisch denselben Siedpunkt hat wie die in größerer Menge vorhandene Flüssigkeit.

### XVII. *Farbeneränderung eines Minerals bei starker Erhitzung.*

An einem Thone oder Steinmark, aus *Santa-Fé de Bogota* herstammend und im *Muséum d'histoire naturelle* zu Paris aufbewahrt, beobachtete Hr. Jannettaz, daß die schön grüne Farbe desselben bei starker Erhitzung in eine weißse, schwach violette übergeht. Er analysirte es daher und fand darin 44.55 Kieselerde, 39.97 Thonerde, 0.6

## DER PHYSIK UND CHEMIE.

## BAND CXXIII.

**I. Untersuchung über die Wärme-Entwicklung galvanischer Inductionsströme und das Verhältniß dieser Entwicklung zu der dabei verbrauchten Arbeit; von Er. Edlund.**

1. **W**enn ein geschlossener Leiter in die Nähe eines galvanischen Stromes gebracht wird, so entsteht in jenem ein Inductionsstrom, welcher eine derartige Richtung bekommt, daß eine Repulsion zwischen beiden stattfindet. Wird dagegen der Leiter von dem galvanischen Strom entfernt, so erhält der Inductionsstrom eine dem vorigen entgegengesetzte Richtung, wodurch eine Attraction zwischen beiden Strömen erfolgt. Die Induction ist somit in beiden Fällen von einem Verbräuche mechanischer Arbeit begleitet. Wird aber die galvanische Induction durch eine Intensitätsveränderung in der inducirenden Stromstärke verursacht, ohne daß dabei die beiden Stromleiter ihre Lage relativ zu einander verändern, so entsteht kein Verlust an mechanischer Arbeit. Die beiden genannten Inductionsarten sind demnach in dieser Beziehung einander ungleich. Beim ersten Anblick scheint es, daß eine Annäherung beider Ströme dieselbe Wirkung erzeugen müsse, als eine Vergrößerung der inducirenden Stromstärke, und daß die Entfernung der Stromleiter von einander gleichbedeutend seyn müsse mit einer Verminderung der inducirenden Stromstärke, weil durch die Annäherung des Inductionsleiters an den inducirenden Strom, oder durch die Entfernung von demselben in der That nichts als eine größere oder kleinere Einwirkung des inducirenden Stroms bewirkt wird.

Wenn aber die mechanische Wärmetheorie auch hier ihre Anwendung findet, so muß, da die Induction mit Verlust von mechanischer Arbeit stattfindet, mehr Wärme entstehen, als wenn die Induction durch eine Intensitätsveränderung des inducirenden Stroms geschieht, und dieser Ueberschuß an Wärme muß der verlorenen Arbeit proportional seyn. Die Inductionsströme bieten also ein passendes Mittel zur experimentellen Prüfung der Gemeingültigkeit der Wärmetheorie dar. Ich habe mir daher vorgenommen, die Wärmeverhältnisse der galvanischen Inductionsströme näher als es bisher geschehen, zu untersuchen. Im Folgenden werde ich zuerst die Gesetze in Betreff der Wärme-production der Inductionsströme darstellen und sodann zum Verhältniß zwischen der erzeugten Wärme und der verbrauchten mechanischen Arbeit übergehen.

2. Da ein Inductionsstrom kaum eine andere Eigenschaft als ein gewöhnlicher galvanischer Strom besitzen kann, dessen Intensität sich unaufhörlich verändert, so war es voraussichtlich, daß dessen in jedem Zeitmoment erzeugte Wärme proportional seyn müsse dem Quadrat der Intensität desselben in einem und demselben Zeitmoment. Die Richtigkeit dieser Behauptung ist jedoch nicht mit Beihülfe derjenigen Mittel, die früher zu demselben Zwecke in Betreff galvanischer Ströme von constanter Stärke angewandt worden, vollständig zu beweisen. Dagegen bietet W. Webers Elektrodynamometer eine einfache Methode, um die Gültigkeit dieses Satzes zu untersuchen. Dieses Instrument besteht, wie bekannt, aus zwei Rollen mit übersponnenem Kupferdraht, deren eine fest liegt, die andere aber an zwei langen und feinen Silberdrähten aufgehängt ist, so daß sie um die von diesen Drähten bestimmte Gleichgewichtslage frei oscilliren kann. Da die innere Rolle sich in dieser Gleichgewichtslage befindet, so steht ihre Axe winkelrecht gegen die der äußeren Rolle. Läßt man nun einen und denselben Strom durch beide Rollen gehen, so muß, in Folge ihrer gegenseitigen galvanischen Einwirkung, die bewegliche Rolle einen Ausschlag machen. Die-

mit Hülfe eines Fernrohrs und einer Scale auf die Weise bestimmt. Wenn  $i$  die Intensität des Stroms zu einem gewissen Zeitmoment und  $dt$  das Element des Zeitmomentes, so wird man leicht einsehen, daß der Ausschlag proportional seyn muß mit  $\int i^2 dt$ , da die Gräuzen des Integrals die Zeiten sind, wo die Strömung begann und endete. Die GröÙe, die durch den Inductionstrom entwickelte Wärme proportional seyn muß, wenn die Voraussetzung gültig ist.

In den Versuchen ward eine Inductionsrolle von 118<sup>mm</sup> Länge und 135<sup>mm</sup> innerem Durchmesser, die von mehreren Schichten eines 0,75<sup>mm</sup> dicken versponnenen Kupferdrahts umwunden war, an eine galvanischen Kette in Verbindung gesetzt. Der Inductionstrom ward mit Hülfe eines Blitzrades, das mittelst einer Kurbel von der Hand umgedreht wurde, unterbrochen und geschlossen. Das Blitzrad hatte 50 Zähne, so daß bei jeder Umdrehung des Blitzrades der Strom mit demselben an der Seite des Rades angebrachten SchlieÙknochen, im Ganzen 100 Male geschlossen und geöffnet wurde. In der erwähnten Inductionsrolle ward eine Inductionsrolle angebracht, die einen so großen äußeren Durchmesser hatte, daß sie aufs genaueste in jene hinein- und herausgezogen werden konnte. Die äußeren Enden des letzten Inductionsdrahts konnten nach Belieben entweder an ein Dynamometer oder mit zwei einander nahe stehenden Messingsäulen in Verbindung gesetzt werden; zwischen diesen war ein dünner Platindraht ausgespannt, durch den der Inductionsstrom hindurchgehen konnte. Zur Messung der durch den Inductionsstrom im Platindraht entwickelten Wärme befestigte man auf diesen eine kleine thermoelektrische Säule, von welcher zwei Kupferdrähte den elektrischen Strom zu einem in angemessener Ferne stehenden Magnetometer leiteten, demselben Instrument, welches in meinen früheren Untersuchungen von mir benutzt worden war. Die Ausschläge am Magnetometer wurden auf die gewöhnliche Weise mit Fernrohr und Scale abgelesen. Die

thermo-elektrische Säule war bei mehrfachen Versuchen dieselbe, die ich früher bei Untersuchung der Wärme-Entwicklung bei Veränderung des Volumens fester Körper benutzt hatte<sup>1)</sup>, und bei anderen Versuchen ward eine ähnliche Säule von etwas veränderter Construction angewandt. Ueber den Platindrath und die Säule ward eine Glasglocke gestellt, um sie gegen Luftströme zu schützen.

4. Um durch den Inductionstrom eine so starke Erwärmung des Platindraths hervorzubringen, daß dadurch ein meßbarer thermo-elektrischer Strom entstände, mußte das Blitzrad mehre Male umgedreht werden. Bei den Versuchen, die zur Erforschung der Abhängigkeit der Wärme-Entwicklung von der Intensität des Inductionstromes angestellt wurden, ward das Blitzrad mit gleichmäßiger Schnelligkeit umgedreht, bis die Magnetnadel im Magnetometer in Ruhe gelangt und der Ausschlag somit constant geworden war. Es war dieser constante Ausschlag, der beobachtet wurde. Es ist hinlänglich klar, daß, nachdem dieses geschehen, durch Ausstrahlung und Berührung mit der



Satzes zu beweisen. Diejenige Wärme, die in einer gegebenen Zeit im Platindraht entwickelt wird, muß durchaus der Anzahl der Inductionsströme proportional seyn, vorausgesetzt, daß die Ströme nicht schneller auf einander folgen, als daß ein vorhergehender sein Ende erreicht hat, ehe der folgende beginnt. Wenn dagegen der Zeitraum zwischen zwei Inductionen kleiner ist als die Dauer der Ströme, so müssen zwei auf einander folgende Ströme, weil sie entgegengesetzter Richtung sind, zum Theil einander aufheben. Wenn nun, der vorgenannten Behauptung zufolge, die Ausschläge des Magnetometers proportional sind den entwickelten Wärmemengen, so müssen sie auch proportional der Anzahl der Inductionsströme seyn, sobald diese Anzahl nicht zu groß ist. Die Versuche erwiesen auch, daß das besagte Proportionsverhältniß stattfand, bis sich die Anzahl der Inductionsströme auf mehr als 200 in der Sekunde belief. Hieraus ersieht man, daß die Inductionsströme, deren ich mich bediente, eine Dauer hatten, die weniger als 0,005 Sekunden betrug. Aus untenstehender Tabelle erfährt man, auf eine wie große Genauigkeit man bei Wärmemessungen dieser Art sich Rechnung machen kann.

Das Blitzrad ward so gleichmäßig als möglich mit der Hand umgedreht, so daß es zuerst eine ganze Umdrehung in der Sekunde machte (= 100 Inductionsströmen in derselben Zeit) und darauf doppelt so geschwind. Die Umdrehung ward fortgesetzt, bis die Ausschläge constant wurden. Dabei erhielt man folgende Zahlen:

100 Inductionsströme in der Sekunde	200 Inductionsströme in der Sekunde
Die geringere Stromstärke.	
36,0	72,0
35,5	74,0
35,5	73,5
36,0	73,0
36,5	72,0
Mittel <u>35,9</u>	Mittel <u>72,9</u>

100 Inductionströme in der Sekunde	200 Inductionströme in der Sekunde.
Die größere Stromstärke.	
77,0	151,0
74,5	151,0
73,0	154,0
75,0	154,5
75,0	155,0
Mittel 74,9	Mittel 153,1

Man sieht hieraus, daß die Ausschläge fast den erzeugten Wärmemengen proportional sind. Sollte man einen physischen Grund dafür ermitteln wollen, daß bei der doppelten Geschwindigkeit die Ausschläge beider Stromärken etwas mehr als doppelt so groß sind, wie bei der geringeren Geschwindigkeit, so findet man denselben in dem Umstande, daß die elektromotorische Kraft der Säule bei der größeren Geschwindigkeit, in Folge einer verminderten Polarisation, ein klein wenig gesteigert worden ist. Dieser Gegenstand soll fernerhin näher erörtert werden.

Wenn die thermo-elektrische Säule in oben genannter Weise am Platindraht angebracht wird, ist es beinahe unmöglich, wenigstens wenn die Säule eine solche Vorrichtung hat, wie die, deren ich mich bediente, es so einzurichten, daß die Säulenstäbe in durchaus vollkommener Mitte ge-

her und einander mitten gegenüber kommen. Wenn man einen etwas stärkeren galvanischen Strom den Platindrabt durchlaufen läßt, so geht immer ein Theil des Stroms zum Magnetometer und verursacht einen Ausschlag, weil es selten oder nie gelingt, die Säulenenden in eine gegenseitig vollkommen gerade Mitte zu bringen. Wird der Platindrabt in der so eben genannten Weise durch Inductionsströme erwärmt, so entsteht dennoch kein Ausschlag, weil die Ströme beim Oeffnen und Schliessen eine entgegengesetzte Richtung nehmen und daher ihre beiderseitige Einwirkung auf die Magnetnadel aufheben. Dafs dieses wirklich der Fall sey, davon überzeugte ich mich dadurch, dafs ich die Säulenstäbe aus einem und demselben Metall anfertigen liefs. Es konnte nun kein thermo-elektrischer Strom entstehen und die Magnetnadel verblieb auch im Zustande der Ruhe, weil diejenigen Theile der Inductionsströme, die zum Magnetometer übergingen, ihre wechselseitige Wirkung aufhoben, auch wenn die Säulenenden in eine schiefere Richtung gegen einander gebracht wurden, als diefs der Fall war, wo die wirkliche thermo-elektrische Säule benutzt wurde. Die beobachteten Ausschläge waren demnach eine Folge der Erwärmung und nicht eines begleitenden Inductionstromes.

Um mich zu überzeugen, dafs das benutzte Dynamometer in gehörigem Zustande sich befände, ward dessen Ausschlag der Inductionsströme mit den Quadraten der inducirenden Stromstärken verglichen. Das Blitzrad ward nicht wie früher ungedreht, bis der Ausschlag constant geworden, sondern es wurde eine bestimmte Anzahl Inductionsströme in einer Sekunde durchgelassen, und darauf der Scalentheil in Obacht genommen, wo die Rolle sich kehrte. So erhielt man:

Stromstärke des inducirenden Stroms vor dem Versuche  
 $= \text{Tg. } 56^{\circ} 10'.$

Ausschläge des Dynamometers.

56,0

57,0

57,0

57,0

56,5

Mittel  $\overline{56,7}$ .

Stromstärke nach dem Versuche  $\equiv \text{Tg. } 56^\circ$

Stromstärke vor dem Versuche  $\equiv \text{Tg. } 44'' 5'$

Ausschläge des Dynamometers.

26,0

26,0

26,0

26,0

25,0

Mittel  $\overline{25,8}$ .

Wenn man aus den Stromstärken vor und nach Dynamometerbeobachtungen das Mittel nimmt, so kö diese nach der Gleichung  $x = 26,0 (\text{Tg. } y)'$  mit folge

Hieraus ersieht man, daß sich die erhaltenen Mittel fast zu einander verhalten, wie die Zahlen 1, 2, 3, wie dies denn auch der Fall seyn mußte. Nachdem diese Versuche zur Prüfung der angewandten experimentellen Hilfsmittel angestellt worden, ging ich zu den eigentlichen Wärmebeobachtungen über.

5. Diese Beobachtungen wurden in der Weise angestellt, daß zuerst das Dynamometer mit der oben genannten inneren Rolle in Verbindung gebracht, und nachdem mit diesem Instrument einige Beobachtungen gemacht worden, dasselbe entfernt und statt dessen der Platindraht eingeschaltet wurde.

Nachdem die Wärme-Entwicklung mit dem Magnetometer bestimmt worden, wurden wieder einige Dynamometerversuche gemacht.

Darauf wurde derselbe Versuch mit einer anderen Stärke des inducirenden Stroms gemacht, ohne daß man übrigens bei einer und derselben Reihe etwas veränderte. Zwei Beobachtungsreihen dieser Art mögen hier Platz finden:

a. Dynamometer Wärmeausschläge.

49,0	48,0
48,0	48,0
50,0	52,5
45,0	45,0
44,0	47,0
43,0	Mittel 48,1
Mittel 46,5	

17,0	22,0
19,0	20,0
19,0	21,5
17,0	20,0
18,5	21,0
19,0	Mittel 20,9
Mittel 18,25	

Wenn die Wärmeausschläge ( $x$ ) nach der Gleichung  $x = 1,09y$  berechnet werden, ergibt sich:

$x = 19,89$	<del>30,90</del>	- 1,01
50,69	48,10	+ 2,59

b. In folgender Reihe wurden die Beobachtungen fünf ungleichen Stromstärken angesetzt:

Dynamometer	Wärmeauschläge
102,0	113,5
100,0	112,0
101,0	115,0
95,0	114,0
97,5	112,0
97,5	Mittel 113,3
98,5	
Mittel 98,8	
53,0	58,0
54,0	61,0
53,0	61,5
51,0	60,0

Dynamometer	Wärmeanschläge
18,0	21,0
19,0	20,5
19,0	20,0
18,5	20,0
18,5	20,0
17,5	Mittel 20,3
18,5	
17,5	
Mittel 18,3	

Wenn vorstehende Beobachtungen nach der Gleichung  $x = 1,14y$  berechnet werden, erhält man:

Berechn.	Beobacht.	Untersch.
$x = 112,6$	113,3	— 0,7
84,1	82,8	+ 1,3
59,7	60,1	— 0,4
46,6	46,8	— 0,2
20,9	20,3	+ 0,6.

Bei den erwähnten Beobachtungen ward die Intensität des inducirenden Stromes verändert, ohne dass irgend eine Aenderung in Bezug auf die Weise stattfand, wie man denselben öffnete und schloss. Diese war und verblieb bei allen Versuchen die nämliche. Wenn die Intensität des veränderlichen Inductionsstromes  $i$  genannt wird und  $t$  die Zeit bezeichnet, so war demnach bei allen Bestimmungen  $i$  die nämliche Function von  $t$ . Für zwei ungleiche Stärken  $m$  und  $n$  des inducirenden Stromes war folglich der Inductionsstrom des entsprechenden Zeitmoments  $mi$  und  $ni$ . Die vorigen Beobachtungen beweisen, dass die von den Inductionsströmen erzeugte Wärme für diesen Fall proportional ist:  $m^2 \int i^2 dt$  und  $n^2 \int i^2 dt$ . Hieraus folgt jedoch nicht unbedingt, dass dasselbe Gesetz gültig sey, wenn die Intensität des inducirenden Stromes unverändert bleibt, die Zeit jedoch für das Steigen und Fallen desselben verändert wird. Um diess zu untersuchen, verfuhr man folgendermassen:

c. Am Blitzrade ward eine neue Feder angebracht,

eine Nebenleitung in demselben Augenblicke schloß, so die Säule beim Oeffnen des Stroms mittelst der äußeren Feder abgetrennt wurde. Der beim Oeffnen der Säule in der Inductionsröhre entstehende Extrastrom erhielt durch Gelegenheit zu wirken und verursachte auf diese Weise, daß die Abnahme des inducirenden Stromes beim Oeffnen bedeutend langsamer geschah, als im Fall da kein Nebenleiter angebracht worden war. Durch diese Veranstaltung ward natürlicherweise keine Veränderung in dem Inductionsstrom verursacht, der beim Schließen der Säule entstand. Um endlich auch die Zeit dieses Inductionsstroms zu ändern, war von Anfang an in der inducirenden Strombahn eine Extra-Inductionsröhre angebracht worden, in welche man einen weichen Eisencylinder legte. Durch die so hervorgebrachte Einwirkung auf den inducirenden Strom ward die Steigung beim Schließen desselben langsamer. Diese Inductionsröhre war so weit von jenen entfernt, in welcher der Inductionsstrom gebildet wurde, dessen Wärme gemessen werden sollte, daß zwischen ihnen keinerlei Einwirkung stattfand. Damit die erzeugte Wärmemenge nicht gar zu geringe werden möchte entfernte man für diesen Fall den Nebenleiter. Die inducirende Stromstärke war bei allen drei Versuchen die nämliche.



**Mit Nebenleitung und ohne Elektromagnet.**

Dynamometer	Wärmeausschläge
31,0	48,0
30,0	44,0
31,0	48,0
32,0	50,0
31,0	50,0
30,0	Mittel 48,0
Mittel 30,83	

**Mit Nebenleitung und mit Elektromagnet.**

61,0	85,0
59,0	92,0
59,0	92,0
62,0	84,0
59,0	Mittel 88,25
Mittel 60,0	

Wenn diese Beobachtungen nach der Gleichung  $x = 1,512y$  berechnet werden, erhält man:

Berechn	Beobacht.	Untersch.
$x = 46,6$	48,0	— 1,4
90,7	88,25	+ 2,45
108,5	110,0	— 1,5.

Hiermit ist bewiesen, dass diejenige Wärme, die ein Induktionsstrom hervorbringt, proportional ist mit  $i^2 dt$ , wenn man als Grenzen des Integrals die Zeit annimmt, da der Induktionsstrom anfing und endigte. Hieraus folgt ebenfalls, dass man zu mehreren Untersuchungen, zu deren Ausführung man bisher das galvanische Dynamometer als ein unumgängliches Mittel angesehen hat, in der That die thermoelektrische Säule auf oben erwähnte Weise anwenden kann. Die Ausschläge sind für beide proportional derselben Grösse.

6. Grove hat vor mehreren Jahren gefunden, dass weiches Eisen, Nickel und Kobalt warm werden, wenn man sie schnell magnetisirt und demagnetisirt. Dagegen konnte er keine Wärme-Entwicklung wahrnehmen, wenn derselbe Versuch mit unmagnetischen Metallen gemacht wurde.

Daraus zog er den Schluss, daß beim Magnetisiren eine Molecularveränderung in der Masse des magnetisirten Körpers entstehe, und daß die Reibung, die dabei unter den Molecülen entstehen muß, die eigentliche Ursache der beobachteten Temperatursteigerung sey<sup>1)</sup>. Daß die Molecularfriction, die möglicherweise beim Magnetisiren entstehen kann, keine Erwärmung verursachen könne, scheint wohl daraus hervorzugehen, daß die Molecularveränderung, die bei der Ausdehnung und Zusammenziehung der Metalle innerhalb der Elasticitätsgränzen stattfindet, zu keiner Wärmeentwicklung Anlaß giebt. Ich habe nämlich schon vorher bewiesen, daß bei der Ausdehnung eines Metalles eine ebenso große Wärmemenge verschwindet, als die, welche bei der Zusammenziehung desselben frei gemacht wird, da selbige dabei eben so viele mechanische Arbeit verrichtet als die, welche bei der Ausdehnung verloren geht. Diese Gleichheit würde nicht existiren können, falls die Molecularfriction Wärme verursachte. Das Wahrscheinliche ist demnach wohl, daß die Wärmeentwicklung, die Grove

den Eisencylinder gedrückt und Leitungsdrähte gingen von ihm zum Magnetometer. Ward der genaunte Messingschieber entfernt, so konnten selbstverständlich keine anderen Inductionsströme im Eisencylinder entstehen, als die, welche von dem entstehenden und verschwindenden Magnetismus herrührten. Wenn dagegen der Messingschieber an seinen Ort gebracht wurde, entstanden auch Ströme im Eisencylinder, welche von der umgebenden Inductionsspirale direct inducirt wurden. Der Strom ward mit dem Blitzrade auf dieselbe Weise wie bei den früheren Versuchen geöffnet und geschlossen. Zuerst machte man einige Versuche bei geschlossenem Eisencylinder, sodann entfernte man den Messingschieber und machte einige Bestimmungen mit dem offenen Cylinder; schliesslich ward der Messingschieber wieder eingefügt und die ersten Versuche wiederholt.

Stromstärke = Tg. 24°.

Eisencylinder geschlossen	Eisencylinder offen
16,0	15,0
17,0	15,0
16,5	14,0
12,0	14,5
14,0	Mittel 14,63
17,0	
Mittel 15,42	

Stromstärke = Tg. 36° 15'.

Eisencylinder geschlossen	Eisencylinder offen
43,0	40,5
46,0	40,0
45,0	43,0
43,5	40,0
46,0	Mittel 40,88
40,0	
43,0	
Mittel 43,79	

Wenn diese Beobachtungen unter der Voraussetzung berechnet werden, dass die Wärmemengen proportional sind den Quadraten der Stromstärken (und somit auch den

Quadraten der Intensität der Inductionsströme), so erhält man  
 für den Fall, daß der Cylinder geschlossen ist, nach der  
 Gleichung  $x = 79,63$  (Tg.  $y$ )<sup>2</sup>:

Berechn.	Beobacht.	Untersch.
$x = 15,42$	15,78	+ 0,36
43,79	42,81	- 0,98;

und wenn der Cylinder offen ist, nach der Gleichung  
 $x = 74,92$  (Tg.  $y$ )<sup>2</sup>:

Berechn.	Beobacht.	Untersch.
$x = 14,85$	14,63	- 0,22
40,28	40,88	+ 0,60

In beiden Fällen ist demnach die entwickelte Wärme-  
 menge proportional der Intensität des Inductionsstromes.  
 Im ersten Anblick wird man überrascht, daß die Wär-  
 meentwicklung bei geschlossenem Cylinder unbedeutend  
 größer ist als bei offenem, ungeachtet in jenem Falle die  
 Wärme der Inductionsströme, welche von der Inductions-  
 spirale direct hervorgerufen werden, zu der derjenigen  
 Ströme addirt wird, welche durch das Entstehen und Ver-  
 schwinden des Magnetismus erregt werden. Die Erklärung  
 dieser Erscheinung ist jedoch leicht. Durch die Einwir-  
 kung dieser Inductionsströme geschieht sowohl die Magne-  
 tisirung als die Demagnetisirung langsamer, als wenn sie  
 nicht vorhanden sind, und außerdem wird die Zeit, die er-

Stromstärke = Tg. 67° 20'

Wärmeausschlag

80,0

79,0

80,5

78,0

Mittel 79,4

Stromstärke = Tg. 54° 50'

Wärmeausschlag

32,5

28,5

26,0

26,0

Mittel 28,3.

Werden diese Ausschläge nach der Gleichung  $x = 13,95 (\text{Tg. } y)^2$  berechnet, so erhält man:

Berechn.	Beobacht.	Untersch.
$x = 79,98$	79,5	+ 0,58
28,10	28,3	— 0,20

So entsteht auch in einem unmagnetisirbaren Metalle Wärme unter denselben Verhältnissen, wie in einem magnetisirbaren. Es giebt demnach keinen gültigen Grund für die Annahme, daß die Wärmeentwicklung direct vom Magnetismus erzeugt werde. Ohne Zweifel ist sie ein Product der durch das Entstehen und Verschwinden des Magnetismus verursachten Inductionsströme, die immer bei einer Veränderung in der Stärke des Magnetismus entstehen, der Elektromagnet möge Aussehen und Form haben, welche er wolle.

7. Ein Inductionsstrom hat selbstverständlich eine Einwirkung auf den inducirenden Hauptstrom. Es entstehen in dem letzteren Inductionsströme zweiter Ordnung, die sich je nach ihren Richtungen dem Hauptstrom addiren, oder von demselben subtrahiren. Hieraus folgt, daß die Wärmeentwicklung in der inducirenden Strombahn während der Zeit, daß die Induction stattfindet, eine andere seyn kann, als die während einer eben so langen Zeit, wo keine Induction geschieht. Will man untersuchen, ob durch Induction Wärme entstehe, so muß man also nicht nur die Wärmemenge messen, welche der Inductionsstrom während einer gewissen Zeit ergiebt, sondern auch das Wärmeerzeugniß im inducirenden Strom während derselben Zeit zuerst, wo keine Induction stattfindet, und nachher, während derselbe inducirt. Dabei wird natürlich vorausgesetzt, daß in beiden Fällen die Stromstärke der Säule unverän-

dert dieselbe sey, d. h. daß dort dieselben chemischen Operationen geschehen, oder, wenn dieß nicht der Fall ist, daß die erhaltenen Bestimmungen auf das Maass reducirt werden, welches sie gehabt haben würden, falls diese Bedingung erfüllt worden wäre. Ich werde nun zuerst diejenigen Versuche mittheilen, welche die Induction mittelst des Schliessens und Oeffnens des inducirenden Stromes betreffen.

Hierbei traten beim Experimentiren mehre Schwierigkeiten ein, die zu beseitigen waren, wenn das beabsichtigte Ziel erreicht werden sollte. Wenn der inducirende Strom an Intensität zunimmt, so entsteht, wie bekannt, in der Inductionsbahn ein Strom von entgegengesetzter Richtung. Wie auch dieser Inductionsstrom seyn möge, so muß er doch bei seinem Beginne von Null bis zu einer gewissen Intensität steigen und in selbiger Weise beim Aufhören von einer gewissen Intensität bis auf Null fallen. Bei diesen beiden Intensitätsveränderungen des Inductionsstromes entstehen im Hauptstrom Inductionsströme zweiter Ordnung, und wie leicht ersichtlich, geht der, welcher beim Anfange des primären Inductionsstromes entsteht, in derselben Richtung als der Hauptstrom, und der, welcher beim Aufhören des Inductionsstromes entsteht, in einer demselben entgegengesetzten Richtung. Ein umgekehrtes Verhältniß tritt bei Unterbrechung des Hauptstroms ein, vorausgesetzt, daß ein Nebenleiter dermaßen angebracht sey, daß die Inductionsströme zweiter Ordnung Gelegenheit zu circuliren haben. Der Inductionsstrom zweiter Ordnung, der hier beim Beginne des Inductionsstromes entsteht, geht in einer dem Hauptstrome entgegengesetzten Richtung, und der, welcher beim Aufhören desselben entsteht, in derselben Richtung. Hieraus folgt, daß das Steigen des Hauptstroms beim Schliessen und das Fallen desselben beim Oeffnen auf andere Weise geschieht, wenn er inducirt, als wenn er nicht inducirt. Da die Inductionsströme eine Dauer haben, die mit der Zeit zu vergleichen ist, während welcher der Hauptstrom geschlossen ist, so wird man leicht einsehen, daß die Wir-

lung dieser Inductionsströme zweiter Ordnung eine derartige wird, daß der Hauptstrom eine kürzere Zeit die größte Intensität besitzt, wenn er inducirt, als wenn er nicht inducirt.

Die Säule, deren ich mich bediente, war eine Grove'sche. Bei einer früheren Gelegenheit habe ich bewiesen, daß eine solche Säule, während der ersten Augenblicke nach dem Schließen polarisirt wird <sup>1)</sup>. Die Polarisation ist ihrer GröÙe nach jedoch abhängig von der Stärke und Dauer des Stromes, vorausgesetzt, daß letztere nicht so lang ist, daß die Polarisation ihr Maximum zu erreichen vermag. Es folgt demnach aus dem oben Gesagten, daß die Polarisation in der Säule geringer und somit die elektromotorische Kraft größer seyn mußte, wenn die Bahn des Inductionsstromes geschlossen, als wenn sie offen war. Und so erwies es sich auch. Daß der Unterschied der Stromstärken aus der Polarisation der Säule entstand, ward außerdem dadurch erwiesen, daß dieser Unterschied geringer befunden ward, wenn die Salpetersäure concentrirt, als wenn sie verdünnt war. In beiden Fällen war freilich die Wirkung der Polarisation nicht sonderlich groß, und bei andern Strommessungen, als den hier angestellten, würde man möglicherweise nicht nöthig gehabt haben, selbige zu berücksichtigen. Hier dagegen ward der Wärmeeffect des Stromes so bedeutend dadurch verändert, daß die geringe Wärmequantität, die gemessen werden sollte, leicht hätte verloren gehen können, falls man diese Quelle zu einem möglichen Irrthum nicht beachtet hätte. Es ward also erforderlich, daß gleichzeitig mit der Messung der Wärmeentwicklung des inducirenden Stromes ebenfalls eine Messung seiner Stärke stattfand.

Es ist leicht zu ersehen, daß, wenn alle Inductionsströme zweiter Ordnung, die in der Bahn des Hauptstromes circuliren, Gelegenheit haben, sich zu entwickeln und demselben Leitungswiderstande ausgesetzt sind, ihre algebraische Summe gleich Null ist, und daher können sie auf ein Galvanometer keine Einwirkung haben. Zwei aufeinander fol-

1) Pogg. Ann. Bd. LXXVII, S. 161.

Ströme gehen nämlich immer in entgegengesetzter Richtung. Wenn dagegen der Hauptstrom geöffnet wird, ohne Unterbrechung eines Nebenleiters für die Inductionsströme, die nicht haben circuliren können, so kann die algebraische Summe der übrigen Inductionsströme zweiter Ordnung nicht Null werden. Wenn man in diesem Falle die Stromstärke misst, erhält man somit die algebraische Summe des Säulenstroms und der übrigen Inductionsströme, und da man die Grösse der letzteren nicht kennt, so kennt man auch nicht die des ersteren und kann nicht sagen, in welchem Maasse selbige durch die Polarisation sich hat verändern können. Es ward daher erforderlich, den Inductionsströmen zweiter Ordnung Gelegenheit zu geben, sich frei zu entwickeln.

Wie bereits oben angedeutet worden, ist es fast unmöglich die thermo elektrischen Säulenstäbe so vollkommen einander mitten gegenüber zu bringen, dass nicht ein Theil des den Platindraht erwärmenden Stromes dem thermo-elektrischen Strom zum Magnetometer folgt. Da der Draht von den Inductionsströmen wechselnder Richtung erwärmt wird, so verschwindet diese Ungelegenheit von selbst. Wird er dagegen von einem Säulenstrom unveränderter Richtung erwärmt, dann wird der Ausschlag der Magnetnadel von dem ihm folgenden Stromtheil verändert. Um diesen Theil ohne derartige Beobachtungen zu bestimmen, wurde eine Vorrichtung aus zwei



veränderte, ward sie an einer Messingstange befestigt, und der Tisch, worauf sich dieß Alles befand, auf ein festes Gestell gebracht. Eine übergestülpte Glasglocke hielt die Luftströme ab irgend eine Erwärmung oder Abkühlung des Platindrahtes zu verursachen.

Um den Inductionsströmen zweiter Ordnung Gelegenheit zu geben sich frei zu entwickeln, versah man das Blitzrad, wie bei einem frühern Versuche, mit der Schließungsfeder No. 2. Diese war so angebracht, daß in dem Augenblicke, da der inducirende Strom mit der zweiten Feder geöffnet wurde, sich ein Nebenleiter einfügte, so daß, obgleich die Säule abgetrennt war, dennoch ein geschlossener Leiter für die Circulation der in der Inductionsrolle entstehenden Ströme vorhanden war. Dieser Nebenleiter besaß denselben Widerstand als die abgetrennte Säule. Da eine Reihe von Versuchen gewöhnlich einen ganzen Tag dauerte, so veränderte sich unterdeß selbstverständlich der Widerstand in der Säule, weshalb die Gleichheit dieser Widerstände nicht absolut seyn konnte. Um einen derartigen Einfluß zu mindern, wählte man eine Säule, die eine große Oberfläche besaß, so daß ihr Widerstand, in Vergleich mit dem Gesamtwiderstande im Leiter, nur ein geringfügiger war. Die Abweichungen des Säulenwiderstandes von einander hatten demnach nur wenig zu bedeuten. Dasselbe gilt von der Bemerkung, daß die Schließungsfeder No. 2 den Nebenleiter nicht in demselben mathematischen Augenblicke schließen konnte, wo der Strom durch die zweite Feder unterbrochen wurde, sondern einige Augenblicke vorher, damit der Nebenleiter in dem Augenblicke, wo die Säule abgetrennt wurde, in Ordnung seyn möchte. Auf diese Weise ward auf einen kurzen Zeitmoment die Strombahn wirklich zu gleicher Zeit, sowohl durch die Säule, als durch den Nebenleiter geschlossen. Da jedoch der Widerstand in beiden vergleichsweise geringe war, ward keine sonderliche Wirkung davon verspürt.

Weil die Wärme-Entwicklung des Hauptstroms sehr bedeutend war, so konnte man nicht, wie bei den vorigen Ver-

suchen, das Blitzrad mit constanter Schnelligkeit so lange umdrehen, bis der Ausschlag constant ward; weil in diesem Falle derselbe so groß geworden wäre, daß die angewandte Scale bei weitem nicht hingereicht haben würde. Dazu hätte man in der thermo-elektrischen Strombahn einen besonderen Widerstand anbringen, und später, wenn man die Wärmeentwicklung des Inductionsstromes hätte messen wollen, denselben herausnehmen müssen. Eine derartige Beobachtungsweise würde auch zu zeitraubend gewesen seyn; denn es war wünschenswerth, daß eine Reihe von Beobachtungen ohne Unterbrechung und in möglichst kurzer Zeit gemacht würde. Jedenfalls war ein Tag erforderlich. Statt dessen ließ ich daher die Ströme während einer gewissen Anzahl von Sekunden wirken, und beobachtete darauf bei einem gegebenen Sekundenschlag den erhaltenen Ausschlag. Die Zeiten für die Erwärmung und die Ablesung der Magnetenadel waren selbstverständlich für alle derselben Reihe zugehörenden Beobachtungen die nämlichen. Daß man auf diese Weise ein richtiges

genden Theils vom Hauptstrome, und  $2n$  einen Factor, abhängig von der durch die dicke Kupferhülse und die Drahtschichten verursachten Dämpfung, diese drei letzteren Quantitäten ebenfalls mit dem Trägheitsmoment dividirt — so erhält man für die Berechnung der Bewegung des Nadelsystems, wenn  $x$  den veränderlichen Ausschlagswinkel bedeutet (welcher, da dieser geringfügig ist, anstatt des Sinus gesetzt werden kann), folgende Gleichung:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -mx + kv - p - 2n \frac{dx}{dt};$$

bei welcher angenommen wird, daß  $p$  in einer der Erwärmung entgegengesetzten Richtung wirke. Wenn man den Werth von  $v$  in diese Gleichung einsetzt, die Integration ausführt und die Constanten so bestimmt, daß, wenn  $t = 0$ , auch  $x = 0$  und  $\frac{dx}{dt} = 0$  sind, so erhält man

$$\begin{aligned} mx = & \frac{ks}{a^2 - 2an + m} e^{-at} [(2n - a) \cos t \sqrt{m - n^2} \\ & + \frac{2n^2 - an - m}{\sqrt{n - m^2}} \sin t \sqrt{m - n^2}] + \frac{ks}{a} \left(1 - \frac{m}{a^2 - 2an + m} e^{-at}\right) \\ & + p \cdot e^{-at} \left[ \cos t \sqrt{m - n^2} + \frac{n}{\sqrt{m - n^2}} \sin t \sqrt{m - n^2} \right] - p \quad (1). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} = & - \frac{ks}{a^2 - 2an + m} e^{-at} \left[ \frac{(n - a)}{\sqrt{m - n^2}} \sin t \sqrt{m - n^2} \right. \\ & \left. + \cos t \sqrt{m - n^2} \right] + \frac{ks}{a^2 - 2an + m} e^{-at} \\ & - \frac{p}{\sqrt{m - n^2}} \sin t \sqrt{m - n^2} e^{-at} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad (2). \end{aligned}$$

Die Gleichungen (1) und (2), welche die Lage und Geschwindigkeit der Magnetnadel in jedem beliebigen Zeitmoment  $t$  ausdrücken, gelten natürlich nur so lange, als Wärme entwickelt wird und  $p$  zu wirken fortfährt. Wird nun bei allen derselben Reihe angehörenden Versuchen die Wärmeentwicklung in gleich langer Zeit ( $T$ ) fortgesetzt, so erhält man die Lage und Geschwindigkeit der Magnet-

adel beim Schlusse der Wärme-Entwicklung, wenn  $T$  in diese Gleichungen eingesetzt wird. Nun sind die Coëfficienten von  $s$  und  $p$  in denselben Gleichungen allein abhängig von der Veränderlichen  $t$ . Macht man diese nun constant, dann werden auch die Coëfficienten constant und die Gleichungen können geschrieben werden unter der Form

$$x = As - Bp \quad . \quad . \quad . \quad (3)$$

$$\frac{dx}{dt} = A's - B'p \quad . \quad . \quad . \quad (4),$$

welche Gleichungen die Lage und Geschwindigkeit der Magnetnadel beim Schlusse der Wärme-Entwicklung ausdrücken.

Die Differentialgleichung für die Bewegung der Magnetnadel, nachdem die Wärme-Entwicklung aufgehört hat, ist

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -mx + kv - 2n \frac{dx}{dt} \quad . \quad . \quad (5).$$

Man ist aber:

$$dv = -av dt,$$

daraus

$$v = v_0 e^{-at};$$

wo  $v_0$  der Temperaturüberschuss ist, der sich im Draht beim Schlusse der Wärme-Entwicklung befindet.

Allein dem Vorausgegangenen zufolge ist

$$v_0 = \frac{s}{a} (1 - e^{-at}) = gs, \quad (g \text{ eine Constante}),$$

$$\begin{aligned}
x = & \frac{kgs e^{-at}}{a^2 - 2an + m} + \frac{kgs(a-n)}{\sqrt{m-n^2}(a^2 - 2an + m)} e^{-at} \sin t \sqrt{m-n^2} \\
& - \frac{kgs}{a^2 - 2an + m} e^{-at} \cos t \sqrt{m-n^2} \\
& + x_0 e^{-at} \cos t \sqrt{m-n^2} + \frac{nx_0}{\sqrt{m-n^2}} e^{-at} \sin t \sqrt{m-n^2} \\
& + \frac{h_0}{\sqrt{m-n^2}} e^{-at} \sin t \sqrt{m-n^2}.
\end{aligned}$$

Wenn nun die Beobachtungen bei der Zeit  $T$  gemacht werden, von der Zeit  $T$  an gerechnet, und diese Zeit für alle Beobachtungen, die derselben Reihe angehören, gleich ist, so werden die Coëfficienten von  $s$ ,  $x_0$  und  $h_0$  constant, und man kann der Einfachheit wegen diese Gleichung unter der Form schreiben:

$$x = A''s + B''x_0 + Ch_0 \quad . \quad . \quad . \quad (6).$$

Wenn nun die Werthe von  $x_0$  und  $h_0$  aus den Gleichungen (3) und (4) in diese Gleichung gesetzt werden, so erhält man schliesslich

$$x = Fs - Gp \quad . \quad . \quad . \quad (7),$$

wo  $F$  und  $G$  neue Constanten sind.

Wenn der galvanische Strom durch den Platiendraht in einer der vorigen Richtung entgegengesetzten hindurchgelassen wird, so verändert  $p$  sein Zeichen, weil der Stromtheil, der zum Magnetometer mitfolgt, in derselben Richtung als die Erwärmung wirkt. Während alles Uebrige in der Gleichung (7) unverändert bleibt, erhält man demnach für diesen Fall

$$x' = Fs + Gp \quad . \quad . \quad . \quad (8).$$

Wenn die Gleichung (7) zu der (8) addirt und die Summe durch 2 dividirt wird, erhält man

$$\frac{x+x'}{2} = Fs.$$

Wird dagegen die Gleichung (7) von der Gleichung (8) subtrahirt, so wird ebenso

$$\frac{x'-x}{2} = Gp.$$

Für die Erwärmung durch den Inductionsstrom muss

man  $p = 0$  setzen, weil die Einwirkungen der mitfolgenden Stromtheile auf die Magnetnadel sich alsdann gegenseitig aufheben. Da nun  $p$  der Stromstärke proportional ist, so folgt aus der vorübergehenden Berechnung, daß, wenn man bei Umdrehung des Blitzrades mit constanter Schnelligkeit den Hauptstrom während einer gegebenen Zeit ( $T$ ) durch den Platindraht gehen läßt, darauf nach einer gewissen Zeit ( $T'$ ) die Lage der Magnetnadel beobachtet, und denselben Versuch anstellt, nachdem die Richtung des Stromes im Platindraht umgekehrt worden — man durch die halbe Summe der Ausschlagzahlen einen Ausdruck für die Erwärmungskraft des Hauptstroms erhält, mit demselben Maasse gemessen, das man beim Inductionsstrom anwandte; so giebt auch der halbe Unterschied der Ausschlagzahlen ein Maass für die während der Erwärmung stattgefundene Stromstärke.

Um die Richtigkeit der vorstehenden Berechnung zu erproben, ward folgender Versuch angestellt: Der Hauptstrom ward während 15 Sekunden durch den Platindraht geleitet und mittlerweile das Blitzrad mit constanter Schnelligkeit umgedreht, worauf bei der 40sten Sekunde, vom Beginne der Erwärmung an gerechnet, die Lage der Magnetnadel beobachtet wurde. Dann stellte man denselben Versuch an, nachdem die Stromrichtung im Platindraht umgekehrt worden. Derartige Versuche machte man bei zwei ungleichen Stromstärken.

## Ausschläge bei geringerer Stromstärke.

+ 104,0	}	in derselben Richtung.
+ 96,0		
— 26,0	}	in entgegengesetzter Richtung.
— 25,0		
+ 96,0	}	in derselben Richtung.
+ 94,0		
— 25,0	}	in entgegengesetzter Richtung.
— 25,0		

Für die größere Stromstärke ist also  $\frac{x+x'}{2} = 104,0$ ,

„ „ geringere „ „ „  $\frac{x+x'}{2} = 36,12$ ,

dagegen ist  $\frac{x'-x}{2}$  im ersteren Falle  $= 104,25$ ,

und in dem letzteren  $= 61,37$ .

Da nun die Erwärmung proportional ist dem Quadrat der Stromstärke, so muß, wenn die Rechnung richtig ist,

$$\frac{104,0}{36,12} = \left( \frac{104,25}{61,37} \right)^2 \text{ seyn.}$$

Die erste Quote giebt 2,879 und die letzte 2,885. Die Uebereinstimmung ist demnach so vollständig, wie man nur wünschen kann.

a. In der folgenden Beobachtungsreihe ward das Blitzrad während 20 Sekunden mit constanter Schnelligkeit umgedreht (eine ganze Umdrehung in einer Sekunde) und darauf beim 40<sup>sten</sup> Sekundenschlage die Lage der Magnetnadel beobachtet. Zuerst beobachtete man zweimal die Wärme-Entwicklung des Inductionsstromes, nachdem der Platindrath, auf dem die thermo-elektrische Säule festgeschraubt war, in die Bahn des Inductionsstromes eingeschaltet worden. Darauf ward die Inductionsbahn beseitigt und statt deren der Platindraht in die Bahn des Hauptstromes eingefügt. Nun wurden zwei Versuche angestellt, während die Inductionsbahn offen war; bei dem ersten derselben wirkten der thermo-elektrische Strom und der zum Magnetometer mitfolgende Theil des Hauptstroms in entgegen-

gesetzter und beim zweiten Versuche in einer und derselben Richtung. Von diesen beiden Beobachtungen erhielt man somit ein Maass für die Wärme-Entwicklung und Stärke des Hauptstromes während der 20 Sekunden, in denen das Blitzrad umgedreht ward und keine Induction stattfand. Nachdem diese Beobachtungen angestellt waren, ward die Inductionsbahn mit einem Platindrabt von derselben Länge und Dicke als der, auf dem die thermo-elektrische Säule festgeschraubt war, geschlossen. Der galvanische Leitungswiderstand in der Inductionsbahn war demnach nun derselbe, als damals, wo man die Wärme-Entwicklung des Inductionsstroms beobachtete. Während die Inductionsbahn geschlossen war, stellte man abermals zwei Beobachtungen an, die eine, als der zum Magnetometer mitfolgende Theil des Hauptstroms und der thermo elektrische Strom in entgegengesetzter, und die andere, als sie in einer und derselben Richtung wirkten. Diese beiden Beobachtungen ergaben ein Maass für die Stärke und Wärme-Entwicklung des Hauptstroms während der 20 Sekunden, unter denen die Induction stattfand. Nachdem diese Versuche mehrmals wiederholt worden, stellte man schliesslich einige neue Beobachtungen über die Wärmeentwicklung des Inductionsstromes an. Die Strombahn enthielt selbstverständlich den nöthigen Strombrecher und Commutator und daneben eine Tangentenbussole. Die Säule bestand aus fünf Grove'schen Elementen mit grosser Fläche.



Aus schläge am Magnetom.		Inductions- rolle	$\frac{x' - x}{2} =$ Strom- stärke	$\frac{x + x'}{2} =$ Wärme-Ent- wicklung
No. 4.	41,0 317,8	geschlossen	138,4	179,4
No. 5.	44,0 325,0	offen	140,5	184,5
No. 6.	40,0 334,0	geschlossen	147,0	187,0
No. 7.	47,0 327,0	offen	140,0	187,0
No. 8.	38,0 322,0	geschlossen	142,0	180,0
No. 9.	43,0 320,0	offen	138,5	181,5
No. 10.	38,0 326,0	geschlossen	144,0	182,0.

Die Wärme-Entwicklung des Inductionsstroms betrug:

27,0	} vor den Versuchen
28,0	
29,0	} nach den Versuchen
30,0	

Mittel 28,75

Wenn die Wärme-Entwicklung bei den zehn vorgeannten Versuchen für den Fall berechnet wird, daß die Stromstärke der Säule constant und unverändert geblieben ist (= Mittel 140,6), so erhält man folgende Zahlen:

No. 1 . . . . 190,1	No. 2 . . . . 180,0
No. 3 . . . . 193,6	No. 4 . . . . 185,2
No. 5 . . . . 184,8	No. 6 . . . . 171,1
No. 7 . . . . 188,6	No. 8 . . . . 176,5
No. 9 . . . . 187,1	No. 10 . . . . 173,5
Mittel 188,84	Mittel 177,26

Der wahrscheinliche Fehler bei den ersten dieser Mittelwerthe ist  $\pm 0,99$  und bei dem andern  $\pm 1,65$ .

Der Unterschied zwischen diesen beiden Mittelwerthen

11,58 bezeichnet die Abnahme der Wärme-Erzeugung im Hauptstrom, und er entsteht dadurch, daß letzterer einen Strom in einem anderen Leiter inducirt. Diese Zahl 11,58, sowie die Zahl 28,75, welche man für den Inductionsstrom erhielt, repräsentiren jedoch nur die Wärme-Entwicklung im Platindrabt, gehen aber keinen Begriff von der Wärme-Entwicklung in den übrigen Theilen der beiden Leitungsbahnen. Man kann demnach diese Zahlen nicht direct mit einander vergleichen, um zu sehen, ob im Ganzen eine Wärme-Entwicklung abseiten der galvanischen Induction dieser Art verursacht wird. Nun aber ist für einen und denselben Strom die Wärme-Entwicklung proportional dem galvanischen Leitungswiderstande, was nicht nur für metallische Leiter, sondern auch für Flüssigkeiten gilt. Wenn man also 28,75 mit dem Leitungswiderstand der Inductionsbahn multiplicirt und 11,58 mit dem Widerstande im Hauptstrom, so bezeichnen von den erhaltenen Producten jenes die gesammte Wärme Erzeugung in der Bahn des Induc-

28,75  $m$  die gesammte Wärme-Erzeugung in der Inductionsbahn und

11,58  $M$  den gesammten Wärme - Unterschied in der Hauptbahn, wenn der Strom inducirt, und wenn er nicht inducirt.

Um nun das Verhältniß zwischen  $m$  und  $M$  zu finden, ward das Blitzrad einmal in der Sekunde mit constanter Schnelligkeit umgedreht und so fuhr man fort, bis der Ausschlag an der gleich anfangs in der Hauptleitung angebrachten Tangentenbussole constant wurde. Darauf ward die Leitungsbahn des Inductionstromes in die Hauptleitung eingeschaltet und dieselbe Beobachtung angestellt. In erstem Falle erhielt man als Ausschlag  $15^{\circ} 49'$  (das Mittel mehrerer Ablesungen) und im letzteren  $11^{\circ},0$ . Man hat so:

$$\frac{T_g 15^{\circ} 49'}{T_g 11^{\circ},0} = 1 + \frac{m}{M};$$

$$\text{woraus } m = 0,457 M.$$

Diese Bestimmung geschah vor dem Beginne der Beobachtungsreihe. Da  $M$  während des Laufes der Reihe sich veränderte, war es nothwendig beim Schlusse derselben Versuch zu wiederholen. Dieser ergab:

$$\frac{T_g 14^{\circ} 43'}{T_g 10^{\circ} 27'} = 1 + \frac{m}{M};$$

$$\text{woraus } m = 0,424 M.$$

Nimmt man nun hiervon das Mittel, so erhält man  $0,4405 M$ . Setzt man diesen Werth von  $m$  in den gehenden Ausdruck der gesammten Wärme-Erzeugung des Inductionstromes, so erhält man für diese  $12,66 M$ , Ausdruck sich so unbedeutend von  $11,58 M$  unterscheidet, der den Gesamtunterschied in der Wärme-Erzeugung des Hauptstromes bezeichnet, wenn dieser inducirt oder er nicht inducirt, daß man sie als einander gleich annehmen muß.

Die zweite Beobachtungsreihe ward in gleicher Weise wie die erste, mit dem Unterschiede, daß das Blitzrad nur 15 Sekunden umgedreht und die Beobachtung

am Schluß der 35<sup>ten</sup> Sekunde gemacht wurde. Die galvanische Säule, die aus denselben Elementen wie zuvor bestand, war stärker, so daß die Ausschläge, trotz der kürzeren Wirkungszeit des Stromes, dennoch etwas größer ausfielen, als vorher. Dies dürfte doch zum Theil davon herrühren, daß die thermo-elektrische Säule zwischen beiden Versuchsreihen auf den Platindraht versetzt worden war, in Folge dessen die erhaltenen Zahlen in der ersten und zweiten Reihe nicht ganz miteinander vergleichbar sind. In dieser Reihe erhielt man folgende Resultate:

Wärme-Entwicklung des Inductionstromes = 32,0.

		$\frac{x' - x}{2} =$		$\frac{x + x'}{2} =$	
Ausschläge am	Inductions-	Strom-		Wärme-Ent-	
Magnetom.	rolle	stärke		wicklung	
No. 1. 373,0	offen	144,0		229,0	
65,0					
No. 2. 81,0	geschlossen	147,5		228,5	

			$\frac{x' - x}{2} =$	$\frac{x + x'}{2} =$
Ausschläge am	Magnetom.	Inductions- rolle	Strom- stärke	Wärme-Ent- wicklung
No. 9.	343,0 } 70,0 }	offen	136,5	206,5
No. 10.	61,0 } 344,0 }	geschlossen	141,5	202,5
Wärme-Entwicklung des Inductionsstromes = 28,0				31,0

Wenn man aus diesen Beobachtungen berechnet, wie roß die Wärme-Entwicklung geworden seyn würde, falls die Stromstärke sich unverändert gehalten hätte (= 143,2, als arithmetische Mittel aller 10 Beobachtungen), so erhält man folgende Zahlen:

Ohne Induction.		Mit Induction.	
No. 1 . . . .	226,5	No. 2 . . . .	215,4
No. 3 . . . .	226,1	No. 4 . . . .	206,9
No. 5 . . . .	228,6	No. 6 . . . .	220,7
No. 7 . . . .	217,6	No. 8 . . . .	213,0
No. 9 . . . .	227,3	No. 10 . . . .	207,4
Mittel 225,22		Mittel 212,86	

Der wahrscheinliche Fehler bei dem ersten dieser Mittelwerthe ist  $\pm 1,3$  und bei dem letzten  $\pm 1,73$ .

Der Unterschied zwischen diesen beiden Mittelwerthen ist 12,36. Das Mittel der sieben Beobachtungen über die Wärme-Entwicklung des Inductionsstromes ist 30,71. Das Verhältniß zwischen dem Widerstande  $m$  und  $M$  erhält man durch die Gleichung

$$\frac{T_g 18^\circ 45'}{T_g 13^\circ 21'} = 1 + \frac{m}{M}$$

$$\text{woraus } m = 0,430 M.$$

Würden 30,71 mit 0,43 multiplicirt, so erhält man 13,21, welche Zahl sich um 0,85 von 12,36 unterscheidet. Diese Reihe führt also zu demselben Resultat wie die vorige.

c. Die Art der Beobachtung in der dritten Reihe wich etwas von der der beiden früheren ab. Zuerst beob-

mahlte man die Wärme-Entwicklung des Inductionstroms  
 und darauf selbige im Hauptstrom, wenn dieser inducirte  
 und wenn er nicht inducirte; sodann wurde die Wärme  
 des Inductionstromes wieder gemessen. Für jedwede der-  
 artige Combination der Beobachtungen ward das Verhält-  
 niss zwischen  $m$  und  $M$  bestimmt. Nachdem dies gesche-  
 hen, stellte ich neue Beobachtungen an.  $m$  war in dieser  
 Reihe bedeutend gröfser in Verhältniss zu  $M$ , als in den  
 vorhergehenden, weil die Inductionsspirale einen viel län-  
 geren Draht enthielt. Durchschnittlich war  $m = 0,88 M$ . Das  
 Magnetrad ward während 15 Sekunden umgedreht und am  
 Schlusse der 35<sup>ten</sup> Sekunde die Lage der Magnetaedel beob-  
 achtet. Die inducirende Stromstärke war bei diesen Ver-  
 suchen so stark, dafs, da die Erwärmung des Platindrahts  
 durch die Einwirkung derselben geschah, die Ausschläge  
 so grofs wurden, dafs die Scale nicht zureichte. Es ward  
 daher ein Widerstand in die Bahn des thermo-elektrischen  
 Stroms eingeschaltet, wodurch die Ausschläge in einem Ver-  
 hältniss von 5,701 verringert wurden. In folgender Tabelle  
 sind die Zahlen, welche die Wärme Entwicklung des In-  
 ductionstromes bezeichnen, auf denjenigen Widerstand re-  
 duirt, der in dem inducirenden Strom stattfand.

Wärme-Entwicklung	Daraus Unterschied, wenn der
des	Hauptstroms inducirt und wenn

hier etwas grösser ist als die Wärme des Inductionsstroms. Alle drei Reihen führen also zu demselben Resultat, *dass, wenn eine galvanische Induction in einem geschlossenen Leiter durch Oeffnen und Schliessen des inducirenden Stromes geschieht, rücksichtlich der Wärme weder Gewinn noch Verlust entsteht. Die Summe der vom Inductionsstrom verursachten Wärme ist gleich dem gesamten Wärmeverlust, der durch die Induction in dem inducirenden Strom entsteht.*

Wenn  $I$  die Intensität des inducirenden Hauptstromes in einem gegebenen Zeitmoment,  $i$  die Intensität des Inductionstromes, und  $i_1$  die Intensität desjenigen Inductionsstroms zweiter Ordnung, der in der Bahn des Hauptstromes entsteht; wenn ferner  $M$  und  $m$  den galvanischen Leitungswiderstand in der Hauptleitung und in der Bahn des Inductionsstromes bezeichnen, so hat man in Folge des Vorhergegangenen

$$M \int I^2 dt - M \int (I - i_1)^2 dt = m \int i^2 dt, \text{ oder} \\ M \int (2 I i_1 - i_1^2) dt - m \int i^2 dt = 0 \quad . \quad . \quad (A)$$

wobei die Gränzen der Integrale die Zeit für den Anfang und den Schluss der Induction sind.

8. Um durch die Annäherung der Inductionsbahn an den inducirenden Strom, so wie durch ihre Entfernung von demselben einen so starken Inductionsstrom zu erhalten, dass dessen Wärme-Entwicklung mit genügender Genauigkeit gemessen werden könnte, liess ich folgenden Apparat aufertigen. In Fig. 2 Taf. II stellt  $ABCD$  einen Theil eines Holzgestelles dar, worin eine Rolle  $ab$  aus Messing festgemacht ist. Diese Rolle, welche einen inneren Diameter von 200<sup>mm</sup> hat und 60<sup>mm</sup> breit ist, ist in mehreren Schichten von einem übersponnenen Kupferdraht umwunden, der bei den Schraubstöcken  $c$  und  $d$  endigt. In dieser Rolle befindet sich eine andere Messingrolle  $ef$ . Der innere Durchmesser dieser Rolle beträgt 175<sup>mm</sup>, der äussere 190<sup>mm</sup> und ihre Breite 34<sup>mm</sup>. In der Verlängerung eines und desselben Durchmessers sind auf den emporgebogenen Rändern dieser Rolle zwei Stahlcylinder festgeschoben, von

denen der eine bei *g* durch die äußere Rolle geht, bei *h* von einem Lager umgeben, und das Ende desselben bei *k* in eine Messingscheibe eingesteckt ist. Das Lager *h* und die Messingscheibe *k* sind an dem Holzgestell befestigt. Auf dem Stahlcylinder sitzt bei *i* eine aus Messing verfertigte Rollscheibe. Fig. 3 Taf. II zeigt wie der Stahlcylinder an die innere Rolle *e'f* befestigt ist; *g'* ist das genannte Lager und *i* die Rollscheibe. Damit der Stahlcylinder nicht in Berührung mit der äußern Rolle und den darum gewundenen Draht komme, hat das Loch, durch welches der Cylinder geht, eine knöcherne Fütterung. Der zweite Stahlcylinder, welcher in der Figur nicht sichtbar ist, ist bei *l* an der inneren Rolle befestigt, jedoch so, daß sie in keiner leitenden Verbindung mit einander stehen. Um die Isolirung zu bewerkstelligen, ist beim Festschrauben eine knöcherne Scheibe zwischen sie gelegt. Dieser Cylinder, der sehr kurz ist, ist konisch zugespitzt und paßt in eine an der äußern Rolle angebrachte konische Vertiefung. Die innere Rolle ist in mehreren Schichten von einem übersponnenen Kupferdraht umwickelt. Das eine Ende dieses Kupferdrahts steht in leitender Verbindung mit dem oberen Stahlcylinder, und das andere mit dem unteren konisch zugespitzten. Beide Messingrollen sind bei *m* aufgeschnitten, so daß in ihnen keine Inductionsströme entstehen können. An jedem der mehrgenannten Stahlcylinder befindet sich eine Stahlfeder *n* und *p* (*p'* Fig. 3). Diese Federn sind an Messingscheiben befestigt, die im Holzgestell festgeschraubt sind. Der Druck dieser Federn gegen die Stahlcylinder konnte, mittelst einer zu diesem Zwecke angebrachten Vorkehrung an den Messingscheiben, nach Belieben vermehrt oder vermindert werden. Um einigermaßen einer Oxydirung vorzubeugen waren die Stahlfedern da, wo sie die Cylinder berührten, mit Platin belegt. Bei den Versuchen liefs der Contact der oberen Feder nichts zu wünschen übrig, dagegen geschah es mehrmals, daß die Leitung zu der unteren Feder unterbrochen wurde. Die Ursache hiervon war die, daß etwas wenigens von dem Oel, womit zur



Verhinderung stärkerer Reibung das Ende des konischen Cylinders eingeschmiert werden mußte, sich bis zur Contactstelle binzog. Eine an dem Cylinder, zwischen dieser Stelle und der konischen Spitze, befestigte kleine Scheibe vermochte nicht diesen Uebelstand zu beseitigen. Es wäre daher ohne Zweifel besser gewesen, wenn man das untere Lager ungefähr in ähnlicher Weise angeordnet hätte wie das obere. Die Linie, in welcher die beiden Stahlcylinder lagen, oder was dasselbe ist, die Rotationsaxe der inneren Rolle, bildete mit der Horizontal-Fläche einen Winkel von ungefähr 70 Grad. Das Holzgestell war der Art im Fußboden festgeschraubt, daß die Fläche der festen Rolle im magnetischen Meridian lag, wobei die Rotationsaxe der inneren Rolle einigermaßen parallel ward mit der Richtung der erdmagnetischen Inclinationsnadel. Diefs ward für nöthig gehalten, um der Induction des Erdmagnetismus auszuweichen. Wenn die innere Rolle stark rotirte, veränderte sie in Folge der Centrifugalkraft ihre Form in eine elliptische, wobei der untere konische Stahlcylinder aus der Vertiefung der äußeren Rolle hüpfte. Um dies zu verhindern mußte ein Holzcylinder  $w$  in der Richtung der Rotationsaxe angebracht werden. Die Rotation ward mittelst zweier Räder bewerkstelligt, von denen nur das eine  $x$  in der Figur anschaulich gemacht ist. Sie waren beide von Holz, um nicht in der einen oder andern Weise durch Induction auf die beiden Rollen einzuwirken. Ueber das in der Figur ausgelassene Rad, welches mit einer Kurbel versehen war, ging eine Schnur  $t't'$  zu der an derselben Axe wie das Rad  $x$  sitzenden Messingrolle  $s$ . Eine andere Schnur  $tt$  ging um das Rad  $x$  unter der Messingrolle  $r$  zu der an der Rotationsaxe der Drahtrolle befestigten Messingrolle  $i$ . Wenn die Kurbel ein Mal umgedreht wurde, drehte sich die Drahtrolle 90 Male ganz herum. Bei allen Versuchen ward die Kurbel ein Mal in zwei Sekunden umgedreht; die Drahtrolle machte demnach 45 ganze Umdrehungen in der Sekunde.

Der inducirende Hauptstrom ging bei den Versuchen

durch die äußere Rolle. Eine in den Hauptstrom eingeschaltete Sinus-Busssole zeigte, daß die Stromstärke gleich groß war, die geschlossene innere Rolle mochte rotiren oder sich in Ruhe befinden. Man konnte also keine durch die Inductionsströme zweiter Ordnung hervorgerufene Veränderung der elektromotorischen Kraft der galvanischen Säule verspüren. Die Polarisation, die ohne Zweifel auch jetzt nicht mangelte, zeigte sich, da der Strom fortwährend geschlossen war, in unveränderlicher Stärke und verursachte daher keine Veränderung in der Stromstärke. Dieser Umstand gestattete eine bedeutende Vereinfachung der Beobachtungsweise. Da man nämlich darauf rechnen durfte, daß die inducirende Stromstärke sich unverändert gleich blieb, ob Induction stattfand oder nicht, so brauchte man nicht, wie bei den früheren Beobachtungsreihen, dem inducierenden Strom eine andere Richtung zu geben, um ein Maass für denjenigen Theil desselben, der dem thermo-elektrischen Strom bis zum Magnetometer folgte, zu erhalten; denn dieser Stromtheil war hier unverändert derselbe. Um in Betreff des Unterschiedes zwischen den Wärmemengen, die vom Hauptstrom hervorgebracht wurden, wenn er inducirte und wenn er nicht inducirte, ein Maass zu erhalten, brauchte man nur die Ausschläge am Magnetometer, die man in diesen

man den Platindraht, auf welchem die Säule festgeschroben war, in den Hauptstrom und schloß mit dem andern Platindraht die Inductionsrolle; hierauf ward die innere Rolle in Bewegung gesetzt und, nachdem ihre Schnelligkeit 45 Umdrehungen in der Sekunde erreicht hatte, der Hauptstrom geschlossen, und die Rotation mit unveränderter Schnelligkeit während 30 Sekunden fortgesetzt; nachdem diese verstrichen, öffnete man den Hauptstrom und beobachtete sodann in der 50<sup>sten</sup> Sekunde den Ausschlag der Magnetnadel. Endlich wiederholte man diesen letzten Versuch mit dem Unterschiede, daß die innere Rolle in Ruhe gehalten wurde und der Inductionsdraht offen war. Der Unterschied zwischen den beiden letzten Ausschlägen giebt einen Ausdruck für den Unterschied zwischen den Wärmemengen, die während 30 Sekunden vom Hauptstrom erzeugt werden, wenn er inducirt und wenn er nicht inducirt. Derjenige Theil des Hauptstroms, der zum Magnetometer mitfolgte, wirkte in dieser Reihe, in der der Erwärmung entgegengesetzten Richtung.

No. 1	1)	...	78,0	} Wärme-Entwicklung des Induc-
No. 2		.....	75,0	

#### Ausschläge des Hauptstroms.

Ohne Induction.		Mit Induction.	
No. 3	.... 295,0	No. 5	.... 315,0
No. 4	.... 297,0	No. 6	.... 292,0
No. 7	.... 290,0	No. 9	.... 287,0
No. 8	.... 282,0	No. 10	.... 302,0
No. 11	.... 292,0	No. 12	.... 284,0
No. 13	.... 287,0	No. 14	.... 295,0
Mittel 290,5		Mittel 295,8.	
No. 15	..... 80,0	} Wärme des Inductionsstromes	
No. 16	..... 77,0		
No. 17	..... 73,0		
No. 18	..... 74,0		

Das Mittel der Wärme aller Inductionsströme = 76,2.

1) Diese Zahlen bezeichnen die Reihenfolge, in der die Versuche gemacht wurden.

Das Verhältniß zwischen dem Widerstand in der rotirenden Rolle ( $m$ ) und in der festen ( $M$ ) war  $m = 0,274 M$ .

Wenn die Wärme-Entwicklung bei dieser Art der Induction sich eben so verhielte, wie wenn der inducirende Strom geöffnet und geschlossen wurde, so mußte das Mittel der Beobachtungen, die angestellt wurden, als die Induction stattfand, geringer seyn als das Mittel der Beobachtungen, wenn der Hauptstrom nicht inducirte. Hätte keine Wärme-Entwicklung stattgefunden, so würde das erste Mittel  $20,88 (= 76,2 \times 0,274)$  Einheiten geringer geworden seyn als das letzte, statt dessen aber ward es  $5,3$  Einheiten größer. Bei dieser Art Induction wird also Wärme entwickelt. Der Ueberschuß  $5,3$  rührt großentheils von der sicherlich fehlerhaften Beobachtung No. 5 her: wenn aber diese Beobachtung ganz ausgeschlossen wird, erhält man als Mittel  $292,0$  und folglich ein größeres als das andere. Der Ueberschuß an Wärme-Entwicklung wird durch die Wärme gebildet, die sich aus dem Inductionstrom entwickelt, während die Wärme-Erzeugung im Hauptstrom nahezu constant zu seyn scheint.

b) Folgende Versuchsreihe ward in fast eben derselben Weise, wie die vorige angestellt. Eine in dem Hauptstrom angebrachte Sinusbusssole ergab die Stromstärke  $= \sin 37^\circ 30'$ .

Wärme-Entwicklung

Ausschläge des Hauptstromes

tene Mittel eben so groß, wie das andere. Hätte keine Wärme-Entwicklung stattgefunden, so würde dieses Mittel 12,8 ( $= 49,3 \times 0,26$ ) Einheiten weniger als das andere betragen haben.

a. In der letzten Reihe war die Stromstärke  $= \sin 55^\circ$ . Die Beobachtungsweise war dieselbe wie in der vorigen Reihe:

Wärme-Entwicklung des Inductionsstromes	Ausschläge des Hauptstromes	
	ohne Induction	mit Induction
No. 3 . . . . 86,0	No. 1 . . . . 278,0	No. 2 . . . . 276,0
No. 6 . . . . 93,0	No. 5 . . . . 281,0	No. 4 . . . . 281,0
No. 8 . . . . 94,0	No. 9 <sup>1)</sup> . . 254,0	No. 7 <sup>1)</sup> . . 259,0
No. 10 . . . . 91,0	Mittel 271,0	Mittel 273,0.
Mittel 91,0		

Das Verhältniß zwischen  $m$  und  $M$  war hier wie in der ersten Reihe  $m = 0,27 M$ . Hätte keine Wärme-Entwicklung stattgefunden, so würde das letzte Mittel 24,6 ( $= 91,0 \times 0,27$ ) Einheiten geringer gewesen seyn als das erste.

Vergleicht man die Inductionsströme in den zwei letzten Versuchsreihen mit einander und mit den Quadraten der Stromstärken, so erhält man:

$$\frac{(\sin 55^\circ)^2}{(\sin 37^\circ 30')^2} = 1,811.$$

Wird 1,811 mit 49,3 multiplicirt, so erhält man 89,28, was sich nicht viel von 91,0 unterscheidet. Die Wärme dieser Inductionsströme ist demnach proportional dem Quadrat der inducirenden Stromstärke.

Die drei angeführten Beobachtungsreihen führen also gemeinsam zu dem Resultat, daß die Induction dieser Art eine Wärme-Entwicklung verursacht, und diese ist gleich der Summe derjenigen Wärme, welche der entstandene Inductionsstrom entwickelt. Die Wärme-Entwicklung im Hauptstrom ist eine und dieselbe, mag eine Induction stattfinden oder nicht.

1) Bei den Beobachtungen No. 7 und No. 9 waren die Ausschläge bedeutend geringer als vorher, welches wahrscheinlich von einer veränderten Lage der thermo-elektrischen Säule herrührte.

Man wird leicht einsehen, daß die dynamische Einwirkung des Hauptstromes und des Inductionstromes auf einander ein Hinderniß ist für die Rotation der inneren Rolle, in welcher Lage diese sich auch befinden mag. Da nämlich durch Induction durch die Entfernung der Inductionsbahn von dem inducirenden Strom verursacht wird, so entsteht zwischen ihnen Attraction, und geschieht jene durch Annäherung, so entsteht Repulsion. Das hierdurch entstandene Hinderniß für die Bewegung, welches von der Kraft bestritten werden muß, welche die Rolle in Rotation versetzt, ist in einem gegebenen Zeitmoment proportional der Intensität des inducirenden Stromes multiplicirt mit der gleichzeitigen Intensität des Inductionstromes. Bei unveränderter Schnelligkeit ist die Intensität des Inductionstromes proportional derjenigen des inducirenden Stromes. Hieraus geht also hervor, daß die mechanische Arbeit, die in Folge der Einwirkung des Haupt- und des Inductionstromes auf einander bei der Rotation verbraucht wird, proportional dem Quadrat der Intensität des Hauptstromes. In dem vorhergehenden ist nun dargethan, daß der bei der Induction besagter Art entstandene Wärme-Ueberschuß demselben Quadrat proportional ist. Es ist demnach der experimentelle Beweis geliefert, daß — wenn mechanische Arbeit durch galvanische Induction verbraucht wird — eine Wärmemenge entsteht, die der verbrauchten mechanischen Arbeit proportional ist.

$$m \int i^2 dt + N \left[ \int (J - i_1)^2 dt - \int J^2 dt \right] = CA \quad (B).$$

Wenn die Induction ohne Verbrauch mechanischer Arbeit geschieht, d. h. wenn jene durch Schliessen und Oeffnen des inducirenden Stromes verursacht wird, so erhält man wiederum, dadurch dass man in der Gleichung (B)  $A = 0$  macht, die für diesen Fall aufgestellte Gleichung (A).

9. Die mechanische Wärmetheorie besagt nur, dass die entstandene Wärme proportional seyn muss der verbrauchten mechanischen Arbeit, ohne auf irgend eine Weise die innere und nächste physische Ursache dieses Ueberganges von der einen dieser Bewegungsformen in die andere zu bestimmen. Das mechanische Wärmeäquivalent-Gesetz ist ein Princip, das in jedem einzelnen Falle durch Experimente bewiesen werden muss, ehe man demselben volle Gemeingültigkeit beilegen kann, denn es legt in keiner Weise den inneren physischen Verlauf bei dieser Transformation der Bewegung dar. Besagtes Gesetz macht so zu sagen das äussere Band zwischen den betreffenden Naturerscheinungen aus, erklärt aber nicht, auf welche Weise und durch welche physische Mittel diese Verbindung geschieht. Ich will nun schliesslich die physische Ursache andeuten, weshalb bei der einen der beiden galvanischen Inductionsarten Wärme entsteht, bei der andern aber nicht.

Während die innere Rolle mit constanter Schnelligkeit rotirt, entsteht in derselben ein Inductionsstrom. Wenn man den Anfang der Rotation von dem Augenblicke an rechnet, wo die bewegliche Rolle die Mitte der festen passiert, geht der in der beweglichen Rolle entstehende Inductionsstrom während der ersten Hälfte des ganzen Umlaufs immer in derselben Richtung. Der Inductionsstrom ist in der zweiten Hälfte des ganzen Umlaufs dem vorigen in jeder Beziehung gleich, mit dem Unterschiede jedoch, dass er eine entgegengesetzte Richtung hat. Die Einwirkung dieser beiden Inductionsströme auf den Hauptstrom muss demnach ebenfalls vollkommen gleich seyn, wenn wir dabei ausnehmen, dass, wenn die Stromintensität in der Hauptbahn von dem einen vermehrt wird, sie von dem andern

vermindert wird. Wenn nun  $Ox$  und  $Oy$  (Fig. 4 Taf. II) zwei rechtwinklige Coordinataxen darstellen, und die Zeit ( $t$ ) nach der Abscisse und die Stromintensität nach der Ordinate gerechnet wird, so bezeichnet der Abstand zwischen der Abscisse und der mit dieser parallelen geraden Linie  $abcd$  die Stromintensität, wenn diese constant ist. Wenn  $A$  diesen Abstand bezeichnet, so ist die Wärme-Entwicklung des Hauptstromes während der Zeit eines ganzen Umlaufs ( $= 2t_0$ ) proportional mit  $2A^2 t_0$ . Geschieht dagegen die Induction durch die Rotation der beweglichen Rolle, so kann die Intensität in der Hauptbahn mit der krummen Linie  $aef$  bezeichnet werden, welche die gerade Linie bei der Zeit  $t_0$  schneidet und deren erste Hälfte gleich der zweiten ist, nur daß die eine über, die andere unter der geraden Linie  $abcd$  liegt. Ist  $y$  die Intensität der Inductionsströme zweiter Ordnung für einen bestimmten Zeitmoment, so erhält man für die gesamte Wärme-Entwicklung in der Hauptbahn:

$$\int_0^{t_0} (A - y)^2 dt + \int_{t_0}^{2t_0} (A + y)^2 dt$$



werden können, sie sich dem Quadrat der Intensität des Hauptstromes hätte proportional erweisen müssen. Das im vorigen aufgestellte Verhältniß zwischen der mechanischen Arbeit und der entwickelten Wärmesumme war demnach unverändert geblieben. Ganz anders verhält es sich, wenn das Schließen oder Oeffnen des Hauptstroms die Induction verursacht. Es möge für diesen Fall *oabc* (Fig. 5 Taf. II) die Steigung des Hauptstromes beim Schließen darstellen. Diese Steigung kann selbstverständlich jederlei Art seyn, hier wird sie jedoch durch eine gerade Linie bezeichnet. Beim Schließen wird in dem Inductionsdraht ein Strom inducirt, der die entgegengesetzte Richtung des Hauptstromes hat. Wie dieser Inductionsstrom auch sey, so muß doch dessen Intensität anfangs von Null bis zu einem gewissen Maximum steigen und schliesslich von einem gewissen Maximum bis Null heruntergehen. Der Einfachheit wegen nehme ich an, daß der Inductionsstrom nur ein Intensitätsmaximum habe, wiewohl dieselbe Betrachtung sich auf den Fall erstrecken kann, daß er mehrere hat. Der Inductionstrom verursacht alsdann zwei sekundäre Ströme in der Hauptbahn, von denen der erste in derselben, letzterer aber in der dem Hauptstrome entgegengesetzten Richtung geht. Die krumme Linie *ombnf* stellt die dadurch entstehende Steigungscurve dar. Da die inducirte Elektrizitätsmenge bei der Steigung eben so groß seyn muß wie beim Fallen, so ist die Fläche  $omba = bcnf$ . Wenn  $A$  die veränderliche Intensität des Hauptstromes ist,  $y$  die Intensität des ersten, und  $y_1$  die des zweiten secundären Inductionsstromes, wenn ferner die Curve die gerade Steigungslinie bei der Zeit  $t'$  schneidet und die Induction bei der Zeit  $t_0$  endigt, so hat man als Ausdruck für die erzeugte Wärmemenge

$$\int_0^{t'} (A + y)^2 dt + \int_{t'}^{t_0} (A - y_1)^2 dt \text{ oder}$$

$$\int_0^{t_0} A^2 dt + \int_0^{t'} (2A + y)y dt - \int_{t'}^{t_0} (2A - y_1)y_1 dt.$$

Wenn der Werth der Ordinate  $db = A'$  und von  $cf = A_0$ , so ist jeder Werth von  $2A + y$  in dem ersten Integral  $< 2A'$ , und jeder von  $2A - y$  in dem letzten Integral  $< 2A_0$ , aber grösser als  $2A'$ . Man kann daher den vorigen Ausdruck für die entwickelte Wärmemenge unter der Form schreiben:

$$\int_0^{t_0} A' dt + B \int_0^{t'} y dt - C \int_{t'}^{t_0} y_1 dt;$$

wo  $B$  eine Constaute ist, deren Werth zwischen 0 und  $2A'$  und der Werth von  $C$  zwischen  $2A'$  und  $2A_0$  liegt. Die beiden letzten Integrale bezeichnen die Elektricitätsmengen der beiden sekundären Ströme und diese sind dem Vorbergehenden zufolge gleich groß. Der Unterschied der zwei letzten Glieder ist also negativ (weil  $C > B$ ), und der Werth der ganzen Formel ist kleiner als der des ersten Gliedes dieser Formel, das die Wärmemenge bezeichnet, welche hervorgebracht wird, wenn der Strom ohne Induction geschlossen wird. Die im Hauptstrom entwickelte Wärmemenge wird demnach durch die Induction vermindert. Dasselbe geschieht beim Oeffnen des Stromes. Hier geht, wie die Figur zeigt, der erste sekundäre Strom in der dem Hauptstrom entgegengesetzten Richtung. Dafs die Ver-

wenn man die Zeit des Anfangs und Endes des Inductionsstromes als die Gränzen des Integrals annimmt.

2) Grove's Beobachtung, daß weiches Eisen erwärmt wird, wenn man es magnetisirt oder demagnetisirt, hat bei dem vorher angeführten Versuch ihre Bestätigung gefunden. Diese Erwärmung, deren Proportionalität mit dem Quadrat der magnetisirenden Stromstärke diese Versuche darthun, kann nicht durch eine bei der magnetischen Intensitätsveränderung entstandene Reibung der Molecüle des Magnets verursacht seyn (Grove), sondern rührt ohne Zweifel von den Inductionsströmen her, welche theils durch die Inductionsspirale, theils auch durch die Veränderung in dem magnetischen Zustande des Eisens, inducirt werden; welche letztere Ströme bei einer magnetischen Veränderung immer circuliren, der Magnet möge aussehen oder geformt seyn, wie er wolle.

3) Wenn galvanische Inductionsströme in einem geschlossenen Leiter inducirt werden dadurch, daß der inducirende Hauptstrom geschlossen und geöffnet wird, so entsteht durch die Induction weder Gewinn noch Verlust an Wärme. Die Wärmemenge, die vom Inductionsstrom erzeugt wird, ist nämlich eben so groß wie die Verminderung der Wärme-Entwicklung, die durch die Induction in dem inducirenden Hauptstrom entsteht. Wenn  $J$  die Intensität des inducirenden Hauptstromes,  $i$  die Intensität des Inductionsstromes bezeichnet, und  $i_1$  die Intensität desjenigen Inductionsstromes zweiter Ordnung, welche im Hauptstrom entsteht: ferner  $M$  den galvanischen Leitungswiderstand in der Bahn des Hauptstroms, und  $m$  den Widerstand im Inductionsleiter, so ist:

$$M \int (2Ji_1 - i_1^2) dt - m \int i^2 dt = 0;$$

wo die Gränzen der Integrale die Zeiten sind für den Anfang und den Schluß der Induction.

4) Inducirt man dagegen galvanische Inductionsströme durch eine Annäherung der Inductionsbahn an, oder eine Entfernung derselben von dem inducirenden Hauptstrom, dann entsteht Wärme durch die Induction. In diesem Falle ist die Wärmeproduction proportional mit der mechanischen

Arbeit, die nöthig ist, um die Inductionsbahn dem inducirenden Hauptstrom zu nähern, oder sie von demselben zu entfernen. Wenn  $J, i, i_1, M$  und  $m$  die frühere Bedeutung haben,  $A$  die genannte mechanische Arbeit bezeichnet und  $C$  eine Constante ist, so erhält man für diesen Fall:

$$m \int i' dt + M \left[ \int (J - i_1)^2 dt - \int J^2 dt \right] = CA;$$

wo die Gränzen des Integrals dieselben sind als vorher. Wenn in dieser Gleichung  $A$  gleich gemacht wird mit Null, so erhält man dieselbe Gleichung wie in No. 3. Diese letzte Gleichung drückt demnach die allgemeine Bedingung aus, der bei der Induction Genüge geleistet werden muß, möge die Induction durch eine Intensitätsveränderung des inducirenden Hauptstromes, oder durch Annäherung oder Entfernung der Inductionsbahn geschehen.

Stockholm, im Februar 1864.

**Felswände** oder Schneeflächen gegen Westen kehren, des **Abends** stets gleichzeitig mit einem eigenthümlichen purpurfarbenen Lichte am Westhimmel eintrat, während das **analoge** Phänomen sich des Morgens zeigte.

Diese Erscheinung, von welcher ich trotz ihres Glanzes nirgends gelesen hatte, und die auch mir früher stets entgangen war, weil die beleuchteten Gebirge meinen Blick gefesselt hielten, veranlaßte mich, nach meiner Rückkehr nach München, sowohl der Literatur <sup>1)</sup> über diesen Gegenstand nachzugehen, als auch die in der Dämmerung auftretenden Phänomene in unserer Ebene, die einen fast vollkommen freien Horizont gewährt, anhaltend und aufmerksam, zum Theile messend zu verfolgen.

Dabei gelangte ich zu dem Resultate, daß trotz der ausgedehnten Literatur, welche besonders aus älterer Zeit über die Dämmerung existirt, nicht einmal eine richtige und vollständige Beschreibung, geschweige eine einigermaßen genügende Theorie des Dämmerungsvorganges vorhanden ist, sondern, daß hier sowohl für die Beobachtung, als für theoretische Untersuchungen noch ein reiches Feld unerschlossen vor uns liegt.

Wenn ich es wage, die Resultate meiner Beobachtungen schon jetzt, noch ehe ein weitergehender Abschluß, als eine erfahrungsmäßige Feststellung der Thatsachen im Großen und Ganzen erzielt worden ist, der Oeffentlichkeit zu übergeben, so geschieht dies aus doppeltem Grunde: Erstens befinde ich mich wegen Mangel eines geeigneten Locales nicht in der Lage, fortgesetzte, mit genauen Messungen verbundene Beobachtungsreihen anzustellen, anderseits aber erscheint es mir sehr wünschenswerth, noch ehe man an eine mathematische Untersuchung des Gegenstandes herantritt, Beobachtungsreihen von möglichst verschiedenen Punkten zu besitzen, um das rein Locale vom Wesentlichen trennen zu können.

Mithin ist es ein Hauptzweck dieser Zeilen andere Beob-

1) Man findet dieselbe fast vollständig in: Kämtz Meteorologie Bd. III, S. 50 ff und Forbes, Pogg. Ann. Ergänzungsbd. I. S. 49 ff.

achter, vor Allem Astronomen, wissenschaftliche Reisende usw. auf diesen Gegenstand aufmerksam zu machen, und ihnen eine Vorarbeit für weitere Untersuchungen zu liefern.

Es soll demnach zuerst eine Beschreibung der Abenddämmerung gegeben werden, wie sie sich, abgesehen von den individuellen Eigenthümlichkeiten einzelner Tage, an jedem wolkenfreien \*) Abend hier in München beobachten läßt, unter Zugrundelegung von 24 Beobachtungsreihen, welche in der Zeit vom 20. Oct. 1863 bis zum 15. April 1864 theilweise nur unter Anwendung von Zeitbestimmungen, theilweise auch mit Winkelmessungen verbunden, angestellt wurden, ungerechnet die auch noch außerhalb dieses Zeitraums gelegentlich gemachten Beobachtungen. Eine kurze Beschreibung der entsprechenden Erscheinungen in den Alpen wird geeignet seyn, den Zusammenhang zwischen dem Nachglühen, und dem Dämmerungsvorgange, wie man ihn in der Ebene beobachtet, vor Augen zu stellen. Wenige Worte werden hinreichen um zu zeigen, welche und in wiefern sich die Erscheinungen messend verfolgen lassen.

frei von hineingetragenen falschen theoretischen Anschauungen zu entwerfen, wie ich es selbst aus den Beobachtungen gewonnen habe, noch ehe ich mich irgend mit der Literatur bekannt gemacht hatte.

# I.

§. 1. Sobald an einem wolkenfreien Abend die Sonne sich dem Horizonte nähert, nimmt der unterste Theil des Himmels ringsherum eine Farbe an, welche sich stärker von der der darüber befindlichen Partien unterscheidet, als dies bei höherem Stande der Sonne der Fall ist.

Im Westen, worunter hier ein- für allemal der Theil des Himmels verstanden werden soll, welcher im Vertical der Sonne auf Seite der letzteren liegt, während das Entgegengesetzte vom Osthimmel gelten soll, ist diese Farbe Anfangs eine äußerst transparente weisse mit der Zeit ins Gelbe übergehende, während sie im Norden und Süden einen trüberen, zuerst schwach dann etwas stärker, ockergelben Ton annimmt, im Osten aber aus einem schmutzig ockergelben mit der Zeit in einen trüb purpurnen übergeht. Dicht am Horizonte ist die Färbung ringsherum eine trübere, während sich in etwas grösserer Höhe meist eine klarere Schicht bemerkbar macht. Die purpurnen Töne im Osten nähern sich am Horizonte dem Grauen, Aschfarbenen und verlaufen gegen oben allmählich ins Blau des Himmels, so daß sie bei Sonnenuntergang in einer Höhe, welche nach der Beschaffenheit der Atmosphäre zwischen 6 und 12 Grad schwankt, nicht mehr erkennbar sind. Manchmal zeigt sich zwischen dem klaren, durchsichtigen Blau des Himmels und dem trüben Purpur in der Umgebung des Horizontes eine weisliche auch ins Gelbliche spielende hellere Schicht.

Sobald die Sonne unter den Horizont herabgesunken ist, erhebt sich am Osthimmel der aschfarbene (so glaube ich die Farbe richtiger bezeichnen zu können als mit dem Worte »blau«, wie sonst üblich ist) Erdschatten in der

Gestalt des von Le Mairan zuerst beschriebenen <sup>1)</sup> dunklen Segmentes.

Dieses dunkle Segment scheint sich nun förmlich über den purpurnen Theil des Himmels heraufzuschieben, so daß dieser einen zusehends schmaler werdenden Gürtel, den *ersten östlichen Dämmerungsbogen* oder die *erste Gegen-dämmerung* bildet. Da der obere Theil dieser hellen Zone keine oder nur eine sehr geringe Bewegung nach oben ausführt, so wird sie früher oder später vollständig von dem dunklen Segment verdrängt, gleichsam überdeckt, je nachdem sie sich bis zu einer geringeren oder größeren Höhe erstreckt hatte. Sobald das dunkle Segment nicht mehr durch diesen helleren Gürtel von dem darüber ausgebreiteten bereits ziemlich dunklen Himmel getrennt ist, kann seine Gränze nicht mehr wahrgenommen werden, höchstens unterscheidet sich der dem Segment entsprechende bogenförmige Raum durch seinen aschfarbenen Ton von den höheren Theilen des Himmels. Diefß widerspricht den bisher geltenden theoretischen Anschauungen und den darauf gegründeten Beschreibungen. Nur bei Bergmann <sup>2)</sup> finde ich diese Thatsache entschieden ausgesprochen, aus der Beschreibung von Morse <sup>3)</sup> kann man sie herauslesen. Mir ist es nie gelungen das dunkle Segment weiter als bis zu einer Höhe von 12° zu verfolgen, meistens entschwand es sogar schon in der halben Höhe meinen Blicken.

Was die Gestalt des dunklen Segmentes betrifft, so



verwaschen, daß ich mir hierüber kein Urtheil zutraue, ob sie um  $180^\circ$  von einander abstecken, oder, was ich eher für richtig halten möchte, um weniger.

Die Gränze des dunklen Segmentes läßt sich am besten in der Nähe seines höchsten Punktes bestimmen, und auch da nur scharf, nachdem es sich bereits um einen bis zwei Grade über den Horizont erhoben hat, bis einige Zeit bevor es vollständig verschwindet. Dicht am Horizont beobachtet man nämlich meistens eine graue Schicht, die Nebel, Rauch usw. ihren Ursprung verdanken mag, und sehr leicht zu Täuschungen Anlaß giebt, so daß man oft schon ziemlich lange vor Sonnenuntergang das dunkle Segment zu erblicken glaubt, was doch ganz unmöglich ist. Unter den günstigsten Umständen dürfte sich die Gränze des Segments wohl bis auf 10 oder 6 Bogenminuten ja vielleicht noch genauer bestimmen lassen. Ueber das Gesetz seines Fortschreitens soll im §. 9 gesprochen werden.

§. 2. Während man diese Beobachtungen am Osthimmel machen kann, zeigt der westliche die folgenden Erscheinungen:

Der helle weißliche Schein, von welchem schon oben die Rede war, erstreckt sich vor Sonnenuntergang in der Nachbarschaft des Verticals der Sonne hoch hinauf. Diese Ausdehnung nach der Höhe ist mir einige Male besonders aufgefallen, während die Sonne etwa noch  $4^\circ$  über dem Horizonte war, auch schien es mir als habe der Schein um diese Zeit einen leichten Stich ins Purpurne. Bei Beobachtungen, welche man hierüber anstellen will, muß man selbstverständlich das Auge durch einen Schirm vor dem directen Sonnenlichte schützen.

Wenn nun die Sonne sich dem Horizonte nähert, so nimmt der ganze westliche Himmel vom Horizonte bis zu einer Höhe, welche je nach der Beschaffenheit der Atmosphäre zwischen  $8^\circ$  bis  $12^\circ$  schwankt, eine immer entschiedenere gelbe Färbung an, welche dicht am Horizonte oft ins Rothe, ja sogar ins Braunrothe übergeht. Dabei bleibt über der Sonne eine helle, außerordentlich transpa-

rente Stelle von verticaler aber verhältnißmäßig großer horizontaler Ausdehnung übrig, welche die Gränze zwischen dem gelben Theile und dem freilich noch immer ziemlich hoch hinauf leuchtenden blauen Himmel bildet. Wenn die Sonne wirklich untergegangen ist, wird das Gelbe immer intensiver, geht oft ins Orange über, während die besagte transparente Stelle im horizontalen Sinne wächst, und allmählich in eine helle Zone übergeht, welche Brandes den *Dämmerungsschein* <sup>1)</sup> nannte. Der darüber befindliche Theil des Himmels wird rasch dunkler. Da die gelbe Wand des Abendhimmels später auch die Gestalt eines Segmentes annimmt, und die Function, welche das Sinken dieses Segmentes darstellt, einfach die Fortsetzung jener für den Dämmerungsschein geltenden ist, so will ich diesen gelben Theil das *erste helle Segment* nennen, und seine Gränze den *ersten westlichen Dämmerungsbogen*.

§. 3. Während die eben beschriebenen Erscheinungen am unteren Theile des Westhimmels vor sich gehen, machen sich in einer größeren Höhe etwa  $25^{\circ}$  über dem Ho-

jedenfalls deutlich wahrnehmen. Bei weiterem Sinken der Sonne nimmt sie sehr an Intensität zu, und erreicht ein Maximum, bei einer Tiefe der Sonne, welche ich nach meinen Beobachtungen je nach der Beschaffenheit der Atmosphäre zwischen  $3^{\circ},40$  und  $4^{\circ},50$  schwankend fand <sup>1)</sup>). Um diese Zeit erscheinen Gebäude, welche eine Mauer gegen Westen kehren, und welche dicht nach Sonnenuntergang sich bereits ganz fahl gezeigt haben, ohne irgend eine Abwechselung zwischen Schatten und Licht, wieder ziemlich lebhaft mit einem rosenfarbenen oder hellfleischrothen Tone übergossen. Das Analogon des Nachglühens der Gebirge. (S. §. 6). Ziemlich scharfe Schatten machen sich wieder bemerkbar, und man ist im Stande, Details an den Gebäuden zu erkennen, welche sich gleich nach Sonnenuntergang dem Blicke vollkommen entzogen hatten. Diese Beleuchtung reicht hin, um selbst mitten in der Stadt in engen Gassen, wo man nichts vom Westhimmel erblicken kann, das Auftreten des Purpurlichtes auf das Entschiedenste zu constatiren. Das Purpurlicht ist der einzige Grund dieser zweiten Beleuchtungen und nicht etwa Contraste, wie Necker zur Erklärung des Nachglühens annimmt; denn es genügt, um sie wahrzunehmen, wenn z. B. eine günstig gelegene Wand dem Blicke zugänglich ist, ohne daß gleichzeitig auch nur ein Stückchen Himmel sichtbar seyn muß. Alle Personen, welche ich darauf aufmerksam machte, waren im höchsten Grade erstaunt, diese Erscheinung nicht schon früher beachtet zu haben.

Während das Zustandekommen des Purpurlichtes sehr schwer mit Genauigkeit beobachtet werden kann, und überdies an verschiedenen Tagen in sehr verschiedener Weise vor sich geht, so wird der Verlauf desselben von dem Zeitpunkte an, wo es sich seinem Intensitätsmaximum nähert, ein ziemlich regelmäßiger. Es hat alsdann bei reinem Himmel nahezu die Gestalt eines Kreises, dessen Centrum ein

1) Der Kürze halber werde ich mich in der Folge häufig des Ausdruckes »Tiefe der Sonne« bedienen, anstatt des strengeren »negative Sonnenhöhe«.

wenig über dem gelben Segmente liegt, während der untere Theil desselben von letzterem verdeckt scheint, etwa wie Fig. 12 Taf. I es darstellt, in welcher  $h$  den Horizont  $s$  die Gränze des hellen Segments und  $p$  die in der Natur freilich außerordentlich verwaschene des Purpurlichtes bedeutet. Zu beiden Seiten des Purpurlichtes sieht man über dem hellen Segmente zwei lichtblaugrüne Stellen bei  $a^1$ ). Dieser regelmässig vorhandene Stich ins Grüne hat seinen Grund nicht in Contrastwirkungen, wovon man sich durch Abblenden überzeugen kann, noch mehr aber durch eine später zu beschreibende Eigenthümlichkeit derselben. Das Centrum des Purpurlichtes tritt nun rasch nach abwärts, während sein Radius fortwährend wächst, so daß es bald die Gestalt eines Halbkreises annimmt, dessen Centrum auf der Gränze des hellen Segmentes liegt, und endlich in eine schmale und trübe Zone von sehr geringer Höhe aber bedeutender linearer Ausdehnung übergeht. Durch diese Zone wird alsdann das helle Segment scharf begrenzt, so daß von jetzt an eigentlich es erst seinen Namen mit Recht führt.

menlaufende dunkelblaue auch grünliche Streifen in demselben. Dafs diese Streifen, deren schon Howard erwähnt wirklich, wie er vermuthet, Schattenstreifen von Wolken sind, welche sich unter oder nahe am Horizonte befinden, erhellet am Besten daraus, dafs man öfter Gelegenheit hat, die Wolken, denen sie ihr Entstehen verdanken, nebst den von ihnen herrührenden Schatten zu sehen. An ganz wolkenlosen Tagen, wo sie übrigens immer erst sehr spät auftreten, mögen sie ihren Grund wohl in terrestrischen Gegenständen haben. Diese Streifen sind deswegen interessant, weil man, sobald sie vorhanden sind, durch Contrast bemerkt, dafs die purpurnen Töne sich weiter hinauf erstrecken, als sie sonst erscheinen würden. Wenn diese Streifen, wie diefs meistens der Fall ist, erst auftreten nachdem das Purpurlicht weit nach abwärts getreten ist, so sieht man es plötzlich wieder an Theilen des Himmels, von welchen man es längst zurückgewichen wähnte. Ebenso zeigt sich in solchen Fällen, dafs das Purpurlicht wirklich hinter dem gelben hellen Segmente noch vorhanden ist, mit anderen Worten, dafs es höheren Theilen der Atmosphäre sein Zustandekommen verdankt als das helle Segment. Die Gränze des letzteren ist unter diesen Bedingungen kaum erkennbar. Wenn das Purpurlicht schon vollständig verschwunden ist, so bleiben doch die beiden hellblaugrünen keilförmigen Stellen, von denen oben die Rede war, noch lange sichtbar, wohl der sprechendste Beweis, dafs man es hier nicht mit einer subjectiven Täuschung zu thun hat. Diese Streifen bilden den Hauptgegenstand der schon öfter citirten Abhandlung von Necker.

Dieser Gelehrte ist auch, meines Wissens der Einzige, der das Purpurlicht unter dem Namen der *«vapeurs rouges»* als eine regelmäfsig in der Dämmerung auftretende Erscheinung erkannt hat. Seine Beschreibung weicht jedoch mehrfach von der meinigen ab, was wahrscheinlich in dem Umstande seinen Grund hat, dafs er bei seinen Beobachtungen keinen so freien Horizont hatte, wie er mir hier zu Gebote stand, wodurch ihm der *wesentliche* Unterschied

zwischen dem hellen Segmente und dem Purpurlichte entging. Der Dämmerungsschein bildet die unverkennbarste Gränze zwischen der total anderen Färbung des hellen Segmentes und dem zarten Tone des Purpurlichtes. Außer der genannten Abhandlung findet man zwar auch sonst noch häufig nebenher bemerkt, daß purpurne Töne am Abendhimmel zu sehen seyen, so z. B. bei Wolf a. a. O. oder sogar eine Beschreibung der Erscheinung bei G. Forster<sup>1)</sup>, aber ohne daß ein gesetzmäßiges Vorkommen derselben auch nur angedeutet wäre. Vielleicht beziehen sich auch die Worte Kepler's<sup>2)</sup>: *aurora circulari forma enititur* auf das morgendliche Purpurlicht.

Sobald das Purpurlicht verschwunden ist, läßt sich, wenn keine Schattenstreifen vorhanden sind, die Höhe des hellen Segmentes mit ziemlicher Schärfe vielleicht auf 10 bis 15 Bogenminuten genau bestimmen. Nach meinen Messungen hält das Sinken des Segmentes mit dem der Sonne ziemlich gleichen Schritt, so daß, wenn  $\omega$  die Höhe der Sonne, mithin  $\omega$  ihre Tiefe unter dem Horizonte ist,  $\vartheta$  hin-

wohl Spuren eines *zweiten dunklen Segmentes* entdecken, welches sich ungefähr um die Zeit vom Horizonte erhebt, wo das Purpurlicht vollständig verschwindet, oder wo es sich zu der beschriebenen trüben Schicht zusammengezogen hat. Diese zweite Färbung ist oft kaum hinreichend um ihr Vorhandenseyn mit Sicherheit constatiren zu können, niemals aber war sie bei meinen Beobachtungen intensiv genug, um eine Messung über die Höhe des zweiten dunklen Segmentes mit einiger Genauigkeit ausführen zu können. Wolken, welche ich in dieser zweiten Beleuchtung des Osthimmels beobachtete, schienen mir mehr allmählich abzuklingen, als eigentlich von einer Schattengränze ereilt zu werden. In einer etwas bedeutenderen Höhe über dem Horizonte verschwindet das zweite dunkle Segment wieder, ebenso wie früher das erste.

Am Westhimmel aber bereitet sich nun eine Wiederholung der schon einmal beobachteten Erscheinungen vor. Während nämlich der erste Dämmerungsbogen nach dem angeführten Gesetze abwärts steigt, entwickelt sich in einer Höhe, welche nur um Weniges geringer ist, als die, in welcher der erste Dämmerungsschein sichtbar war, allmählich ein zweites Phänomen derselben Art, nur weniger glänzend. Der erste Dämmerungsbogen verliert allgemach seine trübpurpurne Begränzung, ohne jedoch deshalb an Schärfe abzunehmen, und über ihm zeigt sich eine etwas trüb-grünlichgelbe Schicht, aus welcher sich gegen oben eine hellere Zone, der *zweite Dämmerungsschein*, oder der *zweite westliche Dämmerungsbogen*, die *Gränze* des *zweiten hellen Segments* abhebt. Ich habe mehr Male aufs Deutlichste beide Bogen über einander gesehen.

Ueber diesem entwickelt sich unter günstigen Umständen ein *zweites Purpurlicht*, vielleicht in etwas geringerer Höhe als das erste, aber mit ganz ähnlichem Verlaufe, nur mit einer etwas mehr ins Gelbrothe fallenden Farbe. Dieses zweite Purpurlicht habe ich einige Male sehr intensiv gesehen, so z. B. am 18. November stärker, als häufig das

erste, mehre Male ziemlich entschieden, an den meisten Tagen aber gar nicht.

Die Zeit des Intensitätsmaximums kann wegen der viel geringeren Präcision, mit welcher diese Erscheinung auftritt, nur sehr mangelhaft bestimmt werden, doch ergab sich in den vier Fällen, wo eine solche Bestimmung gemacht wurde, ein sehr merkwürdiges Resultat. Es fand sich nämlich die Tiefe der Sonne zur Zeit des Maximums des zweiten Purpurlichtes jedesmal nahezu 2,2mal so groß als jene welche dem Maximum des ersten entsprach, obwohl die letztere an den vier Tagen sehr verschiedene Werthe hatte. (Vergl. §. 11).

Endlich verschwindet auch das zweite Purpurlicht, indem es analog dem ersten hinter das zweite helle Segment hinabtritt, welches nunmehr der einzige noch beleuchtete Theil des Himmels ist, und dessen Verschwinden das Ende der astronomischen Dämmerung bezeichnet. Die Höhe dieses zweiten westlichen Dämmerungsbogens ist es, welche Lambert in seiner Messungsreihe vom 19. November 1759



rasch wie ein schwarzer Schleier herab, bis es sich mit dem zweiten westlichen Dämmerungsbogen vermischt, der jedoch hierum unbekümmert seinen Weg nach abwärts verfolgt. Wenn man die Entstehung des ersten und zweiten hellen Segments beobachtet, so sieht man, wie grundfalsch es ist, irgend eines derselben, wie man bisher that, durch das dunkle Segment begränzt anzunehmen. Diefs wird später noch klarer vor Augen treten, wenn wir die Eintheilung in erste und zweite Dämmerung und das Ineinandergreifen beider untersuchen werden. (Vergl. §. 11). Ich glaube, dafs es dieses rasch um sich greifende erste dunkle Segment ist, welches den dunklen Grund bildet, auf dem sich das zweite Purpurlicht so eigenthümlich abhebt. Spätere Beobachtungen müssen diels entscheiden.

§. 5. Das hier entworfene Bild vom Dämmerungsvorgange ist als das Resultat eines Gesamteindrucks zu betrachten, wie er sich mir aus vielen Beobachtungen eingepägt hat, denn nur selten zeigen sich sämtliche Erscheinungen an einem und demselben Tage so vollständig ausgebildet, wie hier beschrieben.

Insbesondere ist die Intensität, mit welcher die Phänomene auftreten, eine auferordentlich verschiedene; denn während an einem Tage das erste Purpurlicht nur als ein äufserst zarter Ton bemerkbar ist, wobei auch seine Farbe manchmal sehr unentschieden ist, und nur durch einen Stich ins Carmoisinrothe oder Purpurne von der des hellen Segmentes verschieden, zeigt sich an einem anderen Tage sogar das zweite noch mit grossem Feuer. Das eine jedoch steht fest, so bald die Purpurfarbe am östlichen Himmel, also die Gegendämmerung intensiv ist, und sich hoch hinauf erstreckt, so wird auch das erste Purpurlicht sehr lebhaft seyn, und aus der Intensität des Letzteren kann man wiederum mit ziemlicher Sicherheit die des zweiten vorhersagen.

Am Schönsten habe ich sämtliche Erscheinungen während der Monate October und November beobachtet, und es dürfte jedem, der sich in unseren Gegenden mit diesen

Untersuchungen beschäftigen will, zu raten seyn in den genannten Monaten zu beginnen, weil um diese Jahreszeit die Phänomene in ihrer größten Reinheit und mit der größten Präcision auftreten. Auch die beiden Monate, welche den besagten vorangingen, ebenso wie die beiden nachfolgenden boten mir schöne Abenddämmerungen. So war z. B. an einigen sehr kalten Tagen im Januar trotz einer ziemlich nebligen Atmosphäre das Purpurlicht mit ganz ungewöhnlicher Ausdehnung, jedoch mit etwas röthlicherer Färbung, als sonst, zu sehen. Seit Februar aber, und besonders seit April habe ich keine einigermaßen glänzende Abenddämmerung gesehen. So konnte z. B. seit dem 31. Januar nicht ein einziges Mal ein zweites Purpurlicht beobachtet werden. Welche meteorologischen Elemente es sind, von denen diese Dinge abhängen, darüber wage ich nichts auszusagen, da die Zahl meiner Beobachtungen doch nicht hinreicht um derartige Schlüsse darauf zu bauen, nur auf das Eine erlaube ich mir hinzudeuten, daß die Periode der relativen Feuchtigkeit hinsichtlich ihres Maximums und Mini-

den, und einen interessanten Aufschluß über die Höhe jener Theile der Atmosphäre geben, an welchen dieser Schein entsteht. Einmal nämlich (am 23. October) beobachtete ich sowohl die Gestalt als den ganzen Verlauf des Purpurlichtes aufs Deutlichste durch Schäfchenwolken hindurch, mit denen der ganze Himmel mit Ausnahme des untersten Theiles im Westen bedeckt war. Ein andermal (am 15. November) bemerkte ich, als ich mich an dem sehr trüben und nebligen Tage, es war nämlich der ganze Himmel von einer sehr tiefen und wenig durchsichtigen Wolkenschicht umzogen, gegen Abend im Freien befand, auf einmal wieder eine auffallende Zunahme der Helligkeit, und eine eigenthümliche Beleuchtung der Gegenstände durch sehr diffuses Licht; ein Blick auf meine Uhr überzeugte mich, daß diese Erscheinung um jene Zeit eintrat, um welche man an einem hellen Tage das erste Purpurlicht zu erwarten gehabt hätte. Diese beiden Thatsachen lehren unzweifelhaft, daß das Purpurlicht seinen Sitz wenigstens theilweise in sehr hohen Regionen haben muß.

§. 6. Zum Schlusse unseres beschreibenden Theiles, müssen wir noch in Kürze der Erscheinungen gedenken, von denen die Dämmerung in den Alpen begleitet ist.

Die Erscheinungen des Alpenglühens, welches man besonders gut an weißen Kalkfelsen oder an schneebedeckten Bergen studiren kann, findet man recht gut in den öfter citirten Abhandlungen von Necker und von Wolf beschrieben. Sie bestehen ungefähr in Folgendem: bei einer Höhe der Sonne von etwa  $2^{\circ}$  fangen die Berge an lebhaft roth zu werden, was sich gegen Sonnenuntergang in einer Weise steigert, die man nicht besser als eben durch das Wort „*Glühen*“ bezeichnen kann. Sowie nun die Sonne mehr und mehr hinabsinkt, steigt der Schatten von unten an den Bergen empor, und entzieht bald auch den höchsten Gipfeln das Licht, so daß sie nun alle fast farblos grau und kalt dastehen. Doch schon nach wenigen Minuten fangen sie wieder an etwas heller zu werden, und zwar zuerst schwach gelblich weiß, bis sie allmählich in einen

oft ziemlich lebhaften fleischrothen Ton übergehen. Dieses Phänomen, das sogenannte *Nachglühen*, tritt immer gleichzeitig mit dem ersten Purpurlicht auf, und ist nur durch dasselbe hervorgebracht. Obwohl wieder Schatten und Licht aufs Entschiedenste an den Bergen auftreten, so sind doch alle Schatten schlecht begränzt, wie sich bei der grossen Fläche, welche jetzt als Lichtquelle dient, erwarten läst, diese grosse Menge diffusen Lichtes giebt der Beleuchtung etwas Ungewöhnliches, Magisches, wodurch sie die Phantasie des Beschauers so eigenthümlich anregt. Das Verschwinden dieser Beleuchtung geschieht nicht sowohl durch das Emporsteigen von Schatten, wie das erste Mal, sondern vielmehr durch ein allmähliches Abklingen der Farben. Das Fleischroth geht zuerst in einen heller dann immer dunkler aschfarbenen Ton über, bis endlich die Nacht hereinbricht, und allem Farbenspiele ein Ende macht. Ich erinnere mich jedoch, manchesmal auch noch ein zweites freilich sehr schwaches, doch immerhin unverkennbares Nachglühen beobachtet zu haben, welches dem zweiten Purpurlichte ent-

gossen fand <sup>1</sup>). Die rosa und purpurnen Töne sind des Morgens vorherrschend, während die feurigeren Tinten, das Orange und das Rothe, wie man es des Abends beobachtet, weit sparsamer vertreten sind, und gewiss mit vollem Rechte als Vorboten schlechten Wetters betrachtet werden.

§. 7. Schon bei der Beschreibung wurde erwähnt, daß einige der Erscheinungen sich messend verfolgen lassen; dieser Paragraph hat den Zweck die Wege zu besprechen, welche man zu dem Ende einzuschlagen hat.

Obwohl man bei Messungen auf diesem Gebiete keinen hohen Grad von Genauigkeit zu erwarten hat, so müssen die Ergebnisse derselben doch immer als ein sehr schätzbares Material für theoretische Untersuchungen betrachtet werden. Die Hauptschwierigkeit, mit welcher man zu kämpfen hat, liegt in den Täuschungen, welchen man durch Ermüdung des Auges, durch Contrastwirkungen und Nachbilder ausgesetzt ist. Zur Vermeidung dieser schädlichen Einflüsse habe ich vor jeder Messung meine Augen etwas ausruhen lassen, und dann mein Instrument so rasch als möglich auf jene Gränze eingestellt, welche ich auf den ersten Blick als die richtige erkannt hatte. Vor Allem vermied ich es, den Blick länger als durchaus nöthig war auf den blendenden Westhimmel zu richten.

Was das Instrument betrifft, welches zu solchen Messungen dienen soll, so ist es sehr wichtig, daß der Beobachter in der Lage sey, während er auf den höchsten Punkt des zu beobachtenden Bogens einstellt, einen grossen Theil des übrigen Himmels zu überblicken, wodurch man allein sichere Anhaltspunkte erhält, da man an den Punkten, wo die dunklen Theile des Instruments mit dem hellen Himmel so stark contrastiren, den grössten Täuschungen unterworfen ist. Fernröhre sind deshalb ganz unanwendbar, auch

1) In Partenkirchen im baierischen Hochlande kann man diese Erscheinung am Zugspitzgebirge aufs Prachtvollste beobachten, während die grosse Wand des Wetterstein für das Nachglühen am Abend ausserordentlich günstig liegt.

Diopterröhrungen mit Ringen oder Rahmen, welche Fadenkreuze tragen nicht zu empfehlen. Am Besten fand ich es mich eines Kornes und eines Absehens zu bedienen, wie man es auf den Flinten hat. Auf einer Holzleiste von etwa 1 Fuß Länge wurde an dem einen Ende eine Stecknadel befestigt, an dem andern ein Stück Blech mit einer kleinen Kerbe, über diese wurde nun hinweg visirt, und für jenen Punkt eingestellt, an welchem der Stecknadelknopf gerade zu verschwinden begann. Ich glaube, daß diese Vorrichtung den höchsten Grad der Genauigkeit gewährt, den die Natur der Sache nur irgend zuläßt. Es ist klar, daß man mit Hülfe zweier Ringe, welche Korn und Absehen tragen, und sich auf das Fernrohr eines Theodolithen stecken lassen, einen solchen sofort für die Messungen herrichten kann.

Am allerbesten lassen sich die Dämmerungsbeobachtungen gewiß auf der See anstellen, ein Sextant, dessen Fernrohr herausgenommen und durch eine passende Visirvorrichtung, sei es vor oder hinter dem halb belegten Spie-

Da jedoch gerade einige dieser Messungsreihen durch die Witterung außerordentlich begünstigt waren, so werden trotzdem in der Folge einige der gewonnenen Zahlen angeführt werden.

Die Messungen wurden auf einer Plattform des hiesigen Universitätsgebäudes ausgeführt.

## II.

§. 8. Nachdem wir uns nun mit dem Gang der Erscheinungen im Allgemeinen bekannt gemacht haben, wollen wir untersuchen ob und in wiefern die Theorien, welche bisher über diesen Gegenstand aufgestellt worden sind, mit den Thatsachen in Einklang stehen. Die Messungsdata, auf welche wir uns bei dieser Gelegenheit berufen müssen, werden zugleich dazu dienen, das oben nur in allgemeinen Zügen entworfene Bild zu vervollständigen und zu präcisiren.

Die bisher üblichen theoretischen Anschauungen über den Dämmerungsvorgang sind dem Wesen nach schon von dem arabischen Astronomen Alhazen <sup>1)</sup> entwickelt worden, später wurden sie von Lambert <sup>2)</sup> und in neuester Zeit von Grunert <sup>3)</sup> weiter ausgebildet. Sie bestehen kurz gefaßt in Folgendem:

Sey  $ANB$  in Fig. 13 Taf. I ein Stück eines größten Kreises auf der Erdoberfläche, welcher in einer durch die Mittelpunkte der Erde und Sonne und durch den Ort des Beobachters  $N$  gehenden Ebene liegt.  $EDD'$  sey die Gränze der Atmosphäre. Die Strahlen der Sonne denken wir uns in der Richtung  $SE$  ankommend, wobei wir der Einfachheit wegen annehmen wollen, daß die Bahn eines Lichtstrahls in der Atmosphäre genau eine gerade sey, also die Erde bei  $A$  tangirend. Dann wird ein Ort, welcher sich auf der Erdoberfläche zwischen  $A$  und  $B$  befindet, nur Licht erhalten können, welches wenigstens einmalige Reflexion in

1) *Allacen de crepusculis*, Basil. 1572.

2) *A a O*. S. 440 bis 457.

3) *Beiträge zur meteorol. Optik*, Leipzig 1848 I. Theil S. 194 bis 266.

der Atmosphäre erlitten hat, und man sagt von ihm, sowie von jedem Punkte, welcher innerhalb des schwächer schattirten Raumes liegt, er habe die erste Dämmerung. Alle Punkte hingegen, welche sich innerhalb des stärker schattirten Raumes befinden, können nur Licht erhalten, welches wenigstens zweimal reflectirt wurde, und haben demgemäße die zweite Dämmerung. Vorausgesetzt, die durch *D* gehende Gränze zwischen dem Theile der Atmosphäre, welcher noch directes Licht erhält, und demjenigen, dem nur reflectirtes zukommt, sey scharf erkennbar, so würde sie die Form eines Bogens haben müssen, des ersten Dämmerungsbogens, und man könnte aus der Höhe seines Scheitels über dem Horizonte auf die Höhe der der letzten Licht reflectirenden bei *D* liegenden Theilchen über der Erdoberfläche schließen. Diese Betrachtung, welche einen Weg zu zeigen schien, um die Höhe der Atmosphäre zu bestimmen, veranlaßte die älteren Astronomen diesem Gegenstande viele Aufmerksamkeit zu schenken. Daß diese



über die Höhe dieser Theilchen eine Tabelle über das Fortschreiten des Segmentes berechnet. Meines Wissens sind über den Gang des dunklen Segmentes, so lange es sich noch auf der der Sonne gegenüberliegenden Seite des Himmels befindet, niemals Messungen angestellt worden, und was Lambert am Westhimmel als Gränze desselben betrachtet, hatte, wie wir sahen, eine ganz andere Bedeutung. Die Messungen, welche ich darüber gemacht habe, stimmen mit der von Lambert berechneten Tabelle <sup>1)</sup> durchaus nicht, und ergeben ein ganz anderes Gesetz, als man nach der alten Anschauung zu erwarten hat.

Um dies zu beweisen, lasse ich hier drei Messungsreihen folgen. Dabei ist für jede Beobachtung berechnet, in welcher Höhe  $E$  (Fig. 14 Taf. I) über der Erdoberfläche sich der Punkt  $h$ , nämlich der Durchschnittspunkt der die Erde tangirenden Strahlen, mit der nach dem Scheitel des dunklen Segmentes gezogenen Geraden befindet. Diese Höhe ist die größte Erhebung jener Theilchen, welche uns noch Licht von jenen Strahlen durch einmalige Reflexion zusenden können, sie mußte nach der älteren Anschauung eine Constante seyn. Den Werth von  $E$  erhält man, mit einer vollkommen hinreichenden Genauigkeit aus der Formel

$$E = 2R \left[ \frac{\sin\left(\eta - \frac{\omega'}{2}\right) \sin \frac{\omega'}{2}}{\sin(\eta - \omega')} \right]^2 \quad (\alpha),$$

in welcher  $R$  den Radius der Erde, also in runder Zahl 860 Meilen,  $\eta$  die Höhe des dunklen Segments über dem Horizont bezeichnet und  $\omega' = \omega - 33'$  ist, wenn man unter  $\omega$  die Tiefe der Sonne unter dem Horizont versteht.

Auf die astronomische Refraction ist in dieser Formel nur theilweise Rücksicht genommen, es wurde nämlich nur jene Ablenkung in Rechnung gebracht, welche die Sonnenstrahlen auf ihrem Wege von der Sonne bis zu dem Punkte  $A$ , wo sie die Erde tangiren, erfahren, was einfach dadurch geschehen konnte, daß  $\omega'$  anstatt  $\omega$  eingeführt wurde, während der übrige Verlauf der Strahlen, bei welchem die Be-

1) A. a. O. S. 454.

rücksichtigung der Refraction große Weitaufigkeit der Rechnung verursacht hätte, geradlinig angenommen ist. Die Höhe des Punktes  $h$  wird hierdurch etwas größer ausfallen, als die des Punktes  $h_0$ , für welchen man eigentlich rechnen sollte, wie man aus einer zu dem Zwecke entworfenen Figur sofort sieht. Der Fehler wird mit wachsendem  $\eta$  immer unbedeutender.

Auch abgesehen hiervon ist die Formel ( $\alpha$ ) immernoch nur eine Näherungsformel, welche sich aus dem Ausdrücke

$$Ch^2 = R^2 + Ah^2,$$

in welchem  $C$  den in Fig. 14 Taf. I nicht mehr angegebenen Erdmittelpunkt bezeichnet, ergibt, indem man beachtet, daß für kleine Werthe von  $Ah$

$$Ch = R + E = R \left[ 1 + \frac{1}{2} \frac{Ah^2}{R^2} \right]$$

ist, dies ist aber bei der Anwendung, welche wir von der Formel zu machen haben, wirklich der Fall.  $Ah$  endlich findet man mit Hülfe der allereinfachsten Betrachtungen

Tag	Zeit	$\omega =$ Tiefe der Sonne	$\eta =$ Höhe des Segments	$E$ in Meilen
14. April 1864	6 <sup>h</sup> 51 <sup>m</sup>	1° 7'	1°	0,08
	6 54	1 35	1 50'	0,7
	6 58	2 15	3	1,1
	7 0 30"	2 40	4	1,4
	7 2	2 50	4 40	1,7
	7 4	3 10	5 40	2,1
15. April 1864	6 54	1 25	1 30	0,24
	6 57	1 50	2 20	0,65
	6 59 30	2 10	3 40	0,73
	7 1 30	2 30	4 20	1,0
	7 3 30	2 50	5 10	1,4

Die erste dieser Reihen, nämlich die vom 8. Decemb. wurde noch mit dem oben erwähnten ganz rohen Instrumenten gefunden, sie hat also geringeren Werth als die beiden folgenden. Ueberdies war der westliche Horizont an diesem Tage bis zu einer Höhe von 1° mit dichter Nebel umzogen, im Osten waren leichte Schichtwolken (*cirro-stratus*). Die beiden letzten Messungsreihen wurden an vollkommen reinen, sehr trocknen Tagen angestellt. Am 14 April glaubte ich um 7<sup>h</sup> 35<sup>m</sup> die Gränze des dunklen Segmentes am westlichen Himmel in einer Höhe von etwa 50' wieder zu erblicken (Vergl. §. 4) woraus  $E =$  Meilen folgen würde.

Obgleich diese Angaben nicht genügend sind, um aus ihnen ein Gesetz für die Bewegung des dunklen Segmentes zu basiren, & geht aus ihnen doch unzweifelhaft hervor, daß jede Messung für  $E$  einen größeren Werth giebt, als die vorangehenden, eine Thatsache, welche ich durch alle über diesen Punkt angestellten Messungen bestätigt fand. Eine gar so einfache Vorstellung, wie man sie bisher zur Begründung einer Theorie benutzen wollte, erweist sich mithin schon hier & gänzlich unzureichend, und doch ist das dunkle Segment der einzige Punkt, von welchem sich wenigstens qualitativ Rechenschaft zu geben vermag.

Es scheint mir noch nicht sehr schwer anzugeben, worin dieser Widerspruch seinen Grund hat: man lief

nämlich bei dieser Theorie die photometrischen Verhältnisse ganz unberücksichtigt. Man nahm einfach an, daß die Gränze zwischen dem hellen und dunklen Theile des Himmels durch die Lage der böchaten Theilchen bedingt sey, welche überhaupt noch Licht zu reflectiren vermögen, ohne sich darum zu kümmern, ob nicht etwa die Strecke, welche das Licht durch die absorbirende Atmosphäre von ihnen aus zu durchlaufen hätte, zu groß sey, oder ob die Anzahl derselben, welche uns in ein und derselben Richtung Licht zusenden, nicht vielleicht zu klein sey, als daß wir sie erblicken könnten; noch ganz abgesehen davon, daß man doch keinesfalls annehmen kann, daß die Licht reflectirenden Partikelchen dasselbe nach allen Seiten hin gleich stark zerstreuen<sup>1</sup>). Eine kurze Betrachtung wird genügen, um zu zeigen, daß eine solche photometrische Behandlung des Problems, selbst wenn man vor der Hand, wo es sich noch nicht um quantitative Bestimmungen handelt, den letzten Punkt noch ganz bei Seite läßt, eine weit größere Uebereinstimmung mit den Thatsachen verspricht.

Zuletzt noch ein Wort über die Natur des Lichts. Es ist schon

ebenfalls einen sehr langen Weg zurückzulegen hat, so ist zu erwarten, daß die Gränze des Schattenraumes, d. i. des dunklen Segments, sehr nahe an das Helligkeitsmaximum der Gegendämmerung fallen wird, und daß sie von da an aufwärts, wegen der beständig abnehmenden Anzahl der Theilchen, welche uns in ein und derselben Richtung Licht zusenden, allmählich abnehmen, und schon in geringen Höhen unmerkbar werden wird.

Um nun zu untersuchen, welchen Verlauf der Erscheinungen man nach dieser Betrachtungsweise zu erwarten hat, haben wir nur nöthig, von einem anderen Punkte  $N_1$ , aus, für den die Sonne zunächst untergegangen ist, ähnlich wie oben Gerade  $N_1 a_1$ ,  $N_1 b_1$ ,  $N_1 c_1$  nach der Umgebung von  $D$  zu ziehen. Es ergibt sich alsdann, daß die Stücke dieser Linien, welche außerhalb des Schattenraumes zu liegen kommen, im Allgemeinen kleiner seyn werden als vorher, ferner, daß das Ansteigen zum Maximum etwas langsamer erfolgt, und endlich, daß die Gerade  $N_1 b_1$ , welcher dießmal das Maximum angehört, die Gerade  $AD$  in einem Punkte  $h_1$  schneiden wird, welcher höher liegt, als der entsprechende Punkt  $h$  des vorigen Falles.

Man hat demgemäß zu erwarten, daß erstens die Intensität der Gegendämmerung bei fortgesetztem Sinken der Sonne immer mehr abnehmen wird, zweitens, daß die Begränzung des dunklen Segments immer mangelhafter werden wird, und drittens, daß der Durchschnittspunkt der nach dem Scheitel dieser Begränzung gezogenen Geraden mit den die Erde tangirenden Strahlen immer höher und höher zu liegen kommen muß.

Alle diese Sätze werden durch die Erfahrung bestätigt, und deshalb scheint diese Betrachtung, wenn sie auch nur als roher Ueberschlag gelten darf, doch den Weg zu bezeichnen, auf welchem man eine Lösung des Problems zu erwarten hat. So weit ich es übersehen kann wird die Berücksichtigung der fehlenden Punkte, also der mehrfachen Reflexionen, der Eigenthümlichkeiten der Dunstbläschen usw. das Resultat qualitativ nicht ändern, sondern

vor noch prägnanter machen. Für einen gewandten Mathematiker dürfte sich hier ein interessantes Feld der Thätigkeit eröffnen.

§. 10. Die Erscheinungen am Westhimmel, also der Dämmerungsschein oder das *erste helle Segment*, blieben in der bisherigen Theorie ganz unberücksichtigt, mit Ausnahme des zweiten hellen Segments, welches Lambert von dem Punkte an beobachtete, wo das erste dunkle (S. §. 4) dasselbe ereilt hatte. Es wurde schon oben erwähnt, welche Relation sich zwischen der Höhe des ersten hellen Segments und der Tiefe der Sonne unter dem Horizont ergab. Die folgenden Messungsreihen mögen als Belege dienen. Die mit *A* überschriebene Columnne enthält die Abweichungen der einzelnen Beobachtungen von dem Mittelwerthe  $\gamma$ , mit welchem sie ja nach dem angegebenen Gesetze zusammenfallen sollen. Die Bedeutung der in der Columnne *E* stehenden Zahlen, soll später erörtert werden.

Tag	Zeit	$\alpha$	$\beta$	$\alpha + \beta$	$\gamma$	<i>A</i>	<i>E</i>
-----	------	----------	---------	------------------	----------	----------	----------

Diese Messungsreihen, von denen die beiden ersten noch mit dem ganz rohen Instrumentchen angestellt wurden, zeigen, daß das genannte Gesetz wenigstens als eine ziemlich gute Näherungsformel zu betrachten ist. Die Abweichungen halten sich meist innerhalb der Gränzen, welche wir schon oben (§. 3) für die Beobachtungsfehler haben kennen lernen. Vielleicht lassen die beiden letzten Reihen, die genaueren, ein kleines Wachsen der Summe  $\theta + \omega$  mit der Zeit durchblicken. Lambert's Beobachtungen des zweiten hellen Segments zeigen ein solches jedoch weit stärkeres Wachsen in unzweifelhafter Weise. Die \* vor einigen Zahlen bedeuten, daß man es noch mit dem Dämmerungsschein zu thun hat, daß sich also noch kein eigentlicher Bogen constituirt hat.

Es mag auffallen, daß die mittlere Differenz der beobachteten und der berechneten Werthe für die beiden ersten Reihen, welche noch mit viel schlechteren Hülfsmitteln gewonnen wurden, kaum größer ist, als für die beiden letzten Reihen. Der Grund ist einfach der, daß die Hauptschwierigkeit in dem Erkennen scharfer Gränzen zu suchen ist, und daß diese an den verschiedenen Tagen ganz verschiedene Grade der Präcision besaßen. Die beiden Tage im November waren in dieser Hinsicht außerordentlich günstig, während am 15. April alle Erscheinungen nur sehr schwach ausgeprägt waren.

Die genannte Formel gestattet eine eigenthümliche geometrische Deutung. Zieht man nämlich von dem Orte des Beobachters  $N$  (Fig. 15 Taf. I) eine Gerade nach dem höchsten Punkte des hellen Segments, so schneidet diese die Schattengränze in  $h$ . An dieser Stelle befindet sich also das tiefste Lufttheilchen, welches durch Reflexion von directem Sonnenlichte zur Bildung des Scheitels des Segments beitragen kann. Man sieht nun sofort, daß

$$\angle N h D = \angle H N S + \angle K N h = \theta + \omega = \gamma$$

ist. Da nun dieser Winkel an jedem Tage nahezu ein constanter ist, so findet man die Richtungen  $N, h_1, N, h_2$  usw., in welchen Beobachter in den Punkte  $N, N_2, N_3$  usw.

den Scheitel des Bogens erblicken, indem man zu  $Nh$  parallele Grade durch diese Punkte zieht. Die Höhe  $E$ , in welcher sich die Theilchen  $h, h_1, h_2$  usw. befinden, ist demgemäß für jede folgende Beobachtung — denn ein Beobachter befindet sich ja der Reihe nach an den Punkten  $NN_1$  usw. — eine bedeutendere, als für die vorhergehenden. Da man früher das Analogon des ersten Segmentes, nämlich das zweite, durch eine Schattengränze omschrieben annahm, welche dann eben durch die dem  $h, h_1, \dots$  entsprechenden Punkte gehen mußte, und da man gerade deshalb auf die Erhebung dieser Punkte über der Erdoberfläche bedeutendes Gewicht legte, so habe ich diese Werthe für die Beobachtungen vom 14. April berechnet, und sie in der Columnne  $E$  beigefügt. Als Einheit ist, wie oben, die geographische Meile zu Grunde gelegt.

Uebrigens darf man das erste helle Segment, und demgemäß wegen der vollkommenen Analogie auch das zweite, durchaus nicht durch den Erdschatten begränzt denken, da der Dämmerungsschein bereits vor und während des Son-



handlung des ganzen Problems auch von dieser Erscheinung wird Rechenschaft geben können. Ein einfacher Ueberschlag mag dies darthun.

Betrachtet man nämlich wieder, wie im vorigen Paragraph, die Menge der leuchtenden Partikelchen, welche wir in einer bestimmten Richtung erblicken, so ist klar, daß ein Auge, welches von den höheren Theilen des Himmels ausgehend, die westliche Hälfte des Sonnenverticals durchläuft, zuerst auf immer hellere und hellere Stellen stoßen muß. Dieses Wachsthum wird jedoch bei einer bestimmten Höhe über dem Horizonte eine Gränze erreichen, und in eine Abnahme übergehen müssen, da bekanntermaßen die Absorption des Lichtes in der Atmosphäre bei der Annäherung an den Horizont außerordentlich rasch wächst, wozu noch der Umstand kommt, daß auch die Entfernung der nächsten leuchtenden Theilchen für diese Richtungen zunimmt. Hierdurch würde sich also nicht nur das Auftreten eines Helligkeitsmaximums des Dämmerungsscheines erklären lassen, sondern durch das Ueberwiegen der Absorptionswirkungen in den unteren Theilen auch die verschiedene Farbe der durch den Dämmerungsschein getrennten Partieen.

Auch das successive Steigen von  $E$  würde mit dieser Anschauungsweise übereinstimmen. Zieht man nämlich von den Punkten  $N$  und  $N_1$  aus (Fig. 16 Taf. I) Gerade in verschiedenen den respectiven Horizonten benachbarten Richtungen, so sieht man, daß, wenn  $N$  das Helligkeitsmaximum in der Richtung  $Nh$  erblickt, es ganz unwahrscheinlich ist, daß für  $N_1$  dieses Maximum in die Richtung  $N_1h$  falle, da die letztere dem Horizonte des Punktes  $N_1$  schon so nahe liegt, daß die Absorptionswirkungen das Uebergewicht haben werden, und mithin wird es in eine Richtung fallen, welche die Gerade  $AD$  in einem höher gelegenen Punkte schneidet, ganz im Einklange mit den Beobachtungen. Ob diese Anschauungsweise mit dem aufgestellten Gesetze vereinbar sey, diese Frage muß einer genaueren Analyse,

welche alle Umstände berücksichtigt, zur Lösung vorbehalten bleiben.

§. 11. Wir haben schliesslich noch von jener Erscheinung zu sprechen, welche für mich den Ausgangspunkt der ganzen Untersuchung bildete, vom „*Purpurlicht*“. Bisher wurde in keiner theoretischen Behandlung der Dämmerung dieses Phänomens gedacht. Das Nachglühen der Alpen versuchten Necker und de la Rive (a. a. O.) zu erklären, und zwar der erstere durch Contrastwirkungen, was nach den oben mitgetheilten Thatsachen ganz unhaltbar ist, der letztere hingegen durch eine totale Reflexion. Aber abgesehen davon, dass schon Kepler <sup>1)</sup> bemerkte, dass regelmäßige Reflexionen ganz andere Erscheinungen hervorrufen müssten, als die in der Dämmerung beobachteten, hat auch Lubbock <sup>2)</sup> gleich gegen die von de la Rive vortragene Ansicht den richtigen Einwand gemacht, dass man nach dieser Voraussetzung an dem beleuchteten Punkte ein Bild der Sonne erblicken müsse, und zwar müsste das letztere, wie man aus einer einfachen Construction sofort

ist, die übrigens ganz andere Resultate liefert, als die bisherige der Theorie entnommene. Nach der älteren Anschauung mußte nämlich das Ende der ersten Dämmerung mit dem Momente des Untergangs des ersten Dämmerungsbogens zusammenfallen. Diesen Augenblick verlegt Lambert auf eine Tiefe der Sonne von  $12^{\circ},13$ . Diese Zahl erhielt er unter Zugrundelegung einer Höhe der Atmosphäre, welche er aus einer seiner Beobachtungen berechnet hatte. Bekanntlich liefert nach Brandes und Grunert jede der Lambert'schen Beobachtungen einen anderen Werth für diese Höhe, und man könnte mithin mit demselben Rechte den Schluß der Dämmerung auf sehr verschiedene andere Zeitpunkte verlegen. Uebrigens ergibt sich durch Interpolation aus den Lambert'schen Beobachtungen für den Untergang jenes Bogens, den er bei jener Beobachtung, welche er seiner Rechnung zu Grunde legt, als den ersten Dämmerungsbogen betrachtet, eine Tiefe der Sonne von etwa  $19^{\circ},20$ , ein schwer zu versöhnender Zwiespalt in den Resultaten! Seine Speculationen aber über das Ende der zweiten Dämmerung gründet er auf die allgemein übliche Annahme, daß der letzte helle Schein den Horizont erreiche, wenn die Sonne sich  $18^{\circ},30$  unter demselben befinde. Er schloß daraus, daß dieser Schein nicht durch den zweiten Dämmerungsbogen begränzt seyn könne, da das Ende der zweiten Dämmerung, wenn es durch den Untergang des zweiten Dämmerungsbogens bedingt wäre, einer Tiefe der Sonne entsprechen müßte, welche gleich wäre der doppelten am Ende der ersten, also gleich  $24^{\circ},26$ . Diefs nöthigte ihn zu dem Schlusse, daß der zweite Dämmerungsbogen wegen Lichtmangel nicht mehr erkennbar sey.

Es liegt durchaus nicht in meiner Absicht ein einzelnes Capitel eines so verdienstvollen Werkes, wie Lambert's Photometria, einer scharfen Kritik zu unterwerfen, aber ich glaubte diese kleine Digression hier nicht unterlassen zu dürfen, da die Lambert'sche Untersuchung über die Dämmerung eine so ungewöhnlich häufige Reproduction erfah-

ren hat, daß es ernstlich Wunder nehmen muß, wie ihre mannigfachen Widersprüche fast unbeachtet bleiben konnten.

Wir haben schon in dem beschreibenden Theile gesehen, daß man den Beginn der zweiten Dämmerung auf jenen Moment zu verlegen habe, in welchem das zweite dunkle Segment sich vom Horizonte erhebt. ohne daß jedoch damit gesagt seyn soll, daß dieser Zeitpunkt zugleich das Ende der ersten bezeichne. Dieser Moment läßt sich aber nur sehr schwer mit Schärfe beobachten, und mithin scheint dieses allein naturgemäße Mittel der Eintheilung doch practisch unanwendbar. Glücklicherweise bieten uns das erste und zweite Porpurlicht wenigstens theilweise einen Ersatz dafür. Obwohl ich nämlich den Zeitpunkt des Intensitätsmaximums nur viermal, und auch da nur mit mäßiger Genauigkeit beobachten konnte, so ergab sich doch aus diesen Beobachtungen mit einer verhältnißmäßig großen Uebereinstimmung ein merkwürdiges Resultat. Es zeigte sich nämlich, wie schon oben erwähnt, (§. 4), eine ganz bestimmte Relation zwischen den beiden Stellungen

ten Purpurlichts abzuleiten. Der Verlauf der zweiten Dämmerung ist dem der ersten, wenn auch nicht ganz gleich, doch wenigstens sehr ähnlich, man wird sich demnach nicht sehr weit von der Wahrheit entfernen, wenn man annimmt, daß das Stück, um welches die Sonne sinken muß, vom Beginn der zweiten Dämmerung bis zum Helligkeitsmaximum des zweiten Purpurlichtes, jenem gleich sey, um welches sie seit Sonnenuntergang, d. h. seit dem Verschwinden des oberen Sonnenrandes bis zum Eintritt des ersten Maximums gesunken ist. Die auf Grund dieser Voraussetzung ausgeführten Rechnungen ergaben das Resultat, daß *der Beginn der zweiten Dämmerung mit dem vollständigen Verschwinden des Purpurlichtes zusammenfällt*. Dieß tritt aber, so weit man es beobachten kann, gleichzeitig ein mit dem ersten Erscheinen des zweiten dunklen Segments. Und zwar entspricht dieß, wie schon erwähnt, im Durchschnitt einer Tiefe der Sonne von etwa  $6^\circ$ , mithin dem Ende der bürgerlichen Dämmerung.

Wäre unsere Annahme genau richtig, d. h. wäre der Verlauf der zweiten Dämmerung dem der ersten vollkommen gleich, so wäre man im Stande das Verschwinden des zweiten Dämmerungsbogens aus dem des ersten, mithin, wenn  $\gamma$  wirklich eine Constante ist (§. 3), aus einer einzigen Beobachtung des ersten zu berechnen. Wenn auch diese Annahme nicht genau richtig ist, sondern die zweite Dämmerung, wie schon Lambert's Beobachtungen zeigen, etwas langsamer verläuft, so fällt doch das unter dieser Voraussetzung berechnete Ende der zweiten Dämmerung so nahe mit dem für die astronomische Dämmerung durchschnittlich angenommenen zusammen, daß es dadurch im höchsten Grade wahrscheinlich wird, daß letzteres eben durch den Untergang des zweiten westlichen Dämmerungsbogens bestimmt wird. Die Tiefe der Sonne für diesen Moment fällt jedoch nach dieser Voraussetzung immer etwas zu gering aus, ganz im Einklange mit der Lambert'schen Beobachtung, welche für das zweite helle Segment ein entschiedenes Wachsen der Werthe von  $\gamma$  mit der Zeit

erkennen lassen. Da alle Erscheinungen in der Dämmerung der Größe nach bedeutenden Schwankungen unterworfen sind, so zeigen sich selbstverständlich auch solche in den berechneten Werthen für den Untergang des zweiten westlichen Dämmerungsbogens. Uebrigens hat auch Riccioli <sup>1)</sup> bewiesen, daß das Ende der astronomischen Dämmerung auch an ein und demselben Orte wirklich verschiedenem Stande der Sonne entspricht.

Zur Illustration des eben Gesagten mag hier der Verlauf einer Dämmerung ihren Hauptzügen nach folgen, wie er sich theils aus der Beobachtung, theils unter Zugrundelegung der genannten Annahmen ergiebt. Die Werthe, bei welchen nicht ausdrücklich das Gegentheil bemerkt ist, sind der directen Beobachtung entnommen.

Den 18. Nov. 1863.

	Tiefe der Sonne
Beginn der ersten Dämmerung . . . . .	49' (ber.)
Maximum des ersten Purpurlichtes . . . . .	4° 52'
Beginn der zweiten Dämmerung . . . . .	6° 41' (ber.)
Das Purpurlicht ist vollständig verschwunden . . . . .	6° 43'
Maximum des zweiten Purpurlichtes . . . . .	10° 44'
Untergang des ersten westl. Dämmerungsbogens . . . . .	11° 40' (ber.)
Untergang des zweiten westl. Dämmerungsbogens . . . . .	17° 34' (ber.).

In ähnlicher Weise ergab sich für den Beginn der zweiten Dämmerung, am

29. Nov.	eine Tiefe der Sonne von	6° 18'
8. Dec.	„ „ „ „ „	6° 0'
31. Jan.	„ „ „ „ „	5° 36'

Daß der Grad der Zuverlässigkeit dieser Zahlen kein sehr großer seyn kann, so lange man nicht im Stande ist, durch photometrische Hülfsmittel den Augenblick genauer zu bestimmen, in welchem das Purpurlicht sein Helligkeitsmaximum erreicht, ist selbstverständlich.

Es mag vielleicht nicht uninteressant seyn, darauf hinzu-

1) *Almagestum novum*. Bonon. 1651, T. I, p. 39.

deuten, daß sich ähnliche Beziehungen, wie die hier entwickelten, zwischen dem Verlaufe der beiden Dämmerungen, aus der Annahme ergeben würden, das erste Purpurlicht übernehme für das Zustandekommen der zweiten Dämmerung dieselbe Rolle, welche die Sonne bei den Erscheinungen der ersten gespielt hat. Während jedoch die mehr röthliche Farbe des zweiten Purpurlichtes für die Richtigkeit dieser Hypothese zu sprechen scheint, steht die außerordentlich blaßgelbe des zweiten hellen Segments mit ihr im Widerspruch.

Künftige Beobachtungen müssen lehren, ob der in diesem Paragraphen entwickelte Zusammenhang zwischen erster und zweiter Dämmerung richtig ist, ich begnüge mich damit die Existenz einer ersten und zweiten Dämmerung erfahrungsmäßig nachgewiesen zu haben.

Fassen wir zum Schlusse die gewonnenen Resultate noch einmal kurz zusammen.

Schon vor Sonnenuntergang constituirt sich am östlichen Himmel die Gegendämmerung.

Im Momente des Sonnenunterganges beginnt die erste Dämmerung, das dunkle Segment erhebt sich vom Horizont, beschränkt die Gegendämmerung mehr und mehr, und entzieht sich den Blicken des Beobachters in einer Höhe, welche je nach dem Tage zwischen  $6^{\circ}$  und  $12''$  schwankt.

Am westlichen Himmel hingegen erscheint in einer Höhe, welche zwischen  $8^{\circ}$  und  $12''$  schwankend gefunden wurde, der Dämmerungsschein, der das unter ihm liegende gelbe helle Segment von den höheren bläulichen Theilen des Himmels trennt.

Während das helle Segment in ganz bestimmter Weise sinkt, entwickelt sich über demselben das erste Purpurlicht; bei einer Tiefe der Sonne von etwa  $5^{\circ} 20'$  im Mittel erreicht dasselbe sein Helligkeitsmaximum, wobei nach Westen gekehrte Gegenstände lebhaft beleuchtet werden.

Das Purpurlicht sinkt rasch, und schwindet endlich zu einer schmalen Zone zusammen, welche das helle Segment

ziemlich scharf begrenzt. Wenn die Sonne sich ungefähr  $6^{\circ}$  unter dem Horizonte befindet, entzieht es sich dem Blicke vollkommen, die Tageshelligkeit nimmt auffallend ab. Dies bezeichnet das Ende der bürgerlichen Dämmerung und zugleich den Anfang der zweiten; denn ungefähr um diese Zeit erhebt sich ein zweites dunkles Segment vom östlichen Horizont, über dem ersten hellen Segmente bildet sich ein zweiter Dämmerungsschein, und während ersteres seinem Untergange zueilt, erscheint über dem zweiten hellen Segmente ein zweites Purpurlicht, so daß eine förmliche Wiederholung der zuerst beobachteten Erscheinungen eintritt, jedoch wahrscheinlich mit einem etwas langsameren Verlaufe.

Sowie der Untergang des ersten hellen Segmentes den Schluß der ersten Dämmerung bezeichuet, so bildet der des zweiten den der zweiten Dämmerung, vermuthlich zugleich das Ende der astronomischen.

Der ganze Verlauf der Erscheinungen steht mit der bisher üblichen Theorie nicht im Einklang. Doch scheint es,



### III. *Zur Kritik der Regnault'schen Versuche zur Bestimmung der specifischen Wärme fester Körper; von Carl Pape.*

---

In dem kürzlich erschienenen Junihefte dieser Annalen befindet sich eine Abhandlung von Hrn. Regnault über die zur Bestimmung der specifischen Wärme fester Körper angewendeten Verfahren als Erwiderung auf einen Theil meiner Arbeit über die specifische Wärme wasserfreier und wasserhaltiger schwefelsaurer Salze <sup>1)</sup>, worin ich nachzuweisen suche, daß die von Hrn. Regnault zur Bestimmung specifischer Wärmen angewandte Methode an gewissen Fehlern leide, und daß in Folge davon die von ihm ermittelten Zahlen Anspruch auf die größtmögliche Zuverlässigkeit nicht erheben können. Der Zweck dieser Erwiderung ist, die von mir vorgebrachten Gründe zu widerlegen und zu zeigen, daß die beanstandeten Fehler entweder durch sorgfältige Correctionen und zweckmäßige Einrichtung der Versuche aufgehoben seyen, oder daß sie auf das Resultat der Beobachtung überhaupt keinen Einfluß haben.

Hr. Regnault liefert bei dieser Gelegenheit eine ausführliche Darstellung der bei seinen Versuchen befolgten Correctionsmethode, er geht ausführlich auf die meisten meiner Bedenken ein und theilt neue Versuche mit, die allein in der Absicht angestellt sind, die Abwesenheit jener Fehlerquellen zu beweisen. Einzelne derselben zeigen sich danach in der That von geringerer Bedeutung, die wesentlichsten meiner Gründe erscheinen mir indess auch jetzt noch nicht widerlegt, andere, meiner Meinung nach bedeutendere Fehlerquellen sind nur flüchtig angedeutet und es scheint für überflüssig erachtet zu seyn, ihre Abwesenheit zu beweisen. Es veranlaßt mich diess, etwas näher auf die Entgegnungen des Hr. Regnault einzugehen, gleich-

1) Diese Annalen Bd. 120, S. 579.

zeitig ist es aber auch meine Absicht, einige mir, wahrscheinlich in Folge eines Mißverständnisses meiner Worte, zugeschriebene Behauptungen zu berichtigen.

Hr. Regnault ist, abgesehen von den beanstandeten Fehlerquellen, auch damit nicht einverstanden, daß ich seine Versuche kritisirt habe, ohne eigene Beobachtungen über bestimmte auch von ihm untersuchte Körper vorzulegen, die meine Gründe bewiesen.

Die sorgfältige und genaue Ausführung der Versuche bürgt allein nicht für die Zuverlässigkeit der Resultate, wenn sie nach einer im Principe fehlerhaften Methode erhalten sind, es handelt sich bei der Bestimmung der specifischen Wärme deshalb vor Allem darum, die zweckmäßigste und vortheilhafteste Methode ausfindig zu machen. Dies wird kaum anders zu erreichen seyn, als daß ein Jeder seine Methode mittheilt, die er angewandt hat, ihre Vorzüge aufführt und die Gründe vorbringt, die ihn eine anderweitig benutzte Methode weniger zweckdienlich erscheinen lassen. Diese Gründe sind es, welche mich na-

Zuverlässigkeit beanspruchen können. Auch die von mir benutzte Methode kann noch nicht berücksichtigte Fehlerquellen enthalten, ich will keineswegs das Gegenteil ohne Weiteres behaupten, es sind ihr aber bis jetzt keine nachgewiesen, ich selbst habe im Laufe meiner Beobachtungen keine entdecken können, es liegt also nahe, daß ich die Gründe für abweichende Resultate in der Methode des Hrn. Regnault suche, und daß ich Fehlerquellen hervorhebe, die sich bei dieser finden und deren Einfluß mir groß genug scheint, um sich in den Resultaten bemerklich zu machen.

Die Frage, welche der beiden Methoden, die von Hrn. Regnault oder die von mir benutzte, im Principe den Vorzug verdiene, hier nochmals ganz im Allgemeinen zu erörtern und mich darüber auszusprechen, ob eine Frage wie die nach der besten Methode zur Bestimmung specifischer Wärmen sich nicht doch allgemein entscheiden lasse: darauf muß ich leider verzichten. Hr. Regnault liebt Anwendungen mathematischer Sätze bei physikalischen Untersuchungen nicht, *„weil sich theoretische Betrachtungen“,* wie ich sie angewandt habe, *„in ihren aufeinander folgenden Annahmen so sehr von der Wirklichkeit entfernen, daß kein erfahrener Beobachter heutzutage sich mehr bei ihnen aufhält“*<sup>1)</sup>. Ohne nochmalige nähere Betrachtung der mathematischen Entwicklung, von der ich in meiner Arbeit ausgegangen bin, würde sich diese Frage in dem vorliegenden Falle aber schwer entscheiden lassen.

Es wird gewiß Niemand Hrn. Regnault daraus einen Vorwurf machen, daß er in seinen Arbeiten sich der Anwendung von höherer Mathematik enthalten hat, aber ebenso wenig glaube ich, daß nun auch die angeführte Ansicht allgemein getheilt wird. Jedenfalls genügt mir diese bloße Aeußerung nicht, um mich davon zu überzeugen, daß die von mir benutzte Methode nicht auch im Principe vor der seinigen Vorzüge habe. Ich muß deshalb nach wie vor auf der vollen Berechtigung der eingeführten Annahmen

1) Diese Ann. Bd. 122, S. 266.

bestehen, bis wirkliche Gründe dagegen geltend gemacht werden<sup>1)</sup>. Obige Aeußerung muß im Munde eines so geschätzten Forschers um so auffälliger erscheinen, da sie so ganz den Anschauungen zuwiderläuft, die sich über den Nutzen der Mathematik bei physikalischen Untersuchungen seit längerer Zeit gebildet haben, und da sie so ganz die großen Erfolge zu leugnen scheint, die in den verschiedensten Zweigen der Physik Untersuchungen auf Grund theoretischer Betrachtungen bereits erzielt haben.

Ich werde mich hiernach darauf beschränken müssen, auf die Arbeit des Hrn. Regnault in so weit einzugehen, wie ich vorhin angedeutet habe, als sie sich mit der tatsächlichen Widerlegung der Gründe beschäftigt, die ich für das Vorhandenseyn von Fehlerquellen bei seinen Beobachtungen angeführt habe.

Die neuen Versuche, welche Hr. Regnault mittheilt, sind nach seiner Angabe mit seinem in den *Ann. de Chim. et de Phys.* S. III, T. 63, vom Jahre 1861 beschriebenen neueren Apparate angestellt. Derselbe unterscheidet sich

balten und besitzt dabei ein sehr geringes Wärmeleitungsvermögen, das ihn somit sehr geeignet erscheinen läßt, denjenigen meiner Gründe zu prüfen, der sich auf den Einfluß dieser Eigenschaft bei Anwendung voluminöser Stücke bezieht.

Hr. Regnault beginnt mit einer ausführlichen Darstellung seiner Beobachtungsart und der Mittheilung aller Einzelheiten, die bei der Ermittlung der anzubringenden Correctionen von Wichtigkeit sind. Es sind diese Angaben ohne Frage von großem Werthe für die Beurtheilung seiner Versuche. Es kann nur erwünscht seyn, wenn man bei den leider noch immer so schwierigen und von so vielerlei Ursachen beeinflussten thermometrischen Untersuchungen klar zu übersehen vermag, in welcher Weise die verschiedenen Fehlerquellen in jedem einzelnen Versuche durch Correctionen vermieden sind. Er eliminirt die erkannten Fehler der verschiedensten Art mit großer Umsicht und Geschicklichkeit, und es ist nicht zu leugnen, daß bei seiner Methode und den Verhältnissen unter denen seine Versuche angestellt sind nicht besser hätte verfahren werden können. Ich stehe deshalb auch nicht an, zuzugeben, daß ich in dieser Darstellung den Fehler nicht aufzufinden vermag, den ich in meiner Arbeit in Beziehung auf die angebrachten Correctionen bei den älteren Versuchen hervorgehoben habe <sup>1)</sup>. Dagegen muß ich auf Grund der dort citirten eigenen Angaben des Hrn. Regnault auf meiner Ansicht beharren, daß die Art und Weise nicht zu billigen ist, wie dort die Correction für die Ausstrahlung des Mischgefäßes in der Zeit vom Eintauchen des erhitzten Körpers bis zum Eintritt des Temperaturmaximums angebracht ist. Es wird immerhin diese Correction für sich keinen übermäßig großen Einfluß auf das Resultat haben, es gilt das mehr oder weniger auch von jeder der anderen bezeichneten Fehlerquellen, wenn man sie einzeln betrachtet; sind aber mehre Fehler vorhanden, von denen also einige, wie ich es auch gezeigt habe, in *demselben* Sinne

1) A. a. O. S 582.

wirken, so kann die Summe ihrer Wirkungen doch eine merkliche Aenderung des Resultates hervorrufen. Um jede Unsicherheit möglichst zu vermeiden, muß auch der geringste Fehler gleich den übrigen berücksichtigt werden.

Wenn vorhin gesagt ist, daß gegen die beschriebene Correctionsmethode für die Verhältnisse Nichts zu erinnern sey, unter denen Hr. Regnault seine Versuche angestellt hat, so habe ich damit keineswegs seine Beobachtungsmethode überhaupt billigen wollen. Ich kann mich nicht wohl damit einverstanden erklären, daß die Hauptbeobachtung der Flüssigkeittemperatur so lange hinausgeschoben wird, bis die Temperaturänderung der Flüssigkeit nach dem Eintritt des Maximums in der Zeiteinheit constant geworden ist. Es vergehen vom Eintauchen des Körper bis zu dieser Beobachtung bei schlechtleitenden Substanzen vier und mehr Minuten, dadurch ist man genöthigt, die Correctionen für die Abkühlung über die gleiche Zeit hin auszudehnen. Nun scheint es aber bei dem immer etwas zweifelhaften Charakter aller Correctionen, mögen sie auch noch so sorgfältig ausgeführt werden, vor Allen geboten zu seyn, sie

werden. Es ist dies gleichzeitig einer der Gründe, weshalb ich dem von mir benutzten Apparate den Vorzug gebe.

Hr. Regnault hebt bei der Darstellung der verschiedenen Correctionen hervor, daß er den Wasserwerth des erhitzten Messingkörbchens, mit dem es in die Flüssigkeit gelange, nicht berechnet, sondern durch besondere Versuche direct ermittelt habe, weil es auf dem Wege aus dem Dampfapparate in die Flüssigkeit sich etwas abkühle. Er legt hierbei besonderes Gewicht darauf, daß er seinen Rechnungen diesen letzteren und nicht den ersteren Werth zu Grunde gelegt habe. Mir scheint dies durch ein Mißverständniß einer Stelle in meiner Arbeit veranlaßt zu seyn, wo ich allerdings von dieser Art, den Wasserwerth des Körbchens zu ermitteln, spreche, aber keineswegs in der Absicht daran zu mäkeln, ich bin im Gegentheil dort wie hier vollkommen damit einverstanden <sup>1)</sup>.

Es handelte sich daselbst für mich darum, nachzuweisen, daß die im Körbchen befindliche Substanz auf dem Wege aus dem Apparate in die Flüssigkeit einen nicht unbedeutlichen Theil ihrer Wärme verlieren müsse. Diese Annahme scheint namentlich für nicht-metallische Körper mit starkem Ausstrahlungsvermögen gerechtfertigt zu seyn, da diese durch die weiten Maschen des Körbchens hindurch der Luft eine große Oberfläche darbieten und da Hr. Regnault selbst zeigt <sup>2)</sup>, daß der Wasserwerth des Körbchens aus schlechter strahlendem Messing um fast den vierten Theil seines berechneten Werthes hierbei kleiner wird. Damit ist natürlich nicht behauptet, daß der entsprechende Verlust für die Substanz auch den vierten Theil ihrer Gesamtwärme betrage, aber selbst wenn er seinem absoluten Werthe nach nur so viel betrüge, wie der des Körbchens — in Wirklichkeit wird er größer seyn — so dürfte er nicht vernachlässigt werden. Es ist nicht anders anzunehmen, als daß Hr. Regnault diesen Einwurf in Folge eines leicht

1) A. a. O. S. 591.

2) *Ann. de chim. et de phys.* T. 73, p. 32; diese Annalen Bd. 51, S. 68.

erklärlichen Mißverständnisses in meiner Arbeit übersehen hat, sonst würde er sich ohne Zweifel für seine Zulässigkeit ausgesprochen haben.

Hr. Regnault beschäftigt sich weiter mit der Widerlegung der Annahme, die ich gemacht habe, um den auffallend niederen und dabei in den einzelnen Versuchen verschiedenen Stand des Thermometers im Dampfapparate bei den meisten seiner älteren und vielen seiner neueren Versuche zu erklären. Ich nahm an, daß in Folge des unvollkommenen, jetzt von ihm selbst zugegebenen Verschlusses des Heizraumes am oberen Ende warme Luft entweiche, am unteren dagegen kalte Luft eintrete, und daß bei schließlich stationärem Stande des Thermometers in der Mitte des cylindrischen Apparates von hier an bis zur Wand die Temperatur gleichmäßig bis zu der des umgebenden Dampfes steige, daß somit die Substanz im Körbchen heißer als das Thermometer sey, und daß ohne Berücksichtigung dieses Umstandes die specifische Wärme zu groß gefunden werden müsse.



denselben Werth für die specifische Wärme geben müssen. Da aber unter den angeführten Körpern wenigstens einige sind, die ohne Frage, wie auch von anderer Seite zugegeben wird, überall in der gleichen Reinheit zu erhalten sind, so schien die Annahme wenigstens für diese zulässig. Ich führte die Rechnung also für diese durch und dehnte sie auf die übrigen aus, um den Einfluss des angedeuteten Fehlers an mehreren Beispielen zu zeigen, ohne jedoch seine volle Elimination und die Erklärung der Abweichungen durch ihn allein zu beabsichtigen.

Hr. Regnault erklärt die von mir gemachte Annahme für unzulässig und spricht sich im Allgemeinen sowohl, wie durch Anführung besonders zu diesem Zwecke angestellter Versuche dagegen aus. Zunächst macht er dagegen geltend, daß man eine regelmäßige Aenderung der Temperatur von der Axe bis zur Wand des Cylinders überhaupt nicht annehmen werde, da solche Regelmäßigkeit nur bei einem festen Körper, aber nicht bei einem Gase eintreten könne. Er erklärt den fraglichen Temperaturunterschied durch die Luftströmungen, welche dadurch im Apparate entstehen, daß der obere und untere durch Blechstopfen gebildete Verschluss des Cylinders wegen der Berührung mit der äußeren Luft stets eine niedrigere Temperatur als die Seitenwände habe; es werde in Folge davon niemals im Raume die Temperatur des Dampfes erreicht werden können, es müsse aber schliesslich die Temperatur der durch diese Luftströme erwärmten Substanz nicht merklich von der des Thermometers verschieden seyn.

Den Temperaturunterschied erkläre ich gleichfalls durch Luftströmungen, nur kann ich nicht annehmen, daß sie durch die niedere Temperatur der oberen und unteren Grundfläche des Cylinders allein entstehen. Es muß meiner Meinung nach der zugegebene unvollkommene Verschluss eine wesentliche Rolle dabei spielen, sonst ist kein Grund einzusehen, weshalb in den verschiedenen Versuchen nach eingetretener Constanz des Thermometerstandes die Temperaturdifferenz so sehr verschieden ist. Diese

Verschiedenheit läßt sich aber sehr ungezwungen durch einen zufällig mehr oder weniger vollkommenen Verschluss, also einen schwächeren oder stärkeren Zutritt kalter Luft durch die Oeffnung am untern Stopfen erklären. Bei einer solchen dauernden Luftströmung in einer bestimmten Richtung scheint dann auch die Annahme einer regelmäßigen Abkühlung ebenso berechtigt zu seyn, wie bei einem festen Körper.

Es wird schwierig seyn, diese Annahme direct durch den Versuch nachzuweisen, da der Fehler, welcher bei der Temperaturdifferenz zwischen Thermometer und Substanz entsteht, auf das Resultat einen, wenn auch unter allen Umständen zu berücksichtigenden, so doch seiner absoluten GröÙe nach immer noch kleinen Einfluss hat. Aus diesem Grunde kann ich auch die Versuche des Hrn. Regnault mit erhitzten Blei- und Zinn-cylindern von verschiedener Weite, die über die Zunahme der specifischen Wärme des Wassers mit der Temperatur, ebenso die mit Iridium unter Benutzung des alten und neuen Apparates und die

der in allen Fällen die Erhitzung des Körpers auf die genau bekannte Temperatur des Dampfes von siedendem Wasser gestattet <sup>1)</sup>).

Hr. Regnault hat mit seinem neuen Apparate nach seinen Angaben dasselbe nahezu erreicht, es ist in demselben die Temperatur des Thermometers auch nahezu die des Dampfes. Wenn hier wegen der, wenn auch kleinen, aber doch noch vorhandenen Differenz eine gewisse Unsicherheit auch noch bleiben wird, so wird der dadurch bedingte Fehler hier doch wohl ganz zu vernachlässigen seyn. Meine Einwürfe rücksichtlich dieses Fehlers können sich dann auch nur auf die älteren und einige der neueren Versuche des Hrn. Regnault, aber immer doch die große Mehrzahl, beziehen, da er anführt, daß ein Theil der letzteren noch mit dem alten Apparate angestellt sey.

Mit einigen Worten werde ich noch auf die übrigen Versuche eingehen, die Hr. Regnault mit Doppelspath zu dem Zwecke eigens angestellt hat, um die Abwesenheit der genannten Fehlerquelle zu beweisen.

Es liegen zunächst zwei Versuchsreihen vor, die erste und die vierte, welche zeigen sollen, daß die specifische Wärme des Kalkspathes ebenso groß gefunden wird, wenn das Thermometer genau die Temperatur des Dampfes besitzt, wie das hier mit dem neuen Apparate erreicht werden konnte, als wenn es, wie in dem älteren Apparate, mehrere Grade niedriger steht. Es ist nicht zu leugnen, daß die sieben Versuche dieser beiden Reihen, bis auf einen, sehr gut sowohl unter einander, als mit den sieben älteren Beobachtungen stimmen, aber als Beweis gegen die Richtigkeit meiner Behauptung dürfte diese Uebereinstimmung doch nicht gelten. Denn zufällig ist bei allen sieben älteren Versuchen die Temperatur des Thermometers sehr

1) Dieser Apparat gewährt außerdem noch den Vortheil, daß die Länge des Quecksilberfadens im Thermometer des Heizapparates nicht auf eine andere Temperatur reducirt zu werden braucht, da dieß Thermometer bis unmittelbar an seinen Siedepunkt von Dampf umgeben ist.

nahe der des Dampfes gleich gewesen \*), so daß bei diesen der beanstandete Fehler sich gar nicht hat geltend machen können.

Auch bei den Versuchen der zweiten Reihe, bei denen die Eintauchung des erhitzten Körpers stattgefunden hat, während das Thermometer noch im Steigen begriffen gewesen ist, kann ich den meiner Annahme scheinbar entgegenstehenden kleineren Werth der Resultate nicht als Gegenbeweis ansehen. Meine Annahme bezieht sich nur auf den vollkommen stationären Zustand, da man unmöglich etwas Bestimmtes über die Temperatur der Substanz annehmen kann, so lange in dem sehr großen Heizraume noch kein Gleichgewicht der Temperatur besteht. Es erscheint auch gar nicht unmöglich, daß die Substanz wegen der Weite des von ihr erfüllten Raumes und weil sie die Wärme schlecht leitet, längere Zeit vor dem Eintritt des stationären Zustandes selbst noch eine geringere Temperatur besitzt, als die kleinere Masse des Thermometers. Indes will ich hiermit nicht die kleinen Abweichungen zwischen

stellen, die von der Temperatur der Luft an der freien unteren Oeffnung wenig afficirt seyn wird, vollkommene Ruhe im Arbeitsraume vorausgesetzt, wie sie aber bei Versuchen dieser Art gewiss angenommen werden darf. Man wird diese Erklärung um so eher zulassen, wenn man bedenkt, daß die Substanz im Körbchen bei den Versuchen sich in der Röhre nicht unterhalb ihrer Mitte befunden hat.

Bei den geringeren Dimensionen des neuen Apparates kann, selbst wenn auch die Luftströmungen noch existirten, die ich bei dem älteren annehme, keine so große Temperaturdifferenz zwischen Thermometer und Cylinderwand, um so weniger also zwischen letzterer und der Substanz bestehen und es müssen deshalb die neuen mit Kalkspath angestellten Versuche mit den bei der gleichen Temperatur und im Uebrigen unter denselben Verhältnissen ausgeführten älteren stimmen.

Die große Uebereinstimmung der Resultate dieser unter so verschiedenen Verhältnissen angestellten Versuchsreihen ist für den ersten Augenblick ohne Frage überraschend. Aber ich glaube, man wird zugeben, daß die gewählten Verhältnisse nicht geeignet sind, die Unabhängigkeit der Temperatur im Heizraume von der größeren oder geringeren Vollkommenheit seines Verschlusses, also die Abwesenheit des angedeuteten Fehlers zu beweisen. Es hätte entweder der ältere Apparat, oder, da dieser nicht mehr vorhanden war, ein solcher von dessen Dimensionen gewählt werden müssen, ganz abgesehen davon, daß es bei dem kleinen absoluten Werthe des Fehlers überhaupt schwer seyn wird, ihn neben anderen weniger constanten und beiden Apparaten gemeinsamen Fehlern, und namentlich aus einzelnen wenigen Versuchen für sich nachzuweisen.

Außer dieser eben besprochenen Fehlerquelle, an welcher meiner Meinung nach die meisten der älteren Versuche des Hrn. Regnault und ein Theil der neueren leiden, habe ich noch auf das Vorhandenseyn einer anderen aufmerksam gemacht, die ihren Grund in der Vernachlässi-

gung der inneren Wärmeleitungsfähigkeit der untersuchten Substanz hat, wenn dieselbe in sehr grossen Stücken angewandt wird. Die Grösse ihres Einflusses habe ich zwar nicht an bestimmten Beispielen mit Zahlen nachweisen können, ich habe ihr Vorhandenseyn nur wahrscheinlich zu machen und zu zeigen gesucht, dass es im Interesse der Zuverlässigkeit der Versuche liege, ohne Rücksicht auf den absoluten Werth des Fehlers, wenn man ihn durch möglichste Zerstückelung des Körpers überhaupt vermeide.

Hr. Regnault ist auch hier nicht meiner Ansicht und sagt, dass seine langjährige Uebung ihm die Ueberzeugung verschafft habe, dass man bei Metallen, selbst wenn man sie wie z. B. das Magnesium, in einzelnen 50<sup>cc</sup> grossen Stücken anwende, die Leitungsfähigkeit unendlich annehmen könne. Meine Einwürfe beziehen sich nun allerdings zum Theil auf Versuche mit einzelnen grossen Metallstücken und es mag seyn, dass bei diesen der genannte Fehler einen geringeren Werth hat, ich will nicht behaupten, dass er *sehr* gross sey: ich suche diese Fehlerquelle aber namentlich

könnte schliesslich gar nichts an, wenn man sonst die Mittel in Händen hat, ihn auf alle Fälle zu vermeiden.

Die Anwendung grosser Stücke führt auch noch einen anderen Uebelstand mit sich, auf den Hr. Regnault indess gar nicht eingegangen ist, nämlich den, dass darunter die Beweglichkeit der Flüssigkeit und somit die rasche Ausgleichung der Temperatur leidet, auf die es so wesentlich ankommt. Ich habe bei der Besprechung seiner Versuche auf verschiedene leicht zu vermeidende Uebelstände aufmerksam gemacht, die jeder für sich zwar einen geringeren Einfluss üben können, deren *Summe* aber auf alle Fälle nicht vernachlässigt werden darf. Hr. Regnault legt grosses Gewicht darauf, jedes einzelne meiner Bedenken durch Versuche zu prüfen, er beachtet dabei nicht, dass es bei dem kleinen Werthe der einzelnen Fehler darauf weniger ankommt, als solche Fehlerquellen überhaupt zu vermeiden, die sich vermeiden lassen, damit die schwer zu ermittelnde *Summe* ihrer Einflüsse eine sonst unvermeidliche Unsicherheit der Resultate nicht herbeiführe.

Hr. Regnault führt in seiner Abhandlung die Gründe an, die es nicht gestattet haben, einzelne in grossen Stücken untersuchte Körper zu zerkleinern und andere ohne die von mir beanstandete Hülle aus Bleifolie zu verwenden. Ich habe nicht daran gezweifelt, dass bei einzelnen Körpern diese Vorkehrungen nicht in der Absicht getroffen sind, um dadurch die Genauigkeit der Resultate zu erhöhen, es werden gewiss hier und da Vorsichtsmaassregeln nöthig gewesen seyn, um die Körper vor Veränderungen zu schützen, aber ich glaube, dass darunter die Zuverlässigkeit der Beobachtung gelitten hat, und muss den betreffenden Beobachtungen immer einen geringeren Werth beilegen als den übrigen. Bei einigen der untersuchten Körper hätten sich solche aussergewöhnliche Hilfsmittel auch vermeiden lassen, z. B. bei dem Bor und dem Silicium wäre es vielleicht vortheilhafter gewesen, wenn sie nach einer leicht ausführbaren Veränderung des Körbchens geradezu in Pulverform in die Flüssigkeit eingeführt wären.

Bei der Erwähnung seiner Versuche mit dem Lithium legt Hr. Regnault allein darauf Gewicht, daß ich die Einschließung desselben in einen starken Bleicylinder getadelt habe. Allerdings habe ich dieses getadelt, aber keineswegs allein des Verschlusses wegen, sondern namentlich auch, weil die Bleimasse einen viermal so großen Wasserwerth als das Lithium besitzt, weil in Folge davon das letztere nur geringen Einfluß auf die Wärmevertheilung erlangt, und deshalb eine zuverlässige Bestimmung seiner specifischen Wärme nicht möglich ist. Ich habe geglaubt, diese Versuche um so eher beanstanden zu dürfen, als Hr. Regnault selbst seine Versuche mit graphitischem Bor für unzuverlässig erklärt, weil bei diesen die Masse des Bleis zu groß im Verhältnisse zu der des Bors gewesen sey, und doch ist hier der Wasserwerth des mit Blei ausgefüllerten und noch belasteten Körbchens nur zweimal so groß gewesen als der des Bors <sup>1</sup>).

Auf die Widerlegung meiner Einwürfe, die ich gegen die Einhüllung der Metalle und pulverförmigen Körper in



seine Versuche nicht den Anspruch auf den grösstmöglichen erreichbaren Grad der Schärfe erheben können, da sie an einzelnen, jeder für sich zwar kleinen aber nachweisbaren Fehlern und Unzulässigkeiten leiden, die sich vermeiden lassen.

---

Unmittelbar hinter der eben besprochenen Abhandlung des Hrn. Regnault befindet sich in dem Junihefte dieser Annalen ein Aufsatz von Hrn. Bohn in Gießen über denselben Gegenstand. Da ich mich mit einem Theile der darin entwickelten Ansichten nicht völlig einverstanden erklären kann, so werde ich auch hierauf noch mit einigen Worten eingehen.

Nachdem Hr. Bohn den von Hrn. Regnault gegen meine Einwürfe angeführten Gründen seine volle Zustimmung gegeben hat, spricht er sich zunächst noch über die Bedeutung der von mir angeführten Fehlerquellen aus, die sie für die Bestimmung der specifischen Wärme haben würden, wenn ihr Einfluß auch noch grösser wäre, als er in Wirklichkeit sey:

Es würden die Werthe der specifischen Wärmen doch immer nur Annäherungen bleiben und das Gesetz der Constanz des Productes aus Aequivalent-Gewicht und specifischer Wärme bei chemisch-ähnlichen Körpern davon nicht betroffen werden, derentwegen man hauptsächlich specifische Wärmen bestimmt habe. Ich theile diese Ansicht vollkommen und bin namentlich auch der Meinung, daß es nichts desto weniger ein Interesse für sich haben müsse, die Methoden zur Ermittlung der specifischen Wärme auf einen möglichst hohen Grad der Vollkommenheit zu bringen. Es ist mir deshalb sehr lieb, daß Hr. Bohn, um diesen Zweck zu fördern, sich über einige Punkte ausgesprochen hat, von deren Richtigkeit die Anwendbarkeit der Mischungsmethode in der von mir benutzten Form abhängt.

Es ist mir dadurch Gelegenheit gegeben, mich nochmals darüber zu äussern und einige auf den ersten Anblick scheinbar begründete Einwände, wie ich hoffe, zu widerlegen, auf

die ich bei der Darstellung der Methode vielleicht nicht genügend Rücksicht genommen habe.

Bei Aufstellung der Differentialgleichungen, durch welche die Wärmevertheilung bei Mischungsversuchen allgemein dargestellt werden soll, habe ich angenommen, daß das Newton'sche Abkühlungsgesetz sowohl für die Ausstrahlung zwischen Mischgefäß und Luft, als auch für die zwischen dem eingetauchten heißen Körper und der Flüssigkeit gültig sey. Hr. Bohn läßt diese Annahme im ersteren Falle zu, bestreitet aber, daß sie im letzteren angewandt werden dürfe, da die Temperaturdifferenz hier im Minimum  $80^{\circ}$  C. betrage und das Newton'sche Gesetz erfahrungsmäßig nur für Temperaturunterschiede von höchstens  $20^{\circ}$  gelte. Er schließt hieraus und aus der Annahme, daß auch in den ersten Sekunden nach dem Eintauchen, einem sehr merklichen Bruchtheile der bis zum Eintritt des Maximums verfließenden Zeit, die Differenz noch größer als  $20^{\circ}$  sey, das Newton'sche Gesetz also und die Differentialgleichungen für kleine Werthe der Beobach-

sammengehalten zu werden, aus dem Heizapparate durch die kalte Flüssigkeit auf das Sieb des Mischgefäßes, breitet sich dort zu einer dünnen Schicht aus und wird dann sofort durch heftiges Auf- und Abbewegen des Siebes von Neuem mit der Flüssigkeit in Berührung gebracht. Es zeigt bei dieser Ausführung des Versuches selbst das seitlich am Mischgefäße angebrachte Thermometer bereits nach 3 bis 4 Sekunden weit über die Hälfte der schließlichen Temperaturerhöhung an. Ich habe deshalb geglaubt, mich nicht von der Wirklichkeit zu entfernen, wenn ich annehme, die kleinen Körperstücke haben schon nach der ersten, höchstens der zweiten Sekunde so viel Wärme verloren, daß ihr Temperaturüberschuß über die Flüssigkeit weniger als  $20^{\circ}$  C. beträgt, daß also nach der zweiten Sekunde das Newton'sche Gesetz für die Abkühlung hier schon Gültigkeit hat.

Direct nachweisen wird sich die Berechtigung zu dieser Annahme für den vorliegenden Fall allerdings kaum lassen; ich habe aber, um anderweitig Gewißheit hierüber zu erlangen ein Thermometer mit großem, ziemlich dickwandigem Gefäße von etwa 15 Gr. Quecksilber Inhalt auf  $100^{\circ}$  erhitzt, darauf unter mäßig starkem Bewegen in Wasser von  $18^{\circ}$  abgekühlt und gefunden, daß die Abkühlung auf  $40^{\circ}$ . also eine Temperaturdifferenz von etwa  $20^{\circ}$ , nach 3 Sekunden eingetreten war. Hiernach scheint die Annahme gerechtfertigt zu seyn, daß eine gleiche Abkühlung der sehr kleinen Stücke des untersuchten Körpers in der Zeit von 1 bis 2 Sekunden stattfinden könne, und daß nach dieser Zeit, wenn also die Temperaturdifferenz nur etwa  $20^{\circ}$  C. beträgt, das einfache Abkühlungsgesetz gültig sey. Es findet also bei der Annahme, daß dieß Gesetz, während der ganzen Beobachtungszeit gelte, ein Fehler von der Ordnung der Abweichung des angenommenen von dem strengen Gesetze nur in den ersten zwei Sekunden statt. Nun dauert die ganze Beobachtungszeit, vom Eintauchen des erhitzten Körpers bis zum wirklichen Maximum, d. h. dem arithmetischen Mittel aus der Anfangs- und Endzeit

demselben, wenn man die Versuche anstellt, wie ich sie beschrieben habe, gewöhnlich etwa 50 Sekunden, selten mehr und selten weniger. Der besprochene Fehler hat also nur Einfluss in dem ersten Zwanzigstel oder Dreissigstel der zu sich schon sehr kurzen Beobachtungszeit, und ich glaube, dass man nicht anstehen wird, ihn in diesem Falle zu vernachlässigen oder mit anderen Worten die volle Gültigkeit des Newton'schen Gesetzes und der darauf gegründeten Gleichungen anzunehmen.

Ich bemerke noch ausdrücklich, dass ich diese Gültigkeit nur bei der beschriebenen und leicht ausführbaren Einrichtung der Versuche annehme. Wird dagegen ein Körper in größeren Stücken oder durch ein Drahtkörbchen zu einer, für die freie und möglichst vielseitige Berührung mit der Flüssigkeit weniger günstigen dickeren Schicht zusammengehalten angewandt, so dass eine schnelle Wärmeabgabe nicht möglich ist, so bin ich gleichfalls der Ansicht, dass es dann weniger gerechtfertigt seyn wird, die Gleichungen in ihrer bisherigen Form anzuwenden, wenn ich auch meine, dass der dadurch begangene Fehler selbst dann

schreibt, und von denen bei Anwendung derselben allein die Rede seyn kann. Nachdem das Maximum für die entscheidende Temperaturbeobachtung gewählt war, sind die Verhältnisse aufgesucht, unter denen diese Temperatur sich wirklich scharf und für das Resultat des Versuches günstig beobachten liesse. Es ist hierzu nöthig und genügt vollkommen, wenn die Zeit bis zum Eintritt des Maximums und die Dauer desselben sehr kurz ist. Durch eine möglichste Zerkleinerung des Körpers wird dieß erreicht, und wesentlich aus diesem Grunde ist für die benutzte Methode die Anwendung des Körpers in sehr kleinen Stücken zur Bedingung gemacht.

Das Maximum selbst läßt sich sehr scharf beobachten, dabei tritt es bei dem von mir gewählten Verhältnisse zwischen den Gewichten der Flüssigkeit und Substanz nach etwa  $\frac{3}{4}$  Minuten ein und dauert nur 10 oder 15, höchstens 20 Sekunden. Es kann also nur ein sehr kleiner Fehler begangen werden, wenn man für die Zeit seines wirklichen Eintritts, das Mittel aus seiner Anfangs- und Endzeit einführt, wie das an betreffender Stelle gezeigt ist. Auch angenommen die Beobachtung der Zeit, in welcher das Maximum der Wahrscheinlichkeit nach eintritt, also des eben genannten Mittels, sey um 5 Sekunden irrig — und so viel kann man bei der für eine genaue Beobachtung vollkommen ausreichenden Dauer des Maximums selbst im aller ungünstigsten Falle in Wirklichkeit nicht annehmen — so wird dadurch die an sich schon fast zu vernachlässigende Correction, die von dieser Zeit abhängt, gar nicht verändert.

Ich glaube also nicht, daß etwas gegen die Wahl des Maximums zu erinnern seyn wird, vielmehr bin ich der Ansicht, daß man schwerlich einen günstigeren Moment zur Beobachtung wählen könnte. Allerdings, wenn der Körper in größeren Stücken angewandt wird und aus diesem oder einem anderen Grunde die Zeit bis zum Anfang des Maximums und seine Dauer bedeutend länger währen, wird eine wahrscheinliche Annahme über den Zeitpunkt des wirkli-

chen Maximums, wie es bei Abwesenheit jedes Wärmeverlustes an die Luft seyn würde, schwer zu machen seyn und man wird unter derartigen Verhältnissen das Maximum als solches für eine so wichtige Beobachtung nicht wählen dürfen.

Ist man genöthigt, was indess selten vorkommen wird, den zu untersuchenden Körper in größeren Stücken anzuwenden, so wird man sich im Interesse der Zuverlässigkeit des Resultates aus den verschiedenen, bei Besprechung der Versuche des Hrn. Regnault hervorgehobenen Gründen einer anderen, wenn auch weniger einfachen und mühsamer zum Ziele führenden Methode bedienen oder auf eine größere Genauigkeit verzichten müssen. Ich glaube, daß in einem solchen Falle die zwar mühsame und viel Zeit erfordernde Methode sehr gut zum Ziele führen wird, die Hr. Bohn vorschlägt. Es tritt bei derselben zwar die Beschränkung ein, daß der untersuchte Körper eine möglichst große Wärmecapacität haben muß, weil er sonst mit einem zu geringen calorischen Werthe in der Flüssig-

**IV. Ueber die Concentration der Luftarten;  
von Prof. Dr. A. Krönig.**

---

**I**ch habe vor Kurzem die erste Hälfte eines Buches erscheinen lassen, welches betitelt ist: »Die Chemie, bearbeitet als Bildungsmittel für den Verstand«. Jeder, der sich mit den chemischen Lehrbüchern der neueren Zeit einigermaßen bekannt gemacht hat, wird, wie mir scheint, zugeben müssen, daß das meinige an Eigenthümlichkeit der Auffassung von allen seinen Vorgängern mehr verschieden ist als irgend zwei der letzteren von einander. Hieran knüpft sich jedoch unmittelbar die Frage, ob meine neuen Ansichten für einen Fortschritt oder vielmehr für einen Rückschritt der Wissenschaft zu halten sind. Mir selbst steht ein Urtheil hierüber natürlich nicht zu. Aber ich halte es wohl für möglich, daß auch mancher gründlich gebildete Chemiker nicht günstig über mein Buch urtheilen wird. Ich möchte auseinandersetzen, was mich zu dieser Vermuthung veranlaßt.

Ich glaube zwar, daß derjenige, welcher ohne vorgefaßte Meinung den Inhalt meines Buches in sich aufnimmt, über die sämtlichen Erscheinungen der Natur im Allgemeinen und über die chemischen im Besonderen soviel Klarheit daraus schöpfen wird, wie ein Buch von solcher Ausdehnung sie eben zu geben vermag. Wer aber die aus anderen Lehrbüchern der Chemie geschöpften Anschauungen für unumstößlich richtig hält, der wird in dem meinigen, vom Anfang bis zum Ende hin, sehr zahlreiche Irrthümer zu entdecken glauben. Indessen kann ich doch versichern, daß ich mich zu keinem dieser Irrthümer ohne reifliche Ueberlegung entschlossen habe, und ich darf an die etwaigen Leser meines Buches die Bitte richten, jeden derartigen Irrthum als einen Verbesserungsvorschlag zu betrachten, der immer selbst verfehlt seyn mag, der aber ziemlich

sicher auf eine Unvollkommenheit der bisherigen Anschauungsweise hindeutet.

Man wird mich nun mit Recht fragen, warum ich nicht jedem meiner Amendements sogleich auch die Motive beigefügt habe. Meine Antwort hierauf ist, daß ich aus Gründen, deren Darlegung nicht hierher gehört, die Absicht hatte, ein *elementares* Lehrbuch der Chemie zu schreiben. Aber diese Ansicht, von der ich nie abgewichen zu seyn glaube, erlaubte mir nur in sehr seltenen Fällen eine Vergleichung zwischen meiner Auffassungsweise und der bisher in den Lehrbüchern vorgetragenen.

In Nachstehendem möchte ich mir erlauben, einem wissenschaftlichen Publikum kurz die Gründe darzulegen, die mich veranlaßten, die so allgemein angenommene Dalton'sche Theorie zu verwerfen.

Bei Besprechung des Verhaltens der Luftarten im Allgemeinen, sowie des Verhaltens heterogener Luftarten zu einander im Besonderen, würde ich geglaubt haben, von dem Gebiete der eigentlichen Chemie weiter als ich es mir



Meinung hier factisch vorhanden sind, etwas näher eingehen.

Ich wende mich zuerst zu der allgemeinen Anschauung der Dalton'schen Theorie, welche besagt, daß heterogene Gasatome sich gegenseitig nicht abstossen.

Ich habe über Fragen dieser Art eine besondere Ansicht, auf die ich etwas ausführlicher eingehen muß. Ich denke mir einen Tisch. Auf demselben liege ein fester Körper, beide Körper können nach Belieben unelastisch oder elastisch seyn. Der Tisch stehe auf der Erde und es wirke also auf den Körper, dem der Tisch zur Unterlage dient, die Schwerkraft. Nun betrachte ich es als unumstößliches Gesetz, daß ein Körper, der sich in Ruhe befindet, nur so lange in Ruhe verbleiben kann, als die Resultante der auf ihn wirkenden Kräfte gleich Null ist. Da nun auf den betrachteten Körper, der Annahme nach, die Schwerkraft wirkt, und da trotz dessen sein Schwerpunkt in Ruhe verbleibt, so folgt, daß außer der Schwerkraft noch eine zweite Componente auf den Körper wirken muß, die mit der Schwerkraft zusammen die Resultante Null erzeugt. Soweit meine Einsicht reicht, kann diese zweite Componente keine andere seyn als eine, von dem Tische ausgehende, gegen den besprochenen Körper ausgeübte Abstossung. Wenn der Tisch nicht auf jeden Körper, der ihm hinreichend nahe kommt, eine Abstossung ausübt, was sollte denn diesen Körper verhindern, in den Raum einzudringen, in welchem sich der Tisch bereits befindet. Nichts anderes als eine derartige von dem Tische ausgehende Abstossungskraft kann, soweit ich es einsehe, den Tisch befähigen, aus dem von ihm eingenommenen Raume jeden anderen Körper auszuschließen.

Die vorstehende Schlußfolgerung ist nach meinem Dafürhalten so einfach und klar, daß es eine einfachere und klarere kaum geben kann. Dennoch glaube ich, daß wenige Physiker derselben beizupflichten geneigt seyn werden. Ich kann aber versichern, daß ich, trotz jahrelanger Mühe,

nicht habe entdecken können, in welchem Punkte mein Schluss fehlerhaft seyn mag.

Mit dem Worte »Kraft« bezeichnet man eine Ursache, welche eine Bewegung hervorbringen oder abändern kann. Nach meinen Vorstellungen über Mechanik ist es aber, wenn man nicht große Confusion erzeugen will, nothwendig, nicht einige nach Belieben ausgewählte Ursachen von Bewegung oder Bewegungsänderung, sondern *jede* derartige Ursache mit dem Namen Kraft zu belegen, und *alle* diese Ursachen als denselben Gesetzen unterworfen zu betrachten.

Ich kann deshalb das Verfahren solcher Physiker nicht verstehen, welche bei der Betrachtung rein mechanischer Vorgänge außer den Kräften, die sie Kräfte nennen, noch andere Kräfte wirksam seyn lassen, die nicht Kräfte genannt werden und in Folge dessen auch wirklich keine Kräfte seyn sollen.

Dieses thut zum Beispiel Šubic in seinen »Grundzügen

wurf der mechanischen Theorie der Elektrizität und des Magnetismus der Oeffentlichkeit«.

Es ist aber leicht zu sehen, daß Šubic sich im Irrthum befindet, wenn er meint, daß die Elementartheilchen, die er sich vorstellt, keine andere Wirkung auf einander ausüben als die aus dem Gravitationsgesetz hervorgehende. In §. 1 betrachtet er »die Bewegung zweier Elementartheilchen der Materie, welche ihren alleinigen materiellen Anziehungen nach dem allgemeinen Gravitationsgesetze unterworfen sind«. Er entwickelt die Bewegungsgesetze von zwei Elementartheilchen, deren Massen  $m_1$  und  $m_2$  sind, welche zur Zeit  $t=0$  sich in Ruhe befinden und nach dem umgekehrten Verhältniß des Quadrats ihrer Entfernung sich gegenseitig anziehen. Beide bewegen sich so, daß ihr gemeinschaftlicher Schwerpunkt in Ruhe bleibt. Bei dieser Bewegung nimmt die anfängliche Entfernung der beiden Theilchen von einander mehr und mehr ab, und es ist nicht zu ersehen, auf welche Weise aus der Gravitationsanziehung allein, neben welcher keine andere Kraft auf die Theilchen wirken soll, die letzteren verhindert werden können, bis zum Abstände 0 sich zu nähern. So sagt denn auch Šubic auf Seite 9: »Aus diesen allgemeinen Ausdrücken für die Geschwindigkeit und die Zeit läßt sich die Zeit des Eintreffens der Massen  $m_1$  und  $m_2$  am Orte des Schwerpunktes, und auch die Geschwindigkeit bestimmen, mit welcher  $m_1$  und  $m_2$  daselbst ankommen.«

Es ist aber Šubic's Absicht, daß die beiden Massentheile nicht bis zu ihrem Zusammenfallen im Schwerpunkte sich anziehen sollen, vielmehr beide Massen in einem gewissen Abstände von ihrem gemeinschaftlichen Schwerpunkt nicht allein ihre respectiven Geschwindigkeiten ganz verlieren, sondern sogar vollständig umkehren. Nun ist wohl *a priori* klar, daß, wenn ein Körper aus der Geschwindigkeit  $c$  in die Geschwindigkeit  $-c$  übergehen soll, zu dieser Geschwindigkeitsveränderung, sowie zu jeder Geschwindigkeitsveränderung, eine Kraft erforderlich ist. Da außerdem auf das erste Theilchen keine andere als eine

von dem zweiten betrachteten Theilchen ausgehende Kraft wirken soll, so ist es auch klar, daß die Verwandlung der Geschwindigkeit  $c$  des ersten Theilchens in die Geschwindigkeit —  $c$  nur durch eine von dem zweiten Theilchen ausgehende Abstossung hervorgebracht werden kann. Wie verfährt nun Subic? Er leitet zuerst mit vollkommener Genauigkeit die Zeit ab, nach deren Verlauf die beiden Massen  $m_1$  und  $m_2$  in ihren gemeinschaftlichen Schwerpunkt eintreffen müssen. Darauf aber nimmt er an, daß die beiden Massen  $m_1$  und  $m_2$  ein Volumen haben, daß sie kugelförmig sind, daß die Radien der Kugeln bezüglich gleich  $r_1$  und  $r_2$  sind, und daß die beiden Molecüle in Folge dessen nur bis zu dem Abstände  $r_1 + r_2$  ihrer Schwerpunkte sich nähern können, daß sie in dieser Entfernung »zusammenstoßen« und nach den Gesetzen des Stosses vollkommen elastischer Körper auf einander wirken. Hier ist doch gewiss die Frage gerechtfertigt, was denn bei alleiniger Zugrundelegung des Gravitationsgesetzes die Ausdrücke Volumen, Zusammenstoß und Elasticität für

kein Körper ein *constantes* Volumen hat. Es ist kein Körper bekannt, dessen Volumen sich nicht mehr und mehr verkleinerte, mit je stärkeren Kräften man ihn zusammen-drückt. Bei elastischen Körpern besonders ist dieses Verhalten aus dem Versuche, bei welchem man eine Elfenbeinkugel auf eine mit Ruß überzogene Marmorplatte fallen läßt, ganz allgemein bekannt. Will Šubic annehmen, daß Molecüle sich in dieser Beziehung anders verhalten, wie Körper, und daß zwei kugelförmige Molecüle, sobald ihre Schwerpunkte einander bis auf die oben genannte constante Entfernung  $r_1 + r_2$  nahe gekommen sind, plötzlich eine Geschwindigkeitsänderung erfahren müssen, die je nach der Geschwindigkeit, mit welcher die beiden Molecüle den Schwerpunktsabstand  $r_1 + r_2$  erreicht haben, jede beliebige GröÙe annehmen kann?

Diese Annahme würde mir sehr bedenklich vorkommen. Die neuere Naturforschung ist, soweit meine Kenntniß derselben reicht, durchaus der Ansicht, daß alle Kräfte nur als Functionen von Entfernungen, nicht aber als Functionen von Geschwindigkeiten zu betrachten sind, und ich meine, daß auch Šubic dieser Ansicht vollkommen beipflichtet. Die Annahme aber, daß zwei Molecüle, sobald sie den constanten Schwerpunktsabstand  $r_1 + r_2$  erreicht haben, eine Wirkung auf einander ausüben, die von  $r_1 + r_2$  unabhängig und nur eine Function der Geschwindigkeiten der beiden Molecüle ist, steht mit jener Annahme offenbar in directem Widerspruch.

Möge mir Šubic diesen Angriff nicht übel nehmen. Sollte auch mein Einwand gerechtfertigt seyn, so ist es doch sehr gut möglich, daß seine Theorie in ihrem weiteren Verlaufe garnicht dadurch alterirt wird. Ich habe dieselbe zu meinem Bedauern nicht weiter verfolgen können, da mir durch ein hartnäckiges Augenleiden schon seit drei Jahren das Lesen fast vollständig unmöglich gemacht ist.

Ich möchte es für dienlich halten hier noch einen Einwand abzuwehren, den, wie ich glaube, manche Mathematiker mir entgegenzustellen geneigt seyn werden. Nimmt

man nämlich an, daß zwei anfangs ruhende Molecüle einzig und allein dem Gravitationsgesetz unterworfen sind, so werden sie aus der Ruhe in eine allmählich immer schneller werdende Bewegung übergehen, dann in einem und demselben Punkte des Raumes eintreffen — ich wiederhole, daß, wenn man keine andere Kraft als die Gravitation annimmt, die Begriffe Volumen, Stofs, Elasticität nicht existiren — und dann, nachdem die beiden Molecüle, nach gewöhnlicher Auffassungsweise ausgedrückt, sich gegenseitig durchdrungen haben, in unveränderter Richtung weitergehen. Sind die beiden Molecüle einander ganz gleich, so läßt es sich gar nicht bestimmen, ob die beiden Molecüle durch einander hindurchgegangen, oder ob sie von einander zurückgeprallt sind. Sind aber die beiden Molecüle ungleich, so lehrt die Erfahrung mit Bestimmtheit, daß jedes Molecül nach derselben Seite zurückkehrt, von der es gekommen ist. Eine solche Rückkehr kann aber auch durch die Gravitation allein bewerkstelligt werden. Wenn nämlich die Bewegung der beiden Molecüle bei ihrer Annä-

halb als bewiesen annehmen zu dürfen, daß die Erscheinung des Zurückprallens ohne Annahme abstossender Kräfte vollkommen unerklärlich ist.

Es mag seyn, daß ich in meinen Schlüssen irgend einen auf der Hand liegenden Punkt übersehe, der sonst jedermann klar ist. Aber ich kann diesen Punkt nicht ausfindig machen. Ebenso kann ich es mit dem besten Willen nicht verstehen, wenn man sagt, daß die Molecüle eines festen Körpers sich gegenseitig anziehen, und daß eben auf dieser Anziehung das Wesen des festen Aggregatzustandes beruht.

Wenn in Wahrheit auf ein Molecül, welches sich etwa an der Oberfläche eines festen Körpers befindet, die übrigen Molecüle anziehend einwirken, warum soll denn dieses Molecül der Anziehung nicht Folge leisten? Wirkt aber etwa auf das in Rede stehende Molecül, aufser der eben genannten Anziehung, noch eine eben so groÙe Abstossung — und dies muß meiner Meinung nach wirklich stattfinden, da ja das Molecül in Ruhe bleibt — heißt es dann nicht die Confusion auf die Spitze treiben, wenn man von zwei ganz gleich groÙen und also doch auch ganz gleich berechtigten Kräften, die eine ausführlich besprechen zu müssen, die andere aber vollständig mit Stillschweigen übergehen zu dürfen meint? Man kann hiergegen nicht einwenden, daß bei einem durch äußere Kräfte dilatirten Körper die Molecüle allerdings sich einander nähern, sobald die dilatirenden Kräfte nicht mehr wirken; denn wenn man aus diesem Verhalten eines ausgedehnten Körpers auf eine gegenseitige Anziehung zwischen den Molecülen des nicht ausgedehnten Körpers schließen wollte, so müßte man aus dem Verhalten eines zusammengedrückten Körpers, dessen Molecüle beim Aufhören der Zusammendrückung sich von einander entfernen, eben so gut das Vorhandenseyn einer Abstossung zwischen den Molecülen folgern. Das genannte Verfahren der vollständigen Vernachlässigung gewisser Kräfte wird aber nicht etwa bloß von Physikern angewandt, die vielleicht bei ihren mechanischen Betracht-

tungen auf die tiefste Gründlichkeit keinen Anspruch erheben, sondern auch die ausgezeichnetsten Mathematiker machen es nicht anders, so zum Beispiel, wenn sie das Potential eines Körpers auf einen dem Körper selbst angehörigen Punkt berechnen. Mancher Studirende der Mathematik hat gewiss anfangs noch das Gefühl, daß ein Molecül, welches in einer gewissen Richtung angezogen wird, sich auch in dieser Richtung bewegen muß. Es ist aber seine Aufgabe, sich mit den so ausgedehnten und scharfsinnigen Untersuchungen über das Potential vertraut zu machen. Bei der Berechnung des Potentials eines Körpers auf einen dem Körper selbst angehörenden Punkt findet er, daß auf irgend einen Punkt die Resultante der Anziehungen aller übrigen Punkte in einer bestimmten Richtung wirkt. Dennoch weiß er aus der Erfahrung, daß derselbe Punkt jener Anziehung nicht folgt, und so gewöhnt er sich denn allmählich an den Gedanken, daß ein Punkt auf welchen eine gewisse Kraft wirkt, deshalb durch sie nicht zu einer Bewegung in der Richtung dieser Kraft ge-



**cül. oder der Körper unter der Einwirkung einer einzigen Kraft in Ruhe.**

Ich kehre zur Betrachtung der Luftarten zurück. Wenn die Atome einer Luftart die einer anderen Luftart nicht abstossen, so muß sich die erste Luftart in den von der zweiten eingenommenen Raum eben so schnell wie in einen luftleeren Raum ergiessen, und natürlich zu gleicher Zeit die zweite Luftart in den Raum der ersten. Dafs dies nicht der Fall ist, hat Bunsen sogar dem Gesichtssinn klar gemacht. Derselbe schreibt in seinen »Gasometrischen Methoden« auf Seite 209: »Füllt man eine lange, unten verschlossene, vertical stehende Glasröhre vom Boden aus zur Hälfte mit unterchloriger Säure oder einem anderen gefärbten Gase an, so ruht im oberen Theil des Rohres auf dem gefärbten Gase eine farblose Luftsäule. Pumpt man, bevor eine Vermischung erfolgt ist, einen Theil der Luft aus, so rückt die an der Farbe erkennbare Gränzfläche beider Gase mit dem zunehmenden Grade der Verdünnung aufwärts, wobei sich der durch seitlich an der Röhre angebrachte Manometer meßbare Druck in allen Schichten beider Gassäulen auf gleiche Weise ändert. Wir können daraus schliessen, dafs Theilchen substantiell verschiedener Gase dieselben Druckwirkungen auf einander ausüben, wie die Theilchen gleichartiger.«

Wie ist es denn überhaupt nur möglich gewesen, dafs die Ansicht in den von einer Luftart eingenommenen Raum könnte eine zweite Luftart ungehindert eindringen, sich so allgemein Eingang verschafft hat? Es rührt dieses jedenfalls von dem Verhalten her, welches beispielsweise das Wasser zeigt, wenn man es innerhalb eines mit trockener Luft gefüllten und wohl verschlossenen Gefäßes verdampfen läßt. Unter diesen Umständen nimmt allerdings der Raum, welcher die Luft schon enthält, noch eben so viel Wasserdampf auf, wie er aufgenommen haben würde, wäre er ganz luftleer gewesen. Zu gleicher Zeit aber vermehrt sich auch der innerhalb des Gefäßes stattfindende Druck. Das entstandene Gemenge von Wasserdampf und Luft übt

nicht allein auf die Gefäßwände einen Druck aus, welcher größer ist wie der vorherige Druck der trockenen Luft allein, sondern es üben auch die Gefäßwände, wie es sich von selbst versteht, auf das von ihnen umschlossene Gasgemenge einen größeren Druck aus wie vorher auf die trockene Luft. Damit dieser Erfolg eintreten konnte, hat jedenfalls auch eine Ausdehnung der inneren Gefäßwände und eine Vergrößerung des von denselben umgebenen Raumes stattgefunden, welche indess ihrer Kleinheit wegen für gewöhnlich schwer meßbar seyn wird.

Jeder Körper nimmt einen um so kleineren Raum ein, je stärker der auf ihn wirkende Druck ist. Von diesem Gesetze giebt es keine Ausnahme; feste, flüssige und luftförmige Körper sind demselben gleichmäfsig unterworfen, wenn auch die Gröfse der einem gegebenen Druck entsprechenden Volumenverminderung bei verschiedenen Körpern eine sehr verschiedene ist. Kann man sich hiernach darüber wundern, wenn bei dem eben besprochenen Versuche die in dem Gefäfs enthaltene Luft eine Raumvermin-

vermittelt eines Manometers messen. Man kann nach dem Mariotte'schen Gesetze leicht die entsprechende Volumenverminderung der Luft berechnen. Subtrahirt man das jetzige Volumen der trockenen Luft von ihrem früheren Volumen, so findet man den Raum, welchen der in dem Gefäß enthaltene Wasserdampf einnimmt. Man kann auch, statt das Gefäß sich mit Wasserdampf füllen zu lassen, der als luftförmiger Körper erst innerhalb des Gefäßes entsteht, an Stelle des Wasserdampfs, von aussen her, in das Gefäß entweder noch mehr Luft oder ein anderes permanentes Gas, oder einen festen Körper einführen. Die Druckverhältnisse innerhalb des Gefäßes bleiben immer dieselben, sobald der in das Gefäß neu eingeführte Körper hier dasselbe Volumen wie früher der Wasserdampf einnimmt.

Ist das mit Luft gefüllte Gefäß, innerhalb dessen die Verdampfung einer Flüssigkeit stattfindet, nicht hinreichend fest verschlossen, so ist auch gar nicht einmal der Anschein vorhanden, als ob der entstehende Dampf keinen Raum für sich in Anspruch nähme und also den vorher von der Luft eingenommenen Raum nunmehr mit dieser theilte. Zum Beweise hierfür kann unter anderem eine Beobachtung dienen, die jeder Physiker und Chemiker gewiss schon oft gemacht hat. Ich meine die Erscheinung, daß eine theilweise mit Aether gefüllte Flasche, in welche beim Ausgießen des Aethers neue Luft eingedrungen ist, der wieder aufgesetzte Stöpsel sich von selbst lüftet und zwar häufig mehrere Male hintereinander. Man kann die genannte Erscheinung natürlich noch sicherer hervorrufen, wenn man in eine Aetherflasche vermittelt einer Röhre Luft einbläst. In meinem Buche habe ich diesen, trotz seiner Einfachheit, ganz instructiven Versuch etwas ausführlicher besprochen, jedoch natürlich von dem Standpunkt meiner weiterhin darzulegenden Anschauungsweise aus betrachtet.

Man kann diese Erscheinung noch sicherer beobachten, wenn man in einen mit einem Gase gefüllten Cylinder

eine leicht verdampfende Flüssigkeit gießt und den Cylinder rasch durch eine mit Wasser benetzte Glasplatte schließt, so wie man es zu thun pflegt, wenn man ein Gemenge von Stickstoffoxyd und Schwefelkohlenstoffdampf anzünden will. Man sieht dann viele Luftblasen zwischen Cylinderrand und Glasplatte hindurch entweichen.

Ich meine es hiernach als feststehende Thatsache ansehen zu dürfen, daß eine gegebene Menge irgend einer Luftart, sey sie nun ein Dampf, ein condensirbares oder ein permanentes Gas, bei gegebener Temperatur und gegebenem Druck einen bestimmten Raum einnimmt, in welchem zu gleicher Zeit kein anderer fester, flüssiger oder luftförmiger Körper enthalten seyn kann. Ich bemerke nebenbei, daß die Bewegungstheorie der Luftarten ebenfalls zu diesem Resultate führt, da man ja nach dieser Theorie das Volumen eines Gases leicht als Function seines Gewichtes, seiner Dichtigkeit, seines Druckes und seiner Temperatur ausdrücken kann. Ich halte es somit für gerechtfertigt, wenn ich in meinem Buche die Lehre nicht repro-

Temperatur  $0^\circ \text{C}$ . Wie werden sich beide Gase in den Inhalt des Gefäßes theilen, wie groß werden ihre Dichtigkeiten und wie groß wird ihr Druck innerhalb des Gefäßes seyn?

Das Volumen, welches das erste Gas einnimmt, sey bezeichnet durch  $v_1$ , das Volumen des zweiten Gases durch  $v_2$ ; es ist also  $v_1 + v_2 = v$ . Die Dichtigkeit  $D_1$  des ersten Gases ist  $= \frac{g_1}{g_0 v_1}$ , wenn  $g_0$  das Gewicht von 1 Liter Luft bei normaler Dichtigkeit bedeutet. Ebenso ist die Dichtigkeit  $D_2$  des zweiten Gases  $= \frac{g_2}{g_0 v_2}$ .

Den Druck  $p_1$  des ersten Gases findet man aus der Gleichung  $\frac{p_1}{p_0} = \frac{D_1}{d_1}$ , worin  $p_0$  den Druck einer Atmosphäre bedeutet, zu  $p_1 = \frac{D_1}{d_1} p_0 = \frac{p_0 g_1}{g_0 v_1 d_1}$ . Ebenso findet sich der Druck  $p_2$  des zweiten Gases  $p_2 = \frac{p_0 g_2}{g_0 v_2 d_2}$ . Es ist hierbei vorausgesetzt, daß die in dem Gefäß enthaltenen Gase der Wirkung der Schwerkraft entzogen sind. Wäre diese Bedingung nicht erfüllt, so würden die Drucke  $p_1$  und  $p_2$  nicht constant, sondern vielmehr mit der Höhe der Horizontalschichten veränderlich seyn. Nach einem allgemein anerkannten Gesetze ist nun  $p_1 = p_2$ ; wir wollen deshalb statt  $p_1$  und  $p_2$  einfach  $p$  schreiben. Aus den Gleichungen  $\frac{p_0 g_1}{g_0 v_1 d_1} = \frac{p_0 g_2}{g_0 v_2 d_2}$  und  $v_1 + v_2 = v$  findet man

$$v_1 = \frac{v \frac{g_1}{d_1}}{\frac{g_1}{d_1} + \frac{g_2}{d_2}}, \quad v_2 = \frac{v \frac{g_2}{d_2}}{\frac{g_1}{d_1} + \frac{g_2}{d_2}}$$

und

$$p = \frac{p_0 g_1}{g_0 v_1 d_1} = \frac{p_0}{g_0 v} \left( \frac{g_1}{d_1} + \frac{g_2}{d_2} \right).$$

Ferner findet man

$$D_1 = \frac{d_1}{g_0 v} \left( \frac{g_1}{d_1} + \frac{g_2}{d_2} \right) \text{ und } D_2 = \frac{d_2}{g_0 v} \left( \frac{g_1}{d_1} + \frac{g_2}{d_2} \right).$$

Es mag mir gestattet seyn der gefundenen allgemeinen Lösung ein Zahlenbeispiel hinzuzufügen.

Die Aufgabe heie: In einem Gef von 10 Liter Inhalt befinden sich, vermittelt einer luftdichten Membran von einander getrennt, 1 Grm. Wasserstoff und 5 Grm. Stickstoff; beide haben die Temperatur  $0^{\circ}$  C. Wie werden sich beide Gase in den Inhalt des Gefes theilen, wie gro werden ihre Dichtigkeiten und wie gro wird ihr Druck innerhalb des Gefes seyn?

Es ist  $v = 10$  Litre,  $g_1 = 1$  Grm.,  $g_2 = 5$  Grm.,  $d_1 = \frac{10}{144}$  <sup>1)</sup>

$$d_2 = \frac{35}{36}, \quad g_0 = \frac{144,9}{1000} \text{ Grm.}$$

Es findet sich

$$v_1 = \frac{140}{19} = 7,37;$$

$$v_2 = \frac{50}{19} = 2,63.$$

$$D_1 = \frac{475}{4536} = 0,105;$$

$$D_2 = \frac{475}{324} = 1,46.$$

$$p = \frac{95}{63} = 1,51;$$

Es ist leicht zu sehen, wie die vorbergehenden Formeln sich gestalten, wenn die fr beide Gase gleiche Temperatur nicht  $0^{\circ}$ , sondern  $t^{\circ}$  C. betret. Es bleiben dann

Hierin setze ich

$$\alpha = \frac{11}{3000}.$$

In Fortsetzung des vorigen Zahlenbeispiels sey  $t = 20^\circ \text{ C.}$

Es ergibt sich  $p = \frac{437}{270} = 1,62$  Atmosphären.

Wird nun in dem hier betrachteten Gefäß die zwischen den beiden verschiedenen Luftarten befindliche Membran schnell oder langsam, ganz oder theilweise entfernt, so ist die inhaltschwere Frage aufzuwerfen: Welche Veränderungen erleiden  $p_1$  und  $p_2$ ,  $v_1$  und  $v_2$ ,  $D_1$  und  $D_2$ ? Nach meiner Meinung ist die Antwort auf diese Frage so einfach, daß eine noch einfachere nicht möglich ist. Nach meiner Auffassung erleidet nämlich keine der genannten Größen auch nur die allergeringste Veränderung. Die einzige Aenderung, die eintritt, besteht darin, daß die beiden verschiedenen Gase sich von selbst mehr oder weniger schnell mit einander vermengen. Die beiden Luftarten verhalten sich also zu einander wie zwei beliebige feste oder flüssige Körper, bei deren Vermengung jedes Theilchen jedes Körpers seine frühere Dichtigkeit beibehält. Solche Flüssigkeiten, die durch einander diffundiren, verhalten sich dabei, von dem Werthe einer constanten abgesehen, ganz ebenso wie Luftarten. Sie vermengen sich nämlich von selbst vollständig mit einander, nur gebrauchen sie dazu eine längere Zeit. Feste Körper können nur durch äußere Kräfte vermengt werden. Auch ist die Vollständigkeit der Mengung eine Function der Feinheit des Pulverisirens.

Um das ganz analoge Verhalten von Luftarten, Flüssigkeiten und festen Körpern bei dem beschriebenen Versuche genau zu verfolgen, ist es gut, die oben gestellte Bedingung, daß der Inhalt des gegebenen Gefäßes der Wirkung der Schwerkraft entzogen sey, nicht aufzugeben. Es versteht sich indessen, daß Flüssigkeiten oder feste Körper, wenn ihr Verhalten dem der Luftarten parallel bleiben soll, einem Druck unterworfen seyn müssen, der größer als Null ist. Denn die Fähigkeit, unter dem Drucke

Null oder gar unter einem negativen Drucke zu existiren, besitzen nur flüssige und feste Körper, nicht aber Luftarten. Bei festen Körpern ist es endlich auch noch nöthig, daß ihr Druck in allen verschiedenen Richtungen gleich ist, da Flüssigkeiten und Luftarten die Fähigkeit, in verschiedenen Richtungen einen ungleichen Druck zu erleiden oder auszuüben, nicht theilen.

Es scheint mir, daß man meiner Anschauungsweise den Vorzug der Einfachheit nicht streitig machen kann. Eine nähere Vergleichung derselben mit der Art, wie die Anhänger der Dalton'schen Theorie den beschriebenen Vorgang auffassen, ist mir kaum möglich, da ich mich eben in jene Theorie nicht hineinzufinden weiß. Jedenfalls glaube ich, daß der Vorgang für die Daltonianer ein sehr complicirter ist, indem alle obigen Größen, die ich für unveränderlich erkläre, allmählich (da ja die Vermengung nur allmählich erfolgt) immerfort neue Werthe annehmen müssen.

Wollte man den beschriebenen Versuch in der Weise modificiren, daß man in das gegebene Gefäß von 10 Litre



0° C. und unter dem Druck einer Atmosphäre ist  $\frac{5}{8}$ . Dies ist also die ideelle normale Dichtigkeit des Wasserdampfs.

Es ist zwar die wirkliche Dichtigkeit jedes *existirenden* Dampfes seiner ideellen Dichtigkeit stets gleich. Es treten aber Verhältnisse ein, unter denen irgend ein Dampf nicht zu existiren vermag, und unter solchen erst später zu besprechenden Verhältnissen kann natürlich von einer Gleichheit der ideellen und der wirklichen Dichtigkeit nicht mehr die Rede seyn. So hat Wasserdampf unter dem Druck einer Atmosphäre und bei 0° C. die Dichtigkeit  $\frac{5}{8}$ . Für die Existenz dieses Wasserdampfs ist es aber Bedingung, daß er mit einer grossen Quantität irgend einer anderen Luftart gemengt sey. *Reiner* Wasserdampf kann unter dem Druck einer Atmosphäre bei 0° C. nicht existiren, und von der wirklichen Dichtigkeit des reinen Wasserdampfs unter dem Druck einer Atmosphäre und bei 0° C. kann also überhaupt garnicht die Rede seyn. Der concrete Fall, den ich ins Auge fassen will, ist so gewählt, daß die ideelle Dichtigkeit des Wasserdampfs nicht ausserhalb der Grenzen der Möglichkeit liegt.

In einem Gefäfs von 15 Liter Inhalt seyen 2 Decigram. Wasserdampf von 30° C. enthalten. Wir haben  $p_0 = 1$  Atmosphäre,  $g_0 = \frac{9 \cdot 144}{1000}$  Grm.,  $v = 15$  Litre,  $g_1 = \frac{2}{10}$  Grm.

$$g_2 = 0, d_1 = \frac{5}{8}, \alpha = \frac{11}{3000}, t = 30.$$

Wir finden

$$p = \frac{p_0}{g_0 v} \left( \frac{g_1}{d_1} + \frac{g_2}{d_2} \right) (1 + \alpha t) = \frac{37}{2025} = 0,0183 \text{ Atmosphären}$$

$$D_1 = \frac{g_1}{g_0 v} = \frac{5}{486} = 0,0103.$$

Man lasse nun in das Gefäfs Luft einströmen und zwar etwa soviel, daß sich der Druck auf  $\frac{1}{2}$  Atmosphäre erhöht, während die Temperatur ungeändert gleich 30° C. bleibt. Es ist dann  $d_2 = 1$ , der nunmehrige Druck  $p = \frac{1}{2}$ . Was uns besonders interessiren muß, ist das nunmehrige  $D_1$ , nämlich die jetzige Dichtigkeit des Wasserdampfes. Um

$D_1$  zu bestimmen, kann man  $g_2$ , das Gewicht der einge-  
drungenen Luft, berechnen aus der Gleichung

$$\frac{g_2}{d_2} = \frac{p g_1 v}{p_0 (1 + \alpha t)} - \frac{g_1}{d_1},$$

um den gefundenen Werth

$$g_2 = \frac{7804}{925} = 8,44 \text{ Grm.}$$

einzusetzen in

$$D_1 = \frac{d_1}{g_2 v} \left( \frac{g_1}{d_1} + \frac{g_2}{d_2} \right)$$

Einfacher jedoch entwickelt man

$$\frac{D_1}{p} = \frac{d_1}{p_0 (1 + \alpha t)}.$$

Es ergibt sich

$$D_1 = \frac{125}{444} = 0,282.$$

Der Wasserdampf hat also seine Dichtigkeit von 0,0103  
auf 0,282 erhöht, um der eintretenden Luft Platz zu ma-  
chen.

Ich glaube nun mit Evidenz dargethan zu haben, daß

maßen vertheidigen, aber nach meinem Urtheil nicht stichhaltige Weise. Wenn ein Gasmenge auf einen festen oder flüssigen Körper drückt, so kann man von dem Druck allerdings sagen, daß er zum Theil von dem ersten, zum Theil von dem zweiten usw. Gemengtheile ausübt wird. Es ist dabei auch gleichgültig, ob man die ersten Theile der Gase als ruhend, oder nach der neueren Theorie als in fortwährender Bewegung begriffen ansetzt. Warum, so wird man mich fragen, soll es nicht erlaubt seyn, den in Wirklichkeit vorhandenen Gesamtdruck in die Theile, aus denen er besteht, zu zerlegen?

Es scheint hier ein Paradoxon vorzuliegen. Ich habe früher erklärt, daß jedes kleinste Theilchen eines Gasgesetzes unter demselben Druck steht und denselben Druck hervorbringt; jetzt aber muß ich zugeben, daß im Knallgas zum Beispiel zwei Drittel des gesamten Drucks durch Wasserstoff hervorgebracht werden, wogegen von dem Sauerstoff nur ein Drittel des Drucks herrührt.

Die Ursache dieses scheinbaren Widerspruchs liegt darin, daß man das Wort Druck in zwei verschiedenen Bedeutungen gebraucht. Die beiden durch dasselbe Wort Druck bezeichneten Begriffe stehen zu einander in derselben Beziehung wie etwa die Begriffe Weg und Geschwindigkeit. Weg ist eine von einem bewegten Punkte durchlaufene Linie. Unter Geschwindigkeit versteht man den wahren oder scheinbaren Weg einer Zeiteinheit, welche man nach Belieben auch unendlich klein wählen kann, zurückgelegten Weg. Druck ist man eine Abstossung, welcher durch eine Gegenkraft (entweder Druck oder Zug seyn kann) das Gleichgewicht gehalten wird. Zweitens aber versteht man unter Druck noch etwas anderes, nämlich den auf eine Fläche ausgeübten Druck. Dieses Ausdrucks will ich mich hier der Kürze halber bedienen, obwohl ich der Ansicht bin, daß in der unseren Sinnen zugänglichen und deshalb allein von uns zu betrachtenden Wirklichkeit, und wenn sie sich nebst dem als Bruchtheil einer Wellenlänge auszudrückenden Gangunterschiede zweier Lichtstrahlen den etwa nach Siriusweiten zu messenden Umfang der gesamten Milchstraße umfaßt, weder etwas unendlich Kleines noch etwas unendlich Großes existirt.

einheit wirkenden Druck. Um jedem bei der Doppeldedeutigkeit des Wortes Druck leicht möglichen Mißverständniß vorzubeugen, will ich die erste Art des Druckes, bei welcher die GröÙe der von demselben betroffenen Fläche nicht berücksichtigt wird, nicht mehr Druck, sondern Pressung benennen. So wie eine Geschwindigkeit den während der Zeiteinheit zurückgelegten Weg bedeutet, so soll das Wort Druck die auf eine Flächeneinheit wirkende Pressung bezeichnen. Zur Messung einer Pressung gebraucht man die Waage; um einen Druck zu messen, bedient man sich des Manometers. Zur Beschreibung eines Weges ist nur Längenmaaß erforderlich, zur Beschreibung einer Geschwindigkeit Längenmaaß und Zeitmaaß. Zur Beschreibung einer Pressung sind nur Gewichte erforderlich. Zur Beschreibung eines Drucks aber Gewichte und Flächen. So kann man sagen: Ein Druck beträgt 7 Pfd. auf einen Quadratzoll. Häufiger aber mißt man einen Druck durch eine gleichartige GröÙe, das heißt durch einen anderen Druck, und spricht also beispielsweise von einem Druck

lich von dem für gewöhnlich zu vernachlässigendem Einflusse, den das Gewicht des Luftgemenges ausübt, und welcher einen mit wachsender Entfernung vom Erdmittelpunkte abnehmenden Druck bedingt). Wenn die im Obigen dargelegten Ansichten richtig sind, so hat es eben keinen Sinn etwa im Knallgase dem Wasserstoff einen anderen Druck als dem Sauerstoff beizulegen.

Mit der Pressung, die ein Luftgemenge hervorbringt, verhält es sich zwar anders. Man kann diese Pressung recht wohl nach den verschiedenen Bestandtheilen des Gemenges in einzelne Theile zerlegen. Ich muß indessen gestehen, daß mir diese Anschauungsweise keinerlei Vorthail mit sich zu bringen scheint. Hiermit meine ich die Vorstellung von Partialdrucken, welche die verschiedenen Bestandtheile eines Luftgemenges ausüben sollen, zurückgewiesen zu haben. Ich muß mich endlich noch zu der Auffassung wenden, nach welcher jeder Bestandtheil eines Luftgemenges eine besondere Elasticität, Spannung oder Expansivkraft besitzt. Zum Beweise der Unhaltbarkeit dieser Vorstellung wüßte ich etwas Neues kaum noch anzuführen. Denn wenn alle Theilchen eines Luftgemenges denselben Druck ausüben oder auch erleiden, so besitzen auch alle Theilchen gleiche Elasticität. Bei Luftarten werden eben die Ausdrücke Druck und Elasticität in identischem Sinne gebraucht. Nur pflegt man bei der Elasticität, stillschweigend und als ob sie sich ganz von selbst verstände, die Voraussetzung zu machen, daß ein Luftgemenge eine totale Elasticität gar nicht besitzen kann, daß vielmehr eine Elasticität nothwendigerweise auf eine homogene Luftart bezogen werden muß. Hiermit steht es im Einklang, daß man zwar häufig von Partialdrucken, nicht aber von Parzialelasticitäten zu sprechen pflegt.

Ich will indessen nicht verschweigen, daß der Begriff der Elasticität der Luftarten sehr leicht zu einem Mißverständniß Veranlassung geben kann. Diefß besteht darin,

also der, welcher keine Luftart enthält, ein Luftgemenge, ein Gemenge von verschiedenen Luftarten.

dafs man meint, der Druck der Luft sey ein für allemal eine Folge ihrer Elasticität. Diese Meinung ist unrichtig. Wenn man eine elastische Spiralfeder auf eine Waagschale legt, so bestimmt man nicht ihre Elasticität, sondern ihr Gewicht oder ihre Pressung. Dasselbe würde stattfinden, wenn man die elastische Feder auf das Quecksilber in den kurzen Schenkel eines Barometers brächte. Auch hier würde man an dem Steigen des Quecksilbers im langen Schenkel nicht die Elasticität der Feder, sondern nur den durch die Vertheilung der Pressung der Feder auf den ganzen Querschnitt des Quecksilbers hervorgebrachten Druck beobachten. In einem oben offenen Gefäfse kann die Luft nach untenhin keine andere Pressung als die ihres Gewichtes ausüben, welche von ihrer Elasticität ganz unabhängig ist.

Diese sind die Gründe, die mich bewogen haben, in dem Eingangs dieser Abhandlung erwähnten Buche weder die Dalton'sche Theorie noch die daraus abgeleitete Lehre von Partialdrucken oder Spannungen zu erwähnen. Ich

**Temperatur  $t^\circ \text{C}$ .** Wie werden sich diese drei Luftarten in den Inhalt des Gefäßes theilen, wie groß werden ihre Dichtigkeiten und wie groß wird ihr Druck innerhalb des Gefäßes seyn?

Die Volume der drei Luftarten seyen bezüglich  $v_1, v_2, v_3$ ; es ist also  $v_1 + v_2 + v_3 = v$ . Die Dichtigkeit  $D_1$  des ersten Gases ist gleich  $\frac{g_1}{g_0 v_1}$ , wenn  $g_0$  das Gewicht von 1 Cubikfuß Luft bei normaler Dichtigkeit bedeutet. Ebenso hat man

$$D_2 = \frac{g_2}{g_0 v_2} \text{ und } D_3 = \frac{g_3}{g_0 v_3}.$$

Den Druck  $p_1$  der ersten Luftart findet man aus der Gleichung  $\frac{p_1}{p_0} = \frac{D_1}{d_1} (1 + \alpha t)$ , worin  $p_0$  den Druck einer Atmosphäre und  $\alpha$  den Ausdehnungscoefficienten der Luftarten bedeutet, zu

$$p_1 = \frac{D_1}{d_1} (1 + \alpha t) p_0 = \frac{p_0 g_1}{g_0 v_1 d_1} (1 + \alpha t).$$

Ebenso findet man

$$p_2 = \frac{D_2}{d_2} (1 + \alpha t) p_0 = \frac{p_0 g_2}{g_0 v_2 d_2} (1 + \alpha t)$$

$$p_3 = \frac{D_3}{d_3} (1 + \alpha t) p_0 = \frac{p_0 g_3}{g_0 v_3 d_3} (1 + \alpha t).$$

Da nun  $p_1 = p_2 = p_3$  ist, so wollen wir statt  $p_1, p_2$  und  $p_3$  einfach  $p$  schreiben.

$$\text{Aus } p = \frac{p_0 g_1}{g_0 v_1 d_1} (1 + \alpha t) \text{ findet man } \frac{v_1 d_1}{g_1} = \frac{p_0}{p g_0} (1 + \alpha t)$$

Der letztere Werth sey zur Abkürzung bezeichnet durch  $A$ ; dann hat man

$$v_1 = \frac{A g_1}{d_1}, \quad v_2 = \frac{A g_2}{d_2}, \quad v_3 = \frac{A g_3}{d_3}.$$

Durch Addition der drei letzten Gleichungen ergibt sich

$$v = A \left( \frac{g_1}{d_1} + \frac{g_2}{d_2} + \frac{g_3}{d_3} \right),$$

$$A = \frac{v}{\frac{g_1}{d_1} + \frac{g_2}{d_2} + \frac{g_3}{d_3}}.$$

Also hat man

$$v_1 = \frac{\frac{g_1}{d_1} v}{\frac{g_1}{d_1} + \frac{g_2}{d_2} + \frac{g_3}{d_3}}, \quad v_2 = \frac{\frac{g_2}{d_2} v}{\frac{g_1}{d_1} + \frac{g_2}{d_2} + \frac{g_3}{d_3}}, \quad v_3 = \frac{\frac{g_3}{d_3} v}{\frac{g_1}{d_1} + \frac{g_2}{d_2} + \frac{g_3}{d_3}}$$

und außerdem

$$p = \frac{p_0}{g_0 v} \left( \frac{g_1}{d_1} + \frac{g_2}{d_2} + \frac{g_3}{d_3} \right) (1 + \alpha t)$$

Endlich findet sich

$$D_1 = \frac{d_1}{g_0 v} \left( \frac{g_1}{d_1} + \frac{g_2}{d_2} + \frac{g_3}{d_3} \right)$$

$$D_2 = \frac{d_2}{g_0 v} \left( \frac{g_1}{d_1} + \frac{g_2}{d_2} + \frac{g_3}{d_3} \right)$$

$$D_3 = \frac{d_3}{g_0 v} \left( \frac{g_1}{d_1} + \frac{g_2}{d_2} + \frac{g_3}{d_3} \right)$$

Als Zahlenbeispiel mag das folgende dienen.

*Aufgabe:* Es sey das der ersten Seite der Gleichung



entsprechende Gemenge von 0,37 Loth (Zollloth) Aetherdampf und 0,96 Loth Sauerstoff, 3,36 Loth Stickstoff bei 15° C. und unter dem Druck einer Atmosphäre. Welchen Raum nehmen die drei Luftarten ein?

Es ist gegeben das Gewicht  $g_1$  des Aetherdampfes gleich 0,37 Loth, das Gewicht  $g_2$  des Sauerstoffs gleich 0,96 Loth, das Gewicht  $g_3$  des Stickstoffs gleich 3,36 Loth, ferner die ideelle normale Dichtigkeit  $d_1$  des Aetherdampfes, welche sich nach meinen Methoden zu  $\frac{185}{72}$  berechnet, die normale Dichtigkeit  $d_2$  des Sauerstoffs gleich  $\frac{10}{9}$ , die des Stickstoffs  $d_3 = \frac{35}{36}$ , endlich der Druck  $p = 1$ , die Temperatur  $t = 15^\circ \text{C}$ . Außerdem ist das Gewicht  $g_0$  von 1 Cubikfuß (rheinländisch) Luft gleich  $\frac{1}{7}$  Loth,  $\alpha = \frac{11}{3000}$ ,  $p_0 = 1$  Atmosphäre.

Aus dem Ausdruck für  $p$  ergibt sich unmittelbar

$$v = \frac{p_0}{p g_0} \left( \frac{g_1}{d_1} + \frac{g_2}{d_2} + \frac{g_3}{d_3} \right) (1 + \alpha t) = \frac{19623}{10000} \text{ Cubikfuß.}$$

Ferner findet man aus den Ausdrücken für  $v_1$ ,  $v_2$ ,  $v_3$



$$v_1 = \frac{633}{10000}, \quad v_2 = \frac{3798}{10000}, \quad v_3 = \frac{15192}{10000}.$$

An die Berechnung dieser Aufgabe möchte ich noch eine Bemerkung knüpfen. Der gegebene Sauerstoff bildet nämlich mit dem gegebenen Stickstoff nichts anderes als Luft von der normalen Dichtigkeit 1 (wenn man voraussetzt, daß die Luft ein Gemenge von 1 Maafs Sauerstoff und 4 Maafs Stickstoff ist). Betrachtet man nun die Luft als ein reines Gas, für welches also  $g_2 = 4,32$  Loth,  $d_2 = 1$  ist, so findet man wieder  $v = \frac{19623}{10000}$ ,  $v_1 = \frac{633}{10000}$ ; folglich das jetzige  $v_2$  gleich dem früheren  $v_2 + v_3$ . Es steht also nichts im Wege, bei derartigen Rechnungen die Luft als ein reines Gas zu betrachten.

Die Uebereinstimmung der Formeln für drei Luftarten mit den oben für zwei Luftarten entwickelten ist so augenfällig, daß ich mich weiterhin auf die Betrachtung eines Gemenges von zwei Luftarten beschränken kann.

Um nun zu dem eigentlichen Inhalt meines Aufsatzes, der Betrachtung der Concentration der Luftarten nämlich, überzugehen, will ich noch einige Ausdrücke erklären, von denen ich sogleich Anwendung zu machen habe. Um Mißverständnissen vorzubeugen, bemerke ich noch, daß ich unter Dichtigkeit einer Luftart stets die auf Luft von der Temperatur  $0^\circ$  C. und unter dem Druck einer Atmosphäre bezogene Dichtigkeit verstehe.

*Dichtigkeit einer als rein gedachten Luftart* nenne ich die Dichtigkeit, welche eine Luftart haben würde, wenn sie den Raum, den sie mit beigemengten heterogenen Luftarten theilt, allein einnähme. Es ist leicht einzusehen, daß in den obigen Berechnungen die Dichtigkeit der ersten als rein gedachten Luftart gleich  $\frac{g_1}{g_0 v}$ , die Dichtigkeit der zweiten als rein gedachten Luftart gleich  $\frac{g_2}{g_0 v}$  ist.

Ich werde ferner von der *ideellen Dichtigkeit einer Luftart bei der Temperatur  $t$  und unter dem Drucke 1* sprechen. Dieser Ausdruck bedarf kaum einer Erklärung. Unter Bei-

behaltung der früheren Bezeichnung findet man aus der Gleichung

$$\frac{p_1}{p_0} = \frac{D_1}{d_1} (1 + \alpha t) \text{ den Werth } D_1 = \frac{p_1 d_1}{p_0 (1 + \alpha t)}.$$

Will man hieraus die Dichtigkeit unter dem Drucke  $p_1 = 1$  ableiten, so versteht es sich, daß  $p_0$  durch dieselbe Einheit gemessen werden muß wie  $p_1$ . Will man  $p_1$ , sowie es im Obigen immer geschehen ist, durch den Druck einer Atmosphäre messen, so ist natürlich  $p_0 = 1$ . Aber es steht auch nichts im Wege  $p_1$  etwa durch den Druck einer Quecksilbersäule von 1<sup>m</sup> Höhe zu messen; dann hat man  $p_0 = 760$  zu setzen. In diesem Fall würde also die ideelle Dichtigkeit der ersten Luftart für die Temperatur  $t$  und unter dem Druck von 1<sup>m</sup> Quecksilber gleich  $\frac{d_1}{760(1 + \alpha t)}$  seyn.

*Concentration einer Luftart* endlich bedeuete die Dichtigkeit der als rein gedachten Luftart, gemessen durch ihre ideelle Dichtigkeit bei derselben Temperatur und unter dem Drucke 1.

*der Druck eines Luftgemenges gleich ist der Summe der Concentrationen der einzelnen Luftarten.*

Führt man zur Bezeichnung einer Concentration den Buchstaben  $C$  ein, so daß also

$$C_1 = \frac{g_1}{d_0 v} : \frac{d_1}{p_0(1 + \alpha t)}$$

ist, so ergibt sich die einfache Gleichung

$$p = C_1 + C_2.$$

Ich habe zunächst darauf aufmerksam zu machen, daß mein Begriff der Concentration einer Luftart numerisch genau mit demjenigen zusammenfällt, was man bisher Partialdruck oder Spannung einer Luftart genannt hat, sowie denn bei einer wirklich reinen Luftart auch nach meiner Auffassung Druck und Concentration identisch werden. Ich meine, daß diejenigen, die überhaupt mit meinen Vorstellungen über das Verhalten eines Luftgemenges einverstanden sind, in der genannten Uebereinstimmung nur eine Empfehlung meiner Theorie erblicken können. Denn in Folge dieser Uebereinstimmung bedarf kein experimentell bestimmter Werth eines Dampfdrucks irgend einer Umformung, sobald man ihn nach der neuen Anschauungsweise zu irgend einer Rechnung benutzen will.

Wer auf theoretische Betrachtungen überhaupt kein Gewicht legt, der wird mein ganzes bisher vorgetragenes Raisonnement einfach für überflüssig erklären, da ich mit meinen Concentrationen nur zu demselben Resultat gelangt bin, welches man früher mit Hülfe der aus dem Dalton'schen Gesetz abgeleiteten Partialdrucke erreicht hat. Mir für meine Person scheint es indessen allerdings ein Fortschritt zu seyn, wenn außer der Unbegreiflichkeit der Dalton'schen Theorie auch ihre vollkommene Entbehrlichkeit nachgewiesen ist.

Zur weiteren Empfehlung meiner Ansichten erlaube ich mir noch auf die unmittelbar sich ergebende Relation

$$\frac{C_1}{C_2} = \frac{g_1}{d_1} : \frac{g_2}{d_2} = \frac{v_1}{v_2}$$

hinzuweisen, welche, wie der folgende Aufsatz zeigen wird, für manche Berechnungen sehr bequem ist.

Wenn der neue Begriff der Concentration einer Luftart den früheren des Partialdrucks zu ersetzen bestimmt und geeignet ist, so erstreckt sich diese Substitution auch auf das Verhalten der Dämpfe. Jedem Dampfe (eigentlich freilich jedem luftförmigen Körper) entspricht bei jeder Temperatur ein gewisses Maximum der Concentration, von welchem man zwar weiß, daß es mit steigender Temperatur zunimmt, welches aber doch für jeden bestimmten Körper und für jede Temperatur nur experimentell bestimmt werden kann.

Als practische Regel für Berechnungen über Dämpfe oder Gemenge von Dämpfen mit Gasen ergibt sich hienach, daß man dabei die Dämpfe zuerst als dem Mariotte'schen und Gay-Lussac'schen Gesetz unterworfen betrachten kann, daß also alle oben entwickelten Formeln auf sie anwendbar sind, daß man jedoch schließlic nachzusehen hat, ob die Concentration jedes Dampfes nicht etwa das der gegebenen Temperatur entsprechende Maximum überschreitet. Ist dies der Fall, so sind die Formeln ungültig, weil die in ihnen gemachten Voraussetzungen sich nicht

der Dalton'schen Theorie und der meinigen endgültig zu entscheiden. Aber ein solcher Versuch ist schwer auszuführen zu machen, weil man nicht weiß, welche Modificationen an der Dalton'schen Theorie die Anhänger derselben, das heißt also auch die Anhänger der Lehre von Partialdrucken, welche mit der Dalton'schen Theorie zusammen steht und fällt, vornehmen wollen, da es jedem der-  
 selben durchaus bekannt ist, daß zwei mit einander in Berührung stehende heterogene Gase oft erst nach geraumer Zeit sich vollständig mit einander mengen. Es kommt mir übrigens so vor, als wenn die Anhänger der Dalton'schen Theorie behaupten müßten, daß ein Dampf nur durch den Druck eines festen oder flüssigen Körpers, nicht aber durch den Druck eines Gases, condensirt oder in eine Flüssigkeit verwandelt werden könne. Nach meiner Auffassungsweise würde dieser Satz unrichtig seyn. Denn es geht aus demselben hervor, daß ein Dampf stets condensirt werden muß, sobald seine Concentration das seiner Temperatur entsprechende Maximum überschreitet. Ein Dampf braucht übrigens durchaus nicht an jeder Stelle ein und desselben Gefäßes ein und dieselbe Concentration zu haben, da ja eine vollständige Diffusion eines Dampfes durchaus nicht augenblicklich erfolgt.

Wäre nun meine Vermuthung über die Ansichten der Daltonianer richtig, so müßte sich, wie mir scheint, ein entscheidender Versuch nach der Art des oben angeführten Bunsen'schen Experiments mit unterchlorichter Säure und Luft anstellen lassen. Man müßte nur die Luft nicht auspumpen, sondern etwa vermittelt eines luftdicht schließenden Stempels zusammendrücken. Einige Verengungen innerhalb des die unterchlorichte Säure enthaltenden Röhrentheils würden dienlich seyn, um die Vermengung der beiden Luftarten zu verlangsamen. Nach meiner Meinung würde sich bei diesem Versuche die unterchlorichte Säure in Folge des durch die Luft ausgeübten Druckes ebenso condensiren wie in Folge des durch einen Stempel unmittelbar ausgeübten Druckes. Es wäre übrigens bei dem be-

schriebenen Versuche vielleicht eine Explosion der unterchlorichten Säure zu befürchten. Es möchte sich deshalb empfehlen, an Stelle des genannten Dampfes einen andern anzuwenden.

Darin werden wohl die Daltonianer mit mir übereinstimmen, daß es bei der Condensation einer Luftart nicht auf den Druck, sondern einzig auf den Partialdruck, nach meiner Ausdrucksweise auf die Concentration der betreffenden Luftart ankommen kann. Wenn etwa in einem Gefäße Chlorgas enthalten wäre, und wenn man den Druck innerhalb des Gefäßes durch Einpumpen von Luft beliebig vergrößerte, so jedoch, daß Chlorgas und Luft immer vollständig mit einander gemengt wären, so würde keine Condensation des Chlorgases erfolgen.

Ich komme schliesslich noch mit Einigem auf mein oben erwähntes Lehrbuch der Chemie zurück. Den einsichtigen Leser wird es nicht befremden, wenn das, was ich in meinem Buche über die Concentration der Luftarten gesagt habe, in einigen Kleinigkeiten mit dem hier Vorgetragenen

ferner in meinem Buche bei der messenden Dichtigkeit die Temperatur der betreffenden Luftart nicht erwähne, so ist daraus offenbar zu entnehmen, daß die Temperatur der messenden Luftart der der gemessenen gleich seyn soll.

Ich habe in meinem Buche auch den Satz ausgesprochen: „Jeder chemische Körper kann im luftförmigen Zustande bei irgend einer Temperatur eine um so größere Concentration erreichen, je weniger tief die Temperatur unter dem Siedepunkt des Körpers liegt.“

Dieser Satz, welcher ausdrückt, daß die Curven für die Concentrationsmaxima aller Körper, vom Siedepunkt aus gerechnet, einander gleich sind, ist bekanntlich nicht ganz richtig. Seine annähernde Richtigkeit aber hielt ich für geeignet zu einer annähernden Erklärung der bekannten Nebelbildung, welche manche Flüssigkeiten und Gase zeigen, wenn sie mit feuchter Luft in Berührung kommen. Den geneigten Leser, der sich hierfür interessirt, erlaube ich mir auf mein Buch zu verweisen. Meine Auffassung dieser Erscheinung darf, wie mich bedünkt, den Vorzug beanspruchen, daß sie neben dem Rauchen des Chlorwasserstoffgases auch das Nichtrauchen des Ammoniakgases erklärt, während nach der gewöhnlichen Auffassung zwischen den beiden genannten Gasen kein Unterschied stattfinden dürfte. So heisst es zum Beispiel in dem ausgezeichneten Lehrbuch der anorganischen Chemie von von Gorup-Besanez (Braunschweig 1862) auf Seite 197: „Die große Löslichkeit des Gases in Wasser ist auch der Grund seines Rauchens an der Luft. Indem nämlich das Gas in der Luft auf Wasserdampf trifft, verbindet es sich mit diesem zu sogenanntem Bläschendampf. Der Grund des Rauchens ist daher derselbe, wie bei der rauchenden Schwefel- und Salpetersäure“. Nun kann man aus den von Roscoe und W. Dittmar angestellten Beobachtungen <sup>1)</sup> leicht berechnen, daß ein Maass Wasser bei 0° C. von Chlorwasserstoffgas 502, von Ammoniakgas 1140 Maass absorhirt, ferner bei 20° C. von Chlorwasserstoffgas 439, von

1) Fortschritte der Physik 1859 S 112.

Ammoniakgas 688 Maafs. Es scheint mir also, daß die eben citirten Worte besser auf Ammoniak- als auf Chlorwasserstoffgas passen. Aber auf Ammoniakgas bezogen, sind sie falsch; nur auf Chlorwasserstoffgas bezogen, stimmen sie mit der Erfahrung überein.

Ich fasse den Inhalt der vorstehenden Abhandlung noch einmal mit kurzen Worten zusammen. Ich glaube nachgewiesen zu haben, daß die Dalton'sche Lehre, nach welcher die Atome heterogener Luftarten sich gegenseitig nicht abstoßen, vor der Kritik einer gesunden Mechanik nicht zu bestehen vermag. Ist die Dalton'sche Theorie falsch, so kann die Theorie von Partialdrucken oder Partialspannungen, welche lediglich auf jene gegründet ist, nicht richtig seyn. Heterogene Luftarten, seyen sie nun permanente oder condensirbare Gase, oder seyen sie Dämpfe, verhalten sich bei ihrer Mengung nicht anders wie etwa fein pulverisirte feste Körper, wenn auch die Compressibilität der letzteren eine geringere ist als die stets nach dem Mariotte'schen und Gay-Lussac'schen Gesetze geregelte



**V. Ueber die Verbindungen der Schwefelsäure mit chlorsalpetriger Säure, mit salpetriger und mit Untersalpeter-Säure; von Rudolph Weber.**

---

Die chlorsalpetrige Säure, welche bekanntlich in den bei gelindem Erwärmen von Königswasser erzeugten dampfförmigen Zersetzungsproducten desselben sich vorfindet und mit mehreren Chlormetallen <sup>1)</sup> direct sich vereinigt, bildet auch mit wasserfreier Schwefelsäure eine weisse, krystallinische Verbindung. Zur Darstellung derselben verfährt man einfach in folgender Weise: In einem kleinen Kölbchen mit abgeschliffenem Rande fängt man die durch Erwärmen von starkem Vitriolöl entwickelten Dämpfe der wasserfreien Schwefelsäure auf, welche, wenn man zur Kühlung des Kolbens nur kaltes Wasser, nicht eine Frostmischung anwendet, als Flüssigkeit sich condensirt, nach einiger Zeit erst erstarrt und eine bekanntlich dem Asbest äusserlich ähnliche Masse bildet. In das die wasserfreie, entweder flüssige oder festgewordene Säure enthaltende Kölbchen lässt man unter möglichst vollständigen Ausschluss von Feuchtigkeit die durch Chlorcalcium entwässerten Dämpfe der chlorsalpetrigen Säure treten; man führt das Zuleitungsrohr durch eine Oeffnung in der Glasplatte, die man auf den Rand des Kolbenhalses gelegt hat, und kühlt den Kolben von Aussen ab. Unter heftiger Wärmeentwicklung erfolgt die Absorption der gelben Dämpfe durch die Schwefelsäure, die Bildung einer Verbindung von Schwefelsäure mit chlorsalpetriger Säure findet statt und das durch die bei dem Processe entbundene Wärme zum grossen Theile dampfförmig gewordene Product condensirt an der erkalteten Wandung des Kolbens. Wenn die Heftigkeit der Wirkung nachgelassen hat, die Schwefelsäure zum grössten Theile gebunden und der Inhalt des Kolbens erkaltet ist, so wird die Masse fest und krystallinisch; sie absor-

1) Diese Ann. Bd. 118, S. 471.

birt jetzt die Dämpfe der chlorsalpetrigen Säure nicht mehr, und man muß nun, um die noch unverbundene Schwefelsäure möglichst zu sättigen, den Kolben gelinder erwärmen, die Masse eben zum Schmelzen bringen und nun die chlorsalpetrige Säure noch längere Zeit darauf einwirken lassen. Der Proceß ist beendigt, wenn gelbrothe Dämpfe über dem geschmolzenen Inhalte des Kolbens sich erhalten.

Die auf diese Weise erzeugte Verbindung ist weiß, sie ist blättrig krystallisch und erinnert durch ihre Gelfüge an Stearinsäure. Bei gelindem Erwärmen schmilzt sie unzersezt, bei stärkerem Erhitzen färbt sie sich gelb, beginnt zu sieden, entbindet rothgelbe Dämpfe, und zersetzt sich bei der Destillation, regenerirt sich aber wieder zum Theil in der Vorlage. An der Luft wird sie bald feucht; mit einer größeren Menge von Wasser in Berührung gebracht, zersetzt sie sich heftig unter Bildung von Schwefelsäure, Chlorwasserstoff, Stickoxydgas etc.

Die Analyse dieser Verbindung bietet keine Schwierigkeiten dar. Um zunächst den Gehalt an Chlor und an

ausgedrückt, nach der der Gehalt an jenen Körpern sich berechnet auf:

Chlor	24,32 Proc.
Schwefelsäure	55,04 Proc.

Die Abweichung der gefundenen Werthe von dem nach dieser Formel berechneten erklärt sich dadurch, daß die letzten Antheile der von der Verbindung eingeschlossenen freien Schwefelsäure nur schwierig und langsam mit der chlorsalpetrigen Säure sich vereinigen und daher leicht ein kleiner Rest derselben unverbunden bleibt. Ferner kann man füglich nicht vollständig verhindern, daß die Verbindung bei ihrer Darstellung geringe Mengen von Wasser aufnimmt.

Für die Bestätigung der angeführten Formel ist dann noch die Bestimmung der Menge von Eisenoxydul durchgeführt worden, welche mit einer gewissen Quantität dieser Verbindung in Berührung gebracht, in Eisenoxyd umgewandelt wird. Es folgt aus dieser Bestimmung nämlich der Gehalt derselben an Sauerstoff oder an Chlor, welcher an das Eisenoxydul übertragbar, und also noch außer den zwei im Stickoxyde vorhandenen Äquivalenten von Sauerstoff an den in der Verbindung enthaltenen Stickstoff gebunden ist. Für diesen Zweck wurde dasselbe Verfahren, nach welchem die Ermittlung des an Eisenoxydul übertragbaren Sauerstoffs in den Bleikammerkrystallen <sup>1)</sup> stattgefunden hat, eingeschlagen und in folgender Weise operirt: In einer Kochflasche wurde, nachdem die Luft durch Kohlensäure verdrängt worden, die drei- bis vierfache Menge der angewendeten Substanz an Eisenvitriol (mit Alkohol aus wässriger Lösung gefällt) mit verdünnter Schwefelsäure unter Zusatz von Salzsäure aufgelöst, in diese Lösung dann die in einem engen Glasröhrchen abgewogene Substanz gebracht und der Kolben mittelst eines mit einem Gaszuleitungsrohr versehenen Stöpsel verschlossen. Die Verbindung zersetzt sich alsbald, die Lösung des Eisensalzes färbt sich, da sie den größten Theil des entwik-

1) Bericht d. Berl. Akad. vom 13. Febr. 1862.

kelten Stickoxydes aufnimmt, tief dunkel. Der Kolben wird, nachdem die Zersetzung erfolgt ist, gelinde erwärmt, wobei die sich ausdehnenden und entbundenen Gase entweichen, jedoch von Außen Luft in den Kolben nicht eindringen kann. Das Zuleitungsrohr wird mit einem Kohlensäureapparate verbunden und nun unter beständiger Zuführung dieses Gases die Flüssigkeit gekocht, bis das Stickoxydgas völlig entfernt worden ist, wozu die Färbung der Lösung einen Anhalt giebt. Nun wird der Inhalt des Kolbens in Wasser, das mit Schwefelsäure angesäuert worden, gebracht und die Menge des durch die Verbindung nicht oxydirten Eisenvitriols mit übermangansaurem Kali titirt. Diese Methode liefert bei einiger Uebung sichere Resultate; sie ergab für die Menge des in der mit der Schwefelsäure verbundenen chlorsalpetrigen Säure enthaltenen, die Oxydation des Eisenvitriols bewirkenden Chlors (wofür im Nachstehenden die äquivalente Menge von Sauerstoff mitgetheilt ist) folgende Werthe:

Substanz

übertragener Sauerstoff.

**felsäure** mit Chlorwasserstoff  $2\text{SO}_3 + \text{HCl}$  besteht. Setzt man das Erhitzen des Gemisches einige Zeit fort, so wird, besonders wenn man ein offenes Schälchen dazu anwendet, das Chlor leicht ganz beseitigt, und die zurückbleibende Flüssigkeit enthält nur Schwefelsäure und salpetrige Säure, reagirt aber nicht mehr auf Salzsäure.

In dem aus wasserfreier und aus englischer Schwefelsäure gemischten Hydrate von der Formel  $2\text{SO}_3 \cdot \text{HO}$  löst sich dem Anscheine nach die Verbindung unzersetzt auf; dasselbe Hydrat absorbirt auch die Dämpfe der chlorsalpetrigen Säure reichlich und es bildet sich eine gelbrothe, ölige Flüssigkeit, aus der aber selbst nach längerem Stehen Krystalle sich nicht aussondern. Hiernach ist es nicht wahrscheinlich, daß ein krystallisirtes Hydrat der oben beschriebenen Verbindung, welches das Analogon der Bleikammerkrystalle seyn würde, sich wird darstellen lassen.


Es wurden ferner die Producte untersucht, welche sich bei der Einwirkung der durch Erhitzen von salpetersaurem Bleioxyd entwickelten Dämpfe auf wasserfreie Schwefelsäure erzeugen. Die bezüglich dieses Gegenstandes von dem Verfasser früher gemachte kurze Mittheilung ist durch Folgendes zu ergänzen.

Wenn man auf wasserfreie Schwefelsäure, welche in einem Kölbchen aufgefangen ist, die durch Erhitzen des Bleisalzes entbundenen Dämpfe treten läßt, so werden dieselben unter starker Erwärmung von der Säure aufgenommen, und es bildet sich eine ölige, gelbliche Flüssigkeit, welche beim Erkalten weißse, krystallinische Krusten bildet. Um die Producte möglichst rein zu erhalten, erwärmt man, wenn der größte Theil der Untersalpetersäure absorbirt worden ist, den Kolben gelinde, und läßt unter stetem Drehen desselben die braunen Dämpfe noch einige Zeit auf die geschmolzene Masse einwirken, um auch die von der erzeugten Verbindung eingeschlossene noch unverbundene Schwefelsäure möglichst zu sättigen. Hierauf gießt man den Inhalt des Kolbens in ein langes Reagenzglas und erhitzt die Masse zum Sieden. Es entwickelt sich dann

lebhaft Sauerstoffgas; es wird auch Untersalpetersäure entbunden, und es bilden sich die intensiv gelb gefärbten Dämpfe der nachstehend beschriebenen Verbindung, welche in dem kälteren Theile des Glases condensiren. Wenn kein Sauerstoffgas mehr entbunden wird, unterbricht man diese Operation.

Das auf diese Weise dargestellte Product ist bei erhöhter Temperatur flüssig, und gelb gefärbt. Erkalte dasselbe, so wird es heller, es erstarrt und bildet bei gewöhnlicher Temperatur eine harte, krystallinische, weisse Masse. An der Luft wird es sehr schnell feucht; in Wasser löst es sich unter Entbindung von Stickoxydgas leicht auf, in der Lösung befinden sich Schwefelsäure und Salpetersäure.

Diese Verbindung enthält Schwefelsäure und eine Säure des Stickstoffs, und zwar salpetrige Säure, welche mit der Schwefelsäure in dem Verhältniß vereinigt ist, daß die Zusammensetzung der Verbindung durch die Formel



ausgedrückt wird.

bundenen Aequivalenten Sauerstoff in der Verbindung sich vorfindet) betrug:

Substanz.	Sauerstoff.	do. in Procenten.
2,082	0,149	7,1 Proc.
2,230	0,157	7,1 Proc.

Nach obiger Formel berechnen sich die Werthe des Gehalts an Schwefelsäure und an Sauerstoff auf 67,84 Proc. und 6,8 Proc.

Die durch den Versuch ermittelte Menge von Schwefelsäure ist etwas gröfser als die nach der angenommenen Formel berechnete, was darin unzweifelhaft seinen Grund hat, dafs die Verbindung etwas freie Schwefelsäure einschliesst, welche, wenn auch die Dämpfe der Untersalpetersäure auf das Product längere Zeit wirkten, dennoch eingeschlossen und unverbunden verblieben ist.

Der auf diese Weise gebildete Körper ist also eine Verbindung von Schwefelsäure mit salpetriger Säure; er hat die Beschaffenheit und die Zusammensetzung der von Provostaye <sup>1)</sup> dargestellten Verbindung jener Säuren, welche bei der Einwirkung von flüssiger schwefliger Säure auf Untersalpetersäure in zugeschmolzenen, stark abgekühlten Röhren, wobei, wie Provostaye angiebt, oft Detonationen erfolgen, sich erzeugt. Der oben beschriebene Weg zur Darstellung dieser Verbindung bietet diese Gefahren nicht dar, er ist einfach und kann zur Herstellung gröfserer Mengen derselben eingeschlagen werden. Dieser Körper erzeugt sich auch durch Einwirkung von Stickoxyd auf wasserfreie Schwefelsäure, wobei nach Brüinig <sup>2)</sup>, wenn atmosphärische Luft nicht Zutritt hat, schweflige Säure und die Verbindung von Schwefelsäure mit salpetriger Säure  $2\text{SO}_3 + \text{NO}_3$  sich bildet.

Die Dämpfe der Untersalpetersäure werden, wie oben erwähnt, von der wasserfreien Schwefelsäure begierig absorbirt. Hierbei bildet sich eine Verbindung beider Stoffe, welche man in ziemlich reinem Zustande dadurch bereiten

1) *Ann. de phys. et chim.* T. 63, p. 362.

2) *Ann. der Chem. u. Pharm.* Bd. 98, S. 377.

kann, dass man jene Dämpfe auf die Schwefelsäure direct wirken lässt, der Erhitzung durch langsames Zuleiten vorbeugt, und schliesslich, um die noch freie Schwefelsäure, welche von der erzeugten Verbindung eingeschlossen ist, möglichst zu sättigen, das Product, nachdem es bei gelinder Wärme geschmolzen, der Wirkung der untersalpetersauren Dämpfe noch einige Zeit aussetzt, eine stärkere Erhitzung aber, wodurch die Verbindung sich zersetzen würde, vermeidet.

Das hierdurch erzeugte Product hat äusserlich die Beschaffenheit der oben beschriebenen Verbindung: es ist weiss, krystallinisch, schmelzbar, zersetzt sich aber bei stärkerem Erhitzen unter Ausscheidung von Sauerstoffgas und Bildung der vorigen Verbindung. Die Analyse desselben wurde, wie oben erörtert, durchgeführt und ergab folgende Resultate:

Substanz.	schwefels. Baryt	Schwefels. in Procenten.
1,191	2,307	66,49 Proc.
1,885	3,624	66,03 Proc.



übergeht. Dieselbe läßt sich vielleicht durch Wirkung von wasserfreier Salpetersäure auf Schwefelsäure direct und isolirt darstellen.

Bei dieser Gelegenheit habe ich noch einiges die Zusammensetzung der Bleikammerkrystalle Betreffendes zu erwähnen. Ich habe vor einiger Zeit eine Untersuchung dieser viel besprochenen Krystalle, über deren Zusammensetzung vorzugsweise in soweit Meinungsverschiedenheiten obwalteten, als nach Ansicht einiger Chemiker darin Untersalpetersäure, nach Ansicht anderer dagegen darin salpetrige Säure enthalten ist, durchgeführt <sup>1)</sup>).

Das Ergebniss der Untersuchung, wobei eine Ermittelung des mit dem Stickstoff verbundenen Sauerstoffs durch *directe* Versuche durchgeführt worden war, während bei früheren Ermittlungen diese Werthe nur aus dem Verluste bestimmt wurden und bei geringen Abweichungen in der Menge der übrigen Bestandtheile dieser leicht veränderlichen, schwierig zu analysirenden Substanz dann verschieden befunden wurden, leiteten unzweifelhaft zu der Formel



Es wurden damals Krystalle untersucht, welche durch Einwirkung von schwefliger Säure auf rauchende Salpetersäure bereitet waren, und es wurde ermittelt deren Gehalt an Schwefelsäure, Wasser, Stickstoff und Sauerstoff. Die Schwefelsäure wurde durch Baryt bestimmt; die gefundenen Werthe lagen zwischen 63,9 und 64,3 Proc. Der Wassergehalt wurde ermittelt durch Erhitzen der Krystalle mit Magnesia in einem Verbrennungsrohre, daselbst war eine 6" lange Schicht von Kupferspähnen angebracht, um die Oxyde des Stickstoffs zu zersetzen. Das ausgeschiedene Wasser wurde mit vollkommen ausgetrockneter Luft nach dem tarirten Chlorcalciumrohre geleitet. Vier Versuche ergaben für den Wassergehalt zwischen 9,5 und 10,5 Proc. liegende Werthe. Der Gehalt an Stickstoff ist der Art bestimmt, daß die Zersetzung der Substanz in der oben beschriebenen Weise herbeigeführt, und der Stickstoff dem

1) Bericht d. Berl. Akad. vom 13. Febr. 1862.

Volumen nach in bekannter Weise gemessen wurde. Vier Versuche ergaben dafür Werthe zwischen 10,0 und 10,3 liegend. Endlich wurde noch, und darin liegt, wie bemerkt, eben das Wesentliche der Untersuchung, die Menge des Sauerstoffs bestimmt, welche Eisenoxydul in Oxyd verwandeln kann. Wenn  $\text{NO}_2$  in den Krystallen enthalten ist, so wird 1 O abgegeben; steckt darin aber  $\text{NO}_3$ , so werden 2 O an das Eisenoxydul übertragen, indem eine Reduction dieser Verbindungen zu  $\text{NO}_2$  erfolgt; es müßte die doppelte Menge von Eisenvitriol dann von der gleichen Quantität der Substanz oxydirt worden seyn. Nur derartige directe Sauerstoffbestimmungen können zur Entscheidung der Frage: ob  $\text{NO}_2$  oder  $\text{NO}_3$  in den Krystallen enthalten ist, führen; sie waren vorher noch nicht ausgeführt. Ich fand die Menge des an Eisenvitriol übertragbaren Sauerstoffs bei vier Versuchen 5,8 bis 6,3 Proc.; die Formel  $3\text{O}_2, \text{NO}_2 + \text{SO}_2, \text{HO}$  erfordert 6,3 Proc.

Weltzien <sup>1)</sup> hatte kurz zuvor durch Meyer Versuche über die Zusammensetzung dieser Krystalle anstellen las-


bei Anwendung von nur wenig Substanz, 0,223 — 0,466 — 0,744 Grm. ermittelt worden.

Da hier eine Ermittlung des Sauerstoffs nicht erfolgt ist, welche, wenn die Krystalle nach jener Formel zusammengesetzt wären, 8,7 Proc. hätte ergeben müssen, und auch die gefundenen Werthe an die nach der Formel  $3\text{SO}_3 + \text{NO}_3 + 2\text{HO}$  berechneten sich näherungsweise anschließen

	gefunden	ber. nach $3\text{SO}_3, \text{NO}_4, 2\text{HO} - 3\text{SO}_3, \text{NO}_3, 2\text{HO}$ .	
$\text{SO}_3$	63,68 — 64,08	65,21	67,72
$\text{HO}$	11,17 — 13,14	9,78	10,23
$\text{N}$	7,4 — 7,48	7,61	7,95

und die für die Schwefelsäure gefundenen Werthe von den berechneten auch nur um etwa 3 Proc. abweichen, dagegen im Wassergehalt eine etwas größere Annäherung erreicht worden ist: so liefern diese Versuche keinen Beweis, daß die Bleikammerkrystalle  $\text{NO}_4$  und nicht  $\text{NO}_3$  enthalten.

Eine andere Versuchsreihe hat kürzlich A. Müller <sup>1)</sup> angestellt und ist nach folgender Methode verfahren: Die Bleikammerkrystalle werden mit der drei- bis vierfachen Menge von Bleioxyd gemengt, wodurch schon bei gewöhnlicher Temperatur deren Zersetzung eintritt und sämtliche Untersalpetersäure, wie er annimmt, entweicht. Die dadurch erfolgende Gewichtsveränderung soll nach Müller den Gehalt der Krystalle an Untersalpetersäure repräsentiren. Den Wassergehalt findet Müller, indem er den Gewichtsverlust des Gemenges, aus dem sämtliche in den Krystallen enthaltene Untersalpetersäure entwichen seyn soll, ermittelt. Die Schwefelsäure ergibt sich nach ihm aus der Differenz des letzten Gewichtes mit dem Gewichte des angewendeten Bleioxydes. Der Stickstoffgehalt ist auf 10,85 Proc. direct ermittelt worden. Aus diesen Bestimmungen soll nun für die Bleikammerkrystalle die Formel



folgen.

Ich würde ein solches Versuchsverfahren hier keiner

1) Ann. d. Chem. u. Pharm. Bd. 122, S. 1.

Kritik unterworfen haben, wenn nicht R. Wagener in seinem vortrefflichen Jahresberichte Bd. 8, S. 208, wo über die Untersuchungen von Müller und von mir Bericht erstattet ist, es als wünschenswerth bezeichnet hätte, daß neue Untersuchungen über diesen Gegenstand gemacht würden, um zu prüfen, ob vielleicht Verbindungen von verschiedener Zusammensetzung existiren, oder ob die Verschiedenheit der Versuchs-Resultate in der Methode der Analyse begründet ist.

Zunächst bemerke ich in Betreff der Müller'schen Methode die Schwefelsäure durch Erhitzen des Gemenges der Krystalle mit Bleioxyd zu bestimmen, daß, wie man leicht findet, sobald man mit derselben Substanz Gegenversuche mit Baryt anstellt, stets etwas Schwefelsäure beim Erhitzen entweicht, wenn nicht das Gemeuge sehr innig gemacht und Bleioxyd in großem Ueberschusse angewendet wird. Daher erklärt sich leicht der zu gering befundene Gehalt an Schwefelsäure, 59,3 statt 64 Proc. (Welzien, Weber). Was nun Müllers Verfahren die Untersalpetersäure zu bestimmen, anlangt, so bemerke ich nur, daß

sammentritt, oder was im Wesentlichen auf dasselbe hinauskommt, wenn die aus der schwefligen Säure und der Salpetersäure erzeugte Schwefelsäure bei Gegenwart von wenig Wasser mit der hierbei entwickelten Untersalpetersäure zusammentrifft.

Zur Darstellung der Krystalle im Kleinen verfährt man zweckmässig der Art, dass man schweflige Säure auf Salpetersäure wirken lässt, oder man erzeugt dieselben direct durch Wirkung der Untersalpetersäure auf concentrirte Schwefelsäure. Nach der zweiten Methode haben Welzien und Müller die Krystalle dargestellt; die von mir früher untersuchten waren nach der ersten Methode dargestellt.

Da nun die Vermuthung nicht fern liegt, dass die mittelst Untersalpetersäure dargestellten Krystalle Untersalpetersäure und nicht salpetrige Säure enthalten, also verschieden von den durch Wirkung von schwefliger Säure auf Salpetersäure bereiteten Krystallen zusammengesetzt sind, so habe ich die nach ersterem Verfahren bereiteten (wie früher durch Ausbreitung auf einem Ziegelsteine unter dem Exsiccator von der imbibirten Säure befreien) Krystalle gleichfalls untersucht, habe darin den Gehalt an Schwefelsäure und an Sauerstoff bestimmt.

Es ergab:

Substanz.	schwefels Baryt.	Schwefelsäure in Procenten.
1,057	1,967	63,91.

Eine frühere derartige Bestimmung hat ergeben <sup>1</sup>).

1,646	3,120	65,1 Proc.
-------	-------	------------

Der Schwefelsäure-Gehalt der nach dem andern Verfahren bereiteten Krystalle war 63,9 — 64,3 Proc.

Der an Eisenvitriol übertragbare Sauerstoff betrug in den mit Untersalpetersäure und englischer Schwefelsäure bereiteten Krystallen:

Substanz.	übertragbarer Sauerstoff.	
1,490	0,0780	5,2 Proc.
1,500	0,0848	5,6 "
1,424	0,0819	5,7 "

1) Bericht der Akad. v. 13 Febr. 1862.

Die Wiederholung der Sauerstoffbestimmung, der mit rauchender Salpetersäure und schwefliger Säure bereiteten Krystalle ergab;

Substanz.	übertragbarer Sauerstoff.	
1,584	0,0814	5,1 Proc.
1,925	0,1022	5,3 "

also Werthe, welche mit den früheren und mit denen übereinkommen, welche für den übertragbaren Sauerstoffgehalt der nach dem anderen Verfahren bereiteten Krystalle gefunden ist. Wären die Bleikammer-Krystalle nach der Müller'schen Formel zusammengesetzt, so hätten sich 11,8 Proc. Sauerstoff finden müssen.

Dafs die benutzte Methode der Sauerstoffbestimmungen für diese Fälle brauchbar ist, dafür bürgt die früher schon nach dieser Methode von mir ausgeführte Untersuchung des salpetrigsauren Silberoxyds, die Uebereinstimmung der Versuchsreihen, sowie auch das Resultat, welches sich bei der Untersuchung der Verbindungen der wasserfreien Schwefelsäure mit salpetriger Säure und mit Untersalpetersäure ergeben hat.

Die Zusammensetzung der nach verschiedenen Methoden bereiteten Bleikammer-Krystalle ist durch die Formel:



ausgedrückt; die gefundenen Werthe und die nach dieser Formel berechneten sind folgende:

	berechnet.		gefunden.	
$\text{SO}_2$	63,01	Proc.	63,9 — 64,0	Proc.
HO	7,06	"	9,5 — 10,5	"
N	11,03	"	10,0 — 10,3	"
an FeO übertragb. O	6,30	"	5,2 — 6,3	"

**VI. Ueber die Verbindungen der chlorsalpetrigen Säure mit einigen flüchtigen Chlormetallen, von Rudolph Weber.**

---

**D**urch directe Einwirkung der chlorsalpetrigen Säure auf die flüchtigen Chloride von Zinn, Titan, Aluminium und Eisen bilden sich krystallinische Verbindungen jener Körper, über deren Darstellung, Eigenschaften und Zusammensetzung der Verfasser bereits früher Mittheilungen gemacht hat <sup>1</sup>).

Es ist dem Verfasser jetzt gelungen eine Verbindung der chlorsalpetrigen Säure mit fünffach Chlorantimon hervorzubringen. Dieselbe bildet sich ebenfalls direct. Um dieselbe darzustellen leitet man die durch gelindes Erwärmen vom Königswasser erzeugten Dämpfe in ein Kölbchen, welches das flüchtige Chlorid enthält. Die Dämpfe der chlorsalpetrigen Säure werden begierig absorbirt, indem dabei ein gelber, pulveriger Körper sich bildet, der sehr leicht und locker ist und im Aeufseren eine täuschende Aehnlichkeit mit Schwefelblumen hat. Man muß um die letzten Mengen des Chlormetalls zu sättigen, die Wirkung der Dämpfe auf das Pulver noch einige Zeit andauern lassen. Die so erzeugte reine Verbindung bildet ein schwefelgelbes Pulver. Diesselbe wird an der Luft sehr rasch feucht, sie zersetzt sich mit Wasser, löst sich in Weinsteinsäure enthaltendem Wasser klar auf. Beim Erhitzen schmilzt sie nicht, verdampft aber unter Rücklassung von etwas Antimonsäure und condensirt an den kälteren Theilen des Destillirapparates zu einer öligen Flüssigkeit, welche nach vollständigem Erkalten krystallinisch erstarrt.

Die Zusammensetzung wurde ermittelt indem aus der Auflösung einer in ein Glasröhrchen abgewogenen Menge dieser Verbindung in Weinsteinsäure enthaltendem Wasser

1) Bericht der Berl. Akad. vom 5. März 1863. Pogg. Ann. Bd. 118 S. 471.

zuerst das Antimon durch Schwefelwasserstoff und nach Beseitigung des Ueberschusses dieses Gases das Chlor durch Silberlösung gefällt wurde. Der Antimonniederschlag wurde auf einem gewogenen Filter bei  $110^{\circ}$  getrocknet und in bekannter Weise der Schwefelgehalt in demselben ermittelt, wodurch der Gehalt an Antimon sich ergab.

Folgendes sind die ermittelten Werthe:

Substanz	Chlorsilber.	Schwefelantimon.
1,688	3,950	1,050
1,642	3,860	1,026



Das Schwefelantimon (mit rauchender Salpetersäure oxydirt, die Schwefelsäure durch Baryt gefällt) enthielt 0,517 und 0,505 Schwefel. Aus diesen Daten berechnet sich der Gehalt an Chlor und an Antimon auf 100 Theile dieser Verbindung:

Chlor	57,61 — 58,00 Proc.
Antimon	31,57 — 31,60 "



Hiernach ist dieselbe nach der einfachen Formel:







zusammengesetzt, während ich dafür die einfachen Formeln



aus meinen Versuchen ableitete, welche auch für die betreffende Eisen- und Aluminium- sowie auch für die Antimon-Verbindung, nämlich gleiche Anzahl der Äquivalente der Chlorverbindungen, Anwendung finden. Die Versuchsergebnisse der Zinnverbindung weichen folgendermaßen von einander ab:

	Hampe	Weber
Zinn	33,61	29,4 — 30,4
Chlor	54,34	53,3 — 53,6

Ich habe meine Versuche zum Theil wiederholt, habe auf Zinnchlorid sorgfältig getrocknete chlorsalpetrige Säure wirken lassen und habe zur Beseitigung der letzten Menge des Zinnchlorids, die von der erzeugten Verbindung so leicht eingeschlossen wird, nachdem die Masse in den Gefäßen, wo sie erzeugt wurde, möglichst rasch zerdrückt worden und das Glas etwas erwärmt worden ist, noch eine Weile die Dämpfe der chlorsalpetrigen Säure hinzugeleitet. Die Masse wird erst hierdurch von den letzten Mengen des eingeschlossenen Zinnchlorids befreit.

Der nach dieser Vorschrift bereitete Körper hat die früher beschriebenen Eigenschaften. Die Analyse wurde nochmals ausgeführt und ergab:

Substanz.	Chlorsilber.	Zinnoxid.
1,527	3,350	0,594
1,805	3,985	0,705


wonach der Gehalt an Chlor und an Zinn sich berechnet:

Chlor	54,2 — 54,5
Zinn	30,6 — 30,7

also Werthe, welche mit meinen früheren Ermittlungen übereinstimmen.

Ich kann daher nur dabei stehen bleiben, daß man bei Einwirkung von chlorsalpetriger Säure auf Zinnchlorid, wo-

bei man die entstehende Verbindung leicht im reinen Zustande erhält, einen Körper bekommt, welcher nach der Formel:



zusammengesetzt ist. — Analoge Formeln:



drücken die Zusammensetzung der auf diesem Wege dargestellten Verbindungen der chlorsalpetrigen Säure mit den erwähnten Chlormetallen aus.

---

VII. *Ueber die Bildung des Ammoniums und einiger Ammoniummetalle; von W. Weyl<sup>1)</sup>.*

wurden, in der Weise abgeändert waren, daß Ammoniak und das jedesmal anzufügende Metall im *status nascentis* zusammentreten konnten. Es wurde dies ermöglicht durch die Eigenschaft des Natrium-Ammoniums, sich mit Metall-oxydsalzen, unter Bildung des entsprechenden Natriumsalzes, zu ersetzen, wodurch auf der einen Seite Ammoniak, auf der andern Metall frei wird, und so die zur Bildung des entsprechenden Ammoniums geforderten Bedingungen gegeben sind.

Das bei diesen Versuchen innegehaltene Verfahren lehnt sich im Wesentlichen an das bei der Darstellung des Kalium- und Natrium-Ammoniums befolgte an.




Zunächst wurde in den einen Schenkel einer Röhre von nebenstehender Form Chorsilber eingefüllt und mit trockenem Ammoniak-

gas gesättigt, was schnell und vollständig erzielt wird, wenn das Gas unter dem Druck einer Quecksilbersäule von einigen Zollen überströmt. In den zweiten Schenkel der Röhre wurde die Sauerstoff- oder Chlorverbindung eines Metalles mit der äquivalenten Menge Natrium eingeführt, und die Röhre selbst an beiden Enden geschlossen. Wenn nun die so vorbereiteten Röhren mit ihrem Chlorsilberschenkel in ein siedendes Chlorcalciumbad eingesenkt wurden, so war bei allen Versuchen zu beobachten, daß zunächst das Ammoniak auf die Chlor- oder Sauerstoffverbindung des in dem anderen Schenkel befindlichen Metalls einwirkte, diese gleichsam sättigte, und dann erst an das Natrium trat, zur Bildung von Natrium-Ammonium, welches über das Metallsalz hinfließend, im Verlauf von ein bis zwei Stunden die besprochene Umsetzung ohne merkliche Temperaturerhöhung bewirkte.

Die vor der Bildung des Natriumammoniums durch das Metallsalz bewirkte Absorption des Ammoniaks ist begründet in der unter dem hohen Druck erfolgenden Verbindung dieses mit jenem zu dem correspondirenden Ammo-

niumoxydsalz oder Chlorammonium. Es gestaltet sich demnach der oben besprochene Process complicirter als daselbst angedeutet; zumal auch nicht, wie dort angenommen, neben dem allerdings resultirenden Metallammonium, Chlornatrium oder ein Natronsaltz, sondern ebenfalls dessen Ammonium als Endpunkt auftritt, wie dieses folgendes Schema in übersichtlicher Form zeigt.



Zur Rechtfertigung der in diesen Formeln vorgenommenen Verdopplung des Ammoniums bemerke ich, dass, abgesehen von den durch die Analogie zwischen ihm und den übrigen Metallen an die Hand gegebenen Gründen, doch gerade hier, wo man auf synthetischem Wege die zusammengesetzte Natur eines Metalles kennen lernt, die dabei gewonnene Kenntniss von der Organisation desselben einen, wie mir scheint, entscheidenden Grund zur Ver-

lose zusammenhängende Massen, mit schwarzgrauer Farbe zurück. Bei Barium, Kupfer, Quecksilber und Silber dienten die Chlorverbindungen zur Bildung ihrer Ammoniummetalle. Ich theile hier von einigen der vielfach angestellten Versuchen Zahlen mit, um eine bestimmte Vorstellung von den bei denselben angewandten Mengen zu geben. Es wurden verwandt Chlorbarium 0,520 Grm., Chlorkupfer 0,570 Grm. Chlorsilber 1,40 Grm. mit bezüglich einem Aequivalent Natrium. Um sicher zu seyn, daß nach Beendigung des Processes nicht etwa noch unzersetztes Natrium-Ammonium die Eigenschaften der bezweckten Ammoniummetalle trübte, wurde etwas weniger Natrium, als die Rechnung erforderte, in die Röhre eingeführt. Das Zink-Ammonium erhielt ich durch Einwirkung von Natrium-Ammonium auf Zinkoxyd; hierbei absorbirte dasselbe, wie die vorgenannten Chlormetalle, eine große Menge Ammoniak, noch bevor sich Natrium-Ammonium bilden konnte; doch trat die Wirkung dieses auf das Zink-Ammoniumoxyd in gleicher Weise, wie bei obigen Chlormetallen schnell und leicht ein. Jene der Bildung des Natrium-Ammoniums vorangehende Absorption des Ammoniaks erfolgt, namentlich bei Chlorkupfer und Chlorsilber, in so hohem Maasse, daß ein förmliches Zusammensintern der vorher pulverförmigen Körper zu festen compacten Massen, ja sogar theilweise Auflösung dieser in dem flüssigen Ammoniak eintritt.

Um nun die Einwirkung des von jetzt ab sich bildenden Natrium-Ammoniums auf jene ersteren zu beschleunigen, ist es zweckmäßig, durch Schütteln der Röhre eine möglichst gleichmäßige Vertheilung des flüssigen Natrium-Ammoniums über die Chlormetalle hin zu bewirken. Bei der nun, wie schon erwähnt, ohne Temperaturerhöhung eintretenden Umsetzung zwischen diesen und jenem, ist zunächst zu beobachten, wie die Farbe des Natriums-Ammoniums vom Kupferrothen in das Rubin- und Purpurrothe übergeht, unter steter Beibehaltung eines starken Metallglanzes; Farben, die wohl einer Legirung von dem noch unzersetzten Theile des Natrium-Ammoniums mit dem zum

Theil schon gebildeten zweiten Ammoniummetalle angehören.

Es tritt dieser glänzende Farbenübergang besonders schön bei der Bildung des Barium-Ammoniums auf. In dem Maasse jedoch die Bildung der bezweckten Ammoniummetalle fortschreitet, fällt die Farbe der Legirung immer mehr ins Blaue, bis zuletzt, bei völlig erfolgter Umsetzung, ein tief blaues, stark metallglänzendes, flüssiges Metall resultirt; Eigenschaften, die, mit Ausnahme des Kalium- und Natrium-Ammoniums, sämmtlichen hier beobachteten Ammoniummetallen zukommen. Bezüglich der Beständigkeit dieser Verbindungen ist zu bemerken, daß die Dauer derselben wesentlich von dem Druck des über ihnen befindlichen Ammoniakgases und der umgebenden Temperatur abhängt. Obige Versuche wurden bei gewöhnlicher Zimmertemperatur angestellt, und war der die Metalle enthaltende Schenkel der Röhre aus den schon angegebenen Gründen in eine Schale mit kaltem Wasser eingesenkt. Bei wenig erhöhter Temperatur tritt die Reduction der Metallsalze durch das Natriumammonium zwar ein, nicht

folgte erst nach dem Kochen nur schwierig die Vereinigung des Quecksilbers zu einer Kugel.

In Bezug auf das Barium-Ammonium ist noch nachzutragen, daß die Bildung erst nach häufig wiederholter Einwirkung des Ammoniaks vor sich ging. Nach seiner Zersetzung durchzog das Barium, mit Natrium gemengt, als grauweißes Pulver das Chlornatrium; es wurde nach dem Oeffnen der Röhre mit Quecksilber ausgezogen, mit Salzsäure gekocht, und das gelöste Barium durch Schwefelsäure nachgewiesen.

Die bisher gewonnenen Resultate führten mich zu dem Versuch, das Wasserstoffammonium selbst zu bilden, durch Einwirkung von Natrium-Ammonium auf Ammoniumoxydsalze. Bei dem ohne Heftigkeit verlaufenden Proceß, unter dem erhöhten Druck des einwirkenden Ammoniaks, und bei zugleich möglichst niedrig gehaltener Temperatur, waren alle Umstände, welche die Zersetzung eines eventuell sich bildenden Ammoniums bewirken konnten, so viel wie möglich vermieden. Ich verfuhr bei diesen Versuchen genau, wie bei den vorangegangenen, und ging zuerst vom Chlorammonium aus. Dasselbe nahm, wie die übrigen Chlormetalle, bei beginnender Einwirkung des Ammoniaks eine große Menge Ammoniak auf, unter zuletzt erfolgreicher Auflösung in demselben, die mit der beginnenden Natriumammoniumbildung zusammenfiel. Die Farbe des Natrium-Ammoniums ging nach und nach in die einer dunklen Bronze über, und nahm zuletzt, nach Verlauf von etwa einer Stunde, als die Menge des Wasserstoff-Ammoniums vorzuwalten schien, eine stahlblaue Farbe an, unter Beibehaltung eines starken Metallglanzes, so lange noch geringe Mengen von Natrium-Ammonium unzersetzt waren, der jedoch auch mit diesem schwand; es zeigte sich alsdann die Röhre erfüllt von einer blauen, mit überschüssigem Ammoniak gemengten Flüssigkeit. Der hier gebildete Körper, der nach den gemachten Voraussetzungen  $\left. \begin{array}{c} \text{NH}_3 \\ \text{H} \end{array} \right\}$  seyn mußte, ist noch bei weitem unbeständiger, als die schon beschriebenen Am-

Ammoniummetalle; es kann unter Innehaltung der bei diesen schon angegebenen Bedingungen, selbst nur während weniger Stunden bestehen, und erfolgt, wenn die Temperatur dieses Theils der Röhre 12 bis 14° übersteigt, ein Zerfallen des einen Theils des Ammoniums, bevor noch die Umsetzung zwischen Natrium-Ammonium und Chlorammonium vollendet ist. Es zeigt sich die beginnende Zersetzung durch eintretende Entfärbung der vorher tiefdunkelblauen Flüssigkeit, und endet unter Zurücklassung völlig farblosen Ammoniaks, das als leicht bewegliche Flüssigkeit das entstandene Chlornatrium durchdringt und überfließt. War der hier beobachtete blaue Körper das gesuchte Ammonium, so könnte ein Zerfallen desselben voraussichtlich nur nach einer den übrigen Ammoniummetallen analogen Weise, erfolgen, nämlich im Ammoniak und Wasserstoff, dessen Gegenwart, wie unten beschrieben, nachgewiesen wurde.

Um nun zu prüfen, ob die blaue Verbindung nicht etwa eine Chlorverbindung sey, und Chlor zu ihrer Bildung wesentlich sey, wurde in einem zweiten Versuche schwefelsaures Ammoniumoxyd der Einwirkung von Na-



dungs- und Zersetzungsweise der hier erhaltenen Verbindung mit den schon beschriebenen Ammoniummetallen, so wie die Unabhängigkeit ihrer Bildung von den zu ihrer Darstellung gewählten Ammoniumoxydsalzen, so ist mit ziemlicher Gewissheit anzunehmen, daß in ihr das gesuchte Ammonium vorliege. Man könnte freilich geltend machen, daß das Ammoniak im *status nascens* auf der einen Seite zu dem aus Salmiak freiwerdenden Wasserstoffammonium, auf der andern Seite in dieselbe Beziehung treten könne, wie Natrium-Ammonium zu den Chlormetallen, d. h. daß hier, wie dort, sich ein Ammonium bilde durch Zusammen-treten von Ammoniak und Wasserstoff. Berücksichtigt man jedoch, daß, wie aus dem schon beschriebenen Verhalten von Ammoniak gegen gebildete Ammoniummetalle hervorgeht, die äußern Eigenschaften dieser letzteren nicht wesentlich geändert erscheinen, so wird man auch hier, nach Analogie zu schließen, die Eigenschaften des vollkommen isolirten Ammoniums, als nicht wesentlich verschieden von den beobachteten, aufzufassen haben.

Da es mir wichtig erschien, die Zusammensetzung des Wasserstoff-Ammoniums außer Zweifel zu setzen, änderte ich die Bedingungen bei seiner Bildung in folgender Weise ab.

Wenn Natrium-Ammonium auf Chlormetalle und Oxyde reducirend einwirkte, war zu erwarten, daß, wenn überhaupt der Wasserstoff im *status nascens* befähigt ist, mit Ammoniak Ammonium zu bilden, bei der Einwirkung von Natrium-Ammonium auf Natronhydrat, unter Abscheidung von Natriumoxyd, Wasserstoff-Ammonium sich bilden würde.


0,208 Grm. Kalium und 0,298 Grm. Kalihydrat wurden der Einwirkung von Ammoniakgas ausgesetzt. Nach kurzer Zeit war die Bildung von Kalium-Ammonium und dessen gleichzeitig eintretende Einwirkung auf das Kalihydrat an dem Auftreten des intensiv blauen Körpers zu beobachten; er war gleichfalls, wie der aus den Ammoniumsalzen erhaltene, flüssig, und zerfiel wie jener, nach wenigen Stunden in Ammoniak und Wasserstoff, der nach dem Öffnen der Röhre nebst Kaliumoxyd, dieses in einer festen

Verbindung mit Ammoniak nachgewiesen wurde. Zur weiteren Prüfung des metallischen Charakters des Ammoniums



wurde in einer zweiten Röhre von beistehender Abänderung in der Form die Amalgamation mit Quecksilber versucht. Der Schenkel *a* enthielt Chlorsilber-Ammoniak, *b* Natrium und Natronhydrat, *c* Quecksilber. Durch Neigen der Röhre war es möglich das Ammonium zum Quecksilber fließen zu lassen und durch Schütteln die Amalgamation zu unterstützen. Obgleich eine wesentliche Veränderung des Quecksilbers nicht beobachtet werden konnte, so entfärbte sich doch die blaue Flüssigkeit rasch nach dem jedesmaligen Schütteln mit dem Quecksilber, ohne daß eine Gasentwicklung zu beobachten gewesen wäre. Es ist sonach anzunehmen, daß das in dem Ammoniak gelöste Ammonium von dem Quecksilber aufgenommen wurde, während die scheinbare Unveränderlichkeit des letzteren in der überwiegend größeren Menge desselben gegen das aufge-

moniak mit Metalloxyden und deren Salzen erhaltenen Verbindungen als die den bezüglichen Metallen entsprechenden Ammonium-Verbindungen zu betrachten sind, wie dies bei einem grossen Theil auch schon lange geschehen ist; eine Auffassung, die bis zur Evidenz sich erhebt, wenn es gelingt, von den Ammoniummetallen selbst ausgehend, solche Verbindungen zu erhalten. In Folgendem sollen die in dieser Richtung angestellten Versuche beschrieben werden. Das Oxyd des Kalium-Ammoniums mußte sich bei der Darstellung des Wasserstoff-Ammoniums aus Kalium und Kalihydrat gebildet haben. Den hier vor sich gehenden Proceß veranschaulichen folgende Formeln:



Es fand sich denn auch nach dem Oeffnen solcher Röhren eine weisse ziemlich compacte Masse, die in ihren Eigenschaften wesentlich vom Kaliumoxyd abwich. Die Bruchflächen zeigten sich vollkommen weiss und besaßen starken Glimmerglanz; in trockener Luft war dieser Körper geruchlos, in feuchter Luft zog er Wasser an, zerfloß und roch stark nach Ammoniak; in Wasser geworfen zertheilte er sich nach heftigem Schütteln zu einem weissen Pulver, das sich erst nach einiger Zeit klar löste; die Lösung entwickelte nach dem Kochen grosse Mengen Ammoniak. So fest gebunden hält diese Verbindung das Ammoniak, daß beim Erhitzen der Substanz in einer an einem Ende zugeschmolzenen Röhre dasselbe nur zum kleinsten Theile entweicht, während der übrige auf das Kaliumoxyd reducierend einwirkend sich unter Bildung von Wasser und Kaliumamid zersetzt; letzteres an der blaugrünen Farbe erkennbar. Es kann eine Verbindung von Kalium oder Natriumoxyd mit Ammoniak auch noch auf folgendem Wege erhalten werden. Leitet man Ammoniakgas über Kalium oder Natrium, so bildet sich nach einigen Stunden in den meisten Fällen auf der Oberfläche desselben eine sehr dünne Schicht

eines weissen Körpers, dessen Auftreten schon Berzelius gelegentlich der Darstellung des Kaliumamids bemerkt, aber seine Zusammensetzung nicht erkannt hatte. Die Bildung dieser Substanz hat, wie ich beobachtet, ihren Grund in der im Ammoniakapparat fast stets vorhandenen Luft, und lässt sich ein grosser Theil der Kaliummasse in diese Substanz bei gewöhnlicher Temperatur überführen, wenn man zugleich mit trockenem Ammoniakgas trockene Luft zu dem Kalium treten lässt. Denn obwohl Sauerstoff allein weder Kalium noch Natrium bei gewöhnlicher Temperatur zu oxydiren vermag, so erlangt er doch in hohem Grade dieses Vermögen bei Gegenwart von Ammoniakgas. Vollständig gelingt die Umwandlung des Kaliums in den fraglichen Körper, wenn man das Kalium in kleinen Stücken verwendet, die Kugelhöhre, in der man diese Operation zweckmässig vornimmt, in siedendes Wasser einsenkt, und während mehrerer Tage vollständig trockenes Ammoniakgas unter einem Drucke von 1 bis 2 Zoll Quecksilber mit Luft gemengt, überleitet. Erwärmt man über 100 Grad, so kann

versuchte, die Hauptmasse von den Wandungen der Kugel zu trennen, trat unter dem Druck der Finger eine plötzliche explosionsartige Zersetzung unter Umherschleudern brennenden Kaliums ein.

Dass dieser Körper eine Verbindung von Kalium, Ammoniak und Sauerstoff, zur Gruppe der Ammoniumoxyde gehöre, scheint nach seinen Eigenschaften und seiner Bildung zu schliessen, ausser Zweifel; ob aber ein, mehrere oder sämtliche Wasserstoffäquivalente durch Kalium vertreten sind, würde hier auch durch eine Analyse nur sehr schwer zu entscheiden seyn, insofern diese Ammoniumoxyde selbst wieder nicht unbeträchtliche Mengen Ammoniak hartnäckig zurückhalten.

Analog dem Ammoniak scheinen auch Kalium- und Natrium-Amid befähigt zu seyn, mit den Oxyden dieser Metalle charakteristische Verbindungen zu bilden. Ich beobachtete nämlich bei der Einwirkung von Ammoniak und Sauerstoff auf Kalium, Amidbildung noch weit unter der Temperatur, wie sie erforderlich ist, bei der Darstellung dieses Körpers aus Ammoniak und Kalium allein, was sich durch die Verwandtschaft des anwesenden Sauerstoffs zu dem aus dem Ammoniak freiwerdenden Wasserstoff erklärt. Aehnliche Beziehungen finden bei Natrium statt. Die Bildung des Amides geht so lange vor sich, als das Ammoniakgas vorwaltet; vermehrt man jedoch die Menge des zuströmenden Sauerstoffs, so treten beide an das Metall, gleichzeitig Amid und Oxyd bildend, deren Verbindung bei dem Kalium als tiefblaue, bei dem Natrium als rubinrothe geschmolzene Masse von der Kaliumkugel abfließt; beide sind bei 300° im Ammoniakstrom beständig, zersetzen sich aber beim Ueberleiten von Sauerstoff oder Luft unter Entfärbung und Zurücklassung einer weissen, wie Kalk- und Natronhydrat sich verhaltenden Masse. Die gleichzeitige Einwirkung beider Gase auf die geschmolzenen Metalle ist nicht erforderlich, denn hat man zuerst Amid gebildet, und leitet nun erst Sauerstoff über, so erfolgt auch

hier die Bildung der erwähnten Verbindung, in dem Maasse die Oxydation der Metalle fortschreitet.

Es contrastirt diese energisch ausgesprochene Verwandtschaft der Oxyde der Alkalien in auffallender Weise mit der ziemlich grossen Passivität ihrer Hydrate gegen dasselbe, die hier in dem Streben des Hydratwassers, seinerseits mit dem Ammoniak zu Ammoniumoxyd zusammenzutreten, begründet seyn möchte.

Chlorkalium, Chlornatrium, schwefelsaures Natron und Chlorbarium absorbiren unter sehr hohem Drucke, unter bedeutendem Anschwellen der Masse, zwar viel Ammoniak, geben es aber alle mehr oder weniger rasch an der Luft ab, und kommt sonach diesen Ammoniumverbindungen eine verhältnissmässig nur geringe Beständigkeit zu. Chlorcalcium absorbirt, wie schon Faraday gezeigt, leicht Ammoniak und giebt dasselbe erst wieder beim Erhitzen vollständig ab. Aber auch eine Lösung absorbirt, wie ich beobachtet habe, äusserst heftig grosse Mengen Ammoniak. Stellt man sich eine möglichst concentrirte Lösung von Chlorcalcium in käuflicher

auch beinahe alle in die große Gruppe der Ammoniummetalle sich einzureihen scheinen.

Die Sulfurete des Kalium- und Natrium-Ammoniums suchte ich zu erhalten, einmal durch Einwirkung von flüssigem Ammoniak auf die Schwefelmetalle, und dann durch Einwirkung der Ammoniummetalle auf eine äquivalente Menge Schwefel. Es absorbirten die Schwefelalkalien unter den zuerst genannten Bedingungen eine große Menge Ammoniak. Bei großem Ueberschufs desselben waren die entstandenen Verbindungen orangegelb, und fand eine partielle Lösung derselben statt; nach dem Erkalten des Chlorsilberschenkels trat unter Entfärbung der Masse viel Ammoniak wieder zurück, und der nun weiße Körper liefs beim Oeffnen der Röhre ebenfalls noch Ammoniak entweichen; bei schwachem Erwärmen, sowie beim Kochen der wässerigen Lösung trat der Geruch nach Schwefelammonium auf. Die auffallende Bildung von Schwefelammonium liefs mich vermuthen, dafs hier nicht die Sulfurete von Monokalium- und Natrium-Ammonium vorlagen, sondern dafs eine Zersetzung des Ammoniaks eingetreten seyn müsse, wie diefs sich bei folgendem Versuche evident zeigte. Ich setzte äquivalente Mengen Natrium und Schwefel der Einwirkung flüssigen Ammoniaks aus. Verwandt wurden 0,318 Grm. Natrium, 0,221 Grm. Schwefel. Mit beginnender Einwirkung des Ammoniaks traten die ersten Mengen Natrium-Ammoniums in Reaction mit einem Theile des als feines Pulver angewandten Schwefels, unter Bildung des vorher erwähnten gelben Körpers, der sich in weiter zugeführtem Ammoniak auflöste. Als jedoch die Röhre leicht bewegt wurde, so dafs sämtliches inzwischen gebildetes Natrium-Ammonium mit dem übrigen Inhalt der Röhre in Berührung kam, nahm sofort die ganze Masse die tiefblaue Farbe des Wasserstoffammoniums an, die jedoch, sowie der Schwefel immer mehr zur Wirkung kam, schon nach einer halben Stunde gänzlich verschwand, und der gelben Farbe des bei der Einwirkung von Ammonium auf Schwefelnatrium erhaltenen Körpers wich. Nach dem Oeffnen

der Röhre verhielt er sich in gleicher Weise. Die durch das Ammoniak erzielte Gewichtszunahme betrug 0,118 Grm. Die Menge des Schwefelnatriums stand sonach zu der des aufgenommenen Ammoniaks im Verhältniß von 2:1, so daß um die Hälfte weniger Ammoniak aufgenommen worden war, als zur Bildung von Schwefelnatrium-Ammonium erforderlich gewesen wäre. Zwei andere Versuche ergaben dieselben Resultate. Daß dem erhaltenen Endproducte Schwefelammonium,  $\text{NH}_4\text{S}$ , beigemengt seyn mußte, geht aus dem vorübergehenden Auftreten des Wasserstoff-Ammoniums hervor, dessen Vorhandenseyn außerdem noch durch die Nachweisung des Wasserstoffs documentirt wurde. Wenn der gelbe Körper, welcher sich bei Einwirkung von Ammoniak auf Schwefelnatrium bildet, Schwefelammonium enthält, so erklärt sich das Auftreten von Wasserstoff-Ammonium bei Gegenwart von Natrium, Schwefel und Ammoniak leicht durch die Einwirkung des noch nicht in die Reaction eingetretenen Natrium-Ammoniums auf den schon entstandenen Schwefelammonium enthaltenden Theil des



Berechnet man die durch die Wirkung des Ammoniaks auf Schwefelnatrium erzielte Gewichtszunahmen nach der in der obigen Formel gemachten Voraussetzung, und berücksichtigt man, daß Schwefelammonium an der Luft genau die Hälfte seines Ammoniaks abgibt, so erhält man mit den durch die Formeln geforderten sehr nahe übereinstimmende Zahlen. Um die Voraussetzung, daß bei diesen Versuchen sich Schwefeltetranatrium-Ammonium gebildet, zu prüfen, ließ ich ein Aequivalent Natrium-Ammonium auf vier Aequivalente Schwefel wirken. Es trat bei überschüssigem Ammoniak unter Bildung von Wasserstoff-Ammonium rasch eine Vereinigung des sämtlichen Natriums mit dem Schwefel ein, und blieb nach dem Zerfallen des Wasserstoff-Ammoniums ein schwach-gelbes kristallinisches Pulver zurück. Es löste sich leicht in Alkohol und Wasser, entwickelte beim Kochen kein Schwefelammonium, wohl aber viel Ammoniak.

Eine Analyse dieses Körpers, die über seine Zusammensetzung entscheiden würde, konnte ich bis jetzt noch nicht durchführen.

Die hier, sowie vielleicht auch beim Kaliumoxyd, und namentlich beim Quecksilberoxyd ausgesprochene Tendenz des Ammoniaks die Bildung von Tetrametallammonium zu veranlassen, bestimmten mich, zu den Erscheinungen, die unter den möglichst einfachen Bedingungen erfolgen, wieder zurückzukehren und die Einwirkung des Ammoniaks auf Kalium auch nach dieser Richtung hin zu untersuchen. Die hierbei erlangten, noch nicht zum Abschluß gekommenen Resultate theile ich kurz mit, da sie das Verständniß der übrigen wesentlich erweitern und zu ihnen ergänzend sich verhalten.

So wie man als Ursache für das Entstehen von Tetramercurammoniumoxyd ein Zerfallen des Monomercurammoniumoxyds in jenes und Wasserstoffammoniumoxyd annehmen kann, wäre wohl auch die Bildung eines Tetrametallammoniums aus einem Monometallammonium möglich.

Ich ließ Ammoniak auf Kalium im Verhältniß mehre-

rer Aequivalente von jenem zu einem von diesem einwirken. Anfänglich bildete sich Kalium-Ammonium, das nach mehrstündiger Einwirkung dunkler zu werden begann, alsdann die tiefblaue Farbe des Wasserstoff-Ammoniums annahm und schliesslich unter Zurücklassung einer gelben Flüssigkeit, die sämmtliches Kalium gelöst enthielt, sich entfärbte. So wie der Chlorsilberschenkel erkaltete und das überschüssige Ammoniak in ihn zurücktrat, schied sich ein farbloser durchsichtiger krystallinischer Körper aus, der an der Luft beständig war, in Wasser geworfen, unter heftigem Aufbrausen und starker Ammoniakentwicklung sich löste. Wasserstoff schien er nicht zu entwickeln. Weitere Versuche konnte ich bis jetzt noch nicht mit ihm anstellen; doch scheint in ihm kein Ammoniummetall vorzuliegen und gehört er vielleicht in die Reihe der Amide. Die Röhre liess beim Oeffnen viel Wasserstoff entweichen. Mehrere andere Versuche führten zu den gleichen Ergebnissen. Da hieraus hervorging, dass bei einer grossen Menge überschüssigen Ammoniaks die erwartete Umsetzung nicht

sehr wichtig erschien., neben Wasserstoff-Ammonium auf, der sicherste Beweis, daß das Amalgam außer Natrium noch Stickstoff enthielt. Um gegen einen Irrthum, der durch das dem Amalgam etwa anhaftende gasförmige Ammoniak veranlaßt seyn könnte, geschützt zu seyn, erhitze ich das Amalgam unter Abschlufs der Luft bis zum Schmelzen; doch bildete sich auch hier bei Behandlung des erhaltenen Regulus mit Wasser neben Wasserstoff auch Ammoniak, woraus sonach folgte, daß die Umsetzung in Tetrametallammonium und Wasserstoff - Ammonium selbst auch im Amalgam eintreten kann. Dieses Verhalten des Kalium-Ammoniums veranlaßte mich, die metallischen Rückstände, die ich erhalten hatte bei dem Zerfallen der übrigen Monoammoniummetalle, auf einen möglichen Gehalt an Stickstoff respective Tetrametallammonium zu untersuchen. Es bestätigte sich in der That auch diese Vermuthung bei dem darauf hin untersuchten Barium und Silber, und zwar einmal insofern, als in den Röhren, die zur Darstellung deren Ammoniummetalle dienten, Wasserstoff sich nachweisen liefs, so wie auch dadurch, daß das Silber bei dem Uebergießen mit verdünnter Chlorwasserstoffsäure Wasserstoff entwickelte. Zu einem zweiten Versuch wurden das Barium und Silber mit Quecksilber amalgamirt, die erhaltenen Amalgame durch Waschen mit Salzsäure und Wasser von den noch etwa anhaftenden Ammoniaksalzen befreit, dann mit Wasser übergossen und zum Sieden desselben erhitzt, wobei das Bariumamalgam ziemlich leicht Wasserstoff und Ammoniak entwickelte, während das Silberamalgam nur äußerst schwierig sich zersetzte, doch aber unter dem unverkennbaren Auftreten des Geruches nach Ammoniak. Die Zersetzung jenes letzteren ging rascher von statten nach dem Uebergießen mit Salzsäure, in der nach Beendigung des Processes das aufgenommene Ammoniak durch Platinchlorid nachgewiesen werden konnte.

Berlin, im August 1864.

VIII. *Die Sternschnuppen in ihren Beziehungen  
zur Erdoberfläche;  
von Freiherrn von Reichenbach.*

XXIII.

Ueber die Zusammensetzungen der Meteorsteine habe ich mich in der XIII. dieser Abhandlungen \*) ausgesprochen und darzuthun bestrebt, daß sie nie und nirgends mit mineralogischer Einfachheit angethan, niemals mineralogische Individuen sind, sondern daß sie überall in einer Weise zusammengesetzt erscheinen, wie wir dies nur bei Breccien und ähnlichen Conglomeraten terrestrischer Körper sehen. Weiteres ist dort auseinandergesetzt, wie diese Gemengttheile theils aus kleinern Kügelchen bestehen, mehr oder minder abgerundet, theils aus unregelmäßig geformten, bisweilen sogar noch ganz scharfeckigen Trümmern

*Pegu, Piney, Nanjemoy, Richmond*, die sich fast in allen größern Sammlungen vorfinden; eckig, stellenweise scharfkantig, unregelmäßig gestaltet und mehr oder minder Trümmerstückchen gleichend, erscheinen sie in *Madaras, Bremerförde, Parnallee*; wieder andere halten das Mittel zwischen beiden, und sind aus Kügelchen und Trümmerstückchen nebeneinander zusammengesetzt: so *Lontalax, Nobleborough, Mässing* und vorzugsweise *Siena*, wovon ein überaus schönes, merkwürdiges und lehrreiches Stück zu Berlin in der Sammlung der Universität liegt, ein Journal von einem Meteorsteine.

Wie nun die großen Meteoriten im Allgemeinen hauptsächlich aus metallischem Eisen, aus Schwefeleisen, aus Eisenoxyduloxyd und Talkerdesilicaten bestehen, so sieht man auch die Tochtermeteoriten aus denselben Materialien zusammengesetzt, nur bald in andern Proportionen der Bestandtheile, bald anders von Farbe, weiß in schwarzen Meteoriten wie *Renazzo*, schwarz in weißgrauen, wie *Siena*, verschiedentlich gefärbt in *Madaras* und andern; bald von verschiedener Feinheit des Kornes, bald von anders gerichteter, öfters sich kreuzender Schichtung.

Mit allen diesen Beschaffenheiten und Unterschieden vom Hauptmeteoriten ausgerüstet erweisen sich nun diese eingeschachtelten Meteoriten als Gebilde, die im Ursprunge eigene Entstehung und eigenes Daseyn besaßen. Sie sind wie ich mit Belegen dargethan habe, früher eigene, kleine, primäre Meteoriten gewesen, die sich später für sich zu einem größern Körper aggregirt oder an einen solchen angeschlossen haben. Sie sind dann in seine Masse eingeschlossen und ihm als untergeordnete Bestandtheile einverleibt worden. Die Belege für diese Ansicht will ich hier, um Weitläufigkeit zu vermeiden, nicht wiederholen, sondern mich damit auf meine genannte frühere Abhandlung berufen.

In der darauf folgenden XIV. Abhandlung <sup>1)</sup> habe ich auseinandergesetzt, wie die Meteoriten, welche wir besitzen,

1) Diese Annalen Bd. CXI, S. 387.

von mächtigen, hunderte von Contnern schweren Massen der Größe noch in einer fortlaufenden Reihe heruntersteigen bis zu mikroskopischen Pünktchen; dafs, so wie gröfsere und kleinere Meteormassen zu uns herabfallen, so auch zahllos viele solche grösste und kleinste Körperchen im Sonnensystem umherlaufen: dafs einige wenige Pfunde Meteorstein, z. B. von Borkut, einem feinen Roogensteine ähnlich Millionen solcher Kügelchen in sich angehäuft besitzt, die einst alle in eigener freier Bahn sich bewegt haben mußten, und dafs solche von jeglicher Größe sich noch jetzt und beständig in den Welträumen umhertreiben.

Wenn nun solche kleine Individuen mit all der Geschwindigkeit und dem übrigen Verhalten der uns bis nun bekannten Meteoriten in die Atmosphäre eindringen, so müssen sie wie diese die Erhitzungs-, Schmelzungs- und beziehungsweise Verbrennungsprocess durchlaufen, wie wir sie an den gröfsern Meteoriten nunmehr ziemlich genau kennen; sie müssen, ähnlich den Callomischen Kügelchen<sup>1)</sup>, in feinen Staub zerstieben, und lange ehe sie den Erdboden

Sind sie äußerst kleine Meteoritchen, so bringen sie doch Stoffliches mit, und kommen sie, wie alle Meteoriten, aus kosmischen Räumen, so müssen sie der Erdoberfläche irgend etwas Materielles zubringen. Wäre dies für jeden einzelnen Fall, für jeden einzelnen Tag, ja für ein ganzes Jahr auch noch so wenig: am Ende nach Abfluß von Jahrtausenden müßte zuletzt doch etwas mit Sinnen erreichbares, etwas Greifbares, durch die Luft herabfallen und sich am Boden absetzen. Daß wirklich etwas hieran Anstreifendes geschieht, davon legen die Callum'schen Kügelchen ja schon den unwiderleglichen Beweis ab. Was könnte, was müßte nun das seyn? doch offenbar nur etwas, was sich uns in den Meteoriten schon kund gegeben hat. Gewöhnlich sieht man die Anwesenheit des Nickels als das Kriterium für meteoritische Herkunft derjenigen Steine an, welche sonst durch ihre übrige Beschaffenheit der Herkunft vom Himmel verdächtigt sind. Wären die Sternschnuppen wirklich Erzeugnisse kleinster Meteoriten, so könnte man denken, daß sie Nickel mitbrächten. Ein gleicher Fall wäre es mit Kobalt. Sofort wäre es Eisen, Kieselerde, Talkerde, Schwefel, Phosphor, welche zumeist in den Meteoriten gemein sind. Ob es eines Versuches werth seyn möchte, diese Muthmaßung weiter zu verfolgen?

Diesen Betrachtungen mich überlassend stieg ich den Labisberg hinauf, einen etwa 1200 Fuß hohen kegelförmigen Berg, mit Buchen bewaldet, auf dessen halber Höhe mein Landhaus liegt; ich suchte zuoberst eine Stelle aus, von der angenommen werden muß, daß sie außer etwa von Holzhauern, niemals von menschlicher Thätigkeit erreicht worden ist, und nahm von verschiedenen Stellen einige Hände voll Erde von der Oberfläche, mengte sie untereinander, und trug eine Düte voll davon nach Hause. Sie wurde nun chemisch untersucht, und — zu meiner angenehmen Genugthuung — zeigte sie in der That unverkenubare Spuren nicht allein von Nickel, sondern auch von Kobalt. Ich ging nun auf einen andern Berg, den Haindelsberg, der etwa 100 Fuß höher ist und oben einen

Rücken bildet, und holte von abgelegenen Stellen Erde. Auch in ihr wurde Nickel und Kobalt gefunden. Erde die ich von einer dritten Höhe, gegen den Kahlenberg bis gelegen, aufhob, lieferte Reaction auf Nickel und Kupfer; ebenso ergab Erde, die ich von der Höhe des Dreymarksteinberges geholt hatte, wiederum Nickel und Kobalt. Endlich hatte Hr. Czerny Erde aus dem Marchfelde in anderer Absicht untersucht, und war dabei zu seiner Ueberschung auf Nickel gestossen. So fand sich denn also, daß allenthalben in hiesiger Gegend der Erdboden auf seiner äußersten Oberfläche Nickel und Kobalt enthält.

Wo sollen nun diese herkommen? Das Gebirge, auf dem sie hier gefunden wurden, besteht geognostisch aus wohl- ausgesprochenem Keupersandstein mit Strecken von Keuperkalkstein. Diese enthalten kein Nickel und kein Kobalt, und bei so vielen darüber geführten Untersuchungen ist niemals welches darin gefunden worden. Die Menge derselben ist zwar, weil sie zu gering war, nicht gewogen worden, wurde aber auf Ein Zehntausendtheil der unter-



sogenannten Müdigkeit verfallen wollen. Seit langer Zeit aber zerbrechen sie sich die Köpfe darüber, wo denn eigentlich dieser Phosphor herrühre und woher sich seine so gleichförmige Verbreitung überall ableiten lasse?

Und nicht viel möchte es gefehlt seyn, wenn ich mir erlaube, hierher auch die so allgemeine Oberflächen-Verbreitung der Bittererde zu beziehen. In vielen Gegenden ist die geognostische Unterlage durchweg frei von Bittererde. Und dennoch sind die Felder niemals und nirgends ganz leer davon. Die Menge ist in manchen Gegenden so gering, daß sie zur Bildung der Häute der Getreidekörner, wozu die Vegetation ihrer bedarf, kaum hinreicht. Aber sie ist doch in dieser kleinen Quantität vorhanden und fehlt nirgends gänzlich.

Wir haben also auf der Erdoberfläche, derjenigen Gegend wenigstens, welche ich der Prüfung unterzog, sehr kleine aber unverkennbare Mengen von

Nickel,  
Kobalt,  
Phosphor und  
Bittererde

in allgemeiner gleichförmiger Verbreitung, deren Gegenwart bis jetzt nicht ableitbar aus den Umständen, nicht erklärbar von Seiten der Geologie ist. Aber gerade diese Substanzen sind es, welche sich in den Meteoriten vorzugsweise vorfinden, und welche sie aus den Welträumen auf die Oberfläche der Erde uns zubringen. Finden nun theoretische Gründe statt, welche uns die Sternschnuppen als Meteoriten wahrscheinlich machen, so findet diese Ansicht hierdurch einen neuen, aber thatsächlichen Unterstützungsgrund in der Auffindung derjenigen Stoffe in seiner Verbreitung auf der Erdoberfläche, welche den meteoritischen Körpern vorzugsweise eigen sind.

Demgemäß würden, wenn ich mir den Schluß erlauben darf, die Sternschnuppen der Quell seyn, aus welchem uns seit Jahrtausenden und täglich hinfort Phosphor in Säureform und Bittererde zur Befruchtung unserer Felder zugeführt

werden, Zeuge des Nickels und des Kobaltes, die neben ihnen sich vorfinden. Und man hätte sich dieß als einen äußerst feinen Regen, als einen unsichtbaren Duft zu denken, der in äußerst geringer Menge und in höchst feiner Vertheilung ohne Unterlaß sich aus der Atmosphäre auf unsere Meere, Wälder und Gefilde niedersenkt. Und so dürfte denn auch die Landwirthschaft Veranlassung finden, von der Lehre von den Meteoriten demnächst einige Notiz zu nehmen.

---

**IX. Ueber das angebliche Meteoreisen von Pompeji  
in der Chladnischen Meteoritensammlung;  
von G. Rose.**

---

In der Meteoritensammlung Chladni's, die durch des Letzteren Vermächtniß dem Berliner mineralogischen Museum zugefallen ist, befand sich eine kleine Antike, die Chladni

mit eingeschnittenem Zeichen eines Sterns und Viertelmonds eingelegt, Zeichen mit denen nach Chladni die Alten öfter die herabgefallenen Massen, die sie als Heiligthum und als Symbol der Götter ansahen, bezeichneten, und Chladni glaubte nun, daß dies auch mit diesem Eisen der Fall sey, um so mehr, als er bei ihm noch eine tafelartige und blättrige Structur wie bei dem Meteoreisen zu erkennen glaubte. Er war von seiner Meinung so überzeugt, daß er ausfindig zu machen suchte, zu welcher Zeit das Eisen wohl gefallen seyn mochte. Da nun Plinius (*hist. nat. II, 57*) von einem Niederfalle schwammigen Eisens in Lucanien berichtet, der etwa 56 bis 52 Jahre vor unserer Zeitrechnung stattgefunden hat, so hielt er es für wahrscheinlich, daß es dieser Fall gewesen sey, von welchem die gefundene Antike abstamme und zwar weil ältere Römische Schriftsteller wohl viele Meteorsteinfälle aber weiter keinen Eisenniederfall als diesen meldeten, weil Lucanien aus einem Theile des jetzigen Apulien, Abruzzo und Calabrien bestanden hat, und also die Gegend des Niederfallens nicht weit von Pompeji entfernt seyn konnte, und endlich weil die Zerstörung von Pompeji etwa 135 Jahre später als dieser Niederfall sich ereignet hat, und er also noch in Erinnerung geblieben seyn konnte, wie denn auch die Bearbeitung des Eisens und des Karneoltäfelchens wohl auch eine geraume Zeit vorher geschehen seyn mochte.

Um nun darüber Gewißheit zu erlangen, ob das Eisen der Antike wirklich ein Stück eines Meteoriten sey, habe ich zwei Versuche angestellt, die bei günstigen Resultaten für den meteorischen Ursprung des Eisens allerdings entscheidend wären; ich habe die Antike, so klein sie war, (sie wog nur 0,5912 Grammen) an der Unterseite anschleifen lassen, um sie zu ätzen und auf Widmanstätten'sche Figuren zu prüfen, und das dabei Abgetrennte auf Nickel untersucht.

Bei dem Befeilen des Eisens der Antike löste sich Pulver und ein kleines Stückchen ab: die erhaltene Fläche nahm aber beim Poliren keinen Metallglanz an, sie sah

schwarz aus wie Magneteisenerz, und nur an einer Stelle zeigte sich ein metallischer Streifen von stahlgrauer Farbe; von Widmanstätten'schen Figuren konnte also nichts erhalten werden.

Bei der Untersuchung des abgelösten Pulvers und des kleinen Stückchens wandte ich die Methode meines Bruders zur Auffindung kleiner Mengen von Nickel im Eisen an, nachdem ich mich zuvor bei einem Stückchen von der oxydirten Rinde des Toluca-Eisens von der Anwesenheit des Nickels auch in dieser Rinde überzeugt hatte. Das Eisen der Antike löste sich in heißer Chlorwasserstoffsäure in Vergleich mit dem Meteoreisen viel schneller als dieses auf: es blieb dabei ein kleines Stückchen zurück, das auch der Einwirkung des Königswassers widerstand und sich als Kieselsäure erwies, indem es im Achatmörser zerrieben, mit Soda vor dem Löthrohr zu einem Glase zusammenschmolz. Die Auflösung wurde mit Schwefelwasserstoffwasser und sodann gleich mit Ammoniak versetzt, ohne den zuerst entstandenen Niederschlag von Schwefel zu filtriren, der nun mit dem zuletzt entstandenen schwar-

Prof. Tölken versichert hatte, daß ein solches Zeichen sich oft auf Gegenständen befände, die sicherlich nicht himmlischen Ursprungs wären.

Die Antike ist demnach sehr wahrscheinlich ein Stück eines eisernen Ringes, wie sie bei den alten Römern viel getragen wurden. In der hiesigen Antiken-Sammlung befinden sich viele solche eiserne Ringe mit geschnittenen Steinen und Hr. von Olfers erlaubte mir gern, von mehreren derselben kleine Parthien ablösen zu dürfen, die ich chemisch untersuchte; ich fand bei allen diesen einen kleinen Gehalt an Kupfer, was mir bemerkenswerth zu seyn scheint.

Da es also hiernach erwiesen zu seyn scheint, daß die besprochene Antike kein meteorisches Eisen ist, so bleibt immer der Meteorit von Ensisheim, der 1492 herabgefallen ist, der älteste bekannte Meteorit in den Sammlungen.

---

*X. Ueber die zur Fruchtbildung des Weizens  
specifisch nothwendigen anorganischen Stoffe;  
von Fürst Salm-Horstmar.*

---

**E**s ist mir endlich im verflossenen Sommer gelungen, den Schlüssel des mich schon lange verfolgenden Räthsels:

„welches sind die zur Fruchtbildung des Weizens specifisch nothwendigen anorganischen Stoffe?“  
zu finden.

Ich habe diesen Schlüssel gefunden in dem *Lepidolith* von Rozena, wenigstens für den Sommerweizen, wie sich aus dem ersten der folgenden Versuche ergeben wird.

Ich muß vorausschicken, daß das Bodenmedium dieser Versuche, abgesehen von den gewählten Zusätzen, aus klarem *Bergkrystall* bestand, der so fein zerschlagen war, daß die größten Splitter etwa 1,5 Millimeter Durchmesser hat-

... wurden so  
 begossen bis sich das dritte B  
 an wurden sie mit destillirten  
 auf *hundert* Grammen 1 Cèn  
 2 Milligrammen Chlornatrium  
 kalium enthielt.

A. Am 27. Februar. Ver  
 65,000 Grammen Bergkrystal  
 0,07 " Lepidolith  
 0,04 " drittel phosph  
 glüht ' ).  
 0,01 " Kieselsäureh  
 0,02 " kohlensaure  
 0,05 " kohlensaurer  
 0,02 " schwefelsaure  
 0,002 " drittel phosph  
 0,001 " kohlensaures  
 0,03 " basisch phosph  
 0,02 " Bergkrystal ge  
 0,003 " salpetersaures  
 0,001 " " N

wurde dieses Gemenge in das aus weißem filtrirtem Wachs bestehenden Gefäß eingefüllt und mit einem Platinspatel etwas niedergedrückt; hierauf *drei* gewaschene Körner von Sommerweizen *so eingelegt*, daß das obere Ende des Kornes *wenig* aus der Bodenmischung hervorstand, dann die zweite Hälfte der zuletzt genannten Auflösung über die Oberfläche vertheilt und hierauf noch *zwei* Grammen destillirtes Wasser über die Körner getropft, weil sie *besser keimen*, wenn ihre nächsten Bodentheilchen verdünntere Auflösung enthalten.

Nachdem die Körner den Anfang des Blattkeimes zeigten, wurden zwei Körner herausgezogen, so daß nur *eine* Pflanze blieb, wie es bei allen diesen Versuchen geschehen muß. Diese Pflanze wuchs normal, der Halm wurde siebenzehn Zoll lang, die Aehre hatte *vier* Blüthen und am 27. Juni *drei* vollständig ausgebildete starke Körner.

*B.* Am 27. Februar. Versuch mit gleicher Menge Lepidolith von Rozena und gleicher Bodenmischung wie bei *A.* aber mit Zusatz von

1 Milligrm. schwefelsauren Baryt  
1       "                       "       Strontian.

Hier war das Resultat ein schwächerer, etwas niedriger Halm von zwölf Zoll Länge, eine Aehre mit Staubbeutel, aber doch *ohne* Frucht.

Die Ursache dieses Resultates ist wohl im Baryt oder im Strontian oder in beiden anzunehmen.

*C.* Am 2. März. Versuch in einer Bodenmischung *ohne* Lepidolith, übrigens wie bei *B.* aber mit Zusatz von

0,12 Grammen grünem Glimmer, der durch schaben mit der Schärfe eines Feuersteins fein zertheilt war.

Hier zeigte die Pflanze normalen Wuchs, Halm aufrecht und zwölf Zoll lang, eine kleine Aehre *ohne* sichtbare Staubbeutel aber *ohne* Frucht.

Es ist nicht ohne Interesse, daß dieser Glimmer von demselben war, womit der Versuch mit Gerste angestellt wurde, der im vorigen Jahrgang dieser Annalen mitgetheilt ist.

**D.** Am 20. März. Versuch ohne Lepidokitt ohne Glimmer, übrigens die Bodenmischung wie bei B aber mit Zusatz von

0,02 Milligrm. salpetersaurem Lithion,  
 0,01       "       Chlor-Rubidium,  
 0,02       "       Fluorkalium.

Die Vegetation war hier sehr abnorm, die Depression der Halmbildung verrieth sich, indem der Ansatz des zweiten Blattes längere Zeit in gleicher Höhe mit dem des ersten blieb; endlich trieb sie noch eine Art von Halm, einen Zoll lang und krumm, der aufhörte zu wachsen, als sich an seiner Spitze noch ein fadenförmiges drittes Blatt zeigte, und so blieb die Pflanze, bis am 28. April ihre Blätter abgestorben waren, worauf sich noch eine Spur von Nebentrieb am Wurzelknoten bildete; und so starb die Pflanze bei der sorgfältigsten Pflege.

**E.** Um über den Grund des Absterbens der Pflanze des vorigen Versuchs etwas zu erfahren, wurde — ohne die abgestorbene Pflanze herauszunehmen, ein frisches Sommergetreide ausgesät. Dessen Korn trieb eine



lich die Haupttriebfeder der Kraft fehlte, mußte ihr Halm schwächlich werden.

Ich halte das Chlor-Rubidium für den Stoff der nachtheilig auf *D.* gewirkt hat.

*F.* Am 25. März. Versuch *ohne* Rubidium und *ohne* Fluorkalium, im Uebrigen dieselbe Bodenmischung von *D.* wobei ich wiederholt bemerke, daß das *Lithion* von Rubidium *gereinigt* war.

Diese Pflanze war bis zum *dritten* Blatt — gesund, im *vierten* Blatt stehend, starben alle Blätter an der Spitze ab, und das *fünfte* Blatt fing an zu erscheinen — aber *fadenförmig*. Die Stellung aller Blätter abnorm, die Halmbildung vollständig deprimirt. Zuletzt wurden die Blätter beinahe purpurroth und so starb die Pflanze bei sorglichster Pflege.

Sollte hier die Ursache im Lithion zu suchen seyn, weil das Fluorkalium ihm fehlte?

*G.* Am 2. April. Versuch *ohne* Rubidium; die Bodenmischung wie bei *D.*, folglich mit 0,02 Milligrm. salpetersaurem Lithion; 0,02 Milligrm. Fluorkalium.

Hier wurde die Halmbildung *normal*, der Halm *neun* Zoll lang, mit kleiner Aehre  
aber *ohne* Frucht.

*H.* Am 16. April. Versuch wo die Mischung *D.* folgende Abänderung erlitt:  
0,01 Milligrm. salpeters. Lithion (rein); 0,01 Milligrm. Fluorkalium; 0,001 Milligrm. Chlor - Rubidium; 0,5 Milligrm. schwefelsauren Strontian.

Die Halmbildung war *normal* und *dreizehn* Zoll lang, die Aehre am 27. Juni ganz entwickelt, aber klein, ohne sichtbaren Staubbeutel  
und *ohne* Frucht.

*J.* Am 18. April. Mit folgenden Abänderungen des Versuches *D.*:  
0,01 Milligrm. salpeters. Lithion (gereinigt); 0,01 Milligrm. Fluorkalium; 0,01 Milligrm. Fluornatrium; 0,001 Milligrm.

**Chlor-Rubidium; 0,01 Milligrm. Kupfervitriol; 1,0 Milligrm. Fluorcalcium; ohne Strontian:**

Das Resultat, Halm, sieben Zoll langer Halm, Aehre verkrüppelt

ohne Frucht.

**K. Am ersten Mai. Abänderung von D.**

ohne Lithion; ohne Rubidium; ohne Strontian  
aber mit 0,01 Milligrm. Fluorkalium. Halm sieben Zoll,  
Aehre verkrüppelt

ohne Frucht.

**L. Am 5. Mai. Abänderung von D.**

ohne Lithion; ohne Rubidium; ohne Fluorkalium.

Mit Zusatz von

1 Milligrm. Fluorcalcium; 0,01 Milligrm. Kupfervitriol.

Hier starben die drei ersten Blätter ab, als das dritte Blatt entwickelt war; dann folgte noch ein abnormes viertes, endlich noch ein fadenförmiges fünftes, und so starb die Pflanze, drei Zoll lang, nachdem noch ein zoll langer Nebentrieb den Schluss gemacht hatte.

Hätte ich voraus gewusst, daß *Lepidolith* zum Ziele füh-

gehenden Strahlen sich während ihres langen und raschen Laufs durch den Himmelsraum zertheilen, wie wenn sie durch ein brecheudes Mittel dispergirt wären, wodurch wir sie in rascher Aufeinanderfolge sehen.

Man kann die Dauer der von jedem Lichtstrahl auf der Netzhaut gemachten Empfindung bestimmen, wenn man das Bild auf der Netzhaut verschiebt. Arago hat sich in seiner *„Populären Astronomie“* mit dieser Aufgabe beschäftigt und mehrere Mittel angegeben, das Bild des Sterns auf der Netzhaut zu entwickeln, indem er entweder das Objectiv, oder das Ocular des Fernrohrs rasch bewegt. Er glaubt die Bewegung des Oculars sey leichter zu bewerkstelligen. Mir schien es vortheilhafter, das Ocular im Centrum der Pupille zu halten und die Centrirung beider Gläser zu bewahren. Ich erzeuge daher auf der Netzhaut einen Kreis von dem Stern, indem ich dem Fernrohr eine Bewegung ertheile, vermöge welcher seine Axe einen Kegel beschreibt, dessen Scheitel mit dem Centrum der Pupille zusammenfällt. Um diese Bewegung zu bewirken, bringe ich das Fernrohr in eine konische Röhre. Das Ocular des Fernrohrs hat zum genauen Centrum das kleine Ende der konischen Röhre, während das Objectiv excentrisch gestellt ist, mittelst zweier Schrauben, die an den beiden Enden des Durchmessers der Basis des Kegels befestigt sind. Das Fernrohr kann so geneigt werden, daß es verschiedene Grade von Excentricität annimmt, in solcher Weise, daß, während der ganze Mechanismus die konische Röhre um ihre Axe dreht, die Axe des Fernrohrs sich in einer excentrischen Richtung um die Axe der Röhre drehe. Diese excentrische Bewegung ist eine solche, daß das Licht eines jeden Sterns, welcher der Axe der äußeren Röhre entspricht, durch das Objectiv gebrochen und dispergirt wird, wie wenn das Objectiv ein Prisma wäre. Während dieser Umdrehung beschreibt dann das Bild des Sterns einen Kreis auf der Netzhaut proportional der Excentricität des Fernrohrs. Dieser Kreis nimmt verschiedene Farben an, welche durch ihre Aufeinanderfolge das Fun-

keln hervorrufen. Man bemerkt sogar dunkle Räume, welche die Farben trennen oder sie durchsetzen.

---

**XII. Ueber die Anfertigung astatischer Nadelpaare;  
von Dr. L. C. Levoir,**

Lehrer der Chemie am Polytechnicum zu Delft.

---

Seit Nobili's schöner Erfindung hat sich die Anwendung astatischer Nadeln zu verschiedenen Zwecken sehr vermehrt. Seine Methode zur Anfertigung derselben, die auch Du Bois-Reymond für seine höchst vollkommene Nadelsysteme angewandt hat, ist indess eine sehr zeitraubende. Unlängst wollte ich nach der von Tyndall angegebenen Methode (*Heat considered as a mode of motion*), schwache Luftströmungen in einem großen Raum nachweisen, wozu es 20 Nadelpaare bedurfte. Bei Anfertigung derselben habe

1864.                      A N N A L E N                      No. 11.  
DER PHYSIK UND CHEMIE.  
BAND CXXIII.

---

I. *Ueber Depolarisation*<sup>1)</sup>; von Dr. A. Kundt.

---

Seit man die Erscheinungen der Polarisation des Lichtes kennt, ist man bestrebt gewesen, experimentell wie theoretisch festzustellen, wie das natürliche unpolarisirte Licht unter den mannigfachsten Bedingungen polarisirt werde, welche Veränderungen dasselbe in seiner Intensität und Ebene der Polarisation bei den verschiedensten Vorgängen erleide; sehr wenig jedoch hat man sich mit der Frage beschäftigt, auf welche Weise irgend wie polarisirtes Licht wiederum in natürliches unpolarisirtes zurückgeführt werden könne, und welches die Gesetze dieser Umwandlung seyen. Einzelne Versuche liegen hierüber freilich bereits vor, diese Versuche wurden aber nicht weiter verfolgt, wohl aus dem Grunde nicht, weil sich dieselben meist auf Reflexionen an rauhen Oberflächen bezogen, und mithin die Versuche nach der sehr variablen Natur der reflectirenden Medien auch sehr verschieden ausfallen mochten, und so dann, weil die Erscheinungen, die man an rauhen Oberflächen beobachten kann, sich einer strengen theoretischen Untersuchung und Berechnung entziehen. Wenngleich man aber auf eine umfassende theoretische Behandlung der Erscheinungen der Depolarisation — so wollen wir im Folgendem immer, wie gebräuchlich, den Vorgang bezeichnen, wenn irgend wie polarisirtes Licht ganz oder zum Theil in natürliches übergeführt wird — verzichten muß, so schien es doch nicht ohne Interesse, den Gegenstand einer eingehenderen experimentellen Untersuchung zu unterziehen.

1) Die Untersuchung wurde in dem vom Hrn. Professor Magnus zu Berlin geleiteten Laboratorium ausgeführt.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden im Folgenden in Kürze mitgetheilt werden.

Es giebt zwei Methoden, auf die wir überhaupt Licht vollständig oder theilweise zu polarisiren vermögen, einmal durch Reflexion oder Brechung, die unter bestimmten Winkeln erfolgen, und sodann durch Doppelbrechung. Es liegt nahe zu vermuthen, daß man nun auch umgekehrt im Stande seyn muß, auf diese beiden Weisen, durch Reflexion und Brechung oder andererseits durch Doppelbrechung das Licht zu depolarisiren. Wie alle die verschiedenen und veränderlichen Polarisations Ebenen der einzelnen Strahlen eines Bündels natürlichen Lichtes durch Reflexion oder Brechung, oder aber durch den Durchgang durch einen doppelbrechenden Körper auf ganz bestimmte Polarisations Ebenen zurückgeführt werden, so muß auch umgekehrt ein polarisirtes Strahlenbündel durch Reflexionen oder Brechungen in verschiedenen Ebenen, und sodann auch durch Doppelbrechung der einzelnen Strahlen in verschiedenen, verschieden liegenden Krystallen, in natürlichem, d. h. nach allen Richtungen polarisirtes Licht über-

kel das Licht vollständig zu polarisiren vermögten, daß vielmehr die Polarisation an solchen Oberflächen immer nur theilweise sey, und als später mannigfach diese theilweise Polarisation untersucht wurde, — so noch in neuester Zeit von Brewster <sup>1)</sup> — wurde man sehr bald auch zu jener Constatirung der Depolarisation der rauhen Flächen geführt. Verfolgt wurden diese Untersuchungen aus den bereits oben angegebenen Gründen wenig, und so ist über das Speciellere der Depolarisation an verschiedenen Körpern und unter verschiedenen Bedingungen Wenig bekannt. Depolarisation aber durch Doppelbrechung — ich will gleich genauer sagen, durch Doppelbrechung sehr vieler kleiner, beliebig liegender Krystalle — ist überhaupt, so viel mir bekannt, nur ein einziges Mal beobachtet. Babinet fand nämlich, daß wenn man Bergkrystalle zerstoße, das erhaltene Pulver, auch wenn es das Licht nicht zerstreut, dasselbe doch depolarisirt. Er sagt ferner, daß Glaspulver ebenso wie jenes Pulver vom Bergkrystall depolarisire und endlich der Hyalith dieselbe Eigenschaft zeige.

Moigno führt diese Beobachtungen in seinem *Répertoire d'optique moderne* T. I p. 377 folgender Mafsen an:

*Si l'on égrise un crystal de roche, c'est-à-dire, si on le réduit en poussière, en frottent deux aiguilles l'une contre l'autre, et qu'on mette cette poudre dans de l'huile pour lui rendre de la transparence, le mélange ne produit point la rotation, mais il dépolairise la lumière, qui le traverse. On obtient, du reste, le même resultat avec du verre pilé.*

Das Gemenge von Oel und Pulver ist vollständig durchsichtig, so daß also von einer Zerstreung des Lichtes und dadurch hervorgebrachten Depolarisation nicht die Rede seyn kann. Babinet hat aber, wie man sieht, keine Erklärung der Erscheinung versucht und auch in Folge dessen die Allgemeinheit der Depolarisation bei allen doppelt brechenden Krystallpulvern nicht gefunden.

1) *Philosophical Magazin* 1863, No. 170. *On the polarisation of light by rough and white surfaces by Sir D. Brewster.*

Den Hyalith habe ich, da mir keine Platte, die groß genug gewesen, zu Gebote stand, nicht untersuchen können.

Es sollen nun die Beobachtungen über die beiden verschiedenen Arten von Depolarisation genauer angegeben werden, und zwar wird zuerst die Depolarisation bei den sogenannten rauhen, das Licht zerstreunenden Medien behandelt werden.

Diese soll im Folgenden im Gegensatz zu derjenigen durch viele kleine Krystalle hervorgebracht, bei der keine Zerstreuung des Lichtes stattfindet, immer als *Depolarisation durch Zerstreuung* bezeichnet werden, während jene als *Depolarisation durch Doppelbrechung sehr vieler kleiner Krystalle* oder kurz als *Depolarisation durch Doppelbrechung* angegeben werden wird.

#### I. Depolarisation durch Zerstreuung des Lichtes.

Bevor die Versuche selbst mitgetheilt werden, ist es nöthig einige allgemeinere Angaben voranzuschicken.

Es ist bisher üblich gewesen unter rauhen Oberflächen



wird dem ungefähr entsprechen. Ich habe noch auf eine andere Weise versucht eine solche der Definition entsprechende rauhe Oberfläche herzustellen.

Denkt man sich eine Menge kleiner glaskugelförmiger Perlen in einer Ebene neben einander liegend, so wären das, abgesehen von dem Umstand, daß die Perlen durchbohrt sind, gewissermaßen zwei über einander gelegte rauhe Oberflächen nach unserer Definition, indem man auf den beiden Seiten der durch die Mittelpunkte der Perlen gebildeten Ebene neben einander liegende durchsichtige Halbkugeln hat. Daß man auf diese Weise zwei auf einander gelegte rauhe Oberflächen hat, ist für unsere späteren Betrachtungen nicht störend, es wird dadurch nur die Wirkung verstärkt. Man kann eine solche Ebene aus Perlen aber leicht erhalten durch bloßes Aneinanderreihen mittelst eines dünnen Fadens, ohne die Perlen irgendwie auf ein Zeug zu befestigen.


Sodann werden wir in den Bereich der Untersuchung die sogenannten *durchscheinenden* oder *trüben* Körper ziehen. Unter denselben wollen wir hier nun solche Licht zerstreuernde Platten verstehen, die an ihren Außenflächen vollkommen glatt, und die auch im Innern kein rauhes Gefüge verrathen, also auch gemeiniglich im Bruche glatt sind. Dahin gehört vor allen Dingen das sogenannte Beinglas. Auch Achat und eine Menge Mineralien zählen hierher. Diese durchscheinenden Medien haben die Eigenschaft, das Licht im Innern zu zerstreuen, welche Eigenschaft die rauhen Flächen nur an der Oberfläche haben. Ich möchte daher die durchscheinenden Körper der Analogie wegen auch am liebsten *»im Innern optisch rauhe Körper«* nennen.

Eine dritte Klasse von Körpern ist nun endlich diejenige, die die Eigenschaften der ersten beiden Klassen in sich vereinigt. Diese Körper, die wir *»durchscheinende rauhe Oberflächen«* nennen wollen, sind an der Oberfläche rauh und außerdem durchscheinend. Gemeiniglich pflegen dieselben im Innern nicht eine so glatte Structur zu haben, wie die durchscheinenden Mittel. Sie sind meist körnig

sen geradlinig polarisirtes u  
Licht beim Durchgang durch  
2) ob die sämmtlichen Körper  
hende Licht in derselben W  
reflectirte depolarisiren.

Ich bemerke hier im Voraus, d  
Untersuchung, auf die Betrachtung se  
nen und senkrecht reflectirten Lichtes  
werden unten die weiteren Fragen, d  
tersuchung sich besonders aufdrängen,  
vorerst im Laufe der Untersuchung n  
sirtes Licht betrachtet werden, ich werde  
eine Uebersicht geben über die Resulta  
wenn man nicht geradliniges, sondern  
culäres Licht durch die zu untersuch  
durchgehen oder von jenen reflectiren  
tate denen bei geradlinig polarisirtem  
sind, so werden wir nur das geradlin  
als Repräsentanten des polarisirten Lic  
handeln.

Die Versuche wurden anfangs mit  
Apparat, den Hr. Professor Dove an  
sodann aber ordnete



polarisirt. *L* ist eine Linse von etwa 9'' Brennweite, die die durchgehenden Strahlen in *F* vereinigt. In *AB* befand sich nun ein Stativ, welches einen Metallring trug, in den entweder ein zweites Nicol'sches Prisma oder ein doppelt brechendes Prisma gesteckt und in demselben gedreht werden konnte. Befand sich sodann in *AB* der Nicol, den wir *N''* bezeichnen wollen, und wurde derselbe so gestellt, daß die Polarisationsebene von *N'* und *N''*  $90^\circ$  mit einander machten, so war das Gesichtsfeld, ab-

gesehen von einigen kleinen Reflexen, die nicht wegzuschaffen waren, dunkel, und von dem leuchtenden Punkt *F* war Nichts sichtbar. Außerdem befanden sich an den Seiten und oben Pappschirme *PP*, um alles zerstreute Licht abzuhalten. Gewöhnlich waren auch noch die Fenster des Zimmers verdunkelt. Diese Vorsichtsmaßregeln waren nöthig, da es sich zuweilen um sehr kleine Helligkeiten oder Helligkeitsunterschiede handelte, die das Auge, wenn es von fremdem Licht afficirt war, nicht unterscheiden konnte. In den Vereinigungspunkt *F* wurde nun senkrecht zu der Richtung *lN''* der zu untersuchende Körper, der immer Plattenform hatte, gebracht. Zu dem Zweck befand sich hier ein Stativ, welches ein Stückchen Holz trug, an dem sich an jeder Seite zwei Messingfedern befanden; zwischen diese konnte die zu untersuchende Platte bequem geschoben und von ihnen festgehalten werden.

Wurde nun in *F* irgend eine Platte gebracht, während die Nicols *N'* und *N''* gekreuzt waren, und wurde dann durch das Einschalten der Platte das Gesichtsfeld erhellt,

in jedem Azimuth und  
larisation des hindurch  
besprechen wollen — r  
modificirt, findet eine  
die Art dieser Depolarit  
wurde folgendermaßen  
„. Angenommen, das G.  
ten Nicoln durch Einscha.  
man nun den Nicol  $N''$ , s  
constant gleich hell bleibe  
von  $N''$  um  $360^\circ$ , zwei M.  
ligkeit eintreten. Im erst  
die Platte hindurchgegangen  
unpolarisirtes oder in circ  
Falle entweder in theilweis  
lich polarisirtes.

*Dafs in unseren sämm  
durchgegangene Licht imm  
oder in theilweis geradlini  
worden, wurde auf folgend  
Stelle*

lich ein sehr einfaches Mittel zu entscheiden, welcher Art die Depolarisation ist.

Bleibt die Zeichnung — die Ringe mit dem schwarzen Kreuz — unverändert und sind nur schwächer geworden, so ist das aus der Platte austretende Licht bekanntlich theilweise polarisirt. Verschwindet die Zeichnung ganz, so ist das Licht vollkommen depolarisirt, also natürliches Licht.

Ist das Licht elliptisch polarisirt, so muß sich das schwarze Kreuz zu einer Hyperbel öffnen, ist dasselbe aber circular polarisirt, so muß das schwarze Kreuz ganz verschwinden, und die farbigen Kreise in der bekannten Weise in den Quadranten sich verschieben.

Diese letzten Erscheinungen fanden bei geradliniger Polarisation und Analyse nie statt, sondern die farbige Zeichnung des Kalkpaths war entweder ganz verschwunden oder nur schwächer geworden. Man konnte sich bei fast allen Platten hiervon sehr genau überzeugen. Wir werden bei der Angabe der Beobachtungen noch jedes Mal das Nöthige speciell erwähnen.

Außer dem durchgegangenen Licht wollen wir aber auch das von den Platten reflectirte Licht untersuchen. Zu dem Zweck befindet sich in dem vorderen Pappschirm ein kleines Loch *cd*, vor dem ebenfalls ein Stativ stand mit einer Fassung, in die ein Nicol oder ein doppeltbrechendes Prisma gesteckt und gedreht werden konnte. Ob Depolarisation vorhanden, wurde nun wieder einfach durch Erhellung des Gesichtsfeldes bei gekreuzten Nicols untersucht; und welcher Art diese Depolarisation sey, davon überzeugte ich mich gewöhnlich, da mir dies praktisch am bequemsten war, durch ein Gypsblättchen, das ich zwischen die zu untersuchende Platte und den Nicol, der sich vor dem Auge befand, schob.

Ich werde aber nicht bloß die Polarisation verschiedener Körper constatiren und angeben, welcher Art diese Depolarisation ist, sondern ich habe auch versucht, wenigstens annähernd den Grad der Depolarisation zu geben,

... Stene des vor der  
wurde ein doppeltbrechendes P  
Intensitäts-Verhältniß der beid  
geschätzt, wenn das eine der I  
Helligkeit, das andere sein Maxim  
Dieses Intensitäts-Verhältniß ist in  
achtungen, so gut es ging, mit de  
larisirt, «wenig depolarisirt» usw.

Dafs ich mich überall zur Best  
tion vorhanden oder nicht, eines Ni  
sogleich eines doppeltbrechenden Pr  
darin, dafs zur blofsen Bestimmung  
dann, wenn die Depolarisation sehr  
praktischer zu seyn schien.

Der Gang der Versuche ist also  
mit Hülfe des Nicols vor dem Auge  
Platte überall das hindurchgegangene  
depolarisire, sodann wurde in einer  
sations-Apparat mittelst einer Kalk  
Gypsblättchens entschieden, welcher  
sey. Endlich wurde durch das  
beiden Bilder

Glastafel, auf die ganz reiner durchsichtiger Quarzsand gestreut war.

Folgende kleine Uebersicht giebt die Resultate dieser Versuche an:

	Durchgelassenes Licht.	Reflectirtes Licht.
Platte von kleineren Perlen <sup>1)</sup>	theilweise Depolarisation	beinahe vollständig depolarisirt
Platte von größeren Perlen <sup>1)</sup> .	theilweise Depolarisation	noch stärker depolarisirt
Eine mattgeschliffene Glastafel	gar nicht depolarisirt	Depolarisation eben sichtbar
Vier über einander gelegte	Depolarisation eben sichtbar	stärker depolarisirt
Glasplatte mit <i>Semen Lycopodii</i> <sup>2)</sup>	sehr wenig depolarisirt	stark depolarisirt
Glasplatte mit Quarzsand <sup>2)</sup>	wenig depolarisirt	etwas mehr depolarisirt

Sowohl das durch die Platten hindurchgegangene, wie reflectirte Licht, zeigten bei Untersuchung mittelst Gypsblättchen oder Kalkspathplatten theilweise Polarisation.

Wir haben *Semen Lycopodii* mit hierher gestellt, wenn jedes Körnchen auch nicht ganz durchsichtig ist, da es sich in der That wie die anderen Körper verhält; rührt man dasselbe mit etwas Gummi an und streicht es dann auf eine Platte, so verhält es sich wie die Platten der nächstfolgenden Klasse.

Das Resultat aber, welches wir aus unserer Tabelle ziehen können, ist folgendes:

1) Man mußte hier wie bei den Platten mit *Semen Lycopodii* und Sand das Auge etwas aus der senkrechten Richtung entfernen, da sonst das durch die Zwischenräume der Perlen und Körnchen gegangene Licht, welches polarisirt war, störte.

2) Wurde nur in dünner Schicht aufgestreut.

b) Versuche mit den d

Als durchscheinende Medien  
glas, Achat, einige andere Mi  
hierher rechnen, da man bei ih  
fläche, wie bei den Körpern  
lung doch nicht reden kann, gl  
chen, glatte Papiere, glatte Obl  
Bei allen war das durchgeh  
Licht vollkommen depolarisirt. D  
einer Kalkspathplatte ergab natür  
larisirtes Licht.

Bei dem reflectirten Licht muß  
an der vorderen Fläche direct gesp  
ches polarisirt blieb, und man wird  
Bei den durchscheinenden Körper  
durch Zerstreuung entstandene L  
depolarisirt.

c) Versuche mit den rauhen durchsche

Aus der Reihe dieser v  
schiedene G



**schwarzes raues Papier, Schiefer, Sammet, eine Stahlfeile.**  
**Die folgende Tafel giebt so kurz wie möglich die Re-**  
**sultate.**

	Durchgelassenes Licht	Reflectirtes Licht
Gewebe No. 1	vollständig depolarisirt	vollständig depolarisirt
Gewebe No. 2	1)	nur sehr wenig depo- larisirt
Gewebe No. 3	1)	gar nicht depolarisirt
Papier	vollständig depolarisirt	vollständig depolarisirt
Weisse oder helle Pulver	vollständig depolarisirt	vollständig depolarisirt
Rufs 2)		depolarisiren das re- flectirte Licht nur sehr wenig oder gar nicht
Schwarzes raues Pa- pier 2)		
Schiefer 2)		
Sammet 2)		
Stahlfeile 2)		

Die Resultate, die wir aus dieser Tabelle ziehen kön-  
 nen, sind:

**1) die weissen rauhen durchscheinenden Körper depola-  
 risiren das durchgelassene wie reflectirte Licht eben**

- 1) Liessen nur durch die kleinen Lücken des Gewebes Licht, welches  
 natürlich polarisirt blieb.
- 2) Durchgelassenes Licht konnte bei diesen Körpern nicht vorhanden seyn;  
 im reflectirten Licht zeigte sich aber sehr deutlich ein heller Fleck, der  
 beim Drehen des Nicols ganz sichtlich verschwand.

*so wie die gewöhnlich durchscheinenden Körper (Bauglas) vollständig;*

- 2) dunkle rauhe Körper depolarisiren das reflectirte Licht wenig oder gar nicht.*

Aus der Verbindung dieser beiden Sätze folgt aber alsbald der interessante Schluss:

*dass die Depolarisation, die ein Bogen Papier oder eine weisse Wand ausübt, viel weniger ihren Grund darin hat, dass die Oberflächen dieser Körper rau sind, als vielmehr darin, dass dieselben innerlich Licht reflectiren, wodurch sie eben ihre weisse Farbe haben.*

Ich konnte mich hiervon sehr scharf überzeugen, indem ich zuerst ein Stück Fließpapier in den Brennpunkt der Linse brachte; das reflectirte Licht war dann vollständig depolarisirt. Schwärzte ich nun dasselbe Stück Papier, so zeigte es fast keine Spur von Depolarisation, obgleich es noch ziemlich viel Licht reflectirte.

Die Untersuchung ergab übrigens wieder, dass die Depolarisation immer natürliches oder theilweis polarisirtes Licht herbeibrachte.

unter irgend einem Winkel gegen die ursprüngliche Polarisationsebene geneigt, so ist durch theoretische Untersuchungen bekannt: erstens die Intensität des reflectirten und des gebrochenen Theils, zweitens die Winkel, die die neuen Polarisationsebenen dieser Strahlen mit der ursprünglichen machen. Bei dem sämmtlichen Licht, welches auf eine einzige Perle der Perlenplatte fällt, hat nun der Einfallswinkel und die Einfallsebene alle beliebigen Lagen. Zerlegte man nun allgemein die Intensität eines reflectirten Strahles in zwei Strahlen, die in der Richtung der ursprünglichen Polarisation und senkrecht dazu polarisirt sind und suchte durch Integration nach jenen beiden Variablen die Gesamt-Intensität der Strahlen, die in jeder dieser beiden Richtungen schwingen, so hätte man durch das Verhältniß der beiden das Maass der theilweisen Polarisation des reflectirten Lichtes. Dasselbe könnte man auch mit dem durchgegangenen Lichte machen und sein Maass der Polarisation suchen. Durch die Vergleichung dieser beiden Maasse der Polarisation würde man dann erkennen, ob das durchgegangene Licht in der That weniger depolarisirt seyn muß, als das reflectirte.

So annehmbar eine solche Untersuchung auf den ersten Anblick aber auch scheinen mag, so ist sie doch nicht anwendbar; denn erstens umfaßt dieselbe zugleich *alles* reflectirte oder *alles* gebrochene Licht, während, wenn man senkrecht auf die Platte sieht, doch nur hauptsächlich das Licht ins Auge gelangt, welches in dieser Richtung reflectirt oder gebrochen wird; zweitens aber würde die Untersuchung alles doppelt reflectirte Licht, sowohl das, welches nach einmaliger Reflection noch einmal an den umliegenden Kugeln, wie dasjenige, welches an der Rückwand der Platte oder der Kugel reflectirt wird, nicht mit umfassen.

Wir werden uns daher mit folgender Betrachtung, die aber das Wesen der Erscheinung sehr gut veranschaulicht, begnügen müssen.

Fällt das Licht senkrecht auf eine raue Oberfläche, die aus lauter nebeneinanderliegenden durchsichtigen Halb-

kugeln besteht, so wird das durchgegangene Licht, welches man in der Richtung der auffallenden Strahlen sieht, hauptsächlich aus dem bestehen, welches auf die Kuppen der Halbkugeln fällt; das reflectirte Licht hingegen hauptsächlich aus demjenigen, welches in die Vertiefungen fällt, und hier noch ein oder mehrere Male reflectirt wird. Da diese Strahlen unter einem sehr großen Einfallswinkel auffallen, geht wenig von denselben hindurch. Außerdem aber enthalten das durchgehende wie das reflectirte Licht noch Strahlen, die im Innern reflectirt sind.

Ist das auffallende Licht nun geradlinig polarisirt, so wird das durch die Scheitel der Halbkugeln gegangene in seiner Polarisation nach den bekannten Gesetzen wenig geändert, also die Gesammtheit des durchgegangenen Lichtes nicht sehr stark depolarisirt seyn. Das reflectirte hingegen, welches meist mehr als einmal zwischen den Halbkugeln reflectirt ist, wird viel mehr in seiner Polarisation geändert werden. — Was hier von den Kugeln gesagt, gilt aber allgemein von den rauen Oberflächen. — Man kann die Sache auch so ausdrücken: Fällt polarisirtes Licht senk-

aber doch durchaus nicht ganz. Da jedem durch Reflection zerstreutem Strahl doch auch nur ein durch Brechung zerstreuter Strahl zugehört, so ist von dem durchgelassenen Licht im Allgemeinen doch auch nur so viel zerstreut, als die Intensität des gesamten reflectirten Lichtes beträgt. Den Ueberschuss der Intensität des durchgelassenen Lichtes werden wir als regelmässig durchgegangenes ansehen müssen, dem also auch seine ursprüngliche Polarisation verblieben ist. Daher ist das durchgegangene Licht weniger depolarisirt, als das reflectirte.

Was nun bei den rauhen Flächen nur an der Oberfläche vorgeht, das geht bei den anderen zerstreuenden Körpern, den durchscheinenden rauhen Oberflächen (Papier, Gewebe) und den trüben Mitteln (Beinglas) nicht bloß in der Oberfläche, sondern auch in den inneren Schichten vor. Sobald das Licht die erste sehr dünne Schicht dieser Körper durchdrungen, wird wieder ein Theil reflectirt, der natürlich depolarisirt ist. Sobald nun soviel Licht aus dem Innern reflectirt ist, daß das reflectirte und durchgegangene ungefähr gleiche Intensität haben, wird beim durchgelassenen die Depolarisation vollständig seyn. Wird weniger durchgelassen als reflectirt, so bleibt natürlich vollkommene Depolarisation beim durchgegangenen wie reflectirten Licht. In irgend dickeren Schichten lassen nun im Allgemeinen die rauhen, durchscheinenden und trüben Mittel gleich viel oder meist noch weniger Licht durch, als sie reflectiren, so daß also in jedem Falle vollständige Depolarisation stattfindet.

Es ist so eben gesagt, daß die Zerstreuung, die bei den rauhen Flächen nur an der Oberfläche stattfindet, bei den rauhen durchscheinenden und den durchscheinenden trüben Körpern im Innern vorgehe. Bei den rauhen durchscheinenden Körpern (Papier, Gewebe, Pulver) ist der Vorgang leicht einzusehen. Diese Körper haben meist eine körnige oder faserige Structur und zeigen sich im Innern ebenso rauh als an der Oberfläche. Ein Lichtstrahl, der also die erste Schicht durchdrungen hat, wird von irgend

einem Körnchen oder Faserchen der zweiten Schicht reflectirt usw. Wie aber bei den durchscheinenden Körpern (Beinglas) eine solche Zerstreuung im Innern vor sich gebe, da sie doch im Bruche vollständig glatt sind, darüber müssen wir uns hier des Urtheils enthalten, und die Zerstreuung im Innern als ein durch den Augenschein bewiesenes Factum annehmen.

Was wir bisher über die Depolarisation des zerstreuten Lichtes gesagt haben, führt uns aber sogleich noch auf die Erklärung der Erscheinung, daß dunkle raue Oberflächen das Licht viel weniger depolarisiren als weiße und der bekannten Thatsache, daß wenn polarisirtes Licht sehr schief auf eine weiße Wand auffällt, dasselbe nur sehr wenig depolarisirt wird.

Zur Erklärung dient die folgende Betrachtung:

Wir haben oben gesagt, daß das Licht, welches von einer matten Glastafel senkrecht reflectirt wird, beinahe ganz auf Rechnung der Unebenheiten zu schieben sey. Es ist klar, daß wir von dem gesammten von einer rauhen Glastafel reflectirten Licht nur einen sehr kleinen Theil

Untersuchung, um nicht zu weit zu greifen, auf senkrecht einfallendes Licht beschränken mußte, so bleibt es für die Zukunft noch zu untersuchen, ob die Abnahme der Depolarisation bei schiefer Incidenz wirklich der Zunahme des regelmässig reflectirten Lichtes entspricht.

Die Erscheinung, daß ein rauber Körper, je nachdem er weiß oder dunkel ist, das reflectirte Licht mehr oder weniger depolarisirt, ist in der That sehr überraschend. Die Erklärung ist aber nach dem Bisherigen nicht schwer zu geben. Wenngleich bei einer ebenen Glasplatte von senkrecht auffallendem Licht sehr wenig reflectirt wird, so können doch andere Körper bei senkrechter Incidenz bedeutend mehr Licht reflectiren, z. B. das Quecksilber etwa die Hälfte des auffallenden Lichtes. Fällt nun auf einen rauhen dunklen Körper senkrecht geradlinig polarisirtes Licht, so wird *nur an der Oberfläche* Licht reflectirt und dieß Licht besteht aus regelmässig reflectirtem und zerstreutem Licht. Sobald nun das *regelmässig reflectirte Licht* das *zerstreute an Intensität stark übertrifft, wird sich auch keine Depolarisation zeigen*. Ist jedoch derselbe raube Körper weiß, so reflectirt nicht bloß die Oberfläche, sondern auch die inneren Schichten Licht. Dieß Licht ist immer zerstreut und depolarisirt, und da es aus sehr vielen inneren Schichten reflectirt ist, wird es das an der Oberfläche regelmässig zurückgeworfene an Intensität übertreffen, und daher nun auch das depolarisirte Licht das polarisirte bedeutend überwiegen, mithin die Gesamtintensität fast vollständig depolarisirt seyn.

Eine Frage, die sich hieran anschließt, und die der ferneren Untersuchung vorbehalten bleiben muß, ist: ob nun nicht auch das Umgekehrte stattfindet, also das Licht, welches eine weiße raube Oberfläche nur theilweise polarisirt, dieselbe raube Oberfläche, wenn sie schwarz ist, nicht stärker polarisiren würde?

Es wurde oben angegeben, daß die zu untersuchenden Platten immer in den Brennpunkt *F* gehalten werden sollten, so daß die Zerstreuung des Lichtes auf der Platte

auch nur in diesem einen Punkt stattfand. Entfernt man nun aber die Platte aus  $F$ , indem man sie entweder dem Auge nähert oder von demselben entfernt, so wird alsdann eine ganze Kreisfläche der Platte von den Strahlen getroffen, und dieselben mithin auf diese Weise durch die ganze Kreisfläche zerstreut. Ist nun diese Kreisfläche bei geringer Entfernung aus  $F$  irgend bedeutend, d. h. sind die Lichtstrahlen ziemlich divergent, so wird damit die Lichtintensität eines jeden Punktes des erleuchteten Kreises sehr schnell abnehmen, so daß bei den bisher betrachteten Platten mit Entfernung derselben aus  $F$  die Intensität des durchgehenden zerstreuten Lichtes sehr bald Null wird, also das Gesichtsfeld dunkel wird. Es ist dies aber kein Aufhören der Depolarisation der Platte, sondern nur eine Abnahme der Intensität des Lichtes. Eine *durchsichtige, nicht zerstreuende* Platte dagegen wird, wenn sie etwa durch Depolarisation den Punkt  $F$  erkennen läßt, ihn mit derselben Intensität erblicken lassen, mag man sie in  $F$  selbst oder an irgend einer andern Stelle halten. Dies ist nun in der That der Fall mit den Platten die jetzt betrachtet werden



Licht zu zerstreuen, hat einige Schwierigkeiten. Es müssen erstens die Krystalle in der That sehr klein seyn, dann müssen sie möglichst gleichmäfsig neben einander liegen und endlich mufs die ganze Schicht möglichst wenig rauh oder trübe seyn.

Ich habe solche Platten auf zweierlei Weisen hergestellt:

1. Von den zu untersuchenden krystallinischen Körpern machte ich eine möglichst verdünnte Lösung. Von dieser wurden einige Tropfen auf eine gut gereinigte 4 □Zoll grofse Glasplatte gegossen und nun liefs man sie auskrystallisiren. Bei den wenigsten Lösungen aber wurden, wenn man sie ruhig auskrystallisiren liefs, die Krystalle so klein, dafs sie die Erscheinungen zeigten. Die Krystallisation mufste durch Erhitzen über einer Flamme möglichst beschleunigt werden, so dafs sich nur kleine Krystalle bildeten. In manchen Fällen half auch dies noch nichts und ich mufste während des Erhitzens ganz leise mit dem Finger auf der Platte herumrühren.

Durch ein langes Probiren erhielt ich endlich Platten, die nur mit einem leisen Hauch von Krystallen überzogen schienen und doch das Licht sehr gut depolarisirten. Bei einigen Lösungen reichte dagegen das einfache Auskrystallisiren ohne Erwärmung aus. Um die Platten sodann zu schützen, in einigen Fällen auch um ihnen das wenige zerstreute Licht zu nehmen, wurde etwas venetianischer Terpent in darauf geträpfelt, eine zweite gleichgrofse Glasplatte darauf gelegt und nun das Ganze an den Rändern luftdicht verklebt.

2. Die zweite Methode solche Platten darzustellen bestand darin, dafs ich den zu untersuchenden Krystall möglichst fein zerstiess, so auf eine Glasplatte brachte, Terpent in darüber gofs und eine zweite Glasplatte darauf klebte.

Auf die erste Weise, durch Auskrystallisiren, wurden Platten hergestellt von:

salpetersaurem Uranoxyd,  
schwefelsaurem Uranoxyd,

schwefelsaurem Kupferoxyd,  
salpetersaurem Natron,  
salpetersaurem Kali,

Als Krystallpulver wurde untersucht:

zerstoßener Gyps,  
" Bergkrystall,  
" Doppelspath,  
" Zucker.

*Die sammtlichen Platten ließen das Licht sehr gut durch und depolarisirten das auffallende Licht in jeder Lage der Platte, mochte man diese nahe N, in F, oder nahe N' halten.*

Wenn es richtig ist, daß die Depolarisation dieser Platten durch die Doppelbrechung der unendlich kleinen Krystalle hervorgebracht wird, so ist es klar, daß kleine Krystalle des regulären Systems keine Depolarisation hervorbringen können. In der That zeigt der Versuch:

*daß Schichten unendlich kleiner Krystalle des regulären Systems die auf die oben angegebene Weise hergestellt werden, keine Spur von Depolarisation zeigen.*

Winkelzählung, so daß also die Schwingungsebene des zweiten Nicols ( $N''$ ) das Azimuth  $90^\circ$  hat, und bezeichnet bei irgend einem der kleinen Krystalle den Winkel, den eine der Schwingungsebenen desselben mit der Anfangszählung macht mit  $\vartheta$ , die Amplitude des auffallenden Strahles mit  $a$ , so wird der Strahl durch den kleinen Krystall in die beiden Strahlen

$$a \cos \vartheta \text{ und } a \sin \vartheta$$

zerlegt, die in den Azimuthen  $\vartheta$  und  $90 + \vartheta$  schwingen. Zerlegt man jeden dieser beiden Strahlen, die unabhängig von einander schwingen, nach den Azimuthen  $0$  und  $90^\circ$ , so giebt der Strahl  $a \cos \vartheta$  die Componenten:

$$a \cos \vartheta \cos \vartheta \text{ und } a \cos \vartheta \sin \vartheta;$$

der Strahl  $a \sin \vartheta$  die Componenten:

$$a \sin \vartheta \sin \vartheta \text{ und } a \sin \vartheta \cos \vartheta.$$

Man hat also die Intensitäten:

$$\text{im Azimuth } 0^\circ \quad a^2 \cos^4 \vartheta + a^2 \sin^4 \vartheta,$$

$$\text{im Azimuth } 90^\circ \quad 2a^2 \sin^2 \vartheta \cos^2 \vartheta.$$

Diese Intensitäten giebt ein kleiner Krystall: will man die Gesamt-Intensität aller kleinen Krystalle umfassen, so ist nur  $\vartheta$  jeder beliebige Werth zu geben und das Integral jener Ausdrücke zu suchen.

$\vartheta$  kann nun variiren von  $0$  bis  $360^\circ$ ; wir brauchen aber die Gränzen nicht so weit zu nehmen, denn eine der beiden Schwingungsebenen des kleinen Krystalles wird immer durch den ersten Quadranten der Zählung gehen, und wir brauchen nur die Veränderung der Lage dieser zu betrachten, da von den beiden Schwingungsebenen keine einen Vorzug vor der andern hat. Man braucht mithin die Integrale nur in den Gränzen von  $0$  bis  $90^\circ$  zu nehmen; diese Integrale unterscheiden sich von den andern beiden nur um den constanten Factor 4. Man hat somit als Gesamt-Intensität der Strahlen im Azimuth  $0$

$$J = a^2 \int_0^{90} (\cos^4 \vartheta + \sin^4 \vartheta) d\vartheta;$$

und für die Strahlen im Azimuth  $90$ :

$$J' = a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \sin^2 v \cos^2 v \, dv$$

Wäre nun  $J'$  also das zweite Integral, gleich Null, so wäre sämmtliches durchgegangene Licht noch polarisirt, es hätte also gar keine Depolarisation stattgefunden. Wäre  $J = J'$ , so hätten wir rechtwinklig zu einander polarisirte Strahlen gleicher Intensität, also natürliches Licht, die Depolarisation wäre also vollkommen.

Beides ist nicht der Fall, man findet vielmehr, wenn man in den gegebenen Grenzen integrirt:

$$J = \frac{1}{8} a^2 \pi$$

und

$$J' = \frac{1}{8} a^2 \pi.$$

Man sieht  $J$  ist gröfser als  $J'$ ; das gesammte Licht, das wir nach zwei rechtwinkligen Richtungen zerlegt haben, hat also in diesen Richtungen nicht gleiche Intensität, ist also nicht natürliches Licht, sondern theilweise polarisirtes. Es könnte auch elliptisches seyn: dafs es diefs nicht ist, wird weiter unten anzusehen werden.

nen Lichtes mit der ursprünglichen Polarisationssebene zusammenfällt. Außerdem sieht man beim Drehen, wenn die Schicht der Krystalle sehr dünn ist, daß bei parallelen Nicoln das Gesichtsfeld mehr als doppelt so hell ist, als bei gekreuzten. Nach der strengen Rechnung müßte es drei Mal so hell seyn, in der einen Lage  $\frac{3}{8}a^2\pi$ , in der andern  $\frac{1}{8}a^2\pi$ ; doch man kann nie darauf rechnen, daß man nur eine einzige Schicht neben einander liegender Krystalle habe; es werden auf den nach unserer Methode bereiteten Platten immer noch Krystalle auf einander liegen und das verstärkt, wie man weiter unten sehen wird, die Depolarisation. Will man auf die oben angestellte Rechnung über die Depolarisation nicht eingehen, so kann man sich den ganzen Vorgang leicht geometrisch veranschaulichen. Denkt man sich jeden auffallenden geradlinig polarisirten Strahl durch einen Krystall zerlegt, und alle diese Theilstrahlen um einen Punkt ihrer Richtung und Größe nach aufgetragen, so ist klar, daß sich um das Azimuth 0 das des einfallenden Lichtes, die Strahlen mit den größten Amplituden schaaren, und die Intensität nimmt allmählich nach dem Azimuth  $90^\circ$  ab. Zerlegte man nun alle Strahlen nach den Azimuthen  $0^\circ$  und  $90^\circ$ , so ist klar, daß die Gesamt-Intensität im Azimuth  $0^\circ$  viel größer seyn wird, als die im Azimuth  $90^\circ$ .

Eine gleichmäßige Vertheilung der Lage der optischen Axen der kleinen Krystalle, wie wir sie angenommen, wird auch in der Wirklichkeit immer sehr annähernd vorhanden seyn, da beim Auskrystallisiren oder Aufstreuen eines Krystallpulvers keine Richtung einen Vorzug vor der anderen hat. Liegen mehrere Krystalle nach einer Richtung, so werden im Allgemeinen eben so viel Krystalle nach allen anderen Richtungen mit ihren Axen liegen und unsere Betrachtung wird dadurch nur um eine Constante geändert.

Fällt auf eine solche einfache Schicht, wie wir sie angenommen, natürliches Licht, so wird dies ungeändert hindurchgehen. Für solches Licht kann man bekanntlich zwei rechtwinklig zu einander polarisirte Strahlen gleicher In-

tensität setzen. Jeder von ihnen würde nun in theilweis polarisirtes Licht umgewandelt werden, da aber das Maass der theilweisen Polarisation bei beiden dasselbe und die Ebenen der theilweisen Polarisation senkrecht zu einander stehen würden, so bilden diese beiden Theile wieder natürliches Licht mit einander.

Besteht die krystallinische Platte nicht aus einer einzigen Schicht, liegen die Krystalle nicht bloß neben, sondern auch über einander, so kann man sich eine solche dickere Schicht doch in einfache Schichten zerlegt denken. Durch die erste einfache Schicht wird das auffallende polarisirte Licht in theilweis polarisirtes Licht verwandelt, also haben wir nach dem Durchgang durch diese erste Schicht zur Hälfte polarisirtes, zur Hälfte natürliches Licht, wie oben gezeigt. Auf das natürliche Licht hat der Durchgang durch die weiteren Schichten, wie oben angegeben, keinen Einfluss mehr. Das polarisirte Licht wird jedoch in der zweiten Schicht wieder zur Hälfte in natürliches verwandelt, und so fort in den nächsten Schichten, so daß die Polarisation immer mehr abnimmt, und man somit durch eine

Sodann ist zu bemerken, da das salpetersaure Uranoxyd sehr leicht verwittert, so ist es sehr schwer Platten mit demselben längere Zeit aufzubewahren. Ausserdem giebt es beim Erwärmen einen Theil seiner Säure ab und wird zu einem zähen Brei, von dessen nicht krystallinischer Beschaffenheit, auch wenn er auf der Glasplatte etwas antrocknet, man sich leicht dadurch überzeugt, dass eine solche Platte keine Spur von Depolarisation zeigt. Man musste die Lösung ruhig auskrystallisiren lassen, wodurch freilich die Krystalle etwas groß wurden, doch zeigten sie die Depolarisation sehr gut.

Eine interessante Erscheinung bot das schwefelsaure Kupferoxyd dar. Liefs man dies ruhig auskrystallisiren, so wurden die Krystalle bedeutend zu groß; liefs man aber die Lösung unter schneller Erwärmung krystallisiren, so konnte man es bei hinreichend verdünnter Lösung dahin bringen, dass die Krystalle so klein wurden, dass auf der Platte nur ein ganz leiser bläulicher Hauch zu liegen schien, der mit bloßem Auge nichts Weiteres erkennen liefs. Unter dem Mikroskop selbst zeigte die Platte kaum einen Anflug von Krystallisation. Dieser zarte Ueberzug zeigte aber die Depolarisation durch Doppelbrechung sehr gut. Stand nun eine solche Platte, bevor sie mit Terpentin und einer zweiten Glasplatte bedeckt wurde, einige Zeit an der Luft, so begann sie allmählich sich zu verändern; man sah mit bloßem Auge auf derselben Kreisflächen sich bilden, die aus lauter kleinen Strahlen bestanden, die von den Mittelpunkten der Kreise ausgingen. Diese Erscheinung kann ihren Grund nun darin haben, dass bei der starken Erwärmung der Platte beim Krystallisiren die kleinen Krystalle mit nicht so viel Wasser krystallisiren, als das schwefelsaure Kupferoxyd im gewöhnlichen Zustande enthält, und dass diese kleinen Krystalle beim Stehen an der Luft das ihnen fehlende Wasser aus dieser aufgesogen und sodann in ihre gewöhnliche Form übergegangen sind. Ob die beiden Formen indentisch oder nicht, kann man nicht entscheiden, da diejenigen Krystalle, die man durch

Erhitzen erhalten, viel zu klein sind, um an ihnen, selbst unter dem Mikroskop, die Form zu erkennen. Wir können, gestützt auf die Depolarisation, nur sagen, daß jener leise Hauch, den wir auf der Glasplatte sehen, krystallinisch ist, und daß die kleinen Krystalle, wie die gewöhnlichen des schwefelsauren Kupferoxyds, doppelbrechend sind.

Mit einigen Worten müssen wir jetzt noch auf die oben angeführten Beobachtungen Babinet's zurückkommen. Daß die beim Pulver des Bergkrystalls beobachtete Depolarisation vollkommen unter die hier behandelte fällt, liegt auf der Hand. Die Thatsache, daß Glaspulver ebenso wie Krystallpulver das Licht depolarisirt, habe ich bestätigt gefunden, doch ist diese Depolarisation nur sehr gering und scheint von der Art des angewandten Glases abzuhängen. Das Réaumur'sche Porzellan zeigt zerstoßen ebenfalls Depolarisation durch Doppelbrechung.

Da die Pulver nur dadurch die Depolarisation durch Doppelbrechung zeigen können, daß die einzelnen Stückchen doppelbrechend sind, so werden wir diese Eigenschaft nothwendig auch den kleinen Glaselementen zuer-



sen durchzogen, und man erkennt bald, daß sie eigentlich aus lauter kleinen Stückchen bestehen, die nur noch, da sie so eng in- und aneinander hängen, nicht auseinander fallen. Jedes kleine Stückchen ist aber durch die Abkühlung doppelbrechend geworden und die Axen dieser Stückchen liegen nach allen möglichen Richtungen. Man hat also eine Platte aus lauter kleinen doppelbrechenden Körperchen. Ein solches Stück Glas zeigt dann auch wirklich die Depolarisation durch Doppelbrechung sehr schön.

Bisher ist nur von dem Lichte gesprochen worden, welches durch die kleiner Krystalle hindurchgegangen; beobachtet man aber auf dieselbe Weise, wie oben bei den rauhen Oberflächen, das von einer krystallinischen Schicht senkrecht reflectirte Licht, so zeigt sich *dies ebenfalls depolarisirt*.

Abgesehen von den Glasplatten, die bei uns in den meisten Fällen die krystallinische Schicht umgeben, und die wir unberücksichtigt lassen können, ist klar, daß bei einer solchen krystallinischen Schicht auffallendes Licht an der Vorder-, und nachdem es die Schicht einmal durchdrungen, an der Hinterfläche reflectirt wird. Dies von der Hinterfläche reflectirte Licht ist auf alle Fälle, da es ja durch die Platte gegangen, depolarisirt. Von dem an der Vorderfläche reflectirten Licht ist dies nicht ohne Weiteres zu sagen, wenn dasselbe auch seine Polarisation ändert, so wird es doch kaum nach allen Seiten polarisirt werden.

Mag nun aber auch dies an der Vorderfläche reflectirte Licht in der Einfallsebene oder nach allen Richtungen polarisirt seyn, so wird wegen der Reflection an der Rückseite das Gesamtlicht doch immer depolarisirt seyn.

Abgesehen davon, daß die vorstehende Untersuchung der krystallinischen Körper theoretisch einiges Interesse bietet, indem sie zeigt, wie bei einer Kleinheit der Krystalle, die sie einzeln jeder optischen Untersuchung entzieht, dieselben in ihrer Menge der Untersuchung wieder zugänglich werden und zugleich das Gesetz dieser Gesamtwir-

kung kennen lehrt, scheint dieselbe auch von einigem praktischen Nutzen seyn zu können.

- 1) Ist durch die Beobachtung der Depolarisation durch Doppelbrechung ein Mittel gegeben, bei einem Körper, der nur in sehr feiner Zertheilung, oder als ein Aggregat sehr kleiner krystallinischer Gebilde vorkömmt, und bei dem sich die Krystallform dem Auge, vielleicht selbst dem Mikroskop, entzieht, die krystallinische Beschaffenheit, freilich hier wie in den folgenden Angaben mit Ausschluss des regulären Systems, nachzuweisen.
- 2) Gibt die Depolarisation durch Doppelbrechung ein sehr gutes Mittel bei einer Aenderung der irgend ein Krystall unterworfen wird, z. B. durch Abgeben von mehr oder weniger seines Krystallwassers, zu entscheiden, ob er bei dieser Aenderung krystallinisch bleibt, oder amorph wird.
- 3) Kann die Depolarisation durch Doppelbrechung in vorzüglichem Maasse dazu dienen, bei einem Körper,

sehr gut auf die bekannte Weise durch Vorlegen von Glimmerblättchen, die jedes gerade einen Gangunterschied von  $\frac{1}{4}$  Wellenlänge für die beiden Strahlen in ihnen haben, und durch Einschalten einer Kalkspathplatte anstellen. Wir wollen nur kurz bei den verschiedenen Combinationen verschiedener Polarisationen und Analyse das Bild, welches die Kalkspathplatte zeigte, angeben.

Diese Bilder sind bei den krystallinischen Platten, da diese meist sehr durchsichtig sind, und die Depolarisation nie einen gewissen Grad übersteigt, sehr gut sichtbar; bei den rauen und trüben Körpern ging oft nicht sehr viel Licht hindurch, und dann war auch oft die Depolarisation, wie oben angegeben, so vollkommen, daß keine Farben erschienen. Mattes Glas, die Perleplatten und die Platten mit Pulver etc. zeigten aber die Bilder sehr gut. Ebenso erschienen dieselben Bilder der Kalkspathplatte in dem von den Platten reflectirten Licht.

Außerdem bleibt uns dann noch die Pflicht, den Zusammenhang der Depolarisation durch Doppelbrechung mit den interessanten Erscheinungen, die Hr. Prof. Dove im rotirenden Polarisations-Apparat beobachtet hat <sup>1)</sup>, nachzuweisen.

Die Erscheinungen bei verschiedener Polarisation und Analyse sind kurz in den Satz zusammen zu fassen:

*Die Depolarisation beim Durchgang durch rauhe und trübe Körper und durch Platten sehr kleiner doppelbrechender Krystalle geschieht immer so, daß ein Theil des Lichtes in natürliches umgewandelt wird, während der andere Theil seine ursprüngliche Polarisation behält. Dasselbe gilt von dem von den Platten reflectirten Licht.*

Also wie oben beim geradlinig polarisirten Licht theilweise geradlinige Polarisation eintrat, so zeigt das elliptische Licht eine Mischung von elliptischem und natürlichem, das circulare von circularem und natürlichem. Man sieht mithin bei geradliniger Analyse im ersten Falle die farbigen

1) Pogg. Ann. Bd. LXXI, S. 97; Farbenlehre, S. 213.

Ringe mit schwarzem oder weißem Kreuz, im zweiten das Kreuz in die Hyperbeln geöffnet, im dritten endlich nur die Farbenringe ohne Kreuz, aber dieselben sind in der bekannten Weise in den Quadranten verschoben. Nur die Intensität der Bilder ist geringer, als ohne Einschaltung der zu untersuchenden rauhen, trüben oder krystallinischen Platte. Bei diesen letzten Platten, die aus lauter kleinen Krystallen bestehen, gilt aber das Gesagte nur dann, wenn die Platten wirklich gut sind, d. h. die Krystalle sehr klein und möglichst gleichmäfsig vertheilt sind. Ist diefs nicht der Fall, entsprechen eben die Platten nicht den theoretischen Anforderungen, so zeigen sie bei allen Arten von Polarisation an den verschiedenen Stellen und in den verschiedenen Lagen verschiedene Bilder.

Analysirt man nicht linear, wie so eben, sondern elliptisch oder circular, so ändert die Depolarisation eben so wenig die Bilder der Kalkspathplatte, dieselben werden nur schwächer, oder verschwinden bei vollkommener Depolarisation natürlich ganz. Wir führen von den Versuchen nur an, dafs man also auch beim Einschalten einer theilweis depolarisirenden Platte bei circularer Polarisation und circularer Analyse das Ringsystem ohne Kreuz sieht.

Was den Zusammenhang unserer Untersuchungen mit den Beobachtungen, die Hr. Prof. Dove im rotirenden Polarisationapparat gemacht hat, anlangt, so ist derselbe folgender:

Hr. Prof. Dove hat bei jenen interessanten Untersuchungen auch die Anordnung so getroffen, dafs er ein Glimmerblättchen, welches im Azimuth  $45^\circ$  die circulare Polarisation giebt, zwischen zwei feststehenden Nicoln rotiren liefs. Eine eingeschaltete Kalkspathplatte zeigte alsdann als Resultante sämmtlicher Erscheinungen des circularen, elliptischen und linearen Lichts bei linearer Analyse die Erscheinungen des theilweis geradlinig polarisirten Lichtes, bei circularer, die einer Mischung von natürlichem und circularem.

Ganz die Stelle nun, die hier das rotirende Glimmer-

blättchen einnimmt, nimmt in unseren Untersuchungen eine aus sehr kleinen doppeltbrechenden Krystallen bestehende Platte ein. Dasjenige, was bei dem rotirenden Glimmerblättchen sehr schnell in *der Zeit nacheinander* geschieht, nämlich daß das aus dem ersten Nicol austretende Licht durch das Glimmerblättchen nach allen möglichen Azimutheu polarisirt wird — jedoch so, daß die Intensitäten der Strahlen mit dem Annähern ihrer Polarisations Ebenen an die Ebene der ursprünglichen Polarisation zunehmen — oder anders ausgedrückt, indem man nun gleich zwei zusammengehörige Strahlen zusammenfaßt, daß das austretende Licht in der Zeit nach einander alle Arten von polarisirtem Lichte giebt, dasselbe geschieht bei den Platten aus kleinen Krystallen *im Raume sehr nahe bei einander*, und es ist immerhin interessant das übereinstimmende Resultat dieser beiden verschiedenen Anordnungen zu sehen.

Aber noch eine andere Beobachtung des Hrn. Professor Dove dürfte hierherzuziehen seyn, nämlich diejenige, die derselbe in derselben Abhandlung unter No. 10 anführt. Es wird dort angegeben, daß wenn man das auf den vordern Nicol seines Apparates fallende Licht geradlinig polarisirt, und dann diesen Nicol rotiren läßt, daß dann das aus dem Nicol austretende Licht theilweis in der ursprünglichen Ebene polarisirt sey. Hier ist an die Stelle des Glimmerblättchens der Nicol getreten, und durch die Rotation desselben wird das Licht nach allen möglichen Richtungen, freilich mit verschiedenen Intensitäten, geradlinig polarisirt.

Es entspricht diese Anordnung noch mehr, oder vielmehr ganz genau unseren obigen theoretischen Betrachtungen, und das Resultat ist denn beim geradlinig polarisirten Licht auch vollständig dasselbe, wie bei unseren Beobachtungen. Polarisirte aber Hr. Prof. Dove das auf den rotirenden Nicol fallende Licht circular, so erhielt er vollkommen natürliches. Bei unseren Versuchen dagegen zeigte sich, daß das circulare Licht durch eine Platte klei-

ner Krystalle nicht in natürliches, sondern in theilweis circulares Licht umgewandelt wurde.

Der Grund dieser Verschiedenheiten dürfte der seyn, daß bei dem rotirenden Nicol in der That lauter Strahlen von gleicher Intensität nach jedem Azimuth austreten, die gewissermaßen unabhängig von einander sind, also auch nicht zu circularem oder elliptischem Licht Veranlassung geben können, während beim Durchgang von circularem Licht durch die kleinen Krystalle, die beiden senkrecht zu einander polarisirten Strahlen, in die das circulare Licht zerlegt wird, sich wieder vereinigen, sey es zu circularem, elliptischem oder linearem. Dieß wird jedesmal von der Verzögerung, die die beiden Strahlen gegeneinander beim Durchgang durch einen kleinen Krystall erleiden, abhängen, da aber diese Krystalle sehr klein sind, so wird diese Verzögerung verschwindend seyn; die meisten senkrecht zu einander polarisirten Strahlenpaare werden also ihren alten Phasenunterschied behalten, also zusammen wieder circulares Licht geben, aus dem sie entstanden sind. Wenn mithin auch einzelne Strahlenpaare in elliptisches oder ee-

der Naturforscher aufgedrängt, seit Venetz <sup>1)</sup> und Esmark <sup>2)</sup> zuerst auf sie aufmerksam machten. Es giebt wenig hochgelegene Gegenden in irgend einem Theile der Welt, welche nicht unzweifelhafte Beweise von dem so charakteristischen Abschleifen und Poliren durch Eismassen darbieten, obwohl sie gegenwärtig vielleicht kaum vom Winterschnee betroffen werden. In unserem eigenen Lande haben die Untersuchungen von Buckland und besonders von Ramsay deutlich gezeigt, daß die schottischen Hochlande, die Berge von *Wales* und *Cumberland* und die Kalkfelsen (*Limestone crags*) von *Yorkshire* überreich sind an diesen »*roches moutonnés*«, welche keinen Zweifel lassen, daß die Thäler dieser Bergketten einst ausgefüllt waren mit Gletschern, an GröÙe nicht übertroffen, wenn gar erreicht, von denen, die heut zu Tage an den Seiten ihrer gigantischen Schweizer Nebenbuhler herabhängen. Diefes ewige Eis einer früheren Zeit war auch nicht auf Gegenden beschränkt, wo dasselbe jetzt nicht gesehen wird, sondern zahlreiche Beobachtungen haben festgestellt, daß die Gletscher der Gegenwart, in der Schweiz, in Norwegen und anderswo, nur die eingetrockneten Bäche alter Eisströme von ungeheurer GröÙe sind. Diese Gletscher haben die Alpenthäler, welche sie einst in Besitz hatten, abgenagt, haben die »*Lochs*« und »*Kyles*« von Schottland, so wie die gröÙeren *Fjorde* von Norwegen ausgegraben und dadurch wesentlich zum gegenwärtigen Ansehen unserer Berg-Landschaften beigetragen. Ramsay <sup>3)</sup> und Tyndall <sup>4)</sup> haben neuerlich auf diese Wirkung alter Gletscher aufmerksam gemacht und mit beträchtlicher Wahrscheinlichkeit behauptet, der erstere, daß die Seebecken, der letztere, daß die Alpenthäler, in solcher Weise größtentheils ausgehöhlt worden seyen. In keinem Theile der Welt vielleicht können die Phänomene der Eis-

1) Denkschriften d. Allgm. Schweiz. Gesellsch. 1833 Bd. I, Abth. II.

2) Edinburgh, *New Philosoph. Journal* 1827, Vol. III.

3) *Quart. Journ. of the Geolog. Soc.* Aug. 1862.

4) *Philos. Transact. f.* 1857 et 1858; auch *Phil. Magazine*, Ser. IV, Vol. XV, XVI, et XVII.

zeit vortheilhafter studirt werden als in Norwegen, wo die eisnarbigen Küsten und Fjorde noch vollständig dem Auge des Beobachters bloßgelegt sind, zur Seite des Oceans, welcher das einst sie bedeckende krystallinische Material hergegeben hat. Die 2000 (engl.) Meilen lange Küste von Christiania nach dem Nordkap liefert fast ununterbrochene Zeugnisse von den ungeheueren Operationen des Eises, welche in der erwähnten Zeit beinahe alle Gestaltungen dieses merkwürdigen Landes modellirten.

In dieser Beziehung hat Norwegen schon Esmark und L. v. Buch angeregt, besonders James Forbes, dessen zahlreiche Forschungen und scharfe philosophische Schlüsse am meisten zur Erweiterung unserer Kenntnisse der physikalischen Erscheinungen Scandinaviens beigetragen haben. Dem Prof. Forbes verdanke ich viele in dem Folgenden benutzten Data. Es war auch bei einem Aufenthalt in Norwegen im letzten Sommer, daß ich rücksichtlich der physischen Ursache der Eiszeit die Eindrücke empfing, welche den Gegenstand dieses Aufsatzes ausmachen.

Von Christiania ausgehend, kann der Reisende nicht



gleiche Wirkung von dem Wasser. Dieses löst und zertheilt die löslicheren und bröcklichen Theile und erzeugt statt der Glätte und verhältnißmäßigen Politur, welche die Küste darbietet, je nach Umständen eine zellige oder rissige Oberfläche. Solch eine Verwitterung der Felsen kann in der That an vielen Orten deutlich gesehen werden und zwar oben auf der Politur, welche von der früheren Wirkung bewegter Eismassen herrührt. Kurz es kann als allgemeiner Satz aufgestellt werden, daß die Wirkung des Meeres und des Wetters auf die Felsen eine runzliche, unregelmäßige und besonders eine rissige Oberfläche erzeugt, während die des Gletschereises ein abgerundetes, verhältnißmäßig glattes und gleichförmiges Ansehen derselben hervorbringt. Bedürfte es fernerer Beweise, daß die Oberfläche der Norwegischen Küstenfelsen einen ausschließlich eisigen Ursprung hat, so ergeben sie sich erstens aus dem häufigen Vorkommen jener Schrammen und feinen Ritze, welche so unwiderleglich die früher das Bett eines Gletschers bildenden Felsflächen charakterisiren, und zweitens aus dem Umstand, daß in der Regel die glättende Wirkung offenbar vom Lande hergekommen ist. Alle gegen das Land geneigten Flächen sind, soweit ich gesehen, beständig abgerundet und polirt, während an einigen Orten, wo der Fels jählings gegen das Meer abfällt, er gegen die abreibende Wirkung geschützt worden ist und nur eine verwitterte Oberfläche zeigt.

Geht man um das Vorgebirge Naze herum weiter nach Norden, so zeigt die Küste, mit wenigen Ausnahmen, dasselbe allgemeine Ansehen, bis zum Polarkreis, wo sich der Charakter derselben ziemlich plötzlich ändert. Die felsigen Hügel erlangen die Bedeutung von Bergen, und steigen auf in schroffen, scharfen und phantastischen Pics, welche gegen die runden Gipfel der niederen Breiten stark abstachen. Allein diese arctischen Pics verdanken ihre Verschönerung von der abschabenden Wirkung des Eises bloß ihrer Höhe; denn ringsum an ihrem Fusse, und selbst hoch hinauf an ihren Abhängen haben die trägen Wogen des

sich bewegenden Eismeeres ihre unverkennbaren Spuren hinterlassen, sie abgeschliffen und selbst unterhöhlt in den ungewöhnlichsten Formen, von denen nur die *Sieben Schwestern* und *Torghatten*, mit seinem sonderbaren Tunnel, eben südlich vom Polarkreis, als schöne Beispiele genannt seyn mögen, ferner der *Hästman*, gerade auf diesem Kreise, und die Berge von *Folden* und *Vestfjords*, nördlich desselben; die letzteren sind von R. Everest treffend als ähnlich dem Rachen eines ungeheuren Haifisches beschrieben.

Es ist wichtig, die Richtung der Furchen auf diesen *roches moutonnés* zu bestimmen. Soweit meine eigenen Beobachtungen reichen, bestätigen sie die Angabe von Hrn. Siljeström, daß die abschabende Wirkung gewöhnlich in einer Nordwest-Richtung geht, d. h. vom Lande zum Meere. In Fällen, wo eine Abweichung von dieser allgemeinen Richtung da war, zeigte sich ihm eine hinlängliche Ursache dazu, z. B. die Einmündung eines Fjordes oder das Auftreten eines Hindernisses seewärts. Ich konnte daher nicht dem Schlusse widerstehen, daß die Eismassen,

Beweise, daß sie einst ausgefüllt waren mit ungeheuren Gletschern, denen sie in der That zweifellos hauptsächlich ihr Daseyn verdanken. Der *Hardanger-Fjord* mit seinen neueren Gletschern, welche von dem *Firn* des *Folge Fond* herunterstreichen, ist ein prachtvolles Beispiel vom Canal eines alten Eisstromes. Wo seine felsigen Ufer entblößt sind, da sind sie auch versehen mit den charakteristischen Furchen, deren Lage und anderseits deren Abwesenheit auf den jählings zur Mündung des Fjordes geneigten Abhängen deutlich die Richtung verkünden, in welcher die alten Gletscher sich bewegten. Im *Romsdal-Fjord*, an der Spitze desselben, ist die frühere Eiswirkung vielleicht noch schlagender dargethan, weil sie sich dichter um den Reisenden concentrirt. Soweit das Auge an den steilen Wänden dieses großen Hohlweges hinaufreicht, sind die Felsen gefurcht und geglättet durch die Wirkung des bewegten Eises; und ungeheure Gneisblöcke, die jetzt am Boden der Schlucht liegen, einst aber auf den Gipfeln der Abhänge gelegen haben müssen, zeigen durch die abgeriebene und gefurchte Beschaffenheit ihrer früher entblößten Seiten, daß entweder diese Schlucht einst vollständig mit Eis ausgefüllt, oder durch einen Gletscher von mäßigerer Dicke allmählich ausgehöhlt ward.

Es war natürlich, daß diese gehäuften Beweise eines früheren Zustandes der Erdoberfläche, der von dem gegenwärtigen so sehr verschieden ist, mannigfache Hypothesen hervorriefen, um einen Wärmezustand zu erklären, welcher Landstriche, die jetzt häufig fette Wiesen und üppige Kornfelder darbieten, von solchen ungeheuren Eismassen bedecken ließ. Fourier (Poisson) nahm an, daß die Temperatur des Himmelsraumes nicht gleichförmig sey, und daß unser Sonnensystem in Folge der ihm zugeschriebenen eigenen Bewegung unter den Sternen zuweilen durch Regionen gehe, die kälter als andere seyen. Gemäß dieser Hypothese trat die Eiszeit ein, als das Sonnensystem einen verhältnißmäßig kalten Raum des Himmels durchwanderte. Andere haben gedacht, daß die von der Sonne ausgesandte

Wärme eine Veränderung erleide, und daß jener Zeitraum aus einer so zu sagen kalten Sonnenperiode hervorgegangen sey. Hr. W. Hopkins glaubt, daß eine verschiedene Vertheilung von Land und Wasser, und besonders eine verschiedene Richtung der von den Tropen nach den Polarregionen gehenden Ströme warmen Wassers das Klima gewisser Gegenden kälter als jetzt machten und somit eine hinlängliche Erklärung der Phänomene der Eiszeit liefern. Endlich meint Prof. Kämtz'), daß in der Eiszeit die Berge weit höher als jetzt gewesen seyen, der *Mont-Blanc* z. B. eine Höhe von 20000 Fuß erreicht habe, indem die secundären und tertiären Formationen während der Eiszeit von ihren Gipfeln fortgerissen worden.

Die beiden letzten Annahmen sind mit furchtbaren geologischen Schwierigkeiten verknüpft, besonders wenn man erwägt, daß die Phänomene des besagten Zeitraumes sich über die ganze Oberfläche der Erde erstreckten; sie haben daher niemals eine mehr als theilweise Aufnahme gefunden. Von den beiden ersten Hypothesen hat überdies Tyndall neuerlich gezeigt, daß sie auf einer ganz unthunli-

seyn wesentlich abhängt, verringert wäre. Nur durch einen größeren Temperatur-Unterschied zwischen Land und Meer ist eine Zunahme der Eiswirkung möglich; und diese Hypothesen sind verfehlt, in sofern sie die Nothwendigkeit einer Erhöhung des Temperatur-Unterschiedes gänzlich ignoriren.

Dies erhellt aus einer Betrachtung der Functionen der drei wesentlichen Theile des grossen natürlichen Eis-Apparates, nämlich des Evaporators, des Condensators und des Recipienten. Die Rolle des Oceans als Evaporator ist zu einleuchtend, um einer Beschreibung zu bedürfen. Die beiden anderen Theile des Apparates sind jedoch gewöhnlich mit einander verwechselt worden. Die Berge sind wirklich die Recipienten oder *Eisträger*, und nur in untergeordnetem Sinne Condensatoren. Der wahre Condensator ist die trockene Luft der oberen Regionen der Atmosphäre, welche die Wärme des Wasserdampfs, der nach Tyndall's neueren Untersuchungen ein ausserordentliches Strahlungs- und Absorptions-Vermögen besitzt, eine freie Ausstrahlung in den Himmelsraum gestattet <sup>1)</sup>. Tyndall hat gezeigt; dass der Wasserdampf an der oberen Fläche einer ganz oder bei-

1) Ich habe ein einfaches Verfahren erdacht, die Ausstrahlung des Wasserdampfs experimentell so zu erweisen, dass viele Personen auf einmal den Effect sehen können. Ein Holzkohlenöfchen, 14 Zoll hoch und 6 Zoll im Durchmesser, wird vor einer Thermosäule aufgestellt, aber zwei Fuß von ihm entfernt, und die Strahlung des Oefchens und der Kohlen wird durch einen doppelten Metallschirm von der Säule abgehalten. Nachdem die durch die Ausstrahlung der aufsteigenden und erhitzten Kohlensäure bewirkte Ablenkung des Galvanometers sorgfältig mittelst der Strahlung einer constanten Wärmequelle auf die andere Seite der Säule neutralisirt worden, lässt man einen Dampfstrom durch ein lothrecht den Ofen durchsetzendes Eisenrohr aufsteigen. Augenblicklich weicht das Galvanometer viel stärker ab als vor der Compensation wo es der vollen Ausstrahlung der erhitzten Luft und Kohlensäure ausgesetzt war. Bei Unterbrechung des Dampfstroms kehrt die Nadel sogleich auf Null zurück. Wenn nun statt des Dampfes ein Luftstrom durch das Rohr getrieben wird, erfolgt entweder gar keine Ablenkung oder eine schwache in entgegengesetzter Richtung. Die Höhe des Ofens verhindert die Condensation des Dampfes vollständig.

nahe mit Feuchtigkeit gesättigten Luftschicht seine Wärme rasch in den Himmelsraum ausstrahlen, und sich je nach der Temperatur der umgebenden Atmosphäre zu Regen oder Schnee verdichten muß, da die trockene Luft fast ganz machtlos ist, diese Ausstrahlung zu hemmen. So wird denn die ungeheuere Wärmemenge, welche sich bei der Condensation von Wasserdampf entwickelt fortgeschafft, ohne die Temperatur des Mediums, in welchem die Operation vor sich geht, merklich zu erhöhen. Dafs dieser Condensationsprocess höchst thätig und wichtig bei meteorologischen Erscheinungen seyn muß, kann schwerlich bezweifelt werden, wenn man erwägt, dafs der grofse Zuwachs an Wärme, den die umgebende Atmosphäre erlangte, sobald eine Condensation zu Wasser aus irgend einer anderen Ursache erfolgte, der ferneren Ablagerung von Feuchtigkeit unter solchen Umständen bald Einhalt thun müßte. So würde die Condensation eines Kubikfusses Wasser von  $40^{\circ}$  F. aus Wasserdampf von  $32^{\circ}$  F. die Temperatur von 352053 Kubikfuß Luft um  $10^{\circ}$  erhöhen. Ein solcher ungeheure Wärmezuwachs, wo Condensation ohne Radiation stattfindet, würde unfehlbar den Process schnell abbrechen.

Der Condensator ist also ein Apparat ganz verschieden von dem Eisträger, welcher letzterer in der That bei der gewöhnlichen Destillation die Stelle des Recipienten einnimmt; und solange also die Temperatur der Eisträger, nebst der der umgebenden Luft, sich nicht über  $0^{\circ}$  C. erhebt, bleiben ihre Functionen unangetastet. Alles Uebrige gleich, wird ein Eisträger von  $0^{\circ}$  C schwerlich in Wirksamkeit durch einen von  $-15^{\circ}$  C. übertroffen. Allein man muß bedenken, dafs die actuelle Wirksamkeit eines Eisträgers, nach jährlichem Durchschnitt, abhängt von der Länge der Zeit, während welcher seine Temperatur nicht über den Frostpunkt steigt. Daher sind denn diejenigen Berge, welche am weitesten in die zunehmend kalten Höhen der Atmosphäre hineinreichen die wirksamsten, — nicht weil ihre Temperatur zuweilen tief unter dem Frostpunkt liegt,

sondern weil sie einen größeren Theil des Jahres hindurch eine unter diesem Punkt liegende Temperatur besitzen.

Diese Betrachtungen führen zu dem Schluss, daß, vorausgesetzt die Versorgung der Atmosphäre mit Wasserdampf bleibe constant, eine vergrößerte Condensation nur entstehen kann durch eine erhöhte Leichtigkeit der Wärmestrahlung jenes Wasserdampfs in den Himmelsraum, — eine Bedingung welche kosmische Veränderungen einschließt, von denen wir nicht die geringsten Beweise haben. Da andererseits die Kräfte des ausstrahlenden Condensators im gegenwärtigen Moment bei weitem nicht auf höchste angeschlagen sind, so würde eine reichlichere Versorgung der Atmosphäre mit Wasserdampf zugleich eine entsprechende Verstärkung der Condensation bewirken. Solch eine reichlichere Versorgung mit Wasserdampf, einen bedeutenden Zeitraum hindurch, könnte nur aus der Verbindung einer größeren Wärmemenge mit den Gewässern des Oceans hervorgehen. Allein alle bisher zur Erklärung der Eiszeit aufgestellten Hypothesen haben in der Erkennung dieser Seite des Problemes gefehlt, in sofern sie alle annehmen daß Kälte allein nothwendig war zur Entwicklung der Phänomene jener Zeit. Dieser wichtige Mangel muß mir zur Entschuldigung dienen bei der Aufstellung einer neuen Hypothese, welche nothwendig in gewisser Hinsicht auf noch unvollkommen ermittelten Daten beruht, und welche sich mir allmählich aufdrang aus den Eindrücken, die ich während meiner neuerlichen Reise in Norwegen empfang. Jede solche Theorie muß Kenntniß nehmen von folgenden Punkten in der Geschichte der Eiszeit. Erstens: daß die Wirkungen auf der ganzen Erde verspürt wurden. Zweitens: daß sie erfolgten oder wenigstens endigten in einer verhältnißmäßig neuen geologischen Periode. Drittens: daß ihnen eine Periode von unbestimmter Dauer voranging, in welcher die Eisthätigkeit entweder ganz fehlte oder wenigstens auf Regionen von bedeutender Höhe beschränkt war. Viertens: daß während ihrer Andauer der atmosphärische Niederschlag viel größer war, und zu einer Periode

die Schneelinie bedeutend tiefer lag als gegenwärtig. Fünftens: daß ihr eine Periode folgte, die sich bis in die jetzige Zeit ausdehnte, worin die Eiswirkung wiederum sehr unbedeutend ward.

Alle diese Umstände würden die natürlichen Folgen einer allmählichen Erkaltung des Oceans von einer höheren Temperatur zu seiner jetzigen seyn. Die einzige Ursache der Erscheinungen der Eiszeit war eine Temperatur des Oceans höher als seine jetzige.

Die Hypothese beruht hauptsächlich auf den folgenden zwei Sätzen:

1. Daß eine höhere Temperatur des Oceans zu einer stärkeren Verdampfung und folglich zu einem größeren atmosphärischen Niederschlag Anlaß geben würde.

2. Daß dieser vermehrte atmosphärische Niederschlag die mittlere Tiefe des bleibenden Schnees auf den Esträgern vergrößern, und innerhalb gewisser Gränzen, die Schneelinie herabdrücken würde.

Untersuchen wir diese Sätze im Detail. Allgemein ge-



Wir haben keine hinreichenden Data zur Berechnung der gegenwärtigen Mitteltemperatur des Oceans; allein unter  $69^{\circ} 40'$  N. Br. an der Küste von Norwegen, Mittags an einem merkwürdig heißem Sommertage fand Forbes die Temperatur an der Oberfläche  $= 46^{\circ},5$  F. Die Annahme von  $40^{\circ}$  F. als Mitteltemperatur an der Küste von Norwegen wird daher wahrscheinlich über der Wahrheit liegen. Nehmen wir nun das Mittel aus den von Dalton bei  $35^{\circ}$  und  $45^{\circ}$  erhaltenen Resultaten, so würde die Verdampfung aus einer kreisrunden Fläche von 6 Zoll Durchmesser bei  $40^{\circ}$  seyn:

Bei Windstille.	Bei sanft. Wind.	Bei stark. Wind.	Mittel.
$15^{\circ},15$	$15^{\circ},48$	$15^{\circ},81$	$15^{\circ},48$

und bei  $60^{\circ}$  nach dem Mittel der Dalton'schen Resultate bei  $55^{\circ}$  und  $65^{\circ}$ :

$25^{\circ},26$	$25^{\circ},90$	$35^{\circ},55$	$25^{\circ},90$ .
-----------------	-----------------	-----------------	-------------------

Diese absoluten Zahlen wurden mit trockener Luft erhalten und können daher nicht betrachtet werden als Repräsentanten der *wirklichen* Verdampfung aus einer Wasserfläche wie die des Oceans, welche mit Luft von stets wechselnder hygrometischer Beschaffenheit in Berührung ist. Ich behaupte nur, sie repräsentiren unter ähnlichen Verhältnissen in beiden Fällen die *relative* nicht die absolute Verdampfung aus einer gegebenen Fläche des Oceans; und, wenn das zugegeben wird, so folgt, daß eine Erwärmung des Oceans an der norwegischen Küste von  $20^{\circ}$  F. über seine gegenwärtige Temperatur die Verdampfung aus einer gegebenen Fläche verdoppeln würde. Eine solche verstärkte Verdampfung, begleitet wie es nothwendig seyn muß von einem entsprechenden Niederschlag, würde genügen die Fjorde mit Eis zu füllen und die Westküsten jenes Landes mit demselben zu bedecken, sobald nur die Eisträger sich in einem hinlänglich wirksamen Zustand befänden. Allein, würde nicht die erhöhte Temperatur des Oceans bestrebt seyn, die Mitteltemperatur der Atmosphäre selbst in beträchtlichen Höhen zu steigern, und somit die

**Schneelinie zu heben und das Areal des ewigen Schnees zu verringern?**

Die Antwort auf diese Frage ist in dem zweiten der obigen Sätze enthalten. Dafs die Gränze des ewigen Schnees nicht allein von der Mitteltemperatur der Atmosphäre an dem betreffenden Orte abhängt, beweist die sehr verschiedene Mitteltemperatur der Schneelinie an verschiedenen Orten. So ist sie unter dem Aequator ungefähr 35°, in den Alpen und Pyrenäen 25° und nach L. v. Buch unter 63° N. Br. in Norwegen nur 21°<sup>1)</sup>). Diese Zahlen sind sehr lehrreich. Warum steigt die Mitteltemperatur der Schneelinie mit Annäherung an den Aequator? Die Antwort auf diese Frage gab bereits Hr. Hopkins in seinem bewundernswerthen Aufsatz über den Einfluß der inneren Wärme auf das frühere Klima der Erde<sup>2)</sup>). Er nimmt an, dafs die niedrige Schneelinie unter den Tropen von einer gleichförmigeren Temperatur und einer grösseren Feuchtigkeit der Atmosphäre herrühre. Die Regenströme welche unter den Tropen herabfallen, übertreffen bei weitem die Niederschläge in den gemäßigten und den

Schneelinie daselbst wenigstens eine Höhe von 4500 Fufs über diesem Niveau besitzt. Hr. Hopkins berechnet, daß die Schneelinie am Aequator 1000 Fufs niedriger liegt als die Mittel-Linie von 32°, während sie in den Alpen und unter dem Polarkreis respective 2000 und 3500 Fufs höher liegt als die Linie von 32°. Durch die oben erwähnten Einflüsse wird also die Schneelinie am Aequator nicht weniger als 4500 Fufs unter ihre thermische Lage am Polarkreis herabgebracht, und daher würde, bei aequatorialen Niederschlägen und einer gleichförmigeren Temperatur als jetzt, die Schneelinie in Norwegen am Polarkreis aus ihrer gegenwärtigen Lage von 3000 bis 4000 Fufs über dem Ocean bis zum Spiegel desselben herabsinken. Diese wesentliche Abhängigkeit der Höhe der Schneelinie von der Gröfse des Niederschlags und der Gleichförmigkeit der Temperatur wird auch bestätigt durch ihre relative Höhe an der Küste und im Inneren der skandinavischen Halbinsel, wie sie Forbes in der folgenden Tafel giebt, theils nach seinen eigenen Beobachtungen, theils nach denen von L. v. Buch, Naumann und Anderen <sup>1</sup>).

Breite	Höhe der Schneelinie, in Fussen.		
	Im Inneren	An der Küste	Unterschied
60°	5500	4450	1050
62	5200	4150	1050
64	4200	3650	550
66	3700	3250	450
68	3450	3000	450
70	3350	2900	450

Der Unterschied zwischen der Höhe der Schneelinie nahe an der Küste, wo in Folge des Golfstromes der Winter milde, aber der atmosphärische Niederschlag groß ist, und der im Innern, wo das Klima ein extremes und die Luft verhältnißmäßig trocken ist, beläuft sich also in einigen Fällen auf ganze 1050 Fufs oder nahe ein Viertel der gesamten Höhe. Im Zusammenhang mit dieser Herabdrückung der Schneelinie, darf auch nicht vergessen wer-

1) *Norway and its glaciers*, p. 214.

den, daß reichlicher Niederschlag ganz unverträglich mit großer Sommerhitze. Der unaufhörlich bedeckte Himmel fängt die Sonnenstrahlen auf und mäßigt die Sommertemperatur. Es ist eine alte Erfahrung, daß ein naasser Sommer immer ein kalter ist.

Während also eine Steigerung der oceanischen Wärme die mittlere Temperatur der Gränze des ewigen Schnees zu erhöhen sucht, würde dennoch, innerhalb gewisser Gränzen, eine Herabdrückung der Schneelinie selbst stattfinden und zwar wegen der oben erwähnten Neben-Umstände nämlich 1) wegen vermehrten Niederschlags, welcher während der Wintermonate eine solche Anhäufung von Schnee veranlassen würde, daß er der Schmelzung durch die Wärme des darauf folgenden Sommers widerstände, und 2) wegen Verringerung der Sommertemperatur in Folge der Auffangung der Sonnenstrahlen durch den bedeckten Himmel. Es leuchtet indessen ein, daß diese Erniedrigung der Schneelinie durch Erhöhung der oceanischen Temperatur nur innerhalb gewisser Gränzen stattfinden würde; denn wieviel die mittlere Temperatur der Schneelinie von 21° (ihre

pfung, deren Effect das Heben, der Linie des ewigen Schnees, schon erklärt worden ist.

Nachdem ich mich sonach bemüht habe zu zeigen, daß alle Erscheinungen der Eiszeit sich folgerecht aus der allmählichen Erkaltung des Oceans von einer höheren Temperatur bis auf seine jetzige entwickeln lassen, erübrigt mir noch eine Ursache für solche höhere Temperatur des Oceans anzugeben, und gewisse gegen diese Hypothese vorgebrachte geologische und paläontologische Einwürfe zu beseitigen.

Zuerst mag in Betreff der Ursache der vorausgesetzten höheren Temperatur als ein unumstößlicher Satz bemerkt seyn, daß die Wärme entweder von aussen, von einer kosmischen Quelle, oder von innen, d. h. von einem säcularen Ursprung herkommen muß. Von kosmischen Quellen der Veränderung der terrestrischen Temperatur sind bisjetzt nur zwei hingestellt und auf diese habe ich bereits angespielt. Die erste derselben, nämlich die Hypothese, daß unser Sonnensystem durch Himmelsräume ging, in welchen es eine stärkere Wärmestrahlung durch die Sterne empfing, ist bereits von Hrn. Hopkins in der schon angeführten Abhandlung ausführlich discutirt und schließlic aus astronomischen Gründen als ganz unhaltbar bezeichnet worden. Die zweite erfordert einige Beachtung, da es keineswegs unwahrscheinlich ist, daß die Sonne einst ein kräftigerer Wärme-Ausstrahler war als jetzt, obwohl die Annahme, daß dies in bedeutendem Grade so spät als am Ende der Eiszeit der Fall gewesen seyn sollte, in hohem Maasse unwahrscheinlich ist. Man könnte zugeben, daß eine Verstärkung der Sonnenkraft die Temperatur der Meeresfläche erhöht, und die Functionen des ausstrahlenden Condensators nicht sehr gestört haben würde, indem die leuchtenden Wärmestrahlen der Sonne noch keine starke Absorption durch die Wasserdämpfe erlitten. Allein sie würde ohne Zweifel die Wirksamkeit der Eisträger sehr geschwächt haben, da deren kräftig absorbirende Oberflächen unter der erhöhten Sonnenstrahlung weniger fähig

gewesen wären, die nothwendige niedrigere Temperatur zu unterhalten. Glücklicherweise hat man jedoch nicht nöthig, sich hier auf Conjecturen einzulassen, denn der Beweis liegt in den comparativen Effecten der Sonnenstrahlung auf die Eisphänomene in den verschiedenen Zonen der Erde beständig vor uns. Die Sonnenstrahlung unter den Tropen ist, verglichen mit der in den gemäßigten und kalten Zonen, eine verstärkte, aber diese Verstärkung bringt keine Eiszeit in der heißen Zone hervor; im Gegentheil, obwohl, wie oben gesagt, die Schneelinie herabgedrückt ist in Bezug auf die Linie von  $32^{\circ}$ , sind doch beide Linien unwiderstehlich zu den Bergen hinaufgetrieben.

Keine kosmische Wärmequelle ist also im Stande, die Phänomene der Eiszeit zu erzeugen, und es bleibt daher nur die wohlbekannte säculare Quelle, die innere Erdwärme übrig. Das Problem des Einflusses der inneren Erdwärme auf die Temperatur der Erdoberfläche ist von Hrn. Hopkins<sup>1)</sup> und Prof. W. Thomson<sup>2)</sup> am geschicktesten behandelt worden. Annehmend das Resultat der Poisson'schen Berechnung, daß der von der inneren Wärme

gangs der Wärme durch eine dicke Wasserschicht, wie die des Oceans, welche mir diese Berechnung als gänzlich unanwendbar erscheinen lassen, den ehemaligen Einfluss der innern Wärme auf die Oberflächentemperatur des Oceans darnach zu bestimmen. Vier Umstände kommen in Betracht, wenn man versuchen will, den Wärmezustand des Oceans während der Erkaltung der Erdkruste zu erforschen. Diese sind, erstens: die Wärmeleitung des Wassers; zweitens: seine Wärmetfortführung; drittens: sein Vermögen, in Klüfte oder Verrückungen, die sich von Zeit zu Zeit in dem Boden des Oceans gebildet haben könnten, einzudringen; und viertens: seine specifische Wärme.

Was die Leitungsfähigkeit des Wassers betrifft, so zeigen die Bestimmungen von Despretz <sup>1)</sup>, daß sie, verglichen mit der Leitungsfähigkeit der soliden Erdkruste eine verschwindende GröÙe ist. Allein dieser fast gänzliche Mangel an Leitungsvermögen wird mehr als compensirt durch die Wärmetfortführung. Wäre indess der Ocean frei von seitlichen Strömungen, so würde selbst diese Fortführung nicht viel die Fähigkeit des Granits, Wärme nach der Oberfläche zu leiten, übertreffen; denn nehmen wir an, die mittlere Tiefe des Oceans wäre fünf (engl.) Meilen, so würden wir, selbst wenn er am Boden eine Temperatur von  $100^{\circ}$  C. und an der Oberfläche eine von  $15^{\circ}$  C. hätte, nur einen Unterschied von  $0,0032^{\circ}$  C. für jeden Fuß Erhebung haben. Wir besitzen keine Bestimmungen über die Geschwindigkeit der Wärmetfortführung im Meerwasser für gegebene Temperaturdifferenzen, allein für den betrachteten kleinen Fuß-Unterschied muß sie fast undenkbar klein seyn. Dessenungeachtet läßt sich kaum bezweifeln, daß die polaren und äquatorialen Ströme diese verticale Fortführung in dem Maße unterstützen, daß im Ganzen die Wärme sehr viel rascher von dem Boden des Oceans zu seiner Oberfläche übertragen wird als in einer starren Granitschicht von gleicher Dicke. Ich habe mich bemüht, das relative Vermögen des Wassers und des Granits zu sol-

1) *Ann. de chim. et de phys.* Vol. LXXI, p. 206.

cher Fortpflanzung der Wärme roh zu bestimmen. Zu dem Ende wurde ein 6zölliger Würfel aus Granit geschnitten und ein Blechgefäß verfertigt, das einen gleichen Würfel von Wasser, bedeckt mit einer Oelschicht von  $\frac{1}{15}$  Zoll Dicke zur Verhütung der Verdunstung, aufnehmen konnte. Beide Würfel wurden auf eine Eisenplatte gestellt und von unten durch eine Dampf-Atmosphäre erhitzt, während die lothrechten Seiten durch mehrere Lagen Flanell gegen Wärmeverlust geschützt waren. In die obere, der Luft ausgesetzte Fläche eines jeden wurde die Kugel eines Thermometers versenkt und die Zeit zu seinem Steigen um  $10^{\circ}$  C. aufgezeichnet. Folgendes sind die Resultate dieser Versuche:

Erforderliche Zeit, um die Temperatur der Oberfläche um  $10^{\circ}$  C. zu erhöhen:

beim Granitwürfel  $1^h 10^m$

- Wasserwürfel 0 57.

Erwähnen muß ich, daß die mit der heißen Platte in Berührung stehende Fläche des Blechgefäßes mit einer Schicht Lampenruß überzogen war und daß die Oberflä-



Fortführung durch polare und aequatoriale Ströme vergrößert werden würde; allein dennoch ist die Annahme, der Boden des Oceans hätte sich so rasch erkaltet wie wenn er der freien Luft ausgesetzt gewesen wäre, ganz unhaltbar; und ich halte es nicht allein für möglich, sondern gar für wahrscheinlich, daß die saeculare Abkühlung der Erde durch den Ocean hin bis in eine verhältnißmäßig sehr junge geologische Periode angedauert und selbst in unseren Tagen noch nicht ganz aufgehört habe.

Die größere Leichtigkeit, mit welcher somit Wärme durch Wasser fortgeführt wird, würde offenbar die Wärmezunahme mit der Tiefe für eine gegebene Oberflächentemperatur viel weniger rasch machen, als es beim Granit der Fall wäre. So halte ich es für wahrscheinlich, daß die innere Erdwärme die Oberflächen-Temperatur des Oceans noch in sehr beträchtlichem Grade afficirte, lange nachdem sie aufgehört hatte, die äußere Wärme des Landes merkbar zu influenciren. Diese Annahme wird bedeutend unterstützt durch eine Betrachtung der Umstände, welche das Entweichen der Wärme aus der Oberfläche des Oceans, verglichen mit dem aus dem Lande, zu verzögern trachten. Die Leichtigkeit, mit welcher strahlende Wärme aus gleich großen Flächen von Wasser und Granit bei derselben Temperatur durch vollkommen trockne Luft entweicht, ist beinahe gleich; allein sobald Wasserdampf in die Bahn der Strahlen eindringt, werden die Umstände wunderbar verändert. Aus beiden wird das Entweichen der Wärme verringert, allein die Strahlung aus dem Wasser wird bei weitem im stärksten Grade verzögert. Diese außerordentliche Undurchdringlichkeit (*intranscency*) des Wasserdampfs für Strahlen, die vom Wasser ausgehen, ist entscheidend nachgewiesen durch Tyndall in einem kürzlich der *Royal Society* mitgetheilten Aufsatz <sup>1</sup>).

Mögen wir demnach in Betracht ziehen: die Diffusion der Wärme durch Wasser und Granit oder die Eigenschaft des Oceans, vermöge Dislocationen usw. Wärme aus grö-

1) *Proceedings of the Roy. Soc. Vol. XIII, p. 160.*

flüßeren Tiefen als sein eigener Boden fortzuführen, oder endlich die respectiven Leichtigkeiten, mit welchen unter den angeführten kosmischen Bedingungen Wasser und Granit ihre Wärme in den Himmelsraum ausstrahlen, — so finden wir überall einen Zustand der Dinge, welcher nicht nur die Wärme im Wasser länger zu bewahren, sondern auch die Zunahme der Temperatur von der Oberfläche nach unten weniger rasch zu machen sucht, als es bei der starren Erdkruste der Fall ist; und dieses gilt auch *mutatis mutandis* von der Zurückhaltung der Wärme, die von der Sonnenstrahlung her stammt. Die leuchtenden Wärmestrahlen der Sonne gehen ungehindert durch Wasserdampf und werden absorbirt sowohl durch Granit-, als durch Meeresflächen; allein einmal absorbirt, gehen diese Strahlen als dunkle Wärme von zwei verschiedenen Eigenschaften oder Vibrationsgeschwindigkeiten weiter fort. Um Tyndall's Erklärung des Phänomens zu gebrauchen, haben die Vibrationen der flüssigen Wassermoleküle eine solche Geschwindigkeit, daß sie von denselben Molekülen im Dampf-  
 —————

sen das Wasser am meisten fähig ist, ist also der, durch den die Eisträger mit ihren schneeigen Bürde versehen werden.

*Einwürfe.* — Die Hypothese, welche ich im Vorstehenden zu entwickeln bemüht war, wird, abne ich, außer den schon erwähnten Einwürfen noch verschiedene erfahren, welche auf dem ersten Blick sehr bedenklich erscheinen, welche aber, glaube ich, diesen Charakter wenigstens zum großen Theil verlieren, wenn man sie näher untersucht.

1. Vielleicht der handgreiflichste dieser Einwürfe ist einer gegen meine Behauptung, daß ein reichlicherer atmosphärischer Niederschlag eine größere Anhäufung von Schnee auf den höheren Theilen des Landes veranlassen und somit die Schneelinie herabdrücken würde. Man könnte sagen, daß wenn auch ein vermehrter atmosphärischer Niederschlag im Winter mehr Schnee ablagern, doch der entsprechende starke Regen im Sommer den Ueberschuß des niedergefallenen Schnees wieder schmelzen würde. Zur Antwort auf diesen Einwurf möchte es vielleicht hinreichend seyn, die obengegebenen Thatsachen in Betreff der comparativen Höhe der Schneelinie in benachbarten trocknen und feuchten Orten dagegenzustellen; allein es kann auch zur Erklärung dieser Thatsachen hinzugefügt werden, daß eine verhältnißmäßig große Menge selbst von warmem Wasser zur Schmelzung von Schnee oder Eis erforderlich ist. In der That ist wohl bekannt, daß die Wärmemenge, welche bloß zum Schmelzen derselben erfordert wird, ihre Temperatur auf  $174^{\circ}$  F. erhöhen würde, wenn keine Schmelzung einträte. Gesetzt, es würde der Niederschlag auf einen gegebenen Eisträger das ganze Jahr hindurch verdoppelt, daß während sechs Monate dieses Jahres der vermehrte Niederschlag in Form von Schnee von  $32^{\circ}$  F. erfolgte und während der übrigen sechs Monate in Form von Regen von  $50^{\circ}$  F.; so würde, selbst unter diesen für die Eisträger offenbar so ungünstigen Umständen, sehr wenig mehr als ein Achtel des zusätzlichen Schnees von dem warmen Regen geschmolzen werden. In der That sind nahe acht Tonnen Wasser von  $50^{\circ}$  F. erforderlich, um

eine Tonne Schnee oder Eis zu schmelzen, selbst wenn es schon in aufthauendem Zustand sind. Forbes nimmt an, daß nicht mehr als ein Fünfzigstel des Schnees auf den Schneefeldern von Norwegen im Sommer durch Regen geschmolzen werde; während Hr. Durocher aus den Beobachtungen, die im Kloster auf dem St. Bernhard wenig *unterhalb* der Schneelinie gemacht werden, berechnet hat, daß nicht mehr als ein Neunzigstel des jährlichen Schnees durch den Regen gelöst wird. Somit ist der Effect der Sommerregen im Schmelzen des Winterschnees verhältnißmäßig unbedeutend.

2. Ist es nicht aber eine nothwendige Folge dieser Hypothese, daß der Ocean in der verhältnißmäßig entlegenen protozoischen Periode eine mit dem animalischen Leben unverträgliche Temperatur gehabt haben müsse? Diese Frage erhebt offenbar den bedenklichsten der gegen meine Ansicht zu machenden Einwürfe; desungeachtet giebt es mehrere Betrachtungen, welche ihm viel von seiner Stärke nehmen. Nach rein geologischen Zeugnissen zu urtheilen, würde die Periode welche seit dem ersten Auftreten des

strengeren Theils der Eiszeit nothwendig eine rasche Abkühlung des Oceans verursacht und somit die während der postglacialen Zeit-Einheit bewirkte Erkaltung vergrößert haben.

Die Versuche von Dalton über die Grösse der Verdampfung bei verschiedenen Temperaturen dienen zur Erläuterung der Wahrheit der ersten dieser Betrachtungen. Er fand, was Daniell später bestätigte, daß die Grösse der Verdampfung zunimmt in einer geometrischen Progression bei gleichen Anwüchsen sensibler Wärme. Aus demselben Grunde mußte die Ablagerung der meisten sedimentären Gesteine vor der Eiszeit in einem viel rascheren Verhältniß geschehen seyn als nach derselben. In der That hängt die Grösse der Ablagerung so wesentlich von dem Betrage des Niederschlags ab, daß es keineswegs unwahrscheinlich ist, daß das Verhältniß der Abnahme von einem gewissen Punkt bis herab zur Eiszeit angenähert ebenfalls ein geometrisches war. Dadurch würde das Verhältniß zwischen den prae- und postglacialen zöischen Perioden bedeutend verringert seyn. Endlich mußte das Herabsinken der Schneelinie zu dem Meeresspiegel längs einer ungeheuren Küste während der Eiszeit die Wirkung gehabt haben, daß die Temperatur des Oceans rasch verringert wurde, weil die Niederschläge auf das Land, statt das Meer zu erreichen, nachdem sie auf Kosten der Sonnenhitze erwärmt worden, nun theils als eiskaltes Wasser, hauptsächlich aber als Eis selbst in das Meer geführt wurden; und jede Tonne des letzteren würde beim Schmelzen über vierzehn Tonnen Meerwasser um  $10^{\circ}$  F. abkühlen. Es ist auch zu bedenken, daß dieses eiskalte Wasser nicht wie in Süßwasserseen an der Oberfläche schwimmen bleiben, sondern in den benachbarten warmen Wasser untersinken würde, da nach Despretz das Maximum der Dichtigkeit des Meerwassers  $6^{\circ},6$  F. unter dem Gefrierpunkt des reinen Wassers liegt<sup>1)</sup>. Alle diese Umstände in Betracht gezogen und angenommen, der Ocean habe seit der Eiszeit

1) *Ann. de chim. et de phys.* vol. LXX, p. 45.

etwa 20° F. Wärme verloren, halte ich es für möglich, daß noch zwischen einer mit dem Leben der Seethiere unverträglichen Temperatur und jener Epoche eine hinreichende Zwischenzeit für die Entwicklung der verschiedenen die praeglacialen Meere bewohnenden Organismen übrig blieb. Für die Landthiere und Pflanzen entsteht keine solche Schwierigkeit, weil, wie schon auseinandergesetzt, die Temperatur der Oberfläche, während der ganzen Periode betrachtet, sehr wenig von der inneren Erdwärme afficirt wurde.

3. Neuere Untersuchungen haben einige Geologen zu dem Schlufs geführt, daß die glaciale Wirkung in der Miocen- und sogar schon in der Permischen Periode stattfand; und obwohl die Belege, auf welchen dieser Schlufs beruht, keineswegs allgemein von den Geologen angenommen worden ist, so ist es doch gut hier zu bemerken, daß eine solche entlegene Eiswirkung ganz verträglich ist mit den hier vertretenen Ansichten. In der That ist es eine nothwendige Folgerung aus diesen Ansichten, daß die sogenannte Eiszeit keine scharfe Gränzen hatte, obwohl, aus eben angegebenen Gründen, ihr Ende wahrscheinlich viel schärfer begränzt war als ihr Anfang. Ich habe schon dargethan, daß der ewige Schnee zuerst die Gipfel der Berge berührt haben, und dann langsam zum Meeresspiegel herabgesunken seyn würde. Allein man muß bedenken, daß der atmosphärische Niederschlag während der ganzen praeglacialen Zeit gröfser war als während der Eiszeit selbst, und wo mithin das Land sich über die Schneelinie erhob, mußten Gletscher in einem Maafsstabe, die alle jetzigen übertreffen, die nothwendige Folge seyn. Es ist, glaube ich, für einen Geologen ungemein schwierig, selbst nur annähernd die Umrisse des Landes während der Permischen Zeit anzugeben. Dessenungeachtet glaubt Ramsay<sup>1)</sup>, bei Aufstellung einer glacialen Episode während dieser Periode, er habe beträchtliche Zeugnisse von dem Daseyn einer Hügelreihe, von welchen diese Gletscher herabgekommen seyen.

1) *Proceedings of the Geolog. Soc., Aug. 1855.*

Solche Betrachtungen über die prae-glaciale Periode geben uns ein lebendiges Bild von dem damaligen Klima der Erde. Die Küsten der warmen Meere besaßen eine milde (*genial*) und merkwürdig gleichförmige Temperatur, die Luft war fortwährend warm und feucht, die Erde durch bewölkten Himmel vor der sommerlichen Sonne beschirmt und durch eine Decke (*canopy*) von durchsichtigen, für die Ausstrahlung der Erde undurchdringlichen Wasserdämpfen vor der Winterkälte geschützt. Von der Küste abwärts auf flachen Grund wurden diese Eigenthümlichkeiten allmählig schwächer; allein an einer etwas steilen Küste mußte die Annäherung von warmen und kalten Klimaten viel enger seyn als jetzt. Die Flüsse und Seen, gespeist durch den Schnee der Berge, mußten ebenfalls einen merkbaren Contrast gegen die umgebenden Tiefländer darbieten, und somit auch auf engem Gebiete einen weiten Umfang von Temperatur, den thermischen Bekleidungen sehr verschiedener Organismen angemessen.

Als die Eiszeit hereinbrach wurde diese milde (*genial*) Zone allmählich verringert durch das fortschreitende Herabsinken der Schneelinie; denn obwohl die wirkliche, in Thätigkeit befindliche Wärmemenge an der Erdoberfläche während der Eiszeit größer war als später, so wurde doch die Winterkälte in den Massen des fallenden Schnees aufgespeichert, welche beim Schmelzen die Wärme des nachfolgenden Sommers absorbirten, und somit in Landstrichen, die nicht weit unter der Schneelinie lagen, sowohl die mittlere als die sommerliche Temperatur verringerten. Auch ward dies Herabsteigen eines kalten Klimas selbst durch den Ocean nicht aufgehalten; denn der ungeheure Schub von Gletschereis in das Meer bildete längs den Küsten einen Gürtel von kaltem Wasser, wo viele maritime Organismen, welche ihre Ueberreste in den Eismassen zurückgelassen haben, eine ihnen zusagende Temperatur fanden. Die gewöhnliche Vorstellung also, daß die Eiszeit eine kalte Periode war, ist richtig, obwohl Wärme und nicht Kälte die Ursache derselben war. Dieses scheinbare Pa-

ndoxon, daß Wärme die Ursache von Kälte sey, findet seine Parallele in den Eismaschinen, welche auf der letzten Londoner Ausstellung in Thätigkeit waren. In diesen Maschinen, welche 2 bis 12 Tonnen Eis auf eine Tonne Steinkohlen hervorbrachten, war das Product direct proportional der Wärmemenge, die durch die Verbrennung der Kohlen entwickelt wurde.

Diese sind die hauptsächlichsten Einwürfe gegen die Hypothese, die sich mir darbot oder von Anderen aufgestellt ward. Ich habe mich bemüht, sie zu beseitigen; allein es würde eitel seyn zu läugnen, daß einige derselben bedeutende Kraft behalten oder daß andere, vielleicht noch gewichtigere von Denen aufgefunden werden mögen, die gründlichere Kenntnisse von den Phänomenen der Eiszeit besitzen, als ich in Anspruch nehmen kann. Keiner Hypothese kann man einen Werth beilegen, bevor sie nicht durch und durch geprüft worden ist, bei welchem nothwendigen Proceß sie entweder stehen oder fallen muß. Mittlerweile empfiehlt diese sich dadurch, daß sie nicht die Annahme von



verhältnißmäßig kleine Details sehen zu lassen. Eine sorgfältige länger als ein Jahr fortgesetzte Beobachtung der Mond-Oberfläche mit einem versilberten Glasreflector von 7 Zoll Apertur und scharfer Vergrößerung, hat auf mich den Eindruck gemacht, daß unser Satellit, wie sein Hauptplanet, eine Eiszeit durchgemacht hat, und daß wenigstens mehre der *Thäler*, *Furchen* und *Striche* auf seiner Oberfläche nicht unwahrscheinlich von einer früheren Eiswirkung herkommen. Ungeachtet der vortrefflichen Schärfe der neueren Fernröhre, läßt sich nicht erwarten, daß andere als die riesenhaftesten der charakteristischen Details eines alten Gletscherbodens sichtbar gemacht werden. Unter günstigen Umständen erreicht die End-Moräne eines Gletschers ungeheure Dimensionen und folglich würde, von allen Kennzeichen eines Eisthales, dieses am ersten wahrnehmbar seyn. Zwei solcher End-Moränen, eine von ihnen eine doppelte, scheinen mir auf der Mondoberfläche nachweisbar zu seyn. Die erste liegt nahe am Ende jenes merkwürdigen Strichs, welcher nahe an der Basis von Tycho anfängt, unter den südöstlichen Wall von Bullialdus vorbeigeht, in dessen Ring er einzuschneiden scheint, und sich allmählich verliert, nachdem er den Krater 216 (Lubienitzky) passirt hat. Genau diesem letzten Krater gegenüber und sich fast quer über besagten Strich ausdehnend, befinden sich zwei nordwärts gekrümmte Rücken, die den Beobachter an die concentrischen Moränen des Rhone-Gletschers erinnern. Jenseits des zweiten und äußersten Rückens fällt ein Knorren (*talus*) allmählich nach Norden in das allgemeine Niveau der Mondsoberfläche ab. Diese Rücken sind während der ganzen Dauer der Beleuchtung dieses Theils der Mondfläche sichtbar; allein es ist nur etwa am dritten Tage nach dem ersten Viertel und bei correspondirender Phase des abnehmenden Mondes, wenn die fast horizontal auffallenden Sonnenstrahlen die Details dieses Theils der Oberfläche in starkes Relief versetzen, daß die Erscheinungen die eben aufgestellte Erklärung einflößen.

Der andere, einer End-Moräne entsprechende Rücken

findet sich am nördlichen Ende jenes prächtigen Thales, welches am östlichen Rande von Rheita vorbeigeht. Dieser Rücken ist fast halbrund und bedeutend erhaben sowohl über das nördliche Ende des Thals, als auch über die allgemeine Oberfläche des Monds. Er ist sichtbar etwa vier Tage nach Neu- und Vollmond; allein die Lage des Beobachters rücksichtlich der Lichter und Schatten machen sein Erscheinen in den Strahlen der aufgehenden Sonne bei weitem am auffallendsten.

In Bezug auf die Wahrscheinlichkeit einer früheren Wirkung des Eises oder auch nur des Wassers auf der Mondsoberfläche bieten sich anscheinend sehr große Schwierigkeiten dar. Es fehlt jetzt nicht nur an Beweisen für das Daseyn von Wasser in einem seiner Aggregatzustände auf der Mondsoberfläche, sondern alle selenographischen Beobachtungen scheinen im Gegentheil die Abwesenheit desselben darzutbun. Dessenungeachtet ist die Idee von einer früheren Wirkung des Wassers im Mond keineswegs neu; sie wurde von Gruithuisen und Anderen gehegt. Allein, wenn Wasser auf dem Mond vorhanden war, wohin ist es verschwunden? Nehmen wir an, in Uebereinstimmung mit der Nebularhypothese, daß die Portionen der Materie, aus welcher respective die Erde und der Mond zusammengesetzt ist, einst eine gleich hohe Temperatur besaßen, so folgt fast nothwendig, daß der Mond, vermöge der relativen Kleinheit seiner Masse, viel rascher erkalten mußte als die Erde; denn während der Mond nur ungefähr  $\frac{1}{49}$  des Volums der Erde besitzt, ist seine Oberfläche nahe  $\frac{1}{13}$  derselben.

Diese Erkaltung der Mondmasse mußte, nach aller Analogie, mit einer Contraction begleitet seyn, welche schwerlich als in bedeutende Tiefen hinabgehend zu denken ist, ohne nicht das Innere mit Höhlen zu erfüllen. Viele dieser Höhlen werden ohne Zweifel durch Risse mit der Oberfläche communiciren und dadurch einen inneren Recipienten für den Ocean bilden, aus dessen Tiefen selbst die brennende Sonne der langen Mondtage ganz unfähig ist

mehr als Spuren von Wasserdampf zu entwickeln. Angenommen die starre Masse des Mondes habe sich beim Erkalten in demselben Verhältniß wie der Granit zusammengezogen, so würde seine Erkaltung um nur  $180^{\circ}$  F. einen blässigen Raum von beinahe  $14\frac{1}{2}$  Millionen Kubikmeilen (engl.) erzeugen und dieser wäre mehr als hinreichend den ganzen Monds-Ocean zu verschlingen, vorausgesetzt derselbe stände zur Mondsmasse in demselben Verhältniß wie unser Ocean zur Erdmasse.

Wenn dies die gegenwärtige Beschaffenheit des Mondes ist, so läßt sich kaum der Schluß vermeiden, daß ein flüssiger Ocean nur so lange auf der Oberfläche eines Planeten bestehen kann, als letzterer eine hohe innere Temperatur bewahrt. Der Mond wird dann für uns ein prophetisches Bild des letzten Schicksals, welches unsere Erde erwartet, wenn sie, ihres äußeren Oceans beraubt, mit einer verlangsamten Axendrehung, die zwischen Monat und Jahr liegt <sup>1)</sup>, einen oeden und leblosen Umlauf um die Sonne macht, jede Hemisphäre abwechselnd der verlängerten Gluth einer wolkenlosen Sonne und dem Dunkel einer arctischen Nacht aussetzend.

1) Mayer hat bewiesen, daß die Wirkung der Fluthen die Axendrehung der Erde zu hemmen sucht. Und obwohl die Länge des Tages seit Hipparch's Zeiten nicht um  $\frac{1}{100}$  Sekunde zugenommen hat, so läßt doch diese Thatsache die Folgerung Mayer's unangetastet.

Seitdem Obiges geschrieben ward, hat Hr. James Croll im *Philosoph. Magazine* (Vol. XXVII, p. 285) einen ausführlichen Aufsatz über diesen Einfluß der Fluthen bekannt gemacht.

### III. *Ueber eine neue Klasse von Inductions-Erscheinungen; von J. C. Poggendorff.*

(Ein kürzerer Auszug von dieser Abhandlung ist schon in den Monatsberichten der Akademie 1864 Juli, gegeben.)

Die hier im Auszuge mitgetheilte Untersuchung ist hervorgegangen aus derjenigen, welche ich der K. Akademie im Novembermonat des verflossenen Jahres übergab <sup>1</sup>).

In dieser Untersuchung zeigte ich, daß Drahtrollen, welche in die Bahn eines Inductionsstroms eingeschaltet worden sind, die Schlagweite desselben vermöge eines in ihnen erregten Extrastromes schwächen, und ich fügte hinzu, daß eine solche Schwächung möglicherweise bei geraden Drahtleitungen entweder gar nicht oder nur in sehr geringem Grade stattfinden werde.

Eigene Erfahrungen darüber hatte ich damals nicht, und ich erst, da ich nachher, als ich meine Untersuchungen

Abtheilungen ungefähr 15000 Fufs Kupferdraht von 0,25 Millm. Dicke. Es ist mit zwei primären Rollen versehen, die abwechselnd angewandt wurden. In der einen ist der Draht 1,5 Millm., in der andern 1,25 Millm. dick. Das Drahtbündel war für beide dasselbe.

Zur Unterbrechung des Stroms diente meistens der Foucault'sche Quecksilber-Unterbrecher, weil er stärkere Wirkungen giebt als der gewöhnliche Wagner'sche Hammer, der übrigens in einigen Fällen auch angewandt wurde, ohne im Wesentlichen andere Resultate zu liefern.

Der Condensator bestand für gewöhnlich aus einer belegten Glimmertafel, von dessen Stanniolblättern ein jedes 15,8 par. Quadratzoll mafs. Zuweilen wurde auch ein Condensator aus drei solchen Tafeln oder ein noch gröfserer aus Wachstaffent angewandt.

Die den inducirenden Strom liefernde Batterie war in der Regel aus drei jener kleinen Grove'schen Elemente zusammengesetzt, deren Thonzellen, eine jede, nur etwa ein Loth Salpetersäure fassen. Gröfsere Elemente sind bei dem beträchtlichen Widerstand der primären Drahtrolle überflüssig, wenn man nicht den Strom sehr lange unterhalten will; für einige Stunden reichen die kleinen vollkommen aus <sup>1</sup>).

1) Ein besonderes Element diente dazu, den Quecksilber-Unterbrecher in Bewegung zu setzen, um seinen Gang unabhängig zu machen von den mit dem Inductionsstrom vorgenommenen Abänderungen. Ich will nicht behaupten, dafs diese Unabhängigkeit eine absolute sey, welche man wohl nur erreichen könnte, wenn man die Strom-Unterbrechungen durch ein Uhrwerk vollziehen liesse; aber eine sehr approximative ist sie gewifs. Allerdings zeigen sich auch bei der Quecksilber-Unterbrechung auffallende Veränderungen, wenn man den übrigen Apparat in einem oder dem andern Sinne modificirt. So wird das laute Geräusch, welches diese Unterbrechungsart für gewöhnlich begleitet, schwächer in dem Maafse als man die Pole näher zusammen schiebt; und der Ton, der sich in diesem Geräusch erkennen läfst, wird bedeutend tiefer, wenn man den Condensator ausschaltet oder die Anzahl der galvanischen Elemente vermehrt. Allein die Schwächung des Geräusches in dem einen Fall und die Vertiefung des Tons in dem andern, entspringt aus der

...enthalten in seiner  
par. Fuß Kupferdraht von 0,25 N  
mit drei primären Rollen versehen,  
nur die mit dem dicksten Draht I  
wendung einer Batterie von sechs  
Elemente.

Außer diesen beiden Inductori  
säre zunächst nur zur Bestätigung  
erhaltenen Resultate diente, wurde  
angewandt, welcher *Ableiter* heißen

Derselbe besteht aus einem hori  
tragen von einem isolirenden Stände  
dem Erdboden durch einen dünnen  
nem am Tische festgeschraubten Sch  
besitz, ist er verschiebbar, rechtwin  
der Funken zwischen den Spitzen d  
rolle durch Drähte verbundenen Mik  
teres wiederum vorn an dem Schlitten  
ben werden kann, so läßt sich das  
leitenden Platinstifts jedem Punkt de  
mit auch jeder der Polspitzen selbst  
nähern.

---

Mittels "

seitige Abstand dieser Spitzen, die kurzweg Pole heißen mögen, sey ein mittlerer in Bezug auf das Maximum der Schlagweite, welche der Apparat zu geben vermag.

Unter diesen Umständen zeigt sich nun Folgendes. Nähert man den Ableiter einem der Pole bis zu einem gewissen Abstände, so schlagen Funken zwischen beiden über, ohne daß dadurch die Hauptfunken, nämlich die Funken zwischen den Polen, sonderlich beeinträchtigt werden.

Der Abstand, bei welchem die Nebenfunkken am Ableiter zum Vorschein kommen, scheint gleich zu seyn für beide Pole, wiewohl mir auch manchmal vorkam, als sey er bei dem positiven Pol etwas, jedoch immer nur wenig, größer als beim negativen. Er ist ferner um so größer, je weiter die Pole auseinander stehen, oder anders gesagt: je länger die Hauptfunken, desto länger auch die Nebenfunkken.

Bis soweit hat die Erscheinung nichts Auffälliges; aber räthselhaft scheint das Folgende zu seyn.

Nähert man den Ableiter dem positiven Pole weiter, so kommt ein Punkt, bei welchem die Hauptfunken vollständig verschwinden; nähert man ihn dagegen dem negativen Pole weiter, so werden dieselben verstärkt. Manchmal ist dazu eine wirkliche Berührung zwischen Ableiter und Pol erforderlich, manchmal dagegen treten beide Vorgänge schon bei einem kleinen Abstände ein. Wesentlich scheint zu seyn, daß die Nebenfunkken von der letzten Spitze des Pols ausgehen, wozu bisweilen erforderlich ist, daß die Spitze des Ableiters etwas vor die Polspitze gestellt werde.

Selbst wenn man die Pole so weit auseinander gerückt hat, daß keine Funken mehr zwischen ihnen überschlagen, äußert sich die verstärkende Wirkung des Ableiters am negativen Pol, und gerade in diesem Falle sehr auffällig, denn, wenn man den rechten Punkt getroffen hat, werden dadurch augenblicklich die vorhin verschwundenen Hauptfunken wieder hervorgerufen.

Ueberhaupt werden die Hauptfunken durch die Wir-

uann in einer und derselben Ba.  
und helle zwischen dem Ablei  
Pol, schmale und lichtschwache  
heren Pol. Mitten zwischen der  
zu beiden Seiten des Ableiters  
möchte sagen confuses Ansehen,  
geringer Lichtstärke, an einigen S  
dunkler sind, und damit fortwähre  
nun mit dem Ableiter von der Mitte  
zu, so hat man anfangs die eben ei  
von Funken schön ausgebildet, at  
Abstände von diesem Pol hören mit  
funken plötzlich auf. Bei Annähe  
den negativen Pol sieht man nich  
Gegentheile scheint bei einem gewis  
sem Pol ein Maximum der Wirkun

Bekanntlich wird die Schlagweit  
ein wenig vergrößert, wenn man  
Pol eine Kugel oder Scheibe am n  
Es ließe sich daher vermuthen, daß  
kung des Ableiters am letzteren Po  
hang stehe, obwohl sie sich schon  
und selbst bei



deutlich erkennen, daß die Häufigkeit der Funken, so wie die Helligkeit derselben, besonders nach Seite des positiven Poles, wohin sie sich bekanntlich verschmälern, zugenommen hatte. Dagegen zeigte sich die schwächende Wirkung des Ableiters am positiven Pol so gut wie ungeschmälert. Bei gehörigem Abstände der beiden Pole von einander, ließen sich die Hauptfunken vollständig fortnehmen.

Ziemlich ähnlich verhielt es sich, wenn eine Kugel zum positiven und eine Spitze zum negativen Pol genommen oder an jedem Pol eine Kugel angebracht ward<sup>1)</sup>.

1) Alle diese Versuche wurden mit dem kleineren Inductorium angestellt. Bei Wiederholung derselben mit dem größeren Apparate, wobei sich die angeführten Resultate noch deutlicher herausstellten, hatte ich Gelegenheit eine anderweitig interessante Erscheinung zu beobachten.

Wenn man bei einem etwas kräftigen Inductorium die Polspitzen bis auf 2 bis 3 Linien zusammengeschoben hat, so unterscheidet das Auge, selbst bei mäßig schnellem Gang des Hammers, nicht mehr einzelne Funken, sondern erblickt statt deren einen scheinbar continuirlichen Lichtstreifen von verwaschenen Umrissen, geringer Helligkeit und röthlicher Farbe.

Nähert man nun diesem Lichtstreif, etwa in der Mitte, den Ableiter ungefähr bis auf eine Linie, so wird er, wie schon Perrot beobachtete (*Ann. de chim. et de phys. Ser. III, T. LXI, p. 200*), zerlegt, in ziemlich helle Funken, die sich dem Ableiter zuwenden, und in einem schwächeren Lichtstreif, der zwischen den Polen ausgestreckt bleibt und die von Du Moncel entdeckte Eigenschaft besitzt, daß er sich durch einen Luftstrom fortblasen oder zu krummen Lichtlinien ausdehnen läßt (*Compt. rend. XL, p. 313*).

Als ich diesen Versuch ohne Ableiter wiederholte und zwar in der Weise, daß am negativen Pol statt der Platinspitze eine Kupferscheibe von 8 Linien Durchmesser genommen ward, stieß ich auf folgende Erscheinungen, die, wie es scheint, Perrot und Du Moncel nicht beobachtet haben.

Unter den angegebenen Umständen und überhaupt bei relativ kleiner Schlagweite erhält man nämlich auf der Scheibe einen kleinen blauen oder bläulichen Fleck. Bläst man nun durch ein Glasrohr auf diesen Fleck, etwa unter einem Winkel von  $45^\circ$  gegen die Scheibe, so wird er fortgeschoben oder, richtiger, in zwei Theile zerlegt, in einen weißen Fleck, der an der Stelle bleibt, und in eine aus lauter kleinen schön blauen Fünkchen bestehende Lichtlinie, die radial auf der Scheibe fortgeht, sich noch über den Rand der Scheibe hinaus erstreckt, und dort mit einem vom positiven Pol herkommenden gekrümmten Licht-

Hiernach und auch aus anderen später zu erwähnenden Gründen dürfte es noch zu früh seyn, sich über die Ursache der Wirkung des Ableiters schon jetzt entscheiden auszusprechen.

Nach dieser Auseinandersetzung gehe ich zu dem eigentlichen Gegenstande meiner Untersuchung über, nämlich zur Betrachtung der Erscheinungen, welche durch die Wirkung langer ausgestreckter Drähte hervorgerufen werden.

Nimmt man zu einem der Poldrähte, z. B. zum positiven, einen wohl isolirt in der Luft ausgespannten Kupferdraht von ungefähr 20 oder auch nur 10 Fuß Länge, während der andere seine gewöhnliche Länge von 8 bis 12 Zoll behält, und läßt man nun Funken zwischen den Polen überschlagen, so bieten sich folgende drei auffallende Erscheinungen dar.

Fürs Erste sind die Funken heller und massiger, wie in dem normalen Fall, wo beide Poldrähte eine geringe Länge hatten.

Zweitens findet man mit dem Ableiter, wenn man ihn an

cessiv dem *positiven* und dem *negativen* Pole nähert, daß die Schlagweite der Nebenfunken an dem ersteren Pol *kleiner* und an dem letzteren *größer* ist, als in dem normalen Fall.

Drittens endlich zeigen alle Theile der primären, inducirenden Kette (Voltasche Batterie, primäre Drahtrolle, Eisenkern, Strom-Unterbrecher und Condensator), selbst wenn sie nicht besonders isolirt worden sind, *freie Elektrizität*, vermöge welcher man stechende Funken bekommt, wenn man sie mit der Hand zu berühren versucht. Und wenn man diese Elektrizität mit dem Elektrometer prüft, findet man sie meistens *negativ*, d. h. ungleichnamig mit der Elektrizität desjenigen Pols, der mit dem langen Draht versehen ward.

Hat man dagegen den *negativen* Poldraht lang genommen und den *positiven* kurz gelassen, so ist die freie Elektrizität auf der inducirenden Kette *positiv*, und auch mit der Schlagweite der Nebenfunken verhält es sich umgekehrt wie vorhin: sie ist am *negativen* Pol *kleiner* und am *positiven* *größer*, wie im normalen Fall.

Eine Abnahme in der Schlagweite der Hauptfunken ist in beiden Fällen nicht zu bemerken.

Anders verhält es sich dagegen, wenn man *beiden* Poldrähten eine größere Länge giebt, z. B. von 10 oder 20 Fufs. Dann zeigt sich die Schlagweite dieser Funken merklich verringert, oder wenigstens erscheinen sie bei derselben Schlagweite sparsamer wie im normalen Fall, aber mit noch mehr erhöhten Glanz <sup>1</sup>).

1) Die Bestimmung der Schlagweite oder, richtiger gesagt, des Maximums der Schlagweite unterliegt bei den Inductionsfunken einer beträchtlichen und nicht leicht zu beseitigenden Unsicherheit, dadurch nämlich, daß nicht alle Unterbrechungen des inducirenden Stroms von gleicher Wirksamkeit sind. So lange der Abstand der Pole ein kleiner ist, erhält man bei jeder Unterbrechung dieses Stroms einen Funken aus der Inductionarolle, so wie man ihn aber vergrößert und der Gränze nahe kommt, bei welcher überhaupt noch Funken überspringen, versagen die Unterbrechungen häufig ihren Dienst, ungeachtet man aus der inducirenden Kette jedesmal einen Funken erhält. Man beobachtet diese am

Dabei findet man die Schlagweite der Nebensfunken wiederum gleich an beiden Polen, aber kleiner wie im normalen Fall.

Endlich ist die freie Elektricität auf der inducirenden Kette so gut wie vollständig verschwunden, — bis auf jene geringe Spur, welche man häufig auch bei kurzen Drähten bemerkt, wenn man entblößte Stellen der vom Unterbrecher zum Condensator führenden Drähte leise mit der Außenfläche der Hand berührt.

Die Dicke der Drähte, welche zu der Verbindung mit den Polen genommen werden, hat auf die eben beschriebenen Erscheinungen nur einen geringen Einfluß, wenigstens innerhalb der von mir untersuchten Grenzen.

Es wurden Kupferdrähte von 0,9, von 0,25 und von 0,16 Millim. Dicke angewandt, alle 20 Fufs lang.

Paarweise die von gleichem Durchmesser zu Poldräh-  
ten genommen, gaben sie Wirkungen, die so wenig von

besten, wenn man in einem langsamen Tempo einzelne Unterbrechungen von der Hand ausführt. Drei und mehr Unterbrechungen und

einander unterschieden waren, daß man sie ohne nähere Prüfung sicher für gleich gehalten haben würde. Wenn aber ein dünnerer mit einem dickeren dieser Drähte combinirt wurde, erschien sogleich freie Elektrizität auf der inducirenden Kette, und die Schlagweite der Nebenfunken erwies sich ungleich, in dem Sinne, daß daraus eine stärkere Wirkung des dickeren Drahts hervorging.

Der Unterschied in den Wirkungen war aber keineswegs so groß, daß man diese als umgekehrt proportional dem Widerstande der Drähte oder den Quadraten ihrer Durchmesser hätte annehmen können. Denn alsdann würden sie sich wie 1 : 2,45 : 31,64 verhalten haben, und solche Verhältnisse würden ohne Zweifel auch bei paarweiser Benutzung gleich dicker Drähte wahrnehmbar gewesen seyn.

Mehr als die Dicke ist die *Länge* der Drähte von Einfluß. Diefes ergab sich bei Anwendung von zwei 300 Fuß langen und 0,25 Millm. dicken Kupferdrähten, welche auf einem etwa 12 Fuß langen und 4 Fuß breiten Rahmen isolirt ausgespannt waren. Sie bildeten auf demselben eine einzige Lage von Windungen, deren gegenseitige Abstände ungefähr einen halben Zoll betrugen.

Gewiß wäre es zweckmäßig gewesen, diese Abstände größer zu nehmen oder die Windungen ganz zu beseitigen; denn die Drähte sowohl wie ihre Windungen wirkten auf einander. Wenn der eine als Poldraht benutzt, und der andere ganz außer aller Verbindung mit dem Inductorium gelassen wurde, gab dieser, sobald man den Apparat in Thätigkeit setzte, fühlbare Anzeigen von freier Elektrizität, ungeachtet die nächsten Windungen der beiden Drähte um einen ganzen Zoll auseinander lagen und alle folgenden einen fortschreitend größeren Abstand hatten, auch die Drähte mit Seide besponnen und mit dem zur Anfertigung von Inductionsrollen dienenden Kitt überzogen waren <sup>1)</sup>).

1) Die kürzeren 20 Fuß langen Drähte will ich hier bemerken, waren in der Regel, auch mit diesem doppelten Ueberzug versehen. Ich habe indess statt ihrer in einigen Fällen auch blanke Kupferdrähte angewandt, — versteht sich immer getragen von Glasstativen — ohne bei ihnen

Als Beispiel diene die  
 neren und des grösseren In  
 der kleinen Grove'schen Elei  
 der der beiden Poldrähle, im  
 gende Länge hatte:

Länge jedes Poldrahts.	Kleiner
1 Fuß	$10\frac{1}{2}$ par. L
20 "	$7\frac{1}{2}$ "
300 . "	$6\frac{1}{4}$ "

Die Abnahme der maximal  
 fester Länge der Poldrähle ist,  
 Instrumenten eine ungefähr prop  
 kein großes Gewicht gelegt wer  
 sicherheit, welche die Bestimm  
 sich führt, und dann, weil hier  
 mitwirkt, auf welches ich kün  
 gedanke, nämlich die *Dicke* des  
 Inductionsfunken hervorruft. ]  
 dieser Draht in beiden Appa  
 Stärke nämlich - -

niolstreifen von 0<sup>mm</sup>,01 Dicke. Die Streifen des einen Paares waren 20 Fufs lang und 1 Zoll breit; die des andern hielten 12 Fufs in Länge und 6 Zoll in Breite, waren also an Fläche beinahe 3½ Mal so grofs als die ersten.

In Bezug auf die Eigenschaften, bei Combination mit einem kurzen Draht, einen Spannungs-Unterschied an den Polen und demgemäfs freie Elektrizität auf der induciren- den Kette hervorzurufen, kamen diese Streifen den Drähten von 20 Fufs ziemlich gleich, standen darin den Drähten von 300 Fufs nach. Aehnlich war ihr Verhalten in Bezug auf die Verkürzung der Schlagweite der Hauptfunken, wenn die von gleicher Breite paarweise als Poldrähte benutzt wurden. So erhielt ich unter gleichen Umständen wie vorhin:

Als Poldrähte:	Schlagweite des	
	kleineren	größeren
	Inductoriums.	
Schmale Stanniolstreifen	8½ Lin.	22½ Lin.
Breite                    "	7¾ "	22,0 "

Vergleicht man diese Resultate mit den durch Drähte erhaltenen, so erweisen sie sich als nicht sehr verschieden von ihnen. Aber hinsichtlich der Beschaffenheit der Funken ist ein grofses Unterschied vorhanden. Die Funken, welche man mittelst der Stanniolstreifen bekommt, sind auferordentlich hell und compact und erinnern durch ihren Glanz an die, welche auf bekannte Weise mit Hülfe der Leidener Flasche erhalten werden, und im Wesentlichen nichts anders sind als Entladungen dieser Flasche. Jedoch haben letztere unter gleichen Umständen eine viel geringere Schlagweite, sind heftiger und erfolgen mehr stoßweise.

Wie bei den Drähten die schwächende Wirkung weniger von der Dicke als von der Länge abhängt, so ist auch bei den Streifen die Breite oder Flächengröße von geringem Einfluß, wenigstens auf die Schlagweite, als die Länge.

Es geht dies schon aus den angeführten Beispielen her-

vor, da die breiten 12 Fufs langen Stanniolblätter, trotz ihrer  $3\frac{1}{2}$  Mal grösseren Oberfläche, keine sonderlich stärkere Wirkung auf die Funkenlänge ausübten als die schmalen 20 Fufs langen Streifen. Nur die Helligkeit und Mässigkeit der Funken war bei ihnen eine grössere.

Specieller noch überzeugte ich mich hiervon, als ich zwei Stanniolblätter von nur 2 Fufs Länge, aber 1 Fufs Breite, also von 288 Quadrat Zoll Fläche anwandte. Sie übertrafen die 20 Fufs langen und 1 Zoll breiten Streifen noch um etwa  $\frac{1}{8}$  an Flächengrösse. Dennoch gab ein solcher Streifen, combinirt mit einem dieser breiten Blätter eine entschieden stärkere Wirkung als letzteres. An seiner Seite waren die Nebenfunken ungleich kürzer und lichtschwächer als an Seite des Blattes, und auf der primären Kette erschien freie Elektrizität in bedeutendem Maasse.

Die schwächende Wirkung langer Polverbindungen, mögen sie nun aus Drähten oder Streifen bestehen, ist nicht allein auf Funken oder sonstige Spannungs-Aeusserungen beschränkt, sondern erstreckt sich eben so auf die thermi-



In meiner früheren Arbeit <sup>1)</sup> habe ich gezeigt, daß wenn eine Drahtrolle metallisch mit dem Inductorium verbunden wird, sowohl in dieser Rolle als auf den Verbindungsdrähten freie Elektrizität auftritt, die sich noch steigern läßt, wenn man ein Eisendrahtbündel in die Rolle schiebt.

Bei allen damaligen Versuchen zur Ergründung dieser Erscheinung wurden zur Verknüpfung der Rolle mit dem Inductorium kurze Drähte angewandt. Als jetzt bei einer Rolle von 10000 Fufs langem und  $\frac{1}{8}$  Millm. dickem Draht, der eine dieser Verbindungsdrähte durch einen 300 Fufs langen Draht ersetzt ward, zeigte sich die freie Elektrizität auf dem andern kurz gelassenen Draht so gesteigert, daß mit dem Ableiter Funken von  $1\frac{1}{2}$  Lin. Länge aus ihm gezogen werden konnten.

Dabei kam auch freie Elektrizität auf der primären Kette zum Vorschein, von welcher bei kurzen Verbindungsdrähten nichts zu spüren ist.

Die Drahtrolle verhält sich also ähnlich wie die Funkenstrecke bei den vorhergehenden Versuchen, mit dem Unterschiede nur, daß die Wirkungen weniger kräftig sind.

---

Die Hinzuziehung der Leidener Flasche zu den bisher beschriebenen Versuchen giebt zu einer ganzen Reihe von Erscheinungen Anlaß, die sich, glaube ich, nicht alle voraussehen lassen und daher wohl einer Erwähnung verdienen. Ich will hier nur einige derselben beschreiben.

Es macht keinen Unterschied in der Funkenlänge, wenn man die beiden Poldrähte, die etwa  $1\frac{1}{2}$  Fufs lang seyn mögen, die eine z. B. die *äußere* Belegung zweier *isolirter* Leidener Flaschen berühren läßt, wenigstens wenn die Flaschen klein sind. Bei Anwendung von Flaschen, deren Belegung auf jeder Seite 40"  $\square$  betrug, erhielt ich von dem größeren Inductorium 30" lange Funken, wie ohne dieselben. Zwei Franklin'sche Tafeln von doppelt so großer Belegung statt der Flaschen angewandt, gaben dieselben

1) Ann. Bd. 121, S. 307.

Resultate. Zwei noch größere Tafeln von  $2\frac{1}{2}$  □Fuß einseitiger Belegung verhielten sich ziemlich ebenso.

Wenn man nun aber die *innere* Belegung der einen Flasche *ableitend* mit dem Erdboden in Verbindung setzt, sinkt die Funkenlänge sogleich bedeutend, in meinem Falle von 30 auf 22, und dabei zeigt sich auf der primären Kette ein sehr ansehnlicher Grad von freier Elektrizität. Noch mehr verringert wird die Schlagweite der Funken, wenn man auch die innere Belegung der anderen Flasche *ableitend* berührt. Dann verschwindet auch die freie Elektrizität auf der primären Kette.

Bei diesem leicht erklärlichen Versuche ist es gleichgültig, an welcher Stelle die Flaschen die Poldrähte berühren.

Ein Anderes ist es, wenn man die *äußeren* Belege der Flaschen mit den Enden der Inductionsrolle und die *inneren* mit den Polspitzen des Mikrometers oder umgekehrt *erstere* mit dem Mikrometer und *letztere* mit der Inductionsrolle verbindet, so daß jeder der Poldrähte durch eine Leidener Flasche unterbrochen ist.

Man erhält dann glänzende Funken, entstehend aus hin-

Auch noch in einem dritten Falle äußerte sich der Einfluß der Drahtlänge in bemerkenswerther Weise.

Ich verband die *äußeren* Belege zweier Flaschen einerseits mit der Inductionsrolle, und andererseits mit dem Mikrometer durch Drähte, von denen die ersteren hier kurzweg *Lader* und die letzteren *Entlader* heißen mögen; und ausserdem verknüpfte ich die *inneren* Belege beider Flaschen mit einander durch einen Draht, den ich *Verbindungsdraht* nennen will.

Einfache Poldrähte von 1 Fuß Länge gaben, wie vorhin erwähnt, Funken von 30" Schlagweite. Gegen diese hatten nun die Funken bei der eben beschriebenen Vorrichtung eine sehr geringe Länge.

Es betrug nämlich, als Lader und Entlader jeder 1 Fuß lang war, die Schlagweite nur 8" und die Funken waren sehr stark, glänzend und reichlich.

Als die Lader 300 Fuß und die Entlader 1 Fuß in Länge maßen, betrug die Schlagweite gar nur 6" und die Funken waren auch noch stark und glänzend, doch in geringerem Grade.

Als endlich die Lader 1 Fuß und die Entlader 300 Fuß lang waren, hatte sich zwar die Schlagweite nicht weiter vermindert, aber die Funken waren schwach.

In diesen Versuchen war der *Verbindungsdraht* immer 1 Fuß lang. Bei dieser Länge gab er schwache Anzeigen von freier Elektrizität, allemal wenn ein Funke zwischen den Polspitzen übersprang. — Diese Elektrizität steigerte sich, als der Draht verlängert wurde, in dem Maasse, daß ich aus dem 300füßigen Draht, trotz seines Seidenüberzuges und Firnisses,  $1\frac{1}{2}$  Lin. lange Funken ziehen konnte. Ich glaube, daß man eher das Gegenteil hätte erwarten können, eine Abnahme der freien Elektrizität mit Verlängerung des Verbindungsdrahtes.

---

Es kann nun wohl die Frage aufgeworfen werden, was die Ursache aller der beschriebenen Erscheinungen sey.

Dafs diese keine Widerstands-Phänomene seyn können ist wohl vorweg klar, denn Drahtlängen von 10, 20 und selbst 300 Fufs sind doch zu unbedeutende Bruchtheile von den 15 und 21 Tausend Fufs Draht der angewandten Inductionsrollen, als dafs sie vermöge ihres Widerstandes die angeführten Erscheinungen hervorzurufen im Stande gewesen wären.

*Zweitens verschwinden alle diese Erscheinungen vollständig, so wie man die Drähte aufrollt, wodurch doch ihr Widerstand nicht geändert wird.*

Hiervon überzeuete ich mich als ich die 20füfsigen Drähte von 0<sup>mm</sup>,25 und 0<sup>mm</sup>,9 Dicke auf Glasröhren wickelte, in solcher Weise, dafs sie nur eine einzige Lage von Windungen bildeten, damit keine Funken zwischen diesen Übersprängen, was auch hierdurch und durch den gut isolirenden Ueberzug der Drähte vollkommen verhütet ward.

Ein so aufgewickelter Draht combinirt mit einem ausgestreckten von geringer Länge, gab keine Spur von Spannungs-Unterschied an den Polen oder von freier Electricität auf der inducirenden Kette und wenn auf jeder Seite

lich zu seyn, die dämpfende Wirkung derselben dieser Induction zuzuschreiben. Als indeß 60 Fuß des 0<sup>mm</sup>,25 dicken Drahts in zwei Lagen auf eine Glasröhre gewickelt wurden, auf solche Weise, daß die Windungen der äußeren Lage denen der inneren entgegenliefen, waren die Wirkungen, welche der Draht im ausgestreckten Zustande gezeigt haben würde, eben so vollständig vernichtet, wie wenn die Windungen gleiche Richtung in beiden Lagen gehabt hätten. Und doch mußte hier die Induction, wenn auch nicht ganz, doch wenigstens größtentheils aufgehoben seyn.

In Zusatz hierzu sey auch bemerkt, daß gleich wie Drahtrollen nicht die Eigenschaften ausgestreckter Drähte besitzen, sie auch nicht die Wirkungen derselben verringern oder aufheben. Ein ausgestreckter langer Draht oder Stanniolstreif mit einer Drahtrolle verbunden, wirkt genau ebenso wie ohne diese Rolle. Es zeigt dies abermals, daß der Widerstand hier ohne alle Bedeutung ist.

Allein den schlagendsten Beweis dafür liefert die merkwürdige Thatsache, *daß es, um die oft erwähnten Erscheinungen hervorzurufen, gar nicht nöthig ist, die langen Drähte oder Stanniolstreifen von dem Inductionsstrom durchlaufen zu lassen, sondern daß es vollkommen hinreicht, sie — natürlich im gut isolirten Zustande — mit einem ihrer Enden irgend wo an die kurzen Poldrähte anzuhängen, während man das andere frei in der Luft auslaufen läßt.*

Oft wiederholte und abgeänderte Versuche überzeugten mich von der Richtigkeit dieses Satzes: selbst in der Stärke der verschiedenen Erscheinungen konnte ich keinen Unterschied bemerken, es mochten die Drähte oder Streifen in den Strom eingeschaltet oder ihm bloß angehängt seyn.

Diese Thatsache, verbunden mit der zuvor angeführten, daß Drahtrollen die Wirkung ausgestreckter Drähte nicht schwächen, liefert ein einfaches Mittel, mit einem einzigen Draht den Einfluß verschiedener Drahtlängen zu untersuchen.

Dazu genügt es, den Draht auf eine isolirende Rolle aufzuwickeln und das freie Ende desselben mit einem der

Poldrähte zu verbinden. Man wickelt dann wiederum so viel von dem Drahte ab, als man gerade untersuchen will.

Auf diese Weise habe ich einen 200 Fufs langen Draht von 10 zu 10 Fufs untersucht, um zu sehen, ob sich bei dieser successiven Verlängerung des Drahts irgend eine Periodicität in der Wirkung zeigen würde. Allein es war nicht der Fall. Die Wirkung nahm fortdauernd, obwohl langsam mit der Verlängerung zu.

Gleichwie die Wirkung langer ausgestreckter Drähte nicht einem Widerstande beigezessen werden kann, eben so wenig läßt sie sich einer theilweisen Ableitung der Elektricität nach dem Erdboden zuschreiben; denn die Drähte und Stanniolstreifen waren aufs beste isolirt.

Wohl aber läßt sich einsehen, warum, wenn die Spannung an einem Pole der Inductionsrolle durch irgend eine Ursache geschwächt worden ist, dadurch freie Elektricität auf der inducirenden Kette zum Vorschein kommen muß. Es wirkt nämlich der Strom der Inductionsrolle, wenn er durch einen geschlossenen mit einem doppelten Magneten auf

Durch alle diese Betrachtungen wird indess die Wirkung der langen ausgestreckten Drähte nicht erklärt. Ich kam daher auf den Gedanken, daß hierbei vielleicht hin- und herlaufende Ströme erzeugt werden möchten.

Ich verband demnach zuvörderst Geißler'sche Röhren und andere evacuirte Glasgefäße mit der Inductionsrolle, in solcher Weise daß ich die Poldrähte entweder beide kurz oder beide lang, oder den einen kurz und den andern lang nahm. Alle diese Veränderungen waren aber gleichgültig. Selbst Stanniolstreifen, die einen so entschiedenen Einfluß auf die Beschaffenheit der Funken ausüben erwiesen sich hier als völlig wirkungslos. Immer waren die Erscheinungen denen gleich, welche einem einfachen, in einer einzigen Richtung gehenden Strome zukommen. Auch war bei ungleicher Länge der Poldrähte nichts von freier Elektricität auf der inducirenden Kette wahrzunehmen.

Es ging hieraus hervor, daß zum Auftreten der oft genannten Erscheinungen nothwendig Funken in freier Luft mit in der Schließung begriffen seyn müssen.

Ich änderte daher die eben beschriebenen Versuche in der Weise ab, daß ich das Funkenmikrometer zunächst mit einer Geißler'schen Röhre verband und darauf dieses System durch Poldrähte mit der Inductionsrolle verknüpfte, so daß der Strom nach einander durch Luft von gewöhnlicher Dichte und durch Luft oder Gas in stark verdünntem Zustand gehen mußte.

Bei Anwendung zweier kurzen Poldrähte oder eines kurzen und eines langen Drahts waren die Erscheinungen durchaus dem vorhergenannten gleich; nur durfte, um dieselben ununterbrochen zu erhalten, den Funken keine zu große Schlagweite gegeben werden.

Als indess zwei lange Drähte oder Stanniolstreifen zur Polverbindung benutzt wurden, einer auf jeder Seite des genannten Systems, entweder eingeschaltet in die Strombahn oder ihr bloß angehängt, trat eine merkwürdige Veränderung ein.

Die Geißler'sche Röhre nämlich, die bis dahin, außer

dem positiven geschichteten Lichte, welches mit weißlicher Farbe den größten Theil ihrer Länge erfüllte, nur ein blaues Licht am negativen Ende gezeigt, ließ jetzt, in Zusatz dazu, am positiven Ende ein schön gelbes Licht sehen, ähnlich in Farbe dem gelben Uranglass. Dasselbe umgab den in dieses Ende hineinreichenden Metalldraht ringum und war gegen den übrigen Theil der Röhre scharf abgeschnitten, erfüllte das Innere der Röhre offenbar nicht, sondern ging sichtlich von dem Glase aus, das glänzend durchsichtig erschien, — kurz es war das anderweitig schon bekannte Fluorescenzlicht<sup>1)</sup>.

Aber von dem blauen Lichte, welches sonst diese Fluorescenz zu erzeugen pflegt, war merkwürdigerweise im Innern des positiven Theils der Röhre nichts zu erblicken. Im Gegensatz dazu entwickelte, eben so merkwürdig, das blaue Licht am negativen Ende so gut wie keine Fluorescenz im Glase, denn nur die äußerste Kuppe der Röhre zeigte daselbst in geringer Ausdehnung einen schwachen gelblichen Schein.

Ohne die Funken in freier Luft erhält man, wie gesagt,



tritt, indem die Schichtung des positiven Lichts und der dunkle Raum zwischen diesem und dem negativen Licht vollständig verschwinden. Die ganze Röhre, von einem bis zum anderen Ende, zeigt sich nun erfüllt von einem homogenen violettlichen Nebellicht, welches zu dem unverändert gebliebenen gelben Fluorescenzlicht am positiven Ende im lebhaftesten Contraste steht.

Dieses schöne Phänomen erfordert eine gewisse, nicht zu große Intensität des Inductionsstroms. Am ausgebildetsten mit vollkommener Ausschließung aller Schichtung, erhielt ich es mittelst des kleineren Inductoriums, wenn es durch den dünneren seiner primären Drähte angeregt wurde.

Dasselbe zeigt sich übrigens mit und ohne Anwendung des Condensators; mit demselben jedoch lichtstärker. Auch wird es etwas modificirt, wenn man im Mikrometer die Funken zwischen einer Spitze und einer Scheibe überschlagen läßt. Bildet die Scheibe den negativen Pol, so ist Alles wie vorhin; bildet sie aber den positiven Pol, so entwickelt das blaue Licht am negativen Ende der Röhre eine stärkere gelbe Fluorescenz als zuvor, und am positiven Ende ist diese Fluorescenz schwächer, jedoch immer ohne Anzeige von blauem Licht.

Eine zweite Geißler'sche Röhre bot unter den obigen Umständen, im Ganzen genommen, dasselbe Schauspiel dar.

Sie unterschied sich von der vorigen nur durch ein Paar Eigenschaften. Fürs Erste zeigte sie nämlich am *negativen* Ende kein *blaues* Licht, sondern statt dessen ein *weißliches*, vermuthlich weil bei ihrer Aufertigung der entsprechende Draht mit einer Spur irgend einer fettigen Substanz beschmutzt worden, da dies nach Hrn. Magnus Beobachtung eine solche Farbenveränderung nach sich zieht. Zweitens rief dies weißliche Licht schon unter gewöhnlichen Umständen, d. h. bei kurzen Poldrähnen und ohne Hülfe von Funken in der Schließung, eine starke gelbe Fluorescenz an derselben Seite hervor.

Bei der Verknüpfung mit langen Poldrähnen und dem Funken-Schalter war dieser negativen Fluorescenz noch die

positive hinzu, so daß dann beide Enden der Röhre mit gelber Farbe erglänzten, während der mittlere Theil von geschichtetem weißlichem Lichte eingenommen ward, welches sich durch angemessene Vergrößerung der Schlagweite in das vorhin erwähnte violettliche Nebellicht auflösen ließe.

Ungeachtet in beiden Röhren die gelbe Fluorescenz am positiven Ende von keinem blauen Licht begleitet war, welches sie hätte hervorrufen können, so nehme ich doch keinen Anstand, aus den angeführten Versuchen den Schluß zu ziehen, daß lange ausgestreckte Drähte, sobald sie zu beiden Seiten der Funkenbahn angebracht sind und die Schlagweite der Funken eine gewisse Größe besitzt, zur Bildung von hin- und herlaufenden oder Doppelströmen Anlaß geben.

Bestärkt in diesem Schluß sehe ich mich durch das Verhalten einer dritten Röhre, die ich vor längerer Zeit von Hrn. Dr. Paalzow erhielt. Diese nur 5 Zoll lange und 4 Lin. dicke Röhre ist offenbar nicht sehr luftleer; denn sie zeigt unter gewöhnlichen Umständen d. h. bei kurzen Poldrähnen nichts von Schichtung sondern statt deren

wo nach eben genannter Anzeige der einfache Strom in einen doppelten übergeht, bläht sich der gelblichweiße Lichtfaden zwischen den Drähten zu einer intensiv violetten Lichtmasse auf, welche diesen mittleren Theil der Röhre seinem ganzen Querschnitt nach erfüllt. Der Contrast mit der anfänglichen Erscheinung, die man durch einen die Polspitzen verbindenden Drahtbügel augenblicklich wieder herstellen kann, ist ein außerordentlicher.

Nach allen diesen Erfahrungen schien es interessant, ja nothwendig zu seyn, das Verhalten unzweifelhafter Doppelströme vergleichend zu untersuchen. Solche Ströme erhält man am leichtesten, wenn man in die Bahn der Inductionsfunken eine Franklin'sche Tafel einschiebt. Als nun dieß Verfahren bei den Geißler'schen Röhren angewandt wurde, fand sich dadurch die gelbe Fluorescenz am positiven Ende derselben verstärkt, zugleich kam aber auch daselbst ganz unverkennbar blaues Licht zum Vorschein, was ohne Franklin'sche Tafel nicht sichtbar war. Aehnlich verhielt es sich mit der dritten Röhre.

Es sind also doch die supponirten Doppelströme etwas verschieden von den ächten, vermuthlich weil bei ersteren die Ströme der einen Richtung denen der anderen nicht ganz gleich sind. Damit stimmt auch überein, daß bei mehreren Versuchen, bei welchen bloß das Funkenmikrometer durch zwei lange Drähte oder Stanniolstreifen mit der Inductionsrolle verbunden war, die Temperatur sich am negativen Pol stets größer als am positiven ergab, was bei hin- und herlaufenden Strömen von gleicher Stärke nicht hätte der Fall seyn können.

Wie dem aber auch seyn mag: die Bildung hin- und herlaufender Ströme unter den obigen Umständen kann wohl keinem Zweifel unterliegen. Allein auf welche Weise sie durch ausgestreckte Drähte und Streifen erzeugt werden, weshalb sie nur unter Mitwirkung von Funken zu Stande kommen, warum diese Drähte und Streifen zu beiden Seiten der Funkenbahn angebracht seyn müssen, — darüber, sowie über manche andere Fragen, wage ich mich für

jetzt noch nicht anzusprechen, um so mehr als sich die übrigen Eigenschaften ausgestreckter Drähte und Streifen keineswegs auf das Daseyn solcher Doppelströme zurückführen lassen.

Bietet sich hier auch mehr als eine Hypothese dar, so halte ich es doch für besser sie zurückzuhalten, als eine Erklärung aufzustellen, welche ich bei weiterer Verfolgung des Gegenstandes, wie ich sie beabsichtige, vielleicht annehmen müßte.

#### IV. *Ueber das lange Spectrum des elektrischen Lichts; von G. G. Stokes.*

(Schluß von S. 48 — In der ersten Hälfte dieser Abhandlung S. 42 und 46 sind die Figuren unrichtig numerirt. Man hat Fig 6 und 7 Taf. II statt Fig. 1 und 2 zu lesen).

Ich habe eine große Anzahl von Mineralen mittelst der

Kohlensaurer Kalk, schwefelsaurer Kalk, Baryt und Strontian, so wie farbloser Flußspath erwiesen sich als transparent (schwefelsaurer Strontian am wenigsten), mindestens in dem oben angegebenen Sinn, bewiesen somit die Transparenz der Kohlen-, Schwefel- und wahrscheinlich Fluorwasserstoff-Säure und auch der Basen Kalk, Baryt und Strontian. Doch dieser Theil des Gegenstandes würde besser bei künstlich bereiteten Salzen verfolgt werden und ist auch schon vom Dr. Miller untersucht worden. In beiden Fällen wurden Resultate von bedeutendem Interesse in Bezug auf Fluorescenz erlangt.

Zur Zeit als ich meinen ersten Aufsatz über die Veränderung der Brechbarkeit des Lichtes schrieb, hatte ich ein Mineral aufgefunden, den gelben Uranit, dessen wesentliche Bestandtheile offenbar mit Fluorescenz begabt sind<sup>1)</sup>. Vor und nach der Zeit habe ich mittelst Sonnenlicht an mehreren andern Mineralen Fluorescenz beobachtet, die aber offenbar unbekannten Unreinigkeit angehörte und deshalb meines Erachtens ein viel geringeres Interesse hatte. Mittelst des Inductionsfunken habe ich nun noch ein fluorescirendes Mineral aufgefunden<sup>2)</sup>.

Als ich das Bild mit Adular auffing und denselben für Strahlen von höchster Brechbarkeit in den Brennpunkt einstellte, sah ich ein Paar blauer Flecke, welche die Bilder der durch Fluorescenz sichtbar gemachten Elektroden spitzen waren. Da die Erscheinung immer dieselbe war auf natürlichen und auf Spaltungsflächen, so auch auf Feldspath von verschiedenen Fundorten, so ist sie unzweifelhaft eine Eigenschaft der kieselsauren Thonerde-Kali, aus welchem das Mineral besteht. Einige Exemplare zeigten allerdings die Erschei-

1) *Philosoph. Transact.* 1852 p. 524 (Ergänzbd. IV, S. 177).

2) Die Methode, nach welcher Hr. E. Becquerel die Fluorescenz von Mineralien untersucht hat, *Annales de chim. et de phys. Ser. III. Vol. XLII, p. 48*) erlaubt nicht das Mineral aus der Entfernung von wenigen Zollen deutlich zu sehen, und doch scheint mir dieses notwendig, damit der Beobachter beurtheilen könne, ob die wahrgenommene Fluorescenz den wesentlichen Bestandtheilen des Krystalls oder einem fremden Körper zugehöre.

nung nicht so stark wie Adular oder Mondstein; allein dies läßt sich leicht durch die grössere Reinheit der letzteren Varietäten erklären. Denn die Fluorescenz erstreckte sich in den Krystall bis zu einer sehr merklichen, obwohl kleinen Tiefe, und dennoch wurden die Strahlen, welche sie hervorbrachten, durch ein Glimmerblatt viel dünner als Papier fortgenommen. Die intensive Opacität des Glimmers rührt ohne Zweifel von Eisenoxyd her, welches dennoch nicht mehr als 5 Pro. des Minerals ausmacht. Ein sehr kleiner Gehalt von Eisenoxyd oder einer anderen Unreinigkeit von ähnlichem Absorptionsvermögen würde also hinreichen, die Menge des ausgesandten fluorescirenden Lichtes bedeutend zu verringern.

In einem coucentrirten Bündel Sonnenlicht, das durch ein geeignetes Absorptionsmittel gegangen war, zeigte der Adular nicht die geringste Anzeige von Fluorescenz, in welcher Hinsicht er vom gemeinen Glase, z. B. Fensterglase, bedeutend abweicht.

Den anderen Fall von Interesse bietet eine besondere Varietät von Flusspath, von *Alston-Moor* in *Cumberland*, dar. Diese Varietät ist sehr blaß im durchgelassenen Licht, ist zum Theil von bräunlicher Purpurfarbe, zeigt eine starke blaue Fluorescenz und ist, dem elektrischen Funken ausgesetzt, ungemein phosphorescirend. Wenn man einen solchen Krystall den zwischen Aluminium-Elektroden überspringenden Funken aussetzt, so zeigt er ausser der gewöhnlichen blauen Fluorescenz eine andere von röthlicher Farbe, die sich nicht ganz so weit in den Krystall erstreckt. Fängt man das Bild des Funkens mit dem Krystall auf und bewegt ihn aus dem Brennpunkt der unsichtbaren Strahlen nach der Linse hin, so kommt er bald in den Brennpunkt der Strahlen, welche die blaue Fluorescenz erzeugen. Er mußte der Linse noch näher gebracht werden, ehe er in den Brennpunkt der Strahlen kam, welche die röthliche Fluorescenz hervorbrachten; er befand sich dann in dem Abstände, bei welchem auf dem Uransalz ein scharfes Bild von den Elektrodenspitzen entstand. Dies

bewcist, daß die röthliche Fluorescenz von den Strahlen erzeugt wird, die zu den äußerst brechbaren, hellen Linien (als Ganzes betrachtet) des Aluminiums gehören.

Der Krystall, welcher diese Erscheinung am besten darbot war äußerlich farblos bis zur Tiefe von etwa  $\frac{1}{10}$  Zoll und diese Schicht zeigte, auf diese Weise untersucht, keine Fluorescenz. Dann kamen eine oder zwei Schichten parallel den Flächen des Würfels, welche die röthliche Fluorescenz zeigten und anscheinend die Strahlen, welche diesen Effect hervorzubringen vermochten, erschöpften. Die blaue Fluorescenz erstreckte sich viel tiefer und zeigte ein geschichtetes Ansehen, wie Sir David Brewster vor langer Zeit beobachtete.

Liefs man ein durch eine Quarzlinse verdichtetes Lichtbündel eine Würfelfläche parallel streifen, so daß es durch die farblose Schicht gehen mußte, so wurde in derselben die röthliche Fluorescenz bemerkt, die sich bis weit von der Fläche des Eintritts der Strahlen erstreckte, zum Beweise der Transparenz des Fluorcalciums für die Strahlen von sehr hoher Brechbarkeit.

Die Eigenschaft, unter den ausschließlichen Einfluß von äußerst brechbaren Strahlen einen sowohl markirten Effect zu geben, macht einen solchen Krystall zu einem nützlichen Instrument für die Untersuchung. Außer dem Aluminium zeigen noch verschiedene andere Metalle die röthliche Fluorescenz; aber keins der von mir untersuchten zeigt sie so gut, theils weil sie offenbar von Aluminium-Elektroden reichlicher hervorgebracht, theils weil sie weniger durch die blaue Fluorescenz verdeckt wird, indem das Aluminium-Spectrum bis auf die Region der äußersten Brechbarkeit etwas lichtschwach ist.

Hält man den Krystall nahe an die Elektroden und beobachtet, während man deren gegenseitigen Abstand verändert, so findet man, daß von der größten Schlagweite ausgehend die röthliche Fluorescenz sich entschieden verbessert. Bei fernerer Verringerung der Schlagweite scheint sie noch mehr zuzunehmen; allein ob dies eine wirkliche

Zunahme ist oder nur ein zunehmendes Ueberwiegen über die blaue, ist auf diese Weise nicht sicher zu ermitteln. Die Reichlichkeit der sehr brechbaren Strahlen nimmt also anfangs zu, und fährt fort *relativ*, wenn nicht *absolut* zu wachsen an. Es ist vorausgesetzt, daß die Leidener Flasche hinreichend groß sey, um zu verhüten, daß die Entladung in das Ausarte, welches weiterhin als Bogen-Entladung beschrieben werden wird.

Hält man den Krystall dicht an den Unterbrecher, wenn die secundären Pole getrennt werden, und vergleicht den Effect mit dem der secundären Entladung (mit Verknüpfung einer Leidener Flasche, wie immer vorausgesetzt), während die Elektroden zum besseren Vergleiche von Platin sind, so ergibt sich, daß die Menge der Strahlen von äußerst hoher Brechbarkeit entschieden größer ist bei dem Funken am Unterbrecher als bei dem der secundären Entladung.

Macht man mittelst der 2,5zölligen Linse ein Bild von Aluminium-Elektroden und stellt einen Krystall wie den



oben Theil, ist für die besagten Strahlen opak <sup>1)</sup>, während der *bräunliche* Theil beinahe transparent ist. Es ist daraus zu schliessen, dass der farblose Theil eine kleine Menge irgend einer Unreinigkeit enthält, welche diese Strahlen zu absorbiren vermag, und welche, wenigstens in demselben Maasse, nicht in dem bräunlichen Theil vorhanden ist, obwohl dieser, wie seine Farbe zeigt, nicht aus ganz reiner Kieselerde besteht. Im Ganzen bin ich geneigt zu glauben, dass der Quarz, wäre er *vollkommen* rein, transparent seyn würde. Wir sehen hieraus jedenfalls, wie schwierig es ist, einen sicheren Schluss hinsichtlich der Transparenz oder Opacität einer Substanz zu ziehen, welche in dem Zustande von Reinheit, in welchem wir sie erhalten können, nur einen geringen Mangel an Transparenz zeigt.

Ich versuchte die Strahlen eines Funkens an einem feinen Münchener Gitter zu reflectiren, allein das Licht war zu schwach, um irgend nutzbar zu seyn. Möglich dass ein grosser und sehr ebener Spiegel mit einem Hohlspiegel statt der Linse Licht gäbe, welches zu beobachten wäre. Allein für jetzt habe ich keine, auf Strahlen von noch höherer Brechbarkeit beziehbare hinreichend markirte Effecte aufgefunden, die des Versuchsens werth gewesen wären.

Derselbe Krystall, welcher die röthliche Fluorescenz zeigte, phosphorescirte ausgezeichnet mit blauer Farbe. Die Phosphorenz war, wie die Fluorescenz, in Schichten parallel den Würfelflächen geordnet, und, ähnlich der röthlichen, aber unähnlich der blauen Fluorescenz, war sie jenseits eines mässigen Abstands von der Eintrittsfläche der erregenden Strahlen nicht wahrnehmbar. Als man mittelst der 2,5 zölligen Linse ein Bild von der Entladung machte, den Krystall in den Brennpunkt der die röthliche Fluorescenz erzeugenden.

1) Ich muss hier erwähnen, dass dieser Theil jene zarten, bestimmt gerichteten, verlängerten und kaum anders als im Sonnenlicht sichtbaren Lamellen oder Krystalle enthält, welche von den practischen Optikern »blue shoots« genannt werden. Die Untersuchung einer Anzahl geschnittener Quarze, die mir Hr. D'Arker liess, bestärkt mich in dem Verdacht, dass solche Krystalle weniger transparent sind für Strahlen von höherer Brechbarkeit als andere farblose Exemplare. — Juli 1882.

Strahlen einstellte, ihn daselbst befestigte, und die Kette; nachdem der Inductionsstrom eine Weile gewirkt hatte, öffnete, wurde in dem Krystall am Brennpunkt der Linse ein Blitz (*dart*) von blauem phosphorescirenden Licht gesehen. Bei Einstellung in den Brennpunkt der Strahlen, welche die blaue Fluorescenz am wirksamsten hervorbrachten, verbreitete sich die röthliche über eine breite Portion der dieselbe erzeugenden Schichten; und als der obige Versuch bei dieser Lage des Krystalls wiederholt ward, wurde die blaue Phosphorescenz ähnlich verbreitet gesehen. Diefs beweist, daß die Strahlen von äußerst hoher Brechbarkeit am wirksamsten sind in Hervorbringung der blauen Phosphorescenz.

[Man kann annehmen, daß die blaue Fluorescenz, die röthliche Fluorescenz und die blaue Phosphorescenz entspringen aus der Wirkung eines Verens von heterogenen erregenden Strahlen auf eine und dieselbe Substanz (die zweifelsohne einige Unreinigkeit bei der Krystallisation aufgenommen) oder auf zwei oder drei verschiedene Substanzen. Die blaue Fluorescenz wird innerhalb des Krystalls

beobachten, wenn man die brechbareren der erregenden Strahlen durch eine geeignete Quarzplatte absorbiert oder auch statt des Aluminiums ein anderes Metall nimmt, welches arm an Strahlen von äußerster Brechbarkeit ist, z. B. Magnesium. Andererseits kann die in den oberen Schichten wirklich vorhandene rothe Fluorescenz, wenn sie von der blauen überwältigt wird, sichtbar gemacht werden, wenn man den Krystall durch eine Lösung von chromsaurem Kali betrachtet, welche die blaue Fluorescenz sehr schwächt, während sie genug von dem Spectrum durchlässt, um den nicht absorbierten Rückstand durch seine (grüne) Farbe von der rothen Fluorescenz unterscheiden zu lassen. Auf diese Weise kann die rothe Fluorescenz selbst bei Magnesium-Elektroden leicht wahrgenommen werden. Eine besondere Schicht, die eine blaue Fluorescenz zeigte, wenn Strahlen, die durch eine Würfelfläche eintraten und, bevor sie dieselbe erreichten, einige andere Fluorescenz zeigende Schichten zu durchdringen hatten, auf sie wirkten, liefs eine rothe Fluorescenz sehen, wenn Strahlen auf sie einwirkten, welche direct auf sie einfielen und zwar durch eine Octaëderfläche eingelassen.

Es hält schwer zu entscheiden, ob die Schichten, welche respective die rothe Fluorescenz und die blaue Phosphorescenz zeigen, identisch sind oder nicht, weil die beiden Effecte auf verschiedene Weise erhalten werden; allein so weit ich beurtheilen kann, scheinen die Schichten verschieden (*to correspond*).

Im Ganzen bin ich geneigt es für wahrscheinlich zu halten, dafs es eine und dieselbe Substanz sey, welche vermöge der Wirkung von Strahlen, die mit einem Theil des Violetts beginnen und von dort sich vorwärts erstrecken, eine blaue Fluorescenz zeigt, vermöge der Wirkung von äußerst brechbaren Strahlen eine rothe Fluorescenz, und vermöge der Wirkung von Strahlen ähnlicher Brechbarkeit eine kräftige blaue Phosphorescenz. Wenn die Substanzen verschieden sind, würden sie wenigstens in der Lösung coexistirt haben und bei der Krystallisation

...anmuthig kurzem S  
Juli 1862].

Ich habe gesagt, daß die Ph  
Schichten innerhalb des Krystalls  
Schichten sind an einigen Stellen  
sie in wohl bestimmten Linien abh  
ten der Phosphorescenz war nichts  
die Schichten blieben scharf begrän  
stark genug war, um darüber urtheilen  
im Widerspruch mit einem Paar Resu  
her auf die Autorität von Anderen  
zwischen Phosphorescenz und Fluores  
ich kurz darauf die Sache mit Hrn. I  
konnte ich keines dieser Resultate e  
ben, das auf scheinbare Leitung be  
HH. Biot und A. C. Becquerel  
von Hrn. E. Becquerel für eine  
Das andere, daß durch Strahlen, di  
trirte Lösung von saurem chromsaure  
eine Phosphorescenz in Canton's Pl  
werde, vermag ich, nach ein  
ner noch

Elektroden zu versuchen, und demgemäss verschaffte ich mir Elektroden von den gewöhnlichen Metallen in Gestalt kleiner Uhrgläser von etwa 1 Zoll im Durchmesser. Diese ergaben bei einigen Metallen eine sehr entschiedene Ueberlegenheit über dünne Drähte, indem sie die unsichtbaren Metall-Linien in weit gröfserer Stärke zeigten, während bei anderen Metallen kein grofser Unterschied vorhanden war. Beim Kupfer z. B. war die Ueberlegenheit sehr grofs, beim Eisen dagegen verhältnismäfsig klein.

Statt Elektroden von dieser Gestalt reicht es hin zwei dicke Stücke Folie zu nehmen, sie mittelst einer Walze oder eines Bleistifts etwas aufzurollen und mit ihren Convexitäten einander gegenüberzustellen, die Axen der Cylinder gekreuzt.

Aufser Kupfer, zeigen Silber, Zinn und Aluminium einen grofsen, und Blei einen mäfsigen Vorzug als flache Elektroden, während beim Zink, wie beim Eisen, scharfe Elektroden eben so gut sind. Messing kommt in dieser Beziehung mit Zink überein, nicht mit Kupfer, obwohl es die Kupfer-Linien sehr stark zeigt.

Bei solchen Elektroden tauzt indess der Funke umher, und diese Unstätigkeit ist für einige Versuche hinderlich. Ein guter Theil des Vorzugs der flachen Elektroden wird jedoch bewahrt, wenn man blofs eine, besonders die negative flach nimmt; der Funke ist dann stäter. Statt das Ende eines Drahts mit einer flachen Elektrode zu combiniren, ist es, wie mir Dr. Miller gerathen, besser, den Draht in einer durch das Prisma gehenden Vertical-Ebene sanft zu krümmen; auch kann der Rand eines flachen Metallstücks ebenso angewandt werden.

Macht man von dem zwischen einer scharfen und einer flachen Kupfer-Elektrode erscheinenden Funken ein Bild und fängt es mit einem fluorescirenden Schirm auf, so giebt die flache Elektrode, sie mag die positive oder die negative seyn, das hellere der beiden schon erwähnten Bilder.

Als man ebenso ein Bild von dem zwischen zwei breiten Elektroden erscheinenden Funken machte, und in den

Brennpunkt der Strahlen von höchster Brechbarkeit einstellte, bestand das Bild nicht wie gewöhnlich aus zwei gesonderten Flecken; ob dem aber so war, weil diese wegen der Kürze der Funken in einen einzigen Fleck zusammenfloßen oder weil die den Metall-Linien von hoher Brechbarkeit angehörigen Strahlen in der ganzen Länge des Funkens entwickelt wurden, weiß ich nicht ganz sicher; ich neige indess zur letzteren Meinung, da eine Trennung der Entladung in zwei Portionen, entsprechend der unmittelbaren Nähe respective der beiden Elektroden, schwerlich der Beobachtung entgangen wäre, wenn sie existirt hätte.

Bogen-Entladung und Linien vom blauen negativen Licht.

Bei Verringerung des Abstandes zwischen den Elektroden, vorausgesetzt, sie bestehen aus Kupferdrähten, nimmt die Helligkeit der Metall-Linien anfangs zu, und verändert sich später wenig, oder nimmt vielleicht etwas ab. Verringert man diesen Abstand noch weiter, so daß die Elektroden fast einander berühren, und die Entladung mit schwachem Geräusch übergeht, so erscheint eine neue Reihe star-

weit vom sichtbaren Spectrum liegen. Auf diese folgt, nach einem fast dunklen Raum, Licht in Massen, ähnlich im allgemeinen Ansehen den Gruppen der Kupferlinien (doch verschieden von ihnen), indess nicht so stark, um aufgelöst oder genau gemessen werden zu können. Die Figur zeigt auch ein Paar blauer Streifen ( $b$ ,  $b'$ ) gesehen in Projection. Diese werden bei directer Betrachtung des blauen Lichtes durch ein Flintglas-Prisma von  $60^\circ$  nicht gesehen, weil man Alles in zu grossem Detail erblickt. Die meisten Luftlinien in dem unsichtbaren Spectrum, besonders die Streifen jenseits der Linie 4, haben ein schlecht begränztes Ansehen und würden sich wahrscheinlich auflösen lassen, wenn die Intensität des Lichtes gestattete.

Die eben beschriebene Erscheinung ist unabhängig von der Natur der Elektroden und muß daher der Luft, nicht dem Metall, zugeschrieben werden. Betrachtet man den diese Erscheinung hervorbringenden Lichtstern in einem rotirenden Spiegel, so findet man, daß er eine beträchtliche Dauer besitzt.

Als man die Elektroden etwas auseinander schob, mittelst der 2,5zölligen Linse ein Bild von der Entladung machte und dasselbe mit einem Kuchen von Uransalz aufging, war eine sehr starke Fluorescenz sichtbar über dem Bilde der blauen Scheibe, sobald die Linse auf einen Punkt etwas jenseits des sichtbaren Spectrums eingestellt war. Schob man die Linse vorwärts, so breitete sich die Fluorescenz, welche von den diesem Bilde angehörigen Strahlen hervorgebracht ward, zu einem Ringe aus; und schob man sie noch weiter, so entstand ein leidlich gut begränztes Bild von der ganzen Entladung. Von diesem war der Theil, welcher zu der blauen Scheibe gehörte, am hellsten, und concentrisch umgeben von dem zuvor erwähnten Ring, der nun noch mehr erweitert war. Das Bild der übrigen Entladung war dort am hellsten, wo es am meisten an der positiven Elektrode zusammengezogen war. Im Ganzen war die Entladung vielleicht von etwas höherer Brechbarkeit als die blaue Scheibe, selbst wenn man von letzterer

die zum Ringe gehörigen Strahlen ausschloß. Es scheint sonach, daß die abgebildeten vier hellen Linien hauptsächlich von dem blauen Licht erzeugt wurden.

Die Uebergangsweise der Entladung läßt sich am besten studiren, wenn man die Elektroden in die größte Schlagweite stellt, und sie dann allmählich einander nähert. Zuerst geht dann ein glänzend heller Funke über, der ein scharfes Geräusch macht, und sich nicht im rotirenden Spiegel auflösen läßt. Das unsichtbare Spectrum, welches dieser zeigt, ist zu schwach für genaue Beobachtung; das sichtbare Spectrum zeigt hauptsächlich Luftlinien. So wie man die Elektroden einander nähert, wird der Funke überzogen mit der bekannten gelblichen Hülle, die sich fortblasen läßt, und das blaue Licht beginnt zu erscheinen. Ein rotirender Spiegel zeigt, wie schon Hr. Lissajous beobachtet hat <sup>1)</sup>, beim Beginn der Hülle einen instantanen Funken und blaues negatives Licht, welche beide ausgezogen werden, also eine sehr wahrnehmbare Dauer haben. Bringt man die Elektroden noch etwas näher zusammen, so nimmt der Funke ab, und die Hülle bildet sich vollkommen aus.



gang einer continuirlichen Entladung, welche, zum Theil wenigstens von der inducirenden Wirkung des noch sinkenden Magnetismus herrührt, gerade wie ein Volta'scher Bogen bei einer kräftigen Batterie entsteht, wenn man zwischen den wenig getrennten Elektroden einen elektrischen Funken überschlagen läßt; und das Glimmen (*glowing*) der Luft unter der Wirkung dieser Entladung erzeugt die gelbliche Hülle und das blaue Licht. Wenn daher die Elektroden beinahe den größten Abstand von einander haben, bei welchem diese Art Entladung stattfindet, sieht man das blaue Licht in einem rotirenden (*moving*) Spiegel ziemlich scharf begränzt. Wäre es ein absterbendes Glimmen (*dying glow*), so müßte es sanft verlaufen (*fade away*); wenn es aber unter einer Entladung erzeugt wird, muß es fast plötzlich aufhören, insofern bei diesem Abstand der Elektroden eine continuirliche Entladung nicht überzugehen vermag, sobald die Spannung viel unter die herabgesunken ist, bei welcher sie zuerst erzeugt ward.

Derselbe Schluß läßt sich aus einer Erscheinung ziehen, die ich einmal erhielt, bei welcher aber die genauen Bedingungen der Erzeugung nicht leicht zu errathen sind. Mit einer Leidener Flasche in Verbindung, erschien jede Entladung, herrührend von einer einzigen Unterbrechung des Contacts, in einem rotirenden (*moving*) Spiegel als ein heller Funke, vereint mit einem weniger hellen Funken durch das blaue negative Licht und auch durch das gelbliche und röthliche Licht, welches dicht an der positiven Elektrode am hellsten war. Wenn das blaue Licht von einem Glimmen (*glow*) herrührte, so müßte es durch den zweiten Funken verstärkt, statt ausgelöscht (*put out*) werden, wogegen die Erklärung des Resultats in der Annahme einer continuirlichen Entladung leicht ist. Der erste Funke rief eine continuirliche Entladung hervor, welche die Flasche weniger schnell leerte als sie von der Inductionsrolle gefüllt ward, so daß nun eine andere Entladung stattfand, welche die Flasche so leerte, daß keine continuirliche Entladung mehr übergehen konnte.

Betrachtet man die breite Entladung, welche ohne Flasche bei mäßigem Abstände der Elektroden von einander erhalten wird, durch eine rotirende Scheibe von schwarzem Papier mit einem einzigen Loch nahe am Umfange, während die Hülle seitwärts geblasen wird, so erhält man eine Folge von momentanen Ansichten von der Entladung, und erblickt die Hülle *übermächtig gebogen*, wie ein biegsamer Leiter, nicht *durchgerissen*, wie etwa eine Säule, welche durch einen vorangegangenen Funken erhitzt ward. Der centrale Funke fehlt natürlich, da er nahezu instantan ist.

Ich habe gesagt, der Bogen und besonders das blaue Licht zeige Luftlinien. Der Bogen indess ist einer Färbung ausgesetzt, nicht nur durch einen zufälligen Staub (wie wenn er durch die von Natrium gelbgefärbte Flamme einer Weingeistlampe mit gesalzenem Docht gegangen), sondern auch durch von der positiven Elektrode abgerissene Materie. Diefs sieht man gut bei Aluminium-Elektroden wo der Bogen oder ein Stück desselben grün gefärbt ist. Diefs grüne Licht hat eine sehr merkliche Dauer und eine bestimmte prismatische Zusammensetzung; es ist der positiven Elektrode zuwärts heller als nach der negativen hin, ist aber nicht auf die unmittelbare Nachbarschaft jener Elektrode beschränkt (dehnt sich vielmehr zuweilen über fast die ganze Länge des Bogens aus) in welcher Beziehung und in seiner Dauer es abweicht von dem Licht des eigentlichen Funkens <sup>1</sup>). Mit Aluminium und einem anderen Metall gegenüber, z. B. Kupfer und Eisen, wird das grüne Licht nur gesehen, wenn das Aluminium positiv ist. Selbst beim Aluminium kann man dieses Licht fortschaffen, wenn man die Elektroden einander nähert; und es ist der Bogen in seinem somit als normal zu haltenden Zustand, bei welchem die letzte Linie der Fig. 6 Taf. II beobachtet wurde, obwohl ich bisjetzt in dem unsichtbaren Spectrum keine

1) Der *äußere* Theil des Flaschen-Funkens zwischen Aluminium-Elektroden hat dieselbe grüne Farbe und prismatische Zusammensetzung, obwohl in diesem Fall das grüne Licht beinahe instantan ist. — Juli 1862

dem sichtbaren der Bogen-Entladung entsprechende Veränderungen bemerkt habe.

Von der Ursache des Vorzugs breiter Elektroden und von der Erhitzung der negativen Elektrode.

Obwohl der Funke bei Betrachtung in einem rotirenden Spiegel als instantan erscheint, so muß er doch eine gewisse Zeit einnehmen; so daß wir in der That einen kurzen elektrischen Strom haben, auf welchen das Ohm'sche Gesetz anwendbar ist. Die elektromotorische Kraft ist hier der Unterschied der Spannungen auf den Belegen der Leydener Flasche. Was den Widerstand betrifft, so kann man den kurzen metallischen Theil der Kette vernachlässigen, und braucht nur den Ort der Entladung zu beachten. Der Widerstand hier kann zerfällt werden in dem von der Luft herrührenden, und in dem, welcher von Theilen der Elektroden dicht an den Entladungspunkten herrührt. Daß der letztere keineswegs unbedeutend sey, kann geschlossen werden aus der ungeheuren Temperatur, zu welcher kleine Theile der Elektroden erhoben werden, wie angedeutet wird durch die ungemein hohe Brechbarkeit der Strahlen, die von den Metallen unzweifelhaft im Dampfzustand ausgesandt werden. Durch Anwendung flacher Elektroden wird die Schlagweite wesentlich verringert, ohne irgend eine Aenderung in dem Spannungs-Unterschied der Belege der Flasche. Mithin geht die Elektricität, welche sie enthält, mit größerer Schnelligkeit über und bewirkt daher einen kräftigeren Effect auf die Metalle.

Die nachtheilige Wirkung der Einschaltung eines kleinen Widerstandes zeigte sich auffallend bei breiten, etwas gekrümmten Kupfer-Elektroden von 3 Zoll im Durchmesser, als man Drähte von einer Belegung der Flasche in einen Becher mit Wasser und von da zur entsprechenden Elektrode führte. Der Funke wurde dadurch ganz unbedeutend im Vergleich zu dem, was er früher war.

Mit einer spitzen und einer flachen Elektrode, nahe zusammengestellt, gingen bei metallischer Verknüpfung helle

Zunehmung dieser, auf 1  
für die Bogen-Entladung  
die Vermehrung des Wi  
die Inductionsrolle einsch

Die Thatsache, dass da  
Bildung der Bogen-Entladu  
tet auf die Luft als den  
dieselbst stattfindet; und d  
Strahlen, so wie die sehr  
ben, zeigen, wie intensiv d  
der negativen Elektrode s  
seyn, nicht herrührend vo  
Elektricität durch dieselbe  
sie durchläuft, ist keineswäg  
der sie umhülleuden Luftsch  
dieser Schicht im Vergleich  
der Elektrode klein ist, so  
heuer groß. Wenn so z. ]  
ten her eine negative Elekt  
ser enthält, beinahe berührt,  
Wasser zur Rothgluth, ohn  
Flamm . .

nach so verschieden verhält von jedem arbiträren Querschnitt der Säule, längs welcher die Entladung stattfindet, und einen größeren Widerstand darbietend, der Sitz einer intensiveren Aussendung von sehr brechbaren Strahlen wird. In der positiven Elektrode, wo, aus irgend welcher Ursache, der Ausgang der Elektrizität fast auf einen Punkt beschränkt ist, findet nichts der Art statt; allein wegen der Contraction des Querschnitts, durch welchen die Elektrizität in die Elektrode überzugehen hat, ist die Wirkung auf letztere so groß, daß Theilchen derselben in dem Lichtbogen zu erscheinen vermögen.

Diese Ansichten führen zu interessanten Speculationen hinsichtlich des negativen Lichts in stark evacuirten Röhren und hinsichtlich der merkwürdigen Umkehrung des Wärme-Effects, welchen Hr. Gassiot beobachtete, je nachdem die Entladung intermittirend oder continuirlich war<sup>1)</sup>; allein ich unterlasse weiter zu speculiren.

*N. Neue Bestimmung der Länge der Lichtwellen,  
nebst einer Methode, auf optischem Wege die fort-  
schreitende Bewegung des Sonnensystems zu  
bestimmen;*

von A. J. Ångström.

(Aus d. *Oefversigt af K. Vet. Akad. Förh.* 1863 No. 2;  
vom Hrn. Verf. mitgetheilt).

I.

In der Notiz über die Fraunhofer'schen Linien, welche ich die Ehre hatte der K. Akademie im October 1861 zu übergeben<sup>2)</sup>, sprach ich von meinem Plan, die Fraunhofer-

<sup>1)</sup> *Proceedings of the Roy. Soc. Vol. XI p. 329* (Annalen Bd. 119, S. 131).

<sup>2)</sup> Ann. Bd. 117, S. 290.

schen Bestimmungen der Wellenlängen des Lichts einer Revision zu unterwerfen und diese Bestimmungen auf alle merkwürdigeren Linien des Sonnenspectrums auszudehnen, um sodann mit deren Hülfe die Wellenlängen für die Metallspectra zu erhalten.

Die Witterung des letzt verflossenen Sommers war im Allgemeinen für solche Untersuchungen des Sonnenspectrums wenig günstig; auch sind dieselben keineswegs abgeschlossen. Da indess meine Messungen der Fraunhofer'schen Hauptlinien hinlänglich zahlreich und unter sich übereinstimmend sind, um die von mir erhaltenen Resultate vor einer wesentlichen Veränderung sicher zu stellen, so habe ich es für interessant gehalten zu sehen, ob und wie weit diese neuen Bestimmungen mit den von Fraunhofer selbst bewerkstelligten übereinstimmen würden, um so mehr, als seit der Zeit, da Fraunhofer seine bewundernswerthen Untersuchungen machte, meines Wissens keine neue Messungen über die Wellenlängen des Lichtes angestellt sind.

Bei den Untersuchungen bediente ich mich eines optischen

Mechanicus Baumann in Berlin verfertigten Etalon, der eine Copie von demjenigen Etalon war, welchen derselbe Künstler für Bessel gemacht hatte.

Als Beweis von der Vortrefflichkeit des Glasgitters mag angeführt seyn, daß man damit die Fraunhofer'schen Linien noch im 3. und 4. Spectrum sehen kann, und daß diese Linien an Deutlichkeit und Detail-Reichthum diejenigen weit übertreffen, welche man durch Brechung des Lichts in einem Flintglas-Prisma erhält.

Bei den Beobachtungen wurde das Gitter immer winkelrecht gegen die einfallenden Strahlen gestellt. Diefes geschah dadurch, 1) daß man der ungeritzten Seite des Gitters immer eine solche Stellung gab, daß das von derselben reflectirte Bild der Heliostat-Oeffnung zusammenfiel mit dieser Oeffnung, 2) daß das bei den Beobachtungen bewegliche Fernrohr auf die Heliostat-Oeffnung eingestellt wurde, und 3) daß man die Axe des Sehzeichen-Fernrohrs, in eine Lage brachte und darin befestigte, die zusammenfiel mit der Verlängerung der optischen Axe des anderen Fernrohrs.

Die geritzte Seite des Glasgitters war immer vom einfallenden Licht ab, gegen das bewegliche Fernrohr gerichtet und mitten über die Rotationsaxe des Instrumentes gestellt.

Die Beobachtungen wurden berechnet nach der bekannten Formel

$$e \sin \theta = m \lambda$$

worin  $e$  oder der Abstand zwischen zwei Gitterstrichen nach dem Vorhergehenden ist

$$e = 0,000166954 \text{ Pariser Zoll.}$$

$\lambda$  bedeutet die gesuchte Wellenlänge,  $\theta$  den beobachteten Winkel und  $m$  die Ordnungszahl des Spectrums.

Da die erhaltenen Werthe von  $\lambda$  sich auf Luft beziehen, so müssen sie abhängig seyn von deren Temperatur und Barometerhöhe; ich habe deshalb immer diese beiden Elemente aufgezeichnet, obwohl unter den gewöhnlichen Verhältnissen ihr Einfluß auf die Messungen sich als un-

15° C. und den mittlere  
men werden können, ent  
leicht, wenn man die Grö  
Angenommen der Bre

$n:$

und  $\frac{n-1}{d}$  eine constante  
rator und Druck, so erhal  
von  $e$  als gültig für 15° C  
berichtigten Werth von  $k$

$$\log \lambda = \log \frac{e \sin \theta}{n} + 0,36$$

woraus die Correction für

$$\log \lambda = + 0,45 (t^{\circ} -$$

ausgedrückt in Einheiten d

Hiernach wird eine Teil  
den eine Veränderung von  
hervorbringen, wenn nämli  
ein Fehler vergleichbar m  
Für kleinere Werthe von  
noch kleiner.



Tafel I. Wellenlängen des Lichts in  $\tau, \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau$  Pariser Zoll.

B	C	Spectrum	D	Spectrum	E	Spectrum	b	Spectrum	F	Spectrum	G	Spectrum	H	Spectrum	H <sub>1</sub>	Spectrum
2539,91	2426,50	1	2178,50	3	1948,25	1	1916,51	1	1797,38	1	1592,32	2	1467,19	1	1454,88	4
,54	,26	2	,53	3	,21	3	,64	3	,37	3	,53	1	,58	4	3,39	3
,76	,23	3	,62	2	,24	2	,46	2	,21	3	,22	2	,32	3	3,74	2
	,33	3	,64	1	,20	1	,53	4	,27	2	,16	2	6,66	2	3,89	1
	,25	1	,57	4	,25	3	,56	1	,05	1	,50	2	7,12	1		
	,27	2	,61	4	,24	3	,49	4	,20	3	,32	2	7,34	4		
			,56	2	,23	3	,43	4	,11	2			6,98	3		
			,48	4	,32	4	,47	4	,55	4						
2539,73	2426,29		2178,50		1948,24		1916,50		1797,27		1592,34		1467,18		1453,96	

Der Unterschied in den Wellenlängen für die beiden D-Linien ist aus den Messungen im 3. und 4. Spectrum = 2,226 zwischen den beiden E-Linien bloß = 0,395 aus dem 3. Spectrum.

Von Fraunhofer hat man zwei verschiedene Reihen von Werthen der Lichtwellen des Lichts. Die erste Reihe wurde durch Messungen an Drahtgittern erhalten und ist von Cauchy den Berechnungen in seinem *Mémoire sur la dispersion* zum Grunde gelegt. Sie enthält folgende Zahlenwerthe ( $\beta$ )

B	C	D	E	F	G	H
2541	2425	2175	1943	1789	1585	1451.

Vergleicht man diese Werthe mit den entsprechenden der vorhergehenden Tafel, welche ich die Reihe ( $\alpha$ ) nennen will, so erhält man die Unterschiede ( $\alpha - \beta$ ):

— 1,3   + 1,3   + 3,6   + 5,2   + 8,3   + 7,4   + 16,2

Die Unterschiede wachsen, wie man sieht, gegen das violette Ende des Spectrums hin und werden dort recht beträchtlich. Diefs erklärt sich aus der Schwierigkeit, bei Anwendung so grober Gitter, wie Fraunhofer sich deren bediente, die dunklen Linien im violetten Ende des Spectrums mit Genauigkeit zu unterscheiden.

Das vorzüglichste von allen Gittern, die Fraunhofer benutzte ist ohne Zweifel dasjenige, welches er mit No 4

von Fraunhofer selbst, rücksichtlich ihrer Genauigkeit, der älteren vorgezogen worden zu seyn.

Sie enthält folgende Werthe ( $\gamma$ ):

<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>
—	2422	2175	1945	1794	1587	1464

und giebt, verglichen mit der Reihe ( $\alpha$ ) die Unterschiede ( $\alpha - \gamma$ ):

$$+ 4,3 \quad + 3,6 \quad + 3,2 \quad + 3,3 \quad + 5,4 \quad + 3,1.$$

Die in der Reihe ( $\gamma$ ) enthaltenen Werthe der Wellenlängen beruhen auf Messungen des ersten Interferenzspectrums eines *Glasgitters*, welches nicht unbedeutend feiner als das von mir angewandte war.

Nach Fraunhofer's Angabe war nämlich:

$$e = 0,0001223 \text{ Par. Zoll.}$$

Da indess die Anzahl der Striche in diesem Fraunhofer'schen Gitter nur 3601 betrug, so reducirt sich die Breite auf

$$5,2833 \text{ par. Lin.}$$

und es mußte folglich nicht unbedeutend lichtschwächer als das Nobert'sche seyn. Auch in anderer Hinsicht scheint mir das Fraunhofer'sche Gitter, obwohl vortrefflich, dem Nobert'schen unterlegen zu seyn. Die Linie *B* konnte nämlich nicht einmal im ersten Spectrum gemessen werden; die Linien *C* bis *G* zeigten sich zwar in dem zweiten Spectrum, aber in keinem der folgenden.

Da indess die Unterschiede ( $\alpha - \gamma$ ) fast alle dieselbe Gröfse haben, so scheint dies einen constanten Fehler anzudeuten entweder in meinen Messungen oder in den Fraunhofer'schen. Dafs ein so beschaffener Fehler den Werth von  $\Theta$  in *meinen Messungen* nicht afficirt haben kann, ist daraus deutlich, dafs der Werth dieses Winkels aus vier verschiedenen Spectren übereinstimmend erhalten wurde. Eben so wenig hat sich ein solcher Fehler in die Fraunhofer'schen Messungen eingeschlichen, wie daraus erhellt, dafs man, wenn man die Wellenlängen der Linien *C* bis *G* berechnet, welche Fraunhofer auch im zweiten Interfe-

daß die Anzahl der Li  
richtig angegeben, ode  
messen wurde. Wollte  
lenlänge für die Linie  $\lambda$   
Veränderung des Werth  
gen, so müßte man die  
*verringern* um

0,0123 par. Li  
oder auch die Anzahl der  
mehren.

Derselbe Zweck wird  
Fraunhofer'schen Gitters u  
0,0006

oder durch *Verminderung*

Daß die Breite des Ne  
schon in der zweiten Decim  
scheinlich; wahrscheinlicher  
großer Fehler bei Abmess  
schen Gitters begangen wo  
kroskop vor 40 Jahren ne  
die es gegenwärtig hat

von  $e$  beim Fraunhofer'schen Glasgitter beruhen. Die angeführte Fraunhofer'sche Abhandlung enthält nämlich Messungen an einem anderen Glasgitter, wo  $e$  bedeutend grösser war, nämlich

0,0005919 par. Zoll.

Diese Messungen hat Fraunhofer nicht benutzt, vermuthlich, weil dieß Gitter sich weit weniger vollkommen erwies, da die Spectra auf der einen Seite der Axe doppelt so intensiv waren als auf der andern. Berechnet man indess diese Messungen, so erhält man für die Linien  $D$  bis  $G$

$D$	Spectr.	$E$	Spectr.
2177,25	(5)	1947,21	(5)
7,48	(4)	7,18	(4)
7,64	(3)	7,23	(3)
6,80	(2)	6,63	(2)
7,55	(1)	7,25	(1)
<hr/> 2177,34		<hr/> 1947,10	
$F$	Spectr.	$G$	Spectr.
1796,10	(4)		
6,09	(3)	1590,90	(3)
5,99	(2)	1,07	(2)
6,39	(1)	0,16	(1)
<hr/> 1796,14		<hr/> 1590,71	

Auch diese Werthe deuten auf einen constanten Unterschied mit der Reihe ( $\alpha$ ), aber die Unterschiede betragen hier bloß

1,25      1,14      1,13      1,63

oder ungefähr ein Drittel der früheren.

Da nun dieses letzte Gitter beinahe 5 Mal grösser war als das frühere, und wahrscheinlich auch breiter, so mußte es leichter seyn, für dasselbe den Werth von  $e$  mit Genauigkeit zu bestimmen; das Daseyn eines Fehlers im Werthe von  $e$  für das feinere Gitter gewinnt dadurch an Wahrscheinlichkeit.

Die mittelst des Nobert'schen Gitters erhaltenen Werthe

Hauptlinien beschränkt. Ich  
 stärkeren Linien von 10' bis  
 mit dem Zirkel gemessen und  
 der übrigen Linien mit dem  
 Die Messungen wurden überdie  
 wiederholt, um ihre Genauigkei

Die folgende Tabelle enthä  
 Bloß für die stärksten und he  
 Sonnenspectrum sind die Welle  
 meisten dieser Linien gehören der  
 an, und haben folglich ein doppe  
 in den Gasspectren der Stoffe v  
 ser ein anschauliches Bild von d  
 dieser Linien im Sonnenspectrum  
 Zeichnung beigelegt (Taf. II Fig.  
 seitige Lage richtig angiebt, wie s  
 felkohlenstoffprisma von 60" dar  
 Bogen nehmen in der Zeichnung

Tafel II. Wellenlängen in  $\text{1000000}^{\text{te}} \text{ Theile}$   
 der stärkeren

1	2076,4	Eisen angehörig
2	71,3	Zwei Gruppen von Linien, dem Eisen angehörig
3	69,7	
4	68,3	
5	65,4	
6	60,1	Eisen angehörig
7	16,9	" "
8	13,6	" "
	13,1	" "
9	07,3	" "
10	05,3	" "
11	1988,4	" "
	97,9	" "
12	66,8	" " Linie stark
	85,3	" "
	84,2	" " schwach
	83,5	" "
13	1974,2	Eisen angehörig; Linie doppelt, wie E
14	69,6	Eisen angehörig
15	68,1	" "
16	65,3	" "
17	53,2	" "
E	1948,44	Eisen und Calcium angehörig.
	48,04	
	46,8	Eisen und Calcium; Linie doppelt, wie E
	34,6	Eisen angehörig
	36,4	" "
	19,6	Eisen angehörig; Linie doppelt wie E
b	1916,50	Magnesium angehörig
b,	12,39	" "
b,,	1911,10	Eisen und Magnesium angehörig
	10,49	Eisen angehörig
	03,4	" "
c	1832,70	" "
	19,1	Eisen angehörig. Bei schwachem Glühen zeigte
	18,4	sich im Eisenspectrum bloß die eine dieser Li-
		nien; bei starkem Glühen erschien dagegen noch
		eine dritte
	08,3	Eisen angehörig. Doppelt
	01,1	" "
F	1797,27	Wasserstoff angehörig
f	1632,2	Eisen angehörig
	28,5	" "
	20,4	" "
	04,3	Wasserstoff angehörig
	1598,6	Eisen angehörig
G	1592,34	" "
	79,1	" "
	74,7	" "
	71,2	" "
g	62,4	Calcium angehörig; Linie doppelt
	32,0	Eisen angehörig; Linie doppelt, überdies mehrere
		schwache Linien zwischen g und h

... einem in der K. Gesellschaft  
zu Upsala vor mehr als zwei Jahren  
tenen Vortrag entwickelte ich eine M  
des Sonnensystems durch Beobachtun  
fen eines Glasgitters zu bestimmen.  
wenn man annimmt, die ungebeugt  
des Gitters gehenden Strahlen pflan  
von der Bewegung des Instrumentes  
von den Interferenzstreifen zu beide  
deshalb auch, wenn mittelst des Fernroh  
wie gewöhnlich eine Aberration entste  
tional dem Verhältniß zwischen der R  
rohrs winkelrecht gegen dessen Axe und  
des Lichts in der Richtung der Axe.

Wenn folglich die Geschwindigkeit  
Richtung des einfallenden Lichts  $= h$  ist,  
des Lichts dabei zur Einheit genommen,  
Winkel  $\theta$ , unter welchem man z. B. d  
Interferenzspectrum beobachtet, die  $C$   
Fernrohrs winkelrecht gegen diese Rich  
 $h \sin \theta$



$$\Delta \cdot 2 \Theta = (h - h') \sin \Theta.$$

Nimmt man  $h = -h' =$  der Geschwindigkeit der Erde in ihrer Bahn, so wird

$$\Delta \cdot 2 \Theta = 81'',6 \sin \Theta$$

und da überdies für die Doppellinie  $D$  im vierten Spectrum der Werth von  $2 \Theta$  ist:

$$= 62^\circ 55' 41'',2,$$

so erhält man

$$\Delta \cdot 2 \Theta = 42'',6$$

eine Gröfse, die mit Leichtigkeit beobachtet werden kann.

Die Fragen, welche die Beobachtungen zu beantworten haben, sind hier zwei. Die eine betrifft die Wirklichkeit des Phänomens und läfst sich am leichtesten beantworten durch Anwendung der Methode auf die bekannte Umlaufbewegung der Erde; die andere dagegen beabsichtigt, dafs, nachdem die Richtigkeit der Methode erwiesen worden, mit Hülfe ihrer, die Gröfse der fortschreitenden Bewegung des Sonnensystems bestimmt werde.


In keiner Hinsicht können die bisher angestellten Beobachtungen als ganz entscheidend betrachtet werden. In der Mitte des Sommers war das schlechte Wetter meinen Beobachtungen hinderlich und am Ende des Octobers waren sie zu wenig zahlreich, um selbst die erste dieser beiden Fragen zu beantworten.

Auch würde ich diese Frage nicht zur Sprache gebracht haben, wenn nicht der berühmte Babinet im Pariser Institut eine Methode zur Bestimmung der fortschreitenden Bewegung des Sonnensystems vorgeschlagen hätte, die vollkommen identisch ist mit der, die ich bereits vor zwei Jahren der K. Gesellschaft der Wissenschaften vorlegte.

Ein kleiner Unterschied findet sich indess bei der Berechnung. Ich hatte angenommen, dafs die Bewegung des Gitters nicht auf den Winkel  $\Theta$  einwirke, während Babinet deshalb die Correction

$$h(1 - \cos \Theta) \tan \Theta$$

aufstellt.



verringert, und weil  
 $-c \cos \theta d\theta$ , so erhält  
 $d\theta = -$

Bewegt sich das Innere  
 Licht, so wird der Wert  
 Addiert man nun die  
 der Formel (1) so wird  
 kals  $\theta$

$$\Delta \theta = - \frac{1}{20} \Delta z$$

ist überdies  $\Delta \approx - \Delta' 20$

Die Veränderung des  $\nu$   
 durch die Bewegung des (t  
 ciellen Fall um 7",2.  
 Die Beobachtung

für die Doppellinie  $D$  im vierten Interferenzspectrum. Das einfallende Licht hatte immer die Richtung von ~~Süden~~ nach Norden. Das Sehzeichen und das Gitter wurden alle Tage neu ajustirt.

Tabelle III.

Zeit			$2\Theta_4 = \varphi$	Anmerkung
1862 Oct. 5	11 <sup>h</sup>	Vormitt.	62° 55' 38''	Mittel aus 3 Beob.
	3 <sup>h</sup> ,5	Nachmitt.	55 53	» » » »
	5 <sup>h</sup>	Nachmitt.	56 7	» » 6 »
Oct. 9 und 10			3 <sup>h</sup> ,7 Nachmitt.	62° 56' 0'' Mittel aus 6 Beob.
Oct. 11	9 <sup>h</sup> ,5	Vormitt.	62° 55' 51''	Mittel aus 2 Beob.
	1 <sup>h</sup>	Nachmitt.	55 58	» » »
	3 <sup>h</sup> ,75	Nachmitt.	56 7	» » »

Aus dem Mittelwerth der Wellenlängen für die Linie  $D$  in Tab. (1) erhält man

$$2\Theta_4 = 62^\circ 55' 41'',2 = \varphi_0$$

und da dieser Werth sehr nahe frei seyn muß von dem Fehler, der auf der Bewegung des Instruments beruht, so müssen auch die Beobachtungen in Tab. III diesen Werth wiedergeben, wenn er wegen des Einflusses, den die genannte Bewegung auf die Beobachtungen ausübt, corrigirt wird.

Ist die Geschwindigkeit des Sonnensystems  $= X$  und die Richtung dieser Bewegung bestimmt durch die Coordinaten des Aequators

$$D = 34^\circ,5 \text{ und } A = 259^\circ,8,$$

so erhält man die Größe der Bewegung des Instruments in Richtung von Norden nach Süden zufolge der Bewegung des Sonnensystems

$$= X \cos b = X [\cos D \sin P \cos (A - *) - \sin D \cos P]$$

worin  $P$  die Polhöhe und  $*$  die Sternzeit der Beobachtung bezeichnet.

Für Upsala wird also die Formel:

$$X [0,713 \cos (259^\circ,8 - *) - 0,284.]$$

Geschwindigkeit der Erde = 20",  
 Bogen, dessen Radius gleich ist  
 Lichts. Die ganze Berichtigung d

$$\Delta \varphi = 24",9 [\cos b, -$$

da

$$X = \pi h \text{ und } 40",8 \tan \varphi$$

Berechnet man aus dieser letzte  
 nen für die Winkel  $\varphi$  in der Tab.  
 verschiedener Werthe von  $\pi$ , addir  
 tionen zu ihren respectiven Winkel  
 lich das Resultat  $\varphi + \Delta \varphi$  von dem  
 ren Werth von  $2 \Theta_4$  oder

$$62^{\circ} 55' 41'' = \varphi,$$

so erhält man folgende Uebersicht;

Tafel VI.

$\varphi_0 - \varphi$	$\varphi_0 - (\varphi +$		
	$\pi = 0$	$\pi = \frac{1}{3}$	$\pi =$
+ 3"	+ 3"	+ 4"	+
− 11"	+ 9"	+ 5"	+
− 26"	− 3"	− 6"	−

Soweit sich aus diesen obigen Beobachtungen schliessen lässt, scheint der *Einfluss der jährlichen Bewegung der Erde durch sie* bestätigt zu werden. Die Wirkung der Bewegung des Sonnensystems ist weniger hervortretend; indess zeigt sich doch, dass wenn man die genannte Bewegung  $= 0$  oder  $=$  der Bewegung der Erde in ihrer Bahn annimmt, die Uebereinstimmung zwischen den Beobachtungen schlechter wird als wenn man sie gleich setzt einem Drittel oder etwas mehr von der Bewegung der Erde. Dies Resultat stimmt nicht übel mit dem, was man auf astronomischem Wege von der Bewegung des Sonnensystems weiss.


Inzwischen denke ich in diesem Jahre die in Rede stehenden Spectral-Untersuchungen fortzusetzen und hoffe dabei Gelegenheit zu haben, die Grösse der Bewegung des Sonnensystems numerisch zu bestimmen. Für jetzt habe ich bloß die Absicht, die Möglichkeit zu zeigen, dieses im Bereich der physischen Astronomie liegende interessante Problem auf optischem Wege zu lösen.

---

## VI. *Thermoketten von grosser Wirksamkeit; von R. Bunsen.*

---

Unter den bisher auf ihre thermo-elektrische Differenz untersuchten Substanzen, welche hinlängliche Leitungsfähigkeit für die Elektrizität besitzen, um zu Thermoketten mit Vortheil verwendet werden zu können, nimmt Wismuth in der thermo-elektrischen Spannungsreihe die höchste und eine Legirung von 2 Theilen Antimon mit 1 Theil Zinn die niedrigste Stelle ein. Versuche haben mir gezeigt, dass Pyrolusit in dieser Reihe noch über dem Wismuth steht und natürlicher Kupferkies noch weit über dem Pyrolusit. Combinirt man Kupferkies mit jener Legirung, oder besser, um höhere Temperaturdifferenzen anwenden zu können, mit Kupfer zu einem thermo-elektrischen Paar, so erhält



it  
b  
da  
ne  
pf  
me  
bei  
ent  
For  
nich

rend der untere Theil der Kupfer-  
beinlichen Kupferzapfen in Wa-  
erhält man in den zu einem Sch-  
nen Kupferdrähten  $cc$ , einen Str-  
einiger Zeit vollkommen constant  
Fortsatz erhitzende Flamme vor Se-  
Constanten dieser kleinen Kette  
nen eines Daniellschen Element-  
richtung, dessen in die Flüssigkeit  
gamirten Zinkcylinder zugekehrte  
decimeter betrug und dessen St-

Ver mehrt man den Leitungswiderstand um  $r$ , so wird die dadurch verminderte Stromstärke:

$$i = \frac{E}{L + w + r}.$$

Zur Bestimmung von  $E$  und  $L$  wurde der Strom durch eine auf erforderliche Weise in der Entfernung  $d$  von einem Magnetometer aufgestellte Drahtrolle geleitet und die den Widerständen  $(L + w)$  und  $(L + w + r)$  entsprechenden Ausschläge  $J$  und  $i$  gemessen. Bei sämtlichen Versuchen war  $w = 4,46$  und  $r = 16,00$ . Bei der Daniell'schen Kette war die Entfernung  $d$  der Drahtrolle vom Magnetometer  $1^m$  bei der Kupferkieskette  $0^m,5$  und bei der Pyrolusitkette  $0^m,25$ . Man hat daher den wesentlichen Leitungswiderstand der zu vergleichenden Ketten:

$$L = \frac{16i}{J - i} - 4,46$$

und für die elektromotorische Kraft derselben

$$E = \left( \frac{16i}{J - i} + 16 \right) i d^3.$$

Die Daniell'sche Kette gab:

	Frisch gefällt.	15' gebraucht.	Im Mittel.
$J$	154,0	141,7	
$i$	71,0	69,2	
$L$	9,2	10,8	10,0
$E$	2108,0	2164,0	2136,0

Bei den folgenden Versuchen mit der beschriebenen Kupferkieskette wurden vier constante Erhitzungen angewandt, welche in aufsteigender Reihe gaben:

	1. Erhitz.	2. Erhitz.	3. Erhitz.	4. Erhitz.
$J$	98,9	116,0	134,5	150,5
$i$	41,8	50,7	56,7	63,5
$L$	7,4	7,9	7,2	7,2
$E$	145,4	180,2	196,0	218,8
$\frac{E \text{ Thermok.}}{E \text{ Daniell}}$	$\frac{1}{14,7}$	$\frac{1}{11,9}$	$\frac{1}{10,9}$	$\frac{1}{9,7}$
$\frac{L \text{ Thermok.}}{L \text{ Daniell}}$	0,74	0,79	0,72	0,72

kaltens schliessen konnte,  
Apparat zu zersprengen,  
mögen. Wenn man sich  
gleichen Ausdehnung dadur-  
zapfen mittelst eines, läng-  
genschnitts federnd macht,  
ter gesteigerte Temperatur  
motorische Kraft erreichen  
angewandten Erhitzung zeig-  
mal grössere Wirkung als  
von gleichem wesentlichen  
Erwärmung von 0° C. auf  
benen Paare zu einer Kette  
Wirkungen eines Daniell'schen  
centimeter wirksamer Kupfe-

Natürlicher Kupferkies l-  
hitze ohne bemerkbare Zers-  
beliebige Formen gießen.  
merkwürdiger Weise eine V-  
in der thermo-elektrischen :  
Wismuth herabgedrückt.



messer haltender, 50<sup>mm</sup> langer Cylinder einer leicht zu bearbeitenden verworrenfasrigen Pyrolusitvarietät wurde oben und unten mit Platindraht fest umwickelt und die obere Umwicklung in einer Hülle von Glimmer direct in der Flamme einer nicht leuchtenden Lampe erhitzt, während die untere in Wasser stand. Der Versuch, bei dem, wie bereits erwähnt,  $d = 0^{\text{mm}},25$  war, gab  $J = 74,0$  und  $i = 68,2$ ; woraus folgt:  $L = 183,6$  und  $E = 217,5$ . Die elektromotorische Kraft betrug daher ebenfalls nicht weniger als  $\frac{1}{9,8}$  von derjenigen eines Daniell'schen Bechers, der Leitungswiderstand aber war 18,4mal grösser als bei dem oben beschriebenen Daniell'schen Element.

## VII. *Ueber Interferenzerscheinungen im prismatischen und im Beugungsspectrum;* von J. Stefan.

(Aus den Sitzungsber. der kais. Akad. der Wiss. Bd. XLIX;  
vom Hrn. Verf. übersandt.)

Talbot hat zuerst die Beobachtung gemacht, daß im prismatischen Spectrum dunkle, den Fraunhofer'schen Linien parallele Streifen auftreten, sobald man von der Seite, an welcher sich die Kante des das Spectrum erzeugenden Prismas befindet, ein Glimmerblättchen vors Auge schiebt, so daß es die Hälfte der Pupille verdeckt, die andere Hälfte derselben aber frei läßt. Diese Streifen heißen Talbot'sche Streifen. Ich habe mehrfach Versuche über diese Streifen gemacht, deren Resultate ich im Folgenden mittheile. Man braucht, um diese Streifen zu sehen, das Glimmerblättchen nicht gerade unmittelbar vors Auge zu bringen. Es kann es irgendwo zwischen Auge und Prisma halten, es kann es an das Prisma ankleben, jedoch so, daß es einen an der

brechenden Kante liegenden Theil desselben bedeckt. Blickt man durch den bedeckten oder durch den freien Theil des Prismas, so sieht man keine Streifen. Sieht man aber so durch das Prisma, dals in das Auge Strahlen, die durch den bedeckten, und Strahlen, die durch den unbedeckten Theil gehen, gelangen, so treten die Interferenzstreifen auf.

Man kann aber das Blättchen auch an die vom Auge abgewendete Fläche des Prismas kleben, man kann es auch weiter entfernt vom Prisma irgendwo zwischen diesem und der Spalte anbringen, wenn nur der Theil des von der Spalte ausgehenden Strahlenbüschels, welcher gegen die brechende Kante des Prismas geht, das Blättchen durchsetzen mufs, so treten die Interferenzstreifen auf.

Man sieht diese Streifen auch noch mit freiem Auge in den Spectren, welche durch ein feines beugendes Gitter erzeugt werden. Schiebt man das Blättchen von der linken Seite vor das Auge, so erscheinen die dunklen Streifen nur in den rechts liegenden Spectren, die links liegenden Spectra enthalten keine solche Streifen. Schiebt man das Blättchen von der rechten Seite vor das Auge, so sind

ander, so verschwinden die Streifen in allen Spectren, wenn die Blättchen gleich dick sind. Ist das Blättchen rechts dicker, so bleiben Streifen in den linksseitigen Spectren, und zwar in der Art, wie sie durch ein rechts angebrachtes Blättchen allein hervorgebracht wurden, wenn dieses Blättchen eine Dicke hätte gleich der Differenz der Dicken der beiden angeklebten Blättchen.

Bei diesen Versuchen darf die Dicke des Blättchens nicht bedeutend seyn, weil die Anzahl und damit auch die Feinheit der Streifen bei dickeren Blättchen so groß wird, daß sie mit freiem Auge nicht mehr unterschieden werden können. Ich verwende zu den Versuchen mit freiem Auge Blättchen bis zu 0,1 Millim. Dicke bei einem Prisma von  $45^\circ$ . Bei einem Prisma von  $60^\circ$  kann ich statt des Glimmerblattes auch Glasplättchen bis 0,15 Millim. Dicke nehmen. Ein solches gibt zwischen den Linien *B* und *H* bei 120 Streifen.

Hingegen sieht man die durch dickere Blättchen erzeugten Linien, wenn man das Spectrum durch ein Fernrohr beobachtet und das Blättchen, wie es Brewster und Airy gethan haben, zwischen das Auge und das Ocular bringt, nur muß das Blättchen von der violetten Seite des Spectrums eingeschoben werden, also, wenn das Fernrohr ein astronomisches ist, von der der Kante des Prismas entgegengesetzten Seite. Man sieht dann die Streifen in jenem Theile des Spectrums, von welchem Strahlen, die frei, und solche, die durch das Blättchen gehen, in das Auge gelangen. Hier ist es vortheilhafter Glasplättchen zu nehmen, z. B. solche, welche bei mikroskopischen Präparaten als Deckplättchen verwendet werden. Sie sind ebener als Glimmerblätter und geben viel schärfere Linien.

So wie bei der Beobachtung mit freiem Auge das Glimmerblatt nicht unmittelbar vor dem Auge zu seyn braucht, so kann man auch bei der Beobachtung des Spectrums durchs Fernrohr das Glasplättchen irgendwo zwischen Auge und Spalte anbringen. Ich mache die Versuche an einem Spectroskop. Die Spalte befindet sich im Brennpunkte

einer Collimatorlinse, das Beobachtungsfernrohr ist daher auf unendliche Distanz eingestellt.

Klebt man das Glasplättchen vorne an das Objectiv, und zwar an die Seite, welche gegen die brechende Kante des Prismas liegt, so treten die Interferenzlinien im ganzen Spectrum zugleich auf.

Es braucht nicht gerade die Hälfte des Objectivs von dem Plättchen bedeckt zu seyn, auch braucht die über dem Objectiv liegende Kante des Plättchens nicht parallel zu seyn der brechenden Kante des Prismas, wenn nur das Plättchen vom Planparallelismus nicht zu sehr abweicht, in welchem Falle das ganze Spectrum verwischt wird, so treten die Linien auf. Der Planparallelismus des Plättchens ist ein wesentliches Erforderniß für das Zustandekommen der Erscheinung bei dickeren Plättchen. Ich habe eine planparallele Glasplatte von etwas über 3 Millim. Dicks. Diese liefert sehr schöne Streifen, die in dem durch ein sechziggradiges Steinheil'sches Flintglasprisma erzeugten Spectrum sehr deutlich und scharf gesehen werden können, obwohl sie ungemein fein sind. Die Anzahl dieser Linien

Richtung der durchgehenden Strahlen, so hat jede der Linien das Maximum ihrer Deviation. Man hat darin ein Mittel, das Plättchen in diese senkrechte Stellung zu bringen.

Anstatt das Plättchen unmittelbar vor das Objectiv zu geben, kann man es auch irgendwo zwischen Objectiv und Prisma, oder zwischen diesem und dem Collimator anbringen. Man hat es auf diese Weise in der Hand, mit dem Plättchen Aenderungen vorzunehmen, z. B. es zu erwärmen oder zu pressen und aus der Veränderung der Linien im Spectrum auf die Veränderungen der optischen Eigenschaften des Plättchens zu schließen.

Ganz so verhält es sich mit den Interferenzlinien in den Beugungsspectren. Ersetzt man das Prisma durch ein Gitter und giebt vor das Objectiv ein Glasplättchen, so daß es die rechte Seite desselben bedeckt, so treten die Linien in den rechtsseitigen Spectren auf. Bringt man vor das Objectiv zwei Plättchen eins rechts, eins links, jedoch so, daß der mittlere Theil des Objectivs frei bleibt, so sind dann die Interferenzlinien in allen Spectren vorhanden. Man kann auch jedes dieser Plättchen anderswohin bringen, wenn nur ein Theil des vom Collimator kommenden Strahlenbündels durch das eine, der gegenüber liegende Theil durch das andere Plättchen, der mittlere Theil frei geht.

Noch eine auffallende Modification dieser Versuche muß ich erwähnen. Man kann nämlich das Glasplättchen auch vor die Spalte bringen, so daß ein Theil des auf die Spalte fallenden Lichtes durch das Plättchen geben muß, und sieht dann die Interferenzlinien ebenfalls. Hier ist es aber gleichgültig, ob man das Plättchen von derjenigen Seite halb vor die Spalte schiebt, auf welcher sich die brechende Kante des Prismas befindet, oder von der entgegengesetzten. Der Unterschied zwischen den zwei Seiten tritt erst in dem von der Spalte ausgehenden Strahlenbüschel auf. Um die sehr feine Spalte zur Hälfte mit dem Glasplättchen verdecken zu können, muß man dessen Kante parallel mit der Spalte stellen, z. B. auf einem Tischchen,

das dann eine sanfte Bewegung in einer zu dieser Kante senkrechten Richtung gestattet.

Airy behauptet, Talbot'sche Linien auch dann gesehen zu haben, wenn er das Glimmerblättchen vor das Ocular nicht von der violetten, sondern von der rothen Seite einschob. Brewster konnte auf diese Weise keine Linien sehen; auch mir ist es nicht gelungen Linien zu sehen, wenn das Blättchen auf diese Art vor dem Ocular eingeschoben wurde, auch nicht, wenn das Blättchen zwischen Objectiv und Prisma oder zwischen Prisma und Spalte von der der brechenden Kante des Prisma entgegengesetzten Seite eingeschoben wurde. Wenigstens konnte ich nicht die Linien sehen, welche durch Interferenz der Strahlen, die durch das Blättchen und die frei gehen, gebildet werden, hingegen sieht man Interferenzlinien auch dann, wenn man das Ocular oder das Objectiv, oder den Collimator mit einem Glimmerblatte oder einem Glasplättchen ganz bedeckt, auch wenn man das Licht, bevor es auf die Spalte fällt, durch ein solches Plättchen gehen läßt. Diese Linien

**VIII. Untersuchungen über die Ausdehnung und Doppelbrechung des erhitzten Bergkrystalls;  
von Hrn. Fizeau.**

(*Compt. rend. T. LVIII, p. 923.*)

In einer früheren Arbeit, die der Academie am 23. Juni 1862 vorgelegt und in die *Ann. de chim. et de phys. T. LXVI* eingedruckt worden ist <sup>1)</sup>, habe ich gesucht, die Veränderungen zu bestimmen, welche die lichtbrechenden Eigenschaften des Glases und mehrerer anderer Körper bei Änderungen der Temperatur erleiden. Ich untersuchte mehrere Arten von Glas, Flusspath und Kalkspath in dieser ersten Arbeit, von der ich hier nur die Hauptresultate wiederholen will.

Der Brechungsindex des Glases variirt wenig mit steigender Temperatur, allein bei gewissen Gläsern erleidet er doch eine merkliche Vergrößerung. Bei dem gewöhnlichen Krystallglase nimmt er sehr merkbar zu und diese Zunahme ist noch größer bei dem schweren Krystallglase, das reicher an Bleioxyd ist als das gewöhnliche. Ein durch Schönheit und Klarheit seiner zum kubischen System gehörenden Krystalle merkwürdiges Mineral, der Flusspath, zeigt ein umgekehrtes Verhalten, d. h. eine relativ beträchtliche Schwächung seiner lichtbrechenden Eigenschaft bei Erhöhung der Temperatur. Und bei den rhomboëdrischen Krystallen des Kalkspaths, die durch die Stärke ihrer Doppelbrechung und durch die Sonderbarkeit ihrer Ausdehnungsweise so berühmte sind, fand sich, daß die Temperatur-Erhöhung eine rasche Vergrößerung des Brechungsindex beim außerordentlichen Strahl, begleitet mit einer fast unmerklichen des ordentlichen Strahls, hervorruft.

Die wichtigen Folgerungen, welche man hoffen kann aus diesen Erscheinungen, für die Kenntniß der Structur der Körper und die Theorie des Lichtes zu ziehen, machten es wünschenswerth, dieses Studium auf noch andere

1) Auch diese *Ann. Bd. CXIX, S. 87 und 297.*

Substanzen auszudehnen. Unter denen, die am meisten Interesse darbieten, muß vor Allem die krystallisirte Kieselerde, der Bergkrystall, genannt werden, eine der merkwürdigsten Substanzen in der Natur, sowohl wegen der außerordentlichen Klarheit, der GröÙe, Regelmäßigkeit und Schönheit ihrer Krystalle, als auch wegen der Reinheit ihres chemischen Zusammensatzes und der Unveränderlichkeit ihrer vornehmsten physischen Eigenschaften, was Alles auf genaue Beobachtungen und Messungen Hoffnung giebt.

Ich habe daher gesucht, den Bergkrystall nach der in der früheren Arbeit beschriebenen Methode zu studiren, um die Art und GröÙe der Veränderungen zu bestimmen, welche das Licht beim Durchgang durch denselben im Zustande verschiedener Erhitzung erleidet. Bevor ich die erlangten Resultate beibringe, wird es nicht unnütz seyn, die Methode nochmals kurz auseinander zu setzen.

Die zu studirende Substanz wird so geschnitten, daß sie zwei nahezu ebene und unter sich parallele Flächen darbietet, die 1 bis etwa 10 Millimeter Abstand haben können. Ein lothrecht auf die Platte fallendes Bündel von



ter der Bedingung, daß man die Wellenlänge des angewandten Lichts, den Brechungsindex der Substanz und den Ausdehnungscoëfficienten derselben kenne.

Von diesen verschiedenen Größen ist der Ausdehnungscoëfficient derjenige, dessen Kenntniß im Allgemeinen am unsichersten ist. Was insbesondere den Bergkrystall betrifft, so ist seine Ausdehnungsweise beinahe unbekannt. Man hat einige Beobachtungen, welche darthun, daß seine Ausdehnung größer in winkelrechten Richtungen gegen die Axe ist als parallel derselben; allein alle diese Resultate sind unsicher und ganz ungenügend, daraus die Veränderungen des Brechungsindex zu berechnen.

Es schien daher nöthig, dieses Studium mit speciellen Beobachtungen zu beginnen, die geeignet wären, die Ausdehnungsweise des Bergkrystalls unter dem Einfluß der Wärme mit Genauigkeit kennen zu lehren. Nachdem diese Bestimmung gemacht, schritt man wie bei den früheren Untersuchungen, zur Messung der Verschiebungen, welche die durch Reflection an Platten mit parallelen Flächen erzeugten Fransen bei verschiedener Erhitzung erlitten, und so konnte man endlich berechnen, welche Aenderung der Brechungsindex sowohl beim ordentlichen, als beim außerordentlichen Strahl unter dem Einfluß der Wärme erleidet und wie groß die Geschwindigkeitsänderung dieser beiden Strahlen ist.

**Verfahren zur Bestimmung der Ausdehnungsweise des Bergkrystalls.**

Zur Messung der Ausdehnung des Bergkrystalls benutzte ich ein besonderes Verfahren, ein anderes als man gewöhnlich zur Messung der Ausdehnung starrer Körper anwendet. Die Methode beruht auf einem System von optischen Beobachtungen, ganz analog denen, von welchen vorhin die Rede war. Sie scheint besonders den Vortheil der leichten Anwendbarkeit auf Körper von kleinen Dimensionen zu besitzen, wie sie insgemein zu diesen Untersuchungen gebraucht werden. Folgendes sind ihre Principien.

Bekanntlich entspringen bei den Newton'schen Ringen

die Abwechselungen von Hell und Dunkel, welche bei einfachem Licht das Phänomen ausmachen, aus sehr kleinen Unterschieden in den Abständen, welche die beiden reflectirenden Flächen in ihren verschiedenen Punkten trennen. Um z. B. von einem dunklen Ringe zum nächsten hellen überzugehen, braucht der Abstand, der die beiden Glasflächen trennt, nur um die Länge einer Viertel-Lichtwelle zu variiren. Für das gelbe Licht des Natrons, dessen Wellenlänge  $0^{\text{mm}},0005886$  ist, geht die Veränderung des Abstandes nicht über  $\frac{1^{\text{mm}}}{6793,5}$ . Man kann aber insgemein leicht den fünften Theil des Abstandes zwischen einem hellen und einem dunklen Ringe messen, oder, anders gesagt, den zehnten Theil zwischen zwei dunklen Ringen, was einer noch fünf Mal kleineren Veränderung des Abstandes zwischen beiden Flächen oder nur  $\frac{1^{\text{mm}}}{33967}$  entspricht.

Hieraus folgt, daß, wenn man durch irgend ein Mittel den Abstand der Flächen allmählich ändert, die Ringe sich auf der Glasfläche verschieben, so daß man durch irgend

würde sich durch eine Verschiebung von  $9',18$ , d. h. von mehr als neun ganzen Fransen kund geben.

Man sieht also, daß ein Lichtstrahl mit seinen äußerst zarten und vollkommen regelmässigen Undulationen gewissermaßen als ein natürliches Mikrometer von größter Vollkommenheit betrachtet werden kann, das besonders geeignet ist, äußerst kleine, jedem anderen Messungsmittel entgehende Längen zu bestimmen.

Um das eben erwähnte Princip auf die Messung der Ausdehnung starrer Körper anzuwenden, traf ich folgende Anordnung, die mir den beabsichtigten Zweck am besten zu erfüllen schien. Ich liefs eine Art Dreifufs verfertigen, bestehend aus einer etwa 0,5 Centim. dicken und 4 Centim. im Durchmesser haltenden Stahlscheibe, getragen von drei gleich langen stählernen Schrauben, die einen sehr feinen Gang hatten ( $0^{\text{mm}},25$ ) und mit ihren Stielen die Scheibe in drei gleich abständigen Punkten nahe am Umfang durchsetzten. Die oberen, in stumpfe Spitzen auslaufenden Enden dieser Schrauben, ragten eine gewisse, beliebig abzuändernde Anzahl von Millimetern über die Scheibe hervor; auf diese drei Spitzen legte man eine Glasscheibe, deren untere Fläche leicht der obern und wohl polirten Fläche der darunter liegenden Stahlscheibe parallel gemacht werden konnte. Die unterhalb der Scheibe, nahe am unteren Ende der Schrauben angebrachten Köpfe derselben besaßen eine Theilung, mittelst welcher sie um bekannte Gröfsen gedreht werden konnten. Die gesammte Höhe dieses kleinen Apparats stieg nicht über 5 Centim.; er konnte leicht in die Mitte des in der früheren Abhandlung beschriebenen kupfernen Ofens gebracht und darin bis auf stationäre und wohl bekannte Temperaturen erwärmt werden.

Will man die Ausdehnung eines Körpers messen, so muß man denselben in Stücke von 5 bis 10 Millim. Dicke mit zwei nahezu ebenen und parallelen Flächen zerschneiden, ihn auf die Stahlscheibe legen und durch Drehung der Schrauben die Ebene des Glases fast mit der oberen Fläche des Stückes in Contact bringen, jedoch noch ge-

trennt von ihr durch einen sehr kleinen Zwischenraum ( $0^{\text{m}},02$  etwa), um ganz sicher zu seyn, daß der Körper sich frei ausdehne, ohne die Glasscheibe zu berühren.

Läset man, nach dieser Vorkehrung, ein Bündel der gelben Strahlen einer Kochsalzlampe lothrecht auf die Glasscheibe fallen, so beobachtet man durch Reflexion schöne Ringe oder Fransen, entstehend aus der Interferenz des an der Unterseite der Glasscheibe reflectirten Lichts mit dem an der Oberseite des Körpers reflectirten. Da diese Flächen zufällig fast immer etwas convex sind, so hat man im Allgemeinen kreisrunde Fransen oder Ringe, mehr oder weniger regelmässig. Die Glasscheibe trägt eine gewisse Anzahl kleiner schwarzer Punkte, welche als Merkzeichen dienen, um darnach die Größe der Verschiebung der Fransen zu bestimmen.

Ich setze also voraus, der kleine Apparat sey in den Ofen gebracht und mit gelbem Licht beleuchtet. Nachdem die Temperatur stationär geworden, bestimmt der Beobachter die Lage der Fransen in Bezug auf mehrere Merkpunkte, 10 z. B., und schätzt dabei die Zehntel der Fransen für

so würde, wie man sieht, der beobachtete Effect ganz von der Ausdehnung der Substanz herrühren, welche, indem sie an Dicke zunahm, den kleinen Zwischenraum, in welchem die Fransen sich bilden, um eben so viel verringerte. Allein dem ist nicht so: der Stahl dehnt sich aus, demzufolge werden die das Glas tragenden Schrauben länger und somit vergrößert sich, durch einen umgekehrten Effect, der Zwischenraum, in welchem die Fransen entstehen.

Das beobachtete Phänomen ist also in Wahrheit hervorgegangen aus dem Unterschied zweier Ausdehnungen, der der Substanz und der des Stahls. •

Man sieht also, daß die Ausdehnung des Stahls eine wichtige Rolle bei diesen Bestimmungen spielt und daß der numerische Werth derselben mit aller möglichen Genauigkeit bekannt seyn muß.

**Ausdehnung des Stahls, aus welchem der Apparat besteht.**

Leicht ersichtlich ist, daß der zuvor beschriebene kleine Dreifuß mit seiner polirten Scheibe und seinen drei, ein Planglas tragenden Schrauben, sehr geeignet ist, zwischen dem Planglase und der oberen Fläche der Stahlscheibe ein System von Interferenz-Fransen oder -Ringen hervorzu-  
bringen. Der Versuch zeigte, daß der Abstand zwischen diesen beiden reflectirenden Flächen auf  $8^{\text{mm}},1144$  gebracht werden konnte, um noch schöne recht deutliche gelbe Fransen zu geben, deren Verschiebung unter dem Einfluß der Wärme sich leicht beobachten ließ.

Wenn man unter diesen Umständen den Apparat erhitzt, so dehnen die drei Stahlschrauben sich aus, heben die Glasplatte und entfernen sie von der Stahlscheibe, vergrößern also den Gang-Unterschied der interferirenden Strahlen.

Die Ahandlung (von der Gegenwärtiges ein Auszug ist) enthält eine Tafel über die Gesamtheit der Beobachtungen, die nach diesem Verfahren mit einem kleinen aus englischem Stahl (Huntsman) von den HH. Brunner äußerst sorgfältig verfertigten Dreifuß angestellt worden

sind. Dasselbe Instrument diente auch zur Messung der Ausdehnung des Bergkrystalls.

Nachdem die Ausdehnung des Stahls, aus dem das Instrument bestand, studirt, und die Werthe seines Ausdehnungscoëfficienten für verschiedene Temperatur-Intervalle bestimmt worden, konnte man mit Sicherheit zur Bestimmung der Ausdehnungsweise verschiedener Substanzen schreiten, besonders krystallisirter Körper, deren Studium in dieser Beziehung ein specielles Interesse darbieten.

Ich will einiger Beispiele erwähnen. Das Steinsalz, dessen Ausdehnung nach allen Seiten gleich ist, dehnt sich drei Mal stärker aus als der Stahl. Der Alaun dehnt sich etwas weniger aus als Stahl. Die Blende hat eine Ausdehnung, die kaum die Hälfte von der des Stahls und ein Viertel von der des Flussspaths ist. Der Dolomit dehnt sich nach der Axe zwei Mal stärker, und winkelrecht darauf drittehalb Mal schwächer als der Stahl aus; er dehnt sich also in letzterer Richtung noch aus, während bekanntlich der Kalkspath in dieser Richtung eine Zusammenziehung erleidet. Ich kann indefs für jetzt nur diese ersten Resultate

gehörigen Krystalle, wie der Kalkspath, zeigt zwei besondere Werthe, aus denen alle übrigen hergeleitet werden können, den einen für die Richtung in der Hauptaxe, und den anderen für alle Richtungen winkelrecht auf dieser Axe.

Es waren demnach für den Bergkrystall, der zu demselben Krystallsystem gehört, zwei verschiedene Ausdehnungscoëfficienten zu bestimmen, den ersten für die Richtung der Hauptaxe, welche mit der optischen Axe zusammenfällt, und den zweiten für eine auf dieser Axe winkelrechte Richtung.

Die erstere Ausdehnung, die nach der Axe, ergibt sich aus der Aenderung in der Dicke einer Platte, deren Flächen winkelrecht gegen die Axe geschnitten sind. Die zweite Ausdehnung, die winkelrecht zur Axe, erhält man mittelst einer Platte, deren Flächen parallel der Axe sind. Zwei Tafeln enthalten die Resultate der Versuche, die zur Bestimmung dieser beiden Ausdehnungscoëfficienten des Bergkrystalls angestellt worden sind.

Aus diesen Werthen leitete man, durch dieselbe Berechnungsweise wie beim Stahl, die beiden Schluß-Tafeln her, welche alle Bestimmungen zusammenfassend, die successiv wachsenden Werthe der beiden Ausdehnungscoëfficienten, parallel und winkelrecht zur Axe, für verschiedene Punkte der Thermometerscale gaben. Diese Werthe sind unabhängig von der Richtung des Drehungsvermögens. Man kann daraus ersehen, daß der Bergkrystall sich winkelrecht zur Axe fast zwei Mal stärker ausdehnt als parallel derselben; das Verhältniß zwischen den beiden Ausdehnungen nähert sich desto mehr  $\frac{1}{2}$ , je mehr der mittlere Grad sinkt. Allein wenn auch die gegenwärtigen Versuche vermuthen lassen, daß dem bei einer gewissen Temperatur so seyn muß, so sind sie doch von zu engen Gränzen umschlossen, um mit einiger Wahrscheinlichkeit den diesem Verhältniß entsprechenden Thermometergrad angeben zu können. Andere, zu demselben Krystallsystem gehörende Substanzen, z. B. Kalkspath und Dolomit, zeigen Phänomene, die von denen

des Bergkrystalls abweichen, jedoch auch gewissen merkwürdigen Relationen unterworfen zu seyn scheinen. In dem Dolomit findet sich die grösste Ausdehnung parallel der Axe und sie ist beinahe fünf Mal grösser als die winkelrecht zur Axe. In dem Kalkspath, der sich parallel der Axe auch stark ausdehnt und winkelrecht zur Axe zusammenzieht, ist das Verhältniss der Ausdehnung zur Zusammenziehung ebenfalls fünf, und überdies verhalten sich die Zahlen, welche diese Effecte messen, betrachtet in der einen und der anderen dieser Substanzen, zu einander wie 3:4.

Nachdem solchergestalt die Ausdehnungsweise des Bergkrystalls bestimmt worden war, suchte man den beabsichtigten Zweck vollständiger zu erreichen, indem man die erlangten Resultate auf das Studium der von der Wärme in der Doppelbrechung dieses Krystalls hervorgebrachten Effecte anwandte, ein Studium, das darin bestehen mußte, die Modificationen der beiden Brechungsindices aufzusuchen und demzufolge die numerischen Werthe der durch verschiedene Wärmegrade bewirkten Aenderungen der Lichtgeschwindigkeit in dieser Substanz sowohl für den ordent-



Die durch diese Verschiebungen offenbarten Gang-Unterschiede rühren von zwei wohl verschiedenen Ursachen her: 1) Von der Ausdehnung der Platte winkelrecht gegen deren Fläche, woraus eine Aenderung ihrer Dicke entspringt; 2) Von einer gewissen Modification in der Constitution des den Strahl leitenden Mittels selbst, woraus eine Aenderung des Brechungsindex und folglich der Lichtgeschwindigkeit hervorgeht. Dieß letztere Phänomen findet sich also numerisch bestimmt, sobald, wie im vorhergehenden Fall, die Ausdehnung durch besondere Beobachtungen gemessen worden ist.

Mehre andere physische Eigenschaften der Krystalle, welche zu diesen Versuchen dienten, wurden sorgfältig studirt. Hr. Damour war so gut, die Messung der Dichtigkeiten zu übernehmen. Die Brechungsindices, das Drehungsvermögen und dessen Veränderung durch die Wärme waren ebenfalls der Gegenstand besonderer Messungen. Die Krystalle wurden von Hrn. H. Soleil geschickt geschnitten.

Nachdem die verschiedenen, vorhin angeführten numerischen Elemente festgestellt worden, gelangt man endlich dahin, die Störungen zu bestimmen, welche die Effecte der Doppelbrechung in Wahrheit in dem Krystall erleiden, wenn er erhitzt wird.

Zwei Tafeln bieten die numerischen Elemente dieser Bestimmungen dar. Aus den Zahlen der ersten Tafel ersieht man, daß beide Indices in dem erhitzten Bergkrystall abnehmen, daß aber der außerordentliche rascher abnimmt. Nun hat in diesem Krystall, welcher positiv ist, der außerordentliche Index einen größeren Zahlenwerth als der ordentliche; und daraus folgt, daß die beiden Indices, indem sie abnehmen, einander näher kommen, und daß mithin die Stärke der Doppelbrechung in dem Bergkrystall allmählich abnimmt in dem Maasse wie die Temperatur steigt.

Der Kalkspath bietet anscheinend dasselbe Phänomen dar, aber vermöge eines in Wahrheit ganz anderen Vorgangs. In diesem Krystall, welcher negativ ist, ist der außerordentliche Index der schwächere und er wächst mit

Temperatur-Erhöhung ziemlich rasch, während der ordentliche, welcher der stärkere ist, um eine fast unmerkliche GröÙe zunimmt. Die beiden Indices kommen daher auch im Kalkspath einander näher, aber indem sie wachsen, statt wie im Bergkrystall abzunehmen.

Man hat geglaubt, daß diese Abnahme in der Stärke der Doppelbrechung beim Kalkspath verknüpft seyn könnte mit der Aenderung der Krystallform, deren stumpfe Rhomboëder (von  $105^{\circ} 5'$ ) sich beim Erwärmen der Würfel- form nähern. Allein diese Erklärung scheint nicht vereinbar zu seyn mit den Phänomenen, welche der Bergkrystall darbietet. Die diesem Krystall beigelegte Grundform ist auch ein stumpfes Rhomboëder (von  $94^{\circ} 14'$ ) und, wie aus den oben gegebenen Werthen der beiden Haupt-Ausdehnungen hervorgeht, entfernt sich diese Rhomboëderform beim Erhitzen von der Würfelform; und dennoch nimmt die Doppelbrechung ab, statt zu, wie es die Formveränderung vermuthen lassen könnte.

Man sieht wie sonderbar und unerwartet die meisten der Erscheinungen sind, welche bei krystallisirten Körpern

# IX. *Zur Klangfarbe der Vocale. Vorläufige Notiz* von *F. C. Donders.*

---

Seit Kurzem habe ich meine Studien über die Klangfarbe der Vocale wieder aufgenommen, und dabei den Versuch gemacht, die Schwingungsform mit dem von König modificirten Phonautographen von Scott zu registriren.

Wie bekannt, besteht dieses Instrument aus einem Paraboloid von Metall, an dessen abgeschnittenen Scheitel eine elastische Membran aufgespannt ist, welche durch die von der anderen geöffneten Seite eintretenden und theilweise an der inneren Wand reflectirten Wellen von verschiedenen Klängen in Schwingungen versetzt wird, und welche diese durch ein aufgekittetes Stielchen auf einem mit geschwärzten Papier überzogenen, ziemlich schnell um seine Axe gedrehten Cylinder registriert.

Mittelst kleiner Modificationen, besonders am schreibenden Stielchen, ist es mir gelungen, schöne und getreue Abbildungen von sehr complicirten Schwingungen zu erhalten. Nicht nur die Klangfarbe der Vocale, sondern auch die Modificationen beim Uebergang zu Consonanten, wie weiter die Klangfarbe von verschiedenen Musikinstrumenten, sogar in ihren verschiedenen Tönen, bekunden sich in den erhaltenen Curven.

Die *Bedingungen* zum erwünschten Erfolg sind hauptsächlich diese:

1. Die Membran muß derart gespannt und mit Gewicht beschwert seyn, daß sie die Vibrationen von sehr verschiedener Tonhöhe annehmen kann, damit sie auch mit den höheren Obertönen der Klänge resonire.

2. Das Stielchen (ein zugespitzter in der Vertical-Ebene gebogener und elastischer Span von einer Federspule) muß in einer senkrecht zur Axe des Cylinders stehenden Ebene liegen, mit der Spitze dem Cylinder ziemlich stark angedrückt, und in einer horizontalen Ebene vibriren, ohne in dieser Ebene biegsam zu seyn. Diese Schwingungsebene erhält man dadurch, daß das Federchen in der verticalen Richtung, in der Mitte der Membran, in der horizontalen etwas excentrisch aufgeklebt wird.

Das richtige Verhältniß ist gefunden, wenn ein einfacher Ton als eine einfache Sinus.-Curve registriert wird.

Die erhaltenen *Resultate* sind zunächst folgende:

1. Bei gleicher Spannung der Membran erhält man, mit demselben in gleicher Weise dem Cylinder angelegten Federchen, für denselben Klang jedesmal durchaus dieselbe Curve. Hieraus geht hervor, daß in zusammengesetzten Klängen die Phasen der verschiedenen Partialtöne, in Bezug auf einander, immer dieselben sind.

2. Bei gleicher Spannung der Membran giebt dasselbe in gleicher Weise angelegte Federchen für jeden verschiedenen Klang eine eigenthümliche oft sehr zusammengesetzte Curve.

3. Große Verschiedenheiten der Spannung und der Federchen modificiren die relative Größe der den verschiedenen Partialtönen entsprechenden Amplituden.

4. Jeder der vierzehn Vocale, bei einem bestimmten Ton gesungen, producirt eine constante Curve. Während diese für die meisten Vocale complicirt und durchaus charakteristisch ist, findet man für *u*, und besonders für *ü* und *i* nahezu einfache Sinus-Curven.

5. Für jeden Vocal ändert sich die Form der Curve mit der Tonhöhe. Dieses Resultat hängt zusammen mit der Eigenthümlichkeit der Vocale, daß ihre Klangfarbe nicht durch Obertöne einer bestimmten Ordnung zum Grundton, sondern vielmehr durch Obertöne von nahezu abso-

I. *Ueber die Eigenschaften der Kieselsäure und  
anderer analoger Colloïdsubstanzen;  
von Thomas Graham.*

(Aus den *Proceedings of the Royal Society*, 16. Juni 1864,  
von Hrn. Verf. übersandt).

Die in Bezug auf Löslichkeit herrschenden Begriffe sind vornehmlich von Betrachtungen über krystallinische Salze abgeleitet und sind nur sehr unvollkommen anwendbar auf die Klasse der Colloïdsubstanzen. Kieselsäurehydrat, zum Beispiel, ist im löslichen Zustand ganz eigentlich gesprochen ein flüssiger Körper, wie Alkohol, in allen Verhältnissen mischbar mit Wasser. Wir können hinsichtlich der Kieselsäure nicht von Graden der Löslichkeit sprechen, wie von den Graden der Löslichkeit eines Salzes, es sey denn mit Bezug auf Kieselsäure im gelatinösen Zustand, welche man gewöhnlich als unlöslich betrachtet. Die Kieselsäuregallerte kann mehr oder weniger reich an gebundenem Wasser seyn, wenn sie frisch bereitet ist, und sie scheint löslich zu seyn im Verhältniß des Betrages ihres Wassergehaltes. Eine Gallerte, welche 1 Procent Kieselsäure enthält, giebt mit kaltem Wasser eine Lösung, welche ungefähr 1 Kieselsäure in 5000 Wasser enthält; eine Gallerte, die 5 Procent Kieselsäure enthält, giebt eine Lösung, welche ungefähr 1 Theil Säure in 10000 Wasser enthält. Eine weniger wasserreiche Gallerte, als die zuletzt genannte, ist noch weniger löslich; und wenn endlich die Gallerte wasserfrei gemacht ist, so giebt sie weiße, wie Gummi aussehende Massen, welche ganz unlöslich zu seyn scheinen, wie die leichte, staubige Kieselsäure, welche man bei der gewöhn-

lichen Silicatanalyse erhält, indem man eine mit Salzen beladene Gallerte trocknet.

Das Flüssigseyn der Kieselsäure wird nur durch eine bleibende Umwandlung (nämlich Coagulation oder Pectisation) afficirt, durch welche die Säure in die gelatinöse oder pectöse Form umgewandelt wird und ihre Mischbarkeit mit Wasser verliert. Das Flüssigseyn ist permanent im Verhältniß zum Grade der Verdünnung der Kieselsäure und scheint durch eine niedrige Temperatur begünstigt zu werden; umgekehrt wirkt Concentration und Temperaturerhöhung ihm entgegen. Eine flüssige Kieselsäure von 10 oder 12 Procent wird bei gewöhnlicher Temperatur in wenigen Stunden von selbst pectös, und sofort, wenn sie erhitzt wird. Eine Flüssigkeit von 5 Procent kann fünf oder sechs Tage lang aufbewahrt werden, eine Flüssigkeit von 2 Procent zwei oder drei Monate, und eine Flüssigkeit von 1 Procent war noch nach zwei Jahren nicht pectös geworden. Verdünnte Lösungen von  $\frac{1}{10}$  Procent oder weniger werden ohne Zweifel durch die Zeit so gut wie nicht verändert und daher rührt die Möglichkeit, daß lösliche Kie-

**Contact** mit gestoßenem Graphit, welcher chemisch inactiv ist, wird die Pectisation einer 5procentigen Kieselsäure in einer oder zwei Stunden zu Stande gebracht, und die einer 2procentigen Kieselsäure in zwei Tagen. Eine Steigerung der Temperatur um 1°, 1 C. wurde während der Bildung der 5procentigen Gallerte beobachtet.

Der schließlichen Pectisation der Kieselsäure geht eine stufenweise Verdickung in der Flüssigkeit selbst vorher. Das Strömen flüssiger Colloïde durch ein Capillarrohr ist immer langsam im Vergleich mit dem Strömen von Krystalloïdlösungen, so daß ein Flüssigkeits-Transpirationsrohr als ein Colloïdoskop angewendet werden kann. An einer Colloïdflüssigkeit, deren Zähigkeit veränderlich ist, wie Kieselsäure, ist der wachsende Widerstand gegen den Durchgang durch das Colloïdoskop von Tage zu Tage wahrnehmbar. Unmittelbar vor dem Gelatiniren fließt die Kieselsäure wie ein Oel.

Eine hervorragende Eigenschaft der Colloïde ist die Tendenz ihrer Theilchen, zu adhäriren, sich zu aggregiren und zusammenzuziehen. Diese Selbst-Anziehung findet statt bei der allmählichen Verdickung der Flüssigkeit und führt, wenn dieselbe fortschreitet, zur Pectisation. In der Gallerte selbst schreitet die fragliche specifische Contraction oder *Synaeresis* noch fort, indem sie Wasserabscheidung veranlaßt, zugleich mit der Trennung in einem Klumpen und ein Serum, und indem sie mit der Erzeugung einer harten steinigen Masse von gleicher Structur endigt, welche wasserfrei seyn kann, oder doch nahezu wasserfrei, wenn man dem Wasser gestattet, durch Verdunstung zu entweichen. Die starke *Synaeresis* von Hausenblase, welche in einem Glasgefäß über Schwefelsäure im Vacuum getrocknet ist, befähigt die sich zusammenziehende Gelatine, die Oberfläche des Glases aufzureißen.

Glas selbst ist ein Colloïd und die Adhäsion von Colloïd an Colloïd scheint stärker zu seyn, als die von Colloïd an Krystalloïd. Wenn die Gelatine in der beschriebenen Weise auf Platten von Kalkspath oder Glimmer ge-

trocknet wurde, so adhärirte sie nicht an der krystallinischen Oberfläche, sondern löste sich beim Trocknen ab. Polirte Glasplatten dürfen nicht in Berührung gelassen werden, wie ganz bekannt ist, wegen der Gefahr einer permanenten Adhäsion zwischen ihren Oberflächen. Die Adhäsion von Stücken glasiger Phosphorsäure an einander dient schon lange zu Erläuterung der colloidalen Synaeresis.

Wenn man im Sinne behält, daß die colloidale Phase einer Substanz das Resultat einer besondern Anziehung und Anordnung der Moleküle ist, Eigenschaften, welche dem Stoff nie ganz fehlen, aber in einigen Substanzen vielmehr entwickelt sind als im andern, so kann es nicht auffallen, daß die Colloid-Charaktere sich nach beiden Seiten hin bis in den flüssigen und festen Zustand geltend machen.

Diese Charaktere erscheinen in der Zähigkeit von Flüssigkeiten und in der Weichheit und Neigung gewisser krystallinischer Substanzen zur Adhäsion. Metaphosphat von Natron ist, nachdem es durch Hitze geschmolzen, ein wirkliches Glas oder Colloid; aber wenn dieses Glas während einiger Minuten auf einer Temperatur wenige Grade unter



Gewisse flüssige Substanzen unterscheiden sich von den Salzen dadurch, daß sie einen geringen oder keinen pectisirenden Einfluß auf flüssige Kieselsäure ausüben. Aber andererseits scheint keine der eben erwähnten Flüssigkeiten zur Erhaltung des flüssigen Zustandes des Colloïds beizutragen, wenigstens nicht mehr, als das Zufügen von Wasser thun würde. Zu diesen inactiven Verdünnungsmitteln der Kieselsäure gehören die Chlorwasserstoff-, Salpeter-, Essig- und Wein-Säure, Zuckersyrup, Glycerin und Alkohol. Aber alle die genannten flüssigen Substanzen und viele andere scheinen eine wichtige Beziehung zur Kieselsäure zu haben, von ganz anderer Natur als die pectisirende Wirkung der Salze. Sie sind fähig das gebundene Wasser des Kieselsäurehydrats, mag das Hydrat im flüssigen oder im gelatinösen Zustande sich befinden, zu deplaciren, und geben neue Substitutionsproducte.

Eine flüssige Verbindung von *Alkohol* und Kieselsäure wurde erhalten durch Hinzufügen von Alkohol zu wässriger Kieselsäure und demnächstige Anwendung geeigneter Mittel, das Wasser aus der Mischung zu entfernen. Zu diesem Ende kann die in einer Tasse enthaltene Mischung über trocknes kohlen saures Kali oder über Aetzkalk unter den Recipienten einer Luftpumpe gestellt werden. Oder ein Dialysirbeutel von Pergamentpapier, welcher Alkohol und Kieselsäure gemischt enthält, kann in einem Krug voll Alkohol aufgehängt werden; das Wasser diffundirt hinweg und läßt in dem Beutel eine nur aus Alkohol und Kieselsäure zusammengesetzte Flüssigkeit zurück. Ein Punkt, auf den man achten muß, ist der, daß die Kieselsäure nie mehr, als 1 Procent der alkoholischen Lösung betragen darf, sonst könnte sie während des Versuchs gelatiniren. Wenn es mir gestattet seyn dürfte, die flüssigen und die gelatinösen Kieselsäurehydrate durch die regelmäßig gebildeten Ausdrücke *Hydrosol* und *Hydrogel* der Kieselsäure zu unterscheiden, so könnten die beiden soeben erwähnten correspondirenden alkoholischen Körper das *Alkosol* und *Alkogel* der Kieselsäure genannt werden.

Das *Alkosol* der Kieselsäure, welches 1 Procent der letzteren enthält, ist eine farblose Flüssigkeit, die nicht durch Wasser oder Salze gefällt wird, noch auch durch Berührung mit unlöslichen Pulvern, wahrscheinlich wegen der geringen Menge der in Lösung befindlichen Kieselsäure. Es kann ohne Veränderung gekocht und verdampft werden, aber gelatinirt durch eine geringe Concentration. Der Alkohol wird im Alkosol der Kieselsäure weniger fest zurückgehalten als das Wasser im Hydrosol, aber mit derselben ungleichmäßigen Kraft, indem eine kleine Quantität des Alkohols so stark festgehalten wird, daß sie verkohlt, wenn die entstandene Gallerte rasch bei einer hohen Temperatur abdestillirt wird. Nicht eine Spur von Kieseläther wurde in irgend einer Verbindung dieser Klasse gefunden. Die Gallerte brennt leicht an der Luft, alle Kieselsäure in Form einer weißen Asche zurücklassend.

Das *Alkogel* oder die feste Verbindung, wird leicht erhalten, indem man Massen von gelatinöser Kieselsäure, die 8 bis 10 Procent der trocknen Säure enthält, in absoluten Alkohol einträgt und den letzteren wiederholtlich erneuert, bis das Wasser des Hydrogels völlig durch Alkohol ersetzt ist. Das Alkogel ist im Allgemeinen schwach opalisirend und gleicht im Ansehen dem Hydrogel, indem es fast ganz dessen ursprüngliches Volum beibehält. Folgendes ist die Zusammensetzung eines Alkogels, welches sorgfältig aus einem 9,35 Procent Kieselsäure enthaltenden Hydrogel bereitet war: „

Alkohol	88,13
Wasser	0,23
Kieselsäure	11,64
	<hr/> 100,00

In Wasser gethan wird das Alkogel allmählich zersetzt, indem Alkohol herausdiffundirt und Wasser, statt dessen hineintritt, so, daß wieder ein Hydrogel entsteht.

Ferner kann das Alkogel zum Ausgangspunkt für die Bildung einer großen Menge anderer, durch Substitution zu erhaltender Gallerte analoger Constitution gemacht wer-

den, indem die einzig erforderliche Bedingung die zu seyn scheint, daß die neue Flüssigkeit und der Alkohol mit einander mischbar sind, d. h. daß sie Körper sind, die in einander diffundiren können. Verbindungen von Aether, Benzol, Schwefelkohlenstoff sind so erzeugt worden. Von dem Aetherogel kann wiederum eine andere Reihe Kieselsäuregallerte abgeleitet werden, welche Flüssigkeiten enthalten, die in Aether löslich sind, wie die nicht flüchtigen Oele.

Die Bereitung der *Glycerinverbindung* der Kieselsäure wird durch die verhältnismäßig geringe Flüchtigkeit dieser Flüssigkeit erleichtert. Wenn man Kieselsäurehydrat zuerst in Glycerin taucht und dann in dieser Flüssigkeit kocht, so destillirt Wasser über ohne irgend eine Veränderung im Aussehen der Gallerte, außer daß, wenn sie anfangs opalisirend war, sie jetzt ganz farblos wird und aufhört sichtbar zu seyn, wenn sie von der Flüssigkeit bedeckt ist. Aber ein Theil der Kieselsäure wird gelöst und es entsteht ein *Glycerosol* gleichzeitig mit der Glycerin-Gallerte. Ein Glycerogel, bereitet aus einem 9,35 Procent Kieselsäure enthaltendem Hydrat, war zufolge einer Verbrennungsanalyse zusammengesetzt aus:

Glycerin	87,44
Wasser	3,78
Kieselsäure	8,95
	<hr/> 100,17

Das Glycerogel hat etwas weniger Umfang, als das ursprüngliche Hydrogel. Wenn eine Glyceringallerte mit Hülfe von Hitze destillirt wird, so schmilzt sie nicht, aber alles Glycerin geht über mit einer geringfügigen Zersetzung gegen Ende des Processes.

Die Schwefelsäureverbindung, das *Sulphagel*, ist ebenfalls interessant wegen der Leichtigkeit, mit welcher sie sich bildet und wegen der Vollständigkeit, mit der das Wasser aus dem ursprünglichen Hydrogel entfernt wird. Eine Masse Kieselsäurehydrat kann, ohne zu zerbrechen, bewahrt werden, wenn sie zuerst in Schwefelsäure, die mit 2 oder 3

Volumen Wasser verdünnt ist, gelban wird und dann allmählich in stärkere Säuren gebracht wird, bis man sie zuletzt in concentrirtes Vitriolöl thut. Das Sulphagel sinkt in der letzteren Flüssigkeit unter und kann mit einem Ueberschuß derselben Stunden lang gekocht werden, ohne seine Durchsichtigkeit oder seinen gelatinösen Charakter zu verlieren. Es ist stets etwas geringer an Volum, als das ursprüngliche Hydrogel, aber fürs Auge nicht mehr als  $\frac{1}{2}$  oder  $\frac{1}{3}$  des ursprünglichen Volums. Diefs Sulphagel ist durchsichtig und farblos. Wenn ein Sulphagel stark in einem offenen Gefäße erhitzt wird, so findet man, daß die letzten Antheile des gebundenen ersten Hydrats der Schwefelsäure, um ausgetrieben zu werden, eine höhere Temperatur erfordern, als der Kochpunkt der Saure ist. Alle Kieselsäure bleibt zurück und bildet eine weiße, undurchsichtige, poröse Masse, wie Bimsstein. Legt man ein Sulphagel in Wasser, so wird es bald zersetzt und das ursprüngliche Hydrogel wieder erzeugt. Unter keinen Umständen scheint eine beständige Verbindung von Schwefelsäure und Kieselsäure von der Natur eines Salzes gebildet zu werden.

ther und mehr Aufschluss versprechend, sind die *flüssigen* Verbindungen der Kieselsäure. Die flüssige Alkoholverbindung begünstigt die Möglichkeit der Existenz einer Verbindung des Colloïdes Albumen mit Oleïn ebenfalls löslich und fähig mit dem Blute zu circuliren.

Die Schwäche der Kraft, welche zwei Substanzen zusammenhält, die zu zwei verschiedenen Klassen gehören, indem die eine ein Colloïd, die andere ein Krystalloïd ist, ist ein Gegenstand, der Beachtung verdient. Wenn eine solche Verbindung in eine Flüssigkeit gebracht wird, so kann das überlegene Diffusionsvermögen des Krystalloïds seine Trennung von dem Colloïd bewirken. So verlässt im Kieselsäurehydrat das gebundene Wasser (ein Krystalloïd) die Säure (ein Colloïd), um in den Alkohol zu diffundiren, und wird der Alkohol wiederholentlich erneut, so wird alles Wasser auf diese Weise fortgeschafft, indem gleichzeitig Alkohol (ein anderes Krystalloïd) die Stelle von Wasser in Verbindung mit Kieselsäure einnimmt. Die Flüssigkeit, welche im Ueberschuß vorhanden ist (hier der Alkohol), nimmt vollständig Besitz von der Kieselsäure. Der Proceß kehrt sich um, wenn ein Alkogel in ein beträchtliches Volumen Wasser gethan wird. Dann scheidet sich Alkohol von der Verbindung in Folge der Gelegenheit, welche er findet, in Wasser zu diffundiren, und Wasser, welches nun die im Ueberschuß vorhandene Flüssigkeit ist, nimmt wieder Besitz von der Kieselsäure. Solche Verbindungen erläutern den praedominirenden Einfluß der Masse.

Selbst die Verbindungen der Kieselsäure mit Alkalien geben dem zersetzenden Einfluß der Diffusion nach. Die Verbindung der Kieselsäure mit 1 oder 2 Procent Natron ist eine Colloïdlösung und erleidet allmähliche Zersetzung, wenn sie, um Kohlensäure abzuhalten, im Vacuum in einen Dialysator über Wasser gesetzt wird. Das Natron diffundirt langsam als kaustisches Natron weg und giebt das gewöhnliche braune Silberoxyd, wenn es mit dem Nitrat dieser Base geprüft wird.

Die Pectisation flüssiger Kieselsäure und vieler anderer

bei 19° die folgenden Dichtig  
2,396 und 3,243. Im Vacuum  
wolframsäure farblos; aber an  
scheinlich durch die desox  
Materie.

Flüssige Kieselsäure wird  
sie mit Wolframsäure gemisch  
scheinlich mit der Bildung der  
beiden Säuren zusammenhängt  
dies nachgewiesen hat.

*Molybdänsäure* ist bisher (in  
der unlöslichen Form bekannt ge  
lybdänsaures Natron in Wasser  
liches Hinzufügen von Chlorwasser  
ohne unmittelbare Fällung zerfällt  
auf einen Dialysator gebracht,  
gelatinieren, aber wird von selbst  
Salze hinwegdiffundieren. Nach  
von Chlorwasserstoffsäure und  
Tagen bleiben ungefähr 60 Procent  
im reinen Zustande.

ständigkeit. Die Säure kann bei 100° getrocknet werden, ohne sofort ihre Löslichkeit zu verlieren. Trockne Molybdänsäure hat dasselbe gummiartige Aussehen wie Wolframsäure. Nahezu auf den Punkt erhitzt, bei welchem sie sich verflüchtigt, wird reine pulvrige Molybdänsäure noch in einer Lösung von Carbonat oder Bicarbonat von Kali unter Aufbrausen von Kohlensäuregas gelöst.

Beide Säuren verlieren, mit Natron verbunden, ihre Colloidalität und geben mannigfache krystallisirbare Salze. Die reinen flüssigen Säuren werden auch unlöslich, wenn sie einige Zeit mit Chlorwasserstoffsäure und andern starken Säuren erhitzt werden.

---

## II. Ueber die Doppelbrechung des Lichtes in tönenden Stäben<sup>1)</sup>; von Dr. August Kundt.

---

**B**iot machte im Jahre 1820 die Entdeckung<sup>2)</sup>, daß ein langer Glasstreifen, in longitudinale Schwingungen versetzt, einen Einfluß auf die Polarisation des durch denselben hindurchgehenden Lichtes ausübe. Ein etwa 2 Meter langer Spiegelglasstreifen, dessen Savart sich bei seinen Untersuchungen bedient hatte und der sich dadurch auszeichnete, daß die Töne in demselben sehr leicht und schön hervorgerufen werden konnten, wurde zwischen zwei gekreuzte polarisirende Spiegel gebracht. In dem Moment nun, in dem der Streifen ertönte, erschien derselbe hellglänzend in dem analysirenden Spiegel und dieser Lichtschein erlosch sofort, wenn der Ton verklang.

· Bisjetzt steht dieser Versuch von Biot vereinzelt da. Aehnliche Untersuchungen sind in umfassenderem Maasse,

1) Die mitgetheilten Versuche wurden in dem vom Hrn Professor Magnus zu Berlin geleiteten Laboratorium angestellt.

2) *Annal. de chimie et de physique* T. XIII.

so viel wir wenigstens bekannt, nicht angestellt und eine eingehende Erklärung des Versuches nicht gegeben. Man findet denselben überhaupt, so interessant die Erscheinung ist, nicht häufig erwähnt. Hr. Professor Dove, dessen Beobachtungen sich ja auf fast alle Theile der experimentellen Optik erstrecken, berührt in seiner Abhandlung über Circularpolarisation im 35. Bande dieser Annalen die Biot'sche Entdeckung. Derselbe sagt dort, daß eine Klangscheibe senkrecht gegen einen polarisirten Lichtstrahl gehalten überall keine Wirkung auf die Polarisation desselben habe; bei longitudinal schwingenden Stäben, die nach Biot auf die Polarisation einen Einfluß haben, habe sich ihm das Kreuz einer eingeschalteten Kalkspathplatte zu öffnen geschienen, — mithin war anscheinend das geradlinig polarisirte Licht in elliptisches übergegangen; bemerkt jedoch dabei, daß diese Versuche einer Wiederholung mit besserem akustischem Apparat bedürften. Sodann erwähnt Wertheim<sup>1)</sup> des Biot'schen Versuches.

Fragt man sich nun, welche Vorstellung Biot selbst sich von der beobachteten Erscheinung machte, wie der-



dass die eigenthümliche bei longitudinal schwingenden Glasstreifen beobachtete Erscheinung nicht durch eine besondere Spannung in dem ganzen Stabe, die durch die Verdichtungen und Verdünnungen in demselben entstände, bedingt ist, dass dieselbe an irgend einer Stelle nicht einmal etwas Constantes während des Tönens ist, dass die Erscheinung vielmehr an jeder Stelle des Glasstreifens, wo sie überhaupt beobachtet wird, in jedem Moment eine andere ist, und nur die schnelle Aufeinanderfolge dieses Wechsels lässt uns die Erscheinung für eine continuirliche halten. Denkt man sich nämlich den Versuch so angeordnet, wie Biot ihn angestellt und bringt man nun vor das Spiegelbild des Glasstreifens in dem analysirenden Spiegel ein Diaphragma, so dass man von dem Spiegelbilde nur einen schmalen zur Länge des Glasstreifens senkrechten Streifen sieht und lässt nun das Licht, welches jedesmal wenn der Glasstreifen ertönt durch das Diaphragma hindurchblitzt, statt direct ins Auge auf einen Metallspiegel fallen, so wird man, so lange der Spiegel ruht, die aufblitzende Lichtlinie in demselben sehen. Dreht man jedoch den Spiegel um seine Axe parallel dem erscheinenden hellen Streifen, so wird man denselben nicht in die Breite gezogen sehen, wie es seyn müsste, wenn der Lichtschein continuirlich wäre, sondern man wird eine Anzahl nebeneinander liegender, der ursprünglichen parallelen Lichtlinien erblicken, die durch dunkle Zwischenräume von einander getrennt sind.

Wie man diesen Versuch am Besten anstellt, soll sogleich angegeben werden, betrachten wir vorerst nur, was aus demselben folgt. Die hellen und dunklen Streifen in dem rotirenden Spiegel zeigen an, dass die Polarisation des hindurchgegangenen Lichtes nicht constant, sondern nur in bestimmten Intervallen durch den tönenden Glasstreifen afficirt werde, und da die hellen Streifen sehr regelmässig neben einander liegen, so muss auch die Wirkung des Glasstreifens eine regelmässig periodische seyn.

Es liegt nun Nichts näher als diese Wirkung in den regelmässig auf einander folgenden Verdichtungen und Ver-

dünnungen zu suchen, die der Stab an der beobachteten Stelle während des Tönens erleidet. Und zwar scheint es am sachgemäsesten und einfachsten, anzunehmen, daß jeder helle Streifen einer Verdichtung oder Verdünnung an der bestimmten Stelle des Stabes entspreche, denn in diesen Momenten muß der Stab dort wirklich doppelbrechend seyn, kann also unter gewissen Bedingungen die Polarisation des Lichtes ändern; daß hingegen jeder dunkle Streifen im Spiegel den Zeitmomenten entspricht, in denen an der beobachteten Stelle weder Verdichtung noch Verdünnung, also auch keine Doppelbrechung stattfindet.

Nachzuweisen, daß diese Erklärung in der That die richtige und somit die Vorstellung einer eigenthümlichen constanten Spannung oder einer Depolarisation aufzugeben sey, ist der Zweck des Folgenden und zwar wird dieß vollständiger als durch den soeben angeführten Versuch, der freilich immer der entscheidende und interessanteste bleibt, dadurch möglich seyn, daß gezeigt wird, daß alle diejenigen Folgerungen, die man *a priori* aus der Betrachtung des mechanischen Vorganges in longitudinal schwingenden Stäben für die optischen Erscheinungen bei denselben ziehen kann, sich in der That experimentell bestätigen.

Ist  $AB$  (Fig. 1 Taf. III) ein Glasstreifen, der durch Reiben an einem seiner freien Enden oder zwischen  $K$  und  $K'$  so ins Tönen gebracht ist, daß er die Knotenpunkte  $K$ ,  $K'$ ,  $K''$  hat, so finden bekanntlich die Maxima der Verdichtungen und Verdünnungen an den Stellen  $K$ ,  $K'$ ,  $K''$  statt, die Minima derselben zwischen zwei dieser Punkte und an den freien Enden; die Theilchen gleiten hier nur her und hin. Gerade an den Enden und genau in der Mitte zwischen den Knotenpunkten finden sogar überhaupt gar keine Verdichtungen und Verdünnungen statt.

Daraus würde also erstens folgen, daß die Erscheinung des Hellwerdens sich im Maximum in den Knotenpunkten zeigen, dagegen der Stab in der Mitte zwischen zwei Knotenpunkten und an seinen freien Enden stets dunkel bleiben müsse. Daß der tönende Glasstreifen an seinen En-

den in der That nicht hell erscheine, hat bereits Biot bemerkt, er erklärt sich diese Erscheinung dadurch, daß er sagt, an den Enden sey keine Spannung mehr vorhanden, dort könnten die Theilchen ihre Bewegung frei gegen die Luft ausführen. Dagegen erwähnt derselbe über die Knotenpunkte Nichts.

Sodann sind bekanntlich bei longitudinal tönenden Stäben in zwei benachbarten Knotenpunkten entgegengesetzte Schwingungsphasen vorhanden. Während in dem einen Knotenpunkt ein Maximum der Verdichtung stattfindet, herrscht in dem andern ein Maximum der Verdünnung. Daraus würde nun zweitens folgen, daß wenn man einen polarisirten Strahl, nachdem derselbe in dem einen Knotenpunkte durch den tönenden Glasstreifen gegangen, in einem andern Knotenpunkte noch einmal in umgekehrter Richtung durch den Stab sendete, und dann durch ein Nicol'sches Prisma analysirte, das Gesichtsfeld bei gekreuzten Polarisationssebenen auch beim Tönen des Glasstreifens dunkel bleiben müsse. Die beiden Stellen des Glasstreifens, durch die der Strahl nacheinander gegangen, müssen wie zwei hintereinandergestellte Glaswürfel wirken, von denen der eine ebenso stark comprimirt als der andere in derselben Richtung dilatirt ist. Ebenso wenig wie polarisirtes Licht, welches durch diese hindurchgeht, afficirt wird, ebenso wenig wird der Strahl bei dem doppelten Durchgang durch zwei benachbarte Knotenpunkte geändert werden können.

Es ist bisher Nichts darüber angegeben, welche Lage der Glasstreifen zu der Polarisationssebene des durchgehenden Lichtes haben muß, damit das Hellwerden desselben am Besten beobachtet werde, und doch erkennt man bei den Versuchen bald, daß diese Lage nicht gleichgültig ist. Biot giebt nichts darüber an, welche Stellung bei ihm die Polarisationssebene des auffallenden Lichtes und die Längsrichtung des Streifens zu einander gehabt, und bei welcher er die Erscheinung beobachtet. Da Biot bei seinen Versuchen den Glasstreifen mit der Hand hielt, so ist wohl anzunehmen, daß die Lage desselben eine sehr wechselnde gewesen,

und wohl nur dieserhalb konnte einem so geübten Beobachter wie Biot es entgehen, daß der Streifen nur in bestimmten Lagen die Erscheinung mit voller Deutlichkeit zeigt, während man bei anderen Lagen des Streifens dieselbe vergeblich suchen würde. Um den Grund hiervon einzusehen, bedarf es nur folgender Ueberlegung. In dem Moment, in dem in einem bestimmten Theilchen des Stabes eine Verdichtung stattfindet, sind die Elasticitätsverhältnisse dieses Theilchens gegen diejenigen die bei ruhendem Stab statt hatten, verändert, und zwar ist die Elasticitätsaxe in der Richtung der Compression, — d. h. in unserem Fall immer in der Richtung der Längsaxe des Glasstreifens — größer geworden. Um nun die Elasticitätsfläche des Punktes zu bekommen, ist es nur noch nöthig, in der zur Längsrichtung senkrechten Ebene nach zwei Richtungen die Elasticitätsaxen zu bestimmen. Es leuchtet aber ein, daß diese Axen, mag man sie in dieser Ebene legen, wie man will, immer unter einander gleich seyn werden, denn durch Compression in der Längsaxe wird in einem Punkt zwar auf

das Maximum der Verdichtungen oder Verdünnungen, die an der betrachteten Stelle stattfinden, bedingt.

Lässt man nun also geradlinig polarisirtes Licht senkrecht zur Längsaxe und senkrecht zu den Seiten des Glasstreifens durch denselben hindurchgehen, so verhalten sich während des Tönens alle Theilchen des Stabes wie kleine Krystallplättchen, die parallel zur Axe geschliffen sind und deren Axen alle unter einander und zur Längsrichtung des Streifens parallel sind; nur der Grad der Doppelbrechung dieser Theilchen ist an den verschiedenen Stellen verschieden und wechselt an derselben Stelle sehr schnell in der Zeit.

Fällt aber die Polarisationsebene des Lichtes, welches durch eine parallel der Axe geschliffene Krystallplatte geht, entweder mit der Richtung dieser Axe zusammen, oder steht senkrecht zu derselben, so bleibt bei gekreuzten Polarisations Ebenen des Polarisators und Analysators das Krystallplättchen dunkel, dagegen erscheint das Krystallplättchen am deutlichsten hell oder farbig, wenn die Axe des Krystalls im Azimuth  $45^\circ$  zu der Polarisationsebene des auffallenden Lichtes liegt.

Daraus folgt also drittens, dass wenn die Polarisations Ebene des durch den tönenden Glasstreifen hindurchgehenden Lichtes mit der Längsrichtung des Streifens zusammenfällt oder  $90^\circ$  mit derselben macht, der Streifen während des Tönens bei gekreuzten Polarisations Ebenen nicht hell erscheinen kann, dass derselbe jedoch, am deutlichsten hell erscheinen wird, wenn die Längsrichtung des Streifens und die Ebene der Polarisation des einfallenden Lichtes unter  $45^\circ$  gegen einander geneigt sind.

Da endlich der Grad der Doppelbrechung an einer bestimmten Stelle continuirlich ab- und zunimmt, so folgt endlich viertens, dass die Streifen, die man, wie oben gesagt, im rotirenden Spiegel erblickt, farbig erscheinen müssen, und zwar dass vom Mittelpunkt eines dunkeln Streifens aus nach der Mitte des nächsten hellen die Farben in der Reihe der Farben der newtonischen Ringe mit dunklem Mittelpunkt fortgehen und von der Mitte des hellen

Streifens nach der andern Seite in der umgekehrten Reihenfolge sich zeigen.

Die Versuche nun, die ich anstellte um diese Folgerungen zu prüfen, waren in folgender Weise angeordnet.

Da es nöthig war, ein größeres Stück des Stabes auf einmal zu übersehen, so bedurfte es einer größeren polarisirten Lichtmenge. Um sie zu erhalten, befand sich auf einem etwa 4 Fufs hohen Stativ eine Gaslampe mit großem Argandschen Brenner, die ihre Strahlen durch einen Schirm von geöltem dünnem Seidenpapier sandte. Von den andern drei Seiten war die Lampe mit einem Kasten umgeben, so dafs kein fremdes Licht stören konnte. Das Licht des ziemlich gleichmäfsig hellen Papierschirmes fiel auf einen über einen Quadratsufs grossen schwarzen Spiegel, wo es so vollständig als möglich polarisirt wurde. Als Analysator diente dann ein etwa 6 bis 8 Fufs entfernt aufgestelltes Nicolsches Prisma.

Durch Drehung des Spiegels und demgemäße Aenderung der Stellung der Lampe mit ihrem Papierschirm konnte nun

Stelle, wo ein Knotenpunkt entstehen sollte, auf ein rundes von einem Stativ getragenes Stück Holz aufgelegt. Ich habe eine ganze Anzahl Glasstreifen untersucht, die von grossen Spiegelgläsern geschnitten waren und deren Längen etwa zwischen 2 Fufs und 6 Fufs und deren Breiten zwischen  $2\frac{1}{2}$  und  $\frac{1}{4}$  Zoll schwankten. Die Dicke derselben, durch die das Licht hindurchging, war bei fast allen die eines dicken Spiegelglases, also etwa  $\frac{1}{4}$  Zoll. Die Stäbe zeigten an und für sich bei der angewandten Beobachtungsmethode im polarisirten Licht so wenig Farben, dafs diese bei den Versuchen nicht stören konnten. Alle diese Stäbe lönten bei der angegebenen Befestigung sehr leicht und stark, wenn sie an einem freien Ende oder zwischen zwei Knotenpunkten gerieben wurden, mochten sie mit einem, zwei, drei, oder die längsten Streifen selbst mit vier Knotenpunkten schwingen. Das Reiben geschah mit einem dicken, weichen, nicht allzu rauen Tuch, welches ein wenig angefeuchtet war.

Um dann verschiedene Stellen des Glasstreifens nach einander zu betrachten, wurde das Stativ mit dem Glasstab auf dem Tisch parallel der Längsrichtung desselben vor dem Spiegel verschoben.

Sollte endlich die Erscheinung im rotirenden Spiegel betrachtet werden, so bediente ich mich eines einfachen Dove'schen Polarisationsapparates. Derselbe wurde so auf den Tisch gestellt, dafs der in der angegebenen Weise befestigte Glasstab horizontal zwischen den beiden Nicols sich befand. Das aus dem, dem Beobachter zugekehrten Nicol austretende Licht wurde durch ein rechtwinkliges Prisma zur Seite gelenkt und fiel dann auf den rotirenden Spiegel. Ich wandte theils einen gröfseren versilberten Glasspiegel, theils einen 20<sup>mm</sup> im Durchmesser haltenden Stahlspiegel an, die durch ein Uhrwerk mit mässiger Geschwindigkeit gedreht wurden. Das aus der dem Beobachter zugewendeten runden Oeffnung des Nicols austretende Licht erschien im Spiegel als heller runder Fleck. Die Versuche konnten auf diese Weise ganz gut ohne weite-

res Diaphragma angestellt werden. Zwischen den vorderen Nicol und Spiegel wurde zuweilen auch noch ein Diaphragma eingeschaltet um eine schärfere Lichtlinie zu erhalten.

Die Resultate der Versuche waren nun:

1. Wenn die Polarisationssebene des vom Spiegel reflectirten Lichtes senkrecht oder horizontal lag, erschien beim Tönen an keiner Stelle des Stabes das aufblitzende Licht, dagegen erschien dies am deutlichsten, wenn die Polarisationssebene des Lichtes im Azimuth  $45^\circ$  mit der horizontalen Axe des Glasstreifens lag.

2. Führt man, wenn die Polarisationssebene im Azimuth  $45^\circ$  lag, nacheinander alle Stellen des Glasstreifens vor dem Spiegel vorbei, so zeigte sich, dass außer an den freien Enden auch zwischen zwei Knotenpunkten schmale senkrechte schwarze Stellen sich befanden, die beim Tönen nie hell wurden. Von ihnen aus nahm nach den Knotenpunkten die Helligkeit zu. Die Fig. 2 Taf. III zeigt die Erscheinung die ein mit drei Knotenpunkten schwingender



mag, so liefs er doch das soeben Gesagte deutlich erkennen.

4. Wurde endlich die Polarisationssebene des einen Nicol's des Dove'schen Polarisationsapparates, der, wie oben angegeben, angewandt wurde, unter  $45^\circ$  zur Horizontalebene gedreht und die Polarisationssebene des andern Nicol's senkrecht dazu gestellt, und die Erscheinung während des Tönens dann im rotirenden Spiegel betrachtet, so sah man, wie bereits oben gesagt, nicht eine helle Lichtlinie, sondern viele nebeneinander liegende verticale Streifen. Die Fig. 3 Taf. III zeigt die Erscheinung wie man sie bei nicht allzu schnellem Drehen des Spiegels sieht. Läßt man den Spiegel schneller rotiren, so sieht man weniger Streifen, dieselben sind alsdann aber breiter und durch breitere dunkle Zwischenräume von einander getrennt.

Was die Farben dieser Streifen anbetrifft, so zeigten sich wohl zuweilen Farben bei denselben, jedoch ist die Erscheinung zu lichtschwach und zu wenig constant, um Bestimmteres zu erkennen. Die Streifen sind nämlich, wie leicht einzusehen, nicht etwas Constantes, wie etwa Interferenzstreifen, an denen man mit Bequemlichkeit beobachten kann, sondern mit jeder Drehung des Spiegels erscheinen neue Streifen, die sich mit den vorhergehenden durchaus nicht decken; man muß daher den Spiegel auch nur so schnell rotiren lassen, daß der Eindruck des einen Streifen bereits im Auge verschwunden ist, wenn die andern auftauchen. Daß übrigens die Intensität des Tones hinreichend so stark werden kann, daß wirklich Farben entstehen, geht schon daraus hervor, daß wenn man nach der ersten Methode den Stab direct zwischen Spiegel und Analysator beobachtet, man sehr häufig ein sehr energisches farbiges Flimmern des Stabes sieht, trotzdem sich hier die entstehenden Farben durch ihr schnelles Aufeinanderfolgen sehr verwischen müssen.

Durch die Versuche sind also die von uns oben gezogenen theoretischen Folgerungen vollständig nachgewiesen, und somit dürfte die obige Erklärung, die wir von

dem Biot'schen Versuch gegeben, als bewiesen anzusehen seyn.

Folgende Versuche, die ich noch angestellt, können ebenfalls zur Bestätigung dienen.

Man bringe in die Klemme, die den einen Glasstab hält, oder in eine zweite passend angebrachte Klemme, einen zweiten Glasstab so an, daß derselbe dem ersteren parallel liegt, so daß in Folge dessen das polarisirte Licht, nachdem es durch den ersten Glasstab gegangen, auch noch diesen zweiten durchstrahlen muß, bevor es zum analysirenden Prisma gelangt. Dann sieht man im rotirenden Spiegel, wenn man einen der beiden Glasstreifen tönen läßt, während der andere in Ruhe ist, die dem tönenden Stabe zugehörigen alternirenden Streifen, liefse man jedoch beide Stäbe zugleich tönen, so ist klar, daß wenn die beiden Stäbe genau gleiche Schwingungszahlen hätten, es auf den Phasenunterschied der Oscillationen beider Stäbe ankommen würde, ob man dieselben Streifen wie beim Tönen eines einzigen Glasstabes nur mit etwas anderen Farben erblickte, oder alle Streifen zu einer einzigen langen Lichtbinde ver-

vielleicht selbst circular polarisirt. Dies würde schon genügen um das Bild der Kalkspathplatte sehr zu verwischen, dazu kommt aber noch, daß wenn dies Licht in dem Moment einer Verdichtung rechts elliptisch oder circular ist, es in dem entsprechenden Moment der Verdünnung links elliptisch oder circular seyn muß. Hierdurch wird noch um so mehr das Ringsystem der Kalkspathplatte verwischt. Aus demselben Grunde wird die Farbe eines eingeschalteten Gypsblättchens verwischt.

Man ist bisher geneigt gewesen anzunehmen, daß nur bei longitudinal tönenden Streifen durch die Schwingungen Doppelbrechung hervorgebracht werde; es zeigen jedoch auch transversal schwingende Glasstäbe ganz ähnliche Polarisationerscheinungen; ich will kurz die mit transversal tönenden Stäben von mir angestellten Versuche mittheilen.

Um einen langen Glasstreifen gut transversal tönen zu lassen, mußte derselbe auf eine andere Weise als durch eine Klemme horizontal befestigt werden. Es befand sich zu dem Ende oberhalb des Tisches eine starke Holzleiste. An dieser hing mittelst starker Fäden die in den Knotenpunkten um denselben geschlungen waren, der Glasstreifen. Wurde derselbe nun noch in einem der Knotenpunkte lose mit den Fingern gehalten, und an dem freien Ende mit einem Bogen angestrichen, so ertönte derselbe sehr gut.

Geschah das Anstreichen horizontal, d. h. so, daß die Aus- und Einbiegungen zwischen zwei Knotenpunkten in die Richtung der durchgehenden Lichtstrahlen fielen, so zeigte der in oben angegebener Weise vor dem schwarzen Spiegel befindliche Glasstreifen, durch das analysirende Nicol'sche Prisma betrachtet, in keiner Weise Helligkeit. Wurde jedoch der Glasstreifen vertical angestrichen, so daß die Ein- und Ausbiegungen senkrecht zu den durchgehenden Strahlen waren, so zeigte sich derselbe während des Tönnens stark doppelbrechend. Ein mit drei Knotenpunkten schwingender Stab zeigte, wenn man ihn allmählich vor dem Spiegel vorbeiführte, die in Fig. 4 Taf. III dargestellte Erscheinung, wo  $K$ ,  $K'$ ,  $K''$  die Stellen der Knotenpunkte bezeichnen. Es zeigte sich übrigens die Erscheinung wie-

ist im Maximum wenn die Polarisationsebene des von dem Lichtstrahl durch das Loch  $AB$  mit der Horizontalen gebildet wird. Man sieht aus der Figur, dass, abgesehen von dem sehr kleinen Streifen der der Länge des Lichtstrahls entspricht, die Figur von derjenigen beim Maximum des Tages kaum unterscheidet, dass es hier jedoch die Äquipolaren nicht die Aequidistanten, während zu einem der Äquipolaren ein Maximum der Helligkeit, zu einem der Aequidistanten ein Minimum derselben gehört. Die Äquipolaren sind beim Maximum des Tages nicht.

Zur Erklärung der Entstehung unserer Figur ist es nur nötig, einen kleinen Moment einer Schwingung der der Beobachtung zu Grunde und genauer zu betrachten. Für ein solches Moment, wo die halbe Welle zwischen  $K$  und  $k$  (Fig. 1. Tab. III) ihre größte Auslenkung nach unten hat, wird das freie Ende des Moment das freie Ende bei  $K$  nach oben gezogen,  $A$   $A'$  nach oben im Maximum seines Wellenlaufes, das freie Ende bei  $K$  nach unten gebogen. Der Strahl hat somit die Form wie in Fig. 3. Tab. III.

Die Form der Äquipolaren ist also von Spindelform ent-

stattfindet, die allmählich in einander übergehend, in der Mitte eine neutrale Zone bilden. In dem von uns fixirten Moment der Schwingung des Glasstreifens würden also die Stücke  $KK'$  und  $K'K''$  die angegebene Erscheinung zeigen müssen. Dabei ist nur zu bemerken, dass, da in  $K'$  die erweiterten neutralen Zonen zusammenstossen, sich hier ein etwas breiterer verticaler schwarze Streif bilden muss.

Die freien Enden werden nicht genau die Erscheinung einer Hälfte des durchgebogenen Theiles  $KK'$  zeigen, sondern die Figur die ein an einem Ende befestigter Glasstab zeigt, der an dem andern freien Ende durch ein Gewicht heruntergezogen wird. Auch diese Form der Spannung ist bereits untersucht, dieselbe ergiebt ebenfalls eine neutrale Zone, die sich an der Befestigungsstelle ziemlich schnell nach dem freien Ende hin langsam erweitert.

In dem angedeuteten Moment der Schwingung muss also der Glasstreifen seiner ganzen Länge nach eine schwarze Linie zeigen, die in den Knotenpunkten von etwas breiteren schwarzen Streifen senkrecht durchschnitten ist. Ausserdem müssen die freien Enden dunkel seyn. Die andern Theile des Stabes müssen farbig, oder wenn die Doppelbrechung nicht sehr stark, bei gekreuzten Polarisations-ebenen des Polarisators und Analysators, einfach hell erscheinen. Dabei sind alle Theile, die zwischen der schwarzen Längslinie und der concaven Seite des Glases liegen, durch Compression, die zwischen jener Linie und der convexen durch Dilatation doppelbrechend.

Fixirt man jetzt den Moment der Schwingung, der sich von dem vorher betrachteten genau um eine halbe Schwingung unterscheidet, so finden alle Ausbiegungen nach der entgegengesetzten Seite wie in der Figur statt. Der Erfolg ist, dass in diesem Moment der Stab genau dasselbe Bild zeigen muss, wie oben, nur mit dem Unterschiede, dass da wo vorher Doppelbrechung durch Compression statthatte, sie nun durch Dilatation hervorgebracht wird, und umgekehrt. Genau in der Mitte zwischen den fixirten Momenten ist der Stab ganz in Ruhe, kann also keine Dop-

peilbrechung zeigen. Bei jeder Lage des Stabes aber zwischen dieser Ruhelage und dem andern statum Lageru des Maximums der Ausbiegungen wird der Glanz-stein immer dasselbe Bild zeigen, nur werden, da die Doppelbrechung mit dem Grade der Ausbiegung zunimmt, die auftretenden Farben und die Deutlichkeit mit der sich die ganze Erscheinung zeigt, verschwinden sehr. Von einem Maximum der Ausbiegung muß bis zur Ruhelage die Deutlichkeit und die Farben der Figur abnehmen, in der Ruhelage selbst wohl das Auge Nichts, und von dieser Lage zum Maximum der entgegengesetzten Ausbiegung nimmt die Erscheinung wieder zu. Tönt nun der Stab, so wiederholt sich dieses Spiel mit jeder Schwingung, da aber die Ausbiegungen im Verhältnis zu den Dimensionen des Glasstabes sehr kleine Größen sind, da ferner immer dasselbe Bild auftritt, in dem nur etwa die Farben wechseln, so legen sich für unser Auge diese Bilder übereinander und wir erblicken das constante Bild des tönenden Stabes, wie es in Fig. 4 Taf. III gezeichnet ist. Dieß Bild erklärt sich somit vollständig aus den Biegungen des einzelnen Theile des Stabes, ohne

nalen: Will man die Streifen näher bei einander liegend erblicken, so muß man die Rotation des Spiegels verlangsamen.

Sodann kann man endlich auch bei den transversal tönenden Stäben noch die Einzelheiten die oben bei longitudinalem Schwingen angegeben sind, beobachten. Es muß erstens, da die Axen der Compression und Dilatation auch beim transversalen Durchbiegen immer sehr nahe in der Richtung der Längsaxe des Stabes liegen, das Bild, welches der transversal schwingende Stab zeigt, im Maximum der Deutlichkeit auftreten, wenn die Polarisationssebene des auffallenden Lichtes im Azimuth  $45^\circ$  zur Längsrichtung des Stabes liegt. Ferner muß aus denselben Gründen wie oben, da Compression und Dilatation an derselben Stelle des Stabes aufeinander folgen, das Bild einer eingeschalteten Kalkspathplatte sich verwischen. Da endlich beim transversalen Schwingen Compression und Dilatation oberhalb und unterhalb der neutralen Zone sich entsprechen, so muß, wenn man ein Bündel Licht, welches unterhalb der neutralen Zone hindurchgegangen, oberhalb derselben wieder zurückschickt, beim Tönen kein Aufblitzen stattfinden.

Es sind somit die Erscheinungen der Doppelbrechung die bei longitudinal und transversal tönenden Glasstreifen auftreten vollständig durch die mechanischen Vorgänge, die während des Töns stattfinden, erklärt. Bewunderungswürdig bleibt dabei nur, daß uns das Licht also nicht bloß, wie bekannt, über die geringste Elasticitätsveränderung eines durchsichtigen Mediums Aufschluß giebt, sondern auch noch einen periodischen Wechsel der Elasticität, selbst wenn derselbe über tausendfach in einer einzigen Sekunde ist, mit gleicher Genauigkeit anzeigt.

Es lag nahe, aus dem Versuch mit dem rotirenden Spiegel eine Methode zur Bestimmung der Schwingungszahlen longitudinal oder transversal schwingender Stäbe zu schaffen; und in der That kann man bei gegebener Drehungsgeschwindigkeit des Spiegels durch Zählen der Streifen zwischen zwei gegebenen Objecten, etwa zwei Fäden eines

Fernrohr, annähernd die Schwingungszahl eines Glasstabs bestimmen, doch überzeugte ich mich bald, und liegt es in der Natur der Sache, daß diese Methode, anderen bekannten nicht an Genauigkeit gleich kommt, und dürfte dieselbe deshalb eine wirkliche Anwendung wohl nicht finden.

III. *Ueber ein System von geradlinigen Fransen, welche gleichzeitig mit den Newtonschen Ringen zu beobachten sind;*  
*von S. M. van der Willigen.*

(Aus d. *Verlagen en Mededeeln d. Afd. Natuurk. Dl. XVII,*  
 vom Hrn. Verf. mitgetheilt.)

Sieht man unter einer großen Neigung auf die Gläser, eine recht ebene Glasplatte und eine biconvexe Linse, zwischen welchen die Newtonschen Ringe sich bilden, so ge-



tirte und vergrößerte Bild der Flamme, des Fensters oder im Allgemeinen der Lichtquelle links oder rechts vom Centrum der Gläser erblickt wird.

Manchmal schon hatten diese Fransen meine Aufmerksamkeit erregt, ohne daß ich wußte sie mir genau zu erklären. Und dennoch ist die Erklärung, welche ich seitdem gefunden, ziemlich einfach und bietet sich natürlich dar, wenn man den Weg der Strahlen, die durch Reflexion und Theilung irgend eines einfallenden Strahls entstehen, verfolgt. Nachdem ich ihre Entstehungsweise festgestellt, war ich begierig zu wissen, ob Jemand sie vor mir wahrgenommen, und siehe da, ich fand im N. Gebler'schen Wörterbuch, daß sie schon i. J. 1815 von John Knox beobachtet wurden<sup>1)</sup>.

In der That, in einer Abhandlung voller interessanter Untersuchungen über die Ringsysteme, die sich zwischen zwei oder drei auf einander gelegten Gläsern bilden, erwähnt er auch dieser geradlinigen Fransen, welche er indess beschreibt, ohne ihren Ursprung nachzuweisen. Er sagt, alle diese Erscheinungen mit Hülfe der Karte oder des Schirms von William Herschel entdeckt zu haben, doch dient dieser Schirm bei seinen Versuchen nur dazu, das drei Mal reflectirte Bild der Flamme oder der Fenster Scheiben leichter zu finden.

Die Erklärung dieser Fransen, deren Richtigkeit aus der Messung der gegenseitigen Abstände derselben hervorgeht, ist folgende. Sey  $CD$  (Fig. 6 Taf. III) die Glasplatte,  $EF$  die darauf gelegte biconvexe Linse und  $G$  der Berührungspunkt. Der einfallende Strahl  $As$ , nachdem er durch die Linse gegangen, theilt sich bei  $b$  in zwei Theile, von denen der eine  $bc$  sogleich reflectirt wird, während der andere die Glasplatte in  $b'$  trifft, bevor er in der Richtung  $b'c'$  zurückgeworfen wird;  $bc$  wird abermals in  $c$  reflectirt, längs  $cd$ , und erreicht die Platte in  $e$ , wo er nach  $ef$  reflectirt wird; der Theil  $b'd$  endlich reflectirt sich nach  $c'd$  und wieder nach  $ef$ . Somit haben wir als Resultat zwei

<sup>1)</sup> *Philosophical Magazine* etc. 1815 p. 181 etc.

aus tretende Strahlen,  $ef$  und  $d'f$ , welche, bis auf GröÙen zweiter Ordnung coïncidiren und bei ihrem Austritt zu dem Glase parallel sind. Diese beiden Strahlen, welche aus dem einzigen Strahl  $As$  entspringen und längs  $fB$  zu dem in  $B$  befindlichen Auge gehen, haben in dem convexen Glase und der Luftschicht respective die Wege  $abedef$  und  $abb'e'd'f$  zurückgelegt; da nun diese Wege nicht genau dieselbe Länge haben, so können sie zu Interferenzphänomenen Anlaß geben. Außer dem Weg-Unterschied der aus der ungleichen Dicke der Luftschichten in  $b'$  und in  $e$  hervorgeht, muß man noch Rücksicht nehmen auf einen andern Unterschied, der aus der Krümmung der obern Fläche des convexen Glases und der nothwendig daraus folgenden Abnahme in der Dicke dieses Glases entspringt; man darf auch nicht die Veränderung in der Neigung der reflectirten Strahlen vernachlässigen, die ebenfalls aus dieser Krümmung hervorgeht.

Fig. 7 Taf. III stellt den innern Gang der Strahlen in größerem Maafstabe dar: die beiden Strahlen finden sich

ist klar, daß der Winkel  $abk$  nicht mehr gleich ist dem Winkel in  $d$ , welchen wir  $a$  genannt haben, und zwar wegen der Reflexion, welche in  $c$  gegen die obere, ziemlich stark gekrümmte Fläche der Linse stattfindet. Bei dieser Reflexion ist der Winkel von  $cb$  mit der Verticale gewachsen und folglich auch der von  $ab$  mit seiner Normale  $bh$ . Dieser Winkel erlangt einen Werth gleich

$$a + \frac{2(x - K \operatorname{tg} a)}{r},$$

weil der Abstand des Punktes  $c$  von  $GH$  gleich ist:  $x - K \operatorname{tg} a$  und  $\frac{1}{R}$  gegen  $\frac{1}{r}$  vernachlässigt werden kann, was bei unseren Versuchen vollkommen erlaubt ist.

Die Tangente dieses Winkels in dem Glase wird also für den Radius  $bc$  gleich:

$$\operatorname{tg} a + \frac{2(x - K \operatorname{tg} a)}{r \cos^2 a}$$

und folglich wird der Unterschied von  $x$  für die Punkte  $b$  und  $d$ , oder  $b'$  und  $e$  gleich seyn

$$2K \left( \operatorname{tg} a + \frac{(x - K \operatorname{tg} a)}{r \cos^2 a} \right).$$

Die Veränderung von  $a$  bedingt die des Winkels  $A$  am Punkt  $b$ , dessen Cosinus wird

$$\cos A = 2n \operatorname{tg} A \cos a \frac{x - K \operatorname{tg} a}{r}.$$

Aus Mangel an Contact der beiden Gläser, ist in  $G$  eine Luftschicht vorhanden, deren Dicke, die ich  $U$  nennen will, sich jedes Mal durch Messung der Farbenringe bestimmen läßt. Der in  $e$  durch die Luftschicht erzeugte Weg-Unterschied wird also seyn:

$$2u \cos A = \left( \frac{x^2}{R} + 2U \right) \cos A,$$

und der in  $b'$  erzeugte:

$$\begin{aligned}
& 2u \left( \cos A - 2n \operatorname{tg} A \cos a \frac{x - K \operatorname{tg} a}{r} \right) \\
&= \left\{ \frac{\left[ x - 2K \left( \operatorname{tg} a + \frac{x - K \operatorname{tg} a}{r \cos^2 a} \right) \right]^2}{R} + 2U \right\} \left( \cos A \right. \\
&\quad \left. - 2n \operatorname{tg} A \cos a \frac{x - K \operatorname{tg} a}{r} \right)
\end{aligned}$$

Dieser zweite, aus dem ersten abgeleitete Unterschied giebt den relativen Verlust unserer beiden Strahlen, welchen man den durchlaufenden Luftschichten zuschreiben muss. Allein ausserdem sind die Längen dieser beiden Strahlen in der Linse nicht mehr gleich:  $cd$  ist länger als  $c'd'$ , und  $bc$  länger als der, welcher in  $d'$  ausläuft. Diese beiden Linienpaare können als parallel betrachtet werden. Der Weg  $bcd$  hat gegen den andern einen Ueberschuss, der, wenn man ihn mit dem Brechungsindex  $n$  multiplicirt, um ihn auf Luft als Medium zu reduciren, ausgedrückt wird durch:

$$\begin{aligned}
& 2n \frac{(x - K \operatorname{tg} a)^2}{R} \cdot \frac{x - K \operatorname{tg} a}{\cos a} \left( \frac{1}{R} + \frac{1}{r} \right) \operatorname{tg} A \\
&+ 4n U \operatorname{tg} A \frac{x - K \operatorname{tg} a}{\cos a} \left( \frac{1}{R} + \frac{1}{r} \right)
\end{aligned}$$

oder, wenn wiederum  $\frac{1}{R}$  gegen  $\frac{1}{r}$  vernachlässigt wird,

$$\frac{2n(x - K \operatorname{tg} a)^2}{Rr \cos a} \operatorname{tg} A + 4n U \operatorname{tg} A \frac{x - K \operatorname{tg} a}{r \cos a}$$

Der Werth von  $K$  in diesen Formeln bezieht sich streng auf den Punkt  $c$ .

Der gesammte Weg-Unterschied für unsere beiden Strahlen  $bcdef$  und  $bb'c'd'f$ , welchen ich  $W$  nennen will, und welcher den Ueberschuss des ersten über den zweiten am Austrittspunkt  $f$  giebt, wird, reducirt auf Luft als Medium seyn:

$$\begin{aligned}
W = & \left( \frac{x^2}{R} + 2U \right) \cos A - \left\{ \frac{\left[ x - 2K \left( \operatorname{tg} a + \frac{x - K \operatorname{tg} a}{r^2 \cos a} \right) \right]^2}{R} + 2U \right\} \times \\
& \left( \cos A - 2n \operatorname{tg} A \cos a \frac{x - K \operatorname{tg} a}{r} \right) + \frac{2n(x - K \operatorname{tg} a)^2}{Rr \cos a} \operatorname{tg} A \\
& + 4n U \operatorname{tg} A \frac{x - K \operatorname{tg} a}{r \cos a} \quad (I)
\end{aligned}$$

Entfernen wir zunächst aus dieser Formel die Glieder  $\frac{x^2}{R} \cos A$  und  $-\frac{x^2}{R} \cos A$ , welche einander aufheben, so kommt:

$$W = 2U \cos A + \left\{ \frac{4K \left( \lg a + \frac{x - K \lg a}{r \cos^2 a} \right) x - 4K^2 \left( \lg a + \frac{x - K \lg a}{r \cos^2 a} \right)^2}{R} + 2U \right\} \times$$

$$\left( \cos A - 2n \lg A \cos a \frac{x - K \lg a}{r} \right) + x \cdot 2n \lg A \cos a \frac{x - K \lg a}{Rr}$$

$$+ 2n \frac{(x - K \lg a)^2}{Rr \cos a} \lg A + 4n U \lg A \frac{x - K \lg a}{r \cos a} \quad (\text{II}).$$

Vernachlässigen wir die Producte so wie die Potenzen der Correctionen von  $\lg a$  und  $\cos A$ , so vereinfachen wir die Formel möglichst.

Bei unseren Versuchen hatte  $r$  einen Werth von etwa 100 Centim, und  $R$  einen Werth von unter 5000 Centim.; mithin ist  $r^2$  gleich 10000, d. h. mehr als doppelt so groß wie  $R$ . Gegen die durch  $r$  dividirten Glieder haben wir die durch  $R$  dividirten vernachlässigt, um so mehr ist es also erlaubt, die Glieder zu vernachlässigen in deren Nenner sich  $r$  zur zweiten Potenz erhebt.

Folglich hat man:

$$W = 4 \frac{K \lg a}{R} x \cos A + 4 \frac{K \cos A}{R} \cdot \frac{x - K \lg a}{r \cos^2 a} x$$

$$- 8n \frac{K \lg a \cdot \lg A \cos a}{R} \times \frac{x - K \lg a}{r} \cdot x - 4 \frac{K^2 \lg^2 a}{R} \cos A$$

$$+ 8n \frac{K^2 \lg^2 a}{R} \lg A \cdot \cos a \times \frac{x - K \lg a}{r} - 8 \frac{K^2 \lg a}{R} \times \frac{x - K \lg a}{r \cos^2 a} \cdot \cos A$$

$$+ n U \lg A \cdot \cos a \frac{x - K \lg a}{r} + 2n x^2 \lg A \cos a \frac{x - K \lg a}{Rr}$$

$$+ 2n \frac{(x - K \lg a)^2}{Rr \cos a} \lg A + 4n U \lg A \frac{x - K \lg a}{r \cos a} \quad (\text{III}).$$

Diese, schon wenig verwickelte Formel reducirt sich noch mehr, wenn man die Glieder vereint, welche gemeinschaftliche Factoren haben. Man kann paarweise das erste und vierte Glied; das zweite und sechste, das dritte und fünfte vereinen; dies giebt

$$\begin{aligned}
W = & 4 \frac{K \lg a (x - K \lg a)}{R} \cos A + 4 \frac{K(x - K \lg a)(x - 2K \lg a)}{Rr \cos^2 a} \cos A \\
& - 8n \frac{K \lg a (x - K \lg a)^2}{Rr} \lg A \cos a + 2n \frac{x^2(x - K \lg a)}{Br} \lg A \cos a \\
& + 4n U \frac{x - K \lg a}{r} \lg A \cos a + 2n \frac{(x - K \lg a)^2}{Rr \cos a} \lg A \\
& + 4n U \frac{x - K \lg x}{r \cos A} \lg A \quad \dots \dots \dots (IV).
\end{aligned}$$

Das vierte Glied dieser Formel lässt sich noch auf das dritte reduciren und die Glieder in  $U$  können mit  $R$  multiplicirt und dividirt werden; um überall  $R$  im Nenner zu haben. Dann erhält man:

$$\begin{aligned}
W = & 4 \frac{K \lg a (x - K \lg a)}{R} \cos A + 4 \frac{K(x - K \lg a)(x - 2K \lg a)}{Rr \cos^2 a} \cos A \\
& + 2n \frac{(x - 2K \lg a)^2 (x - U \lg a)}{Rr} \lg A \cos a + 2n \frac{(x - K \lg a)^2}{Rr \cos a} \lg A \\
& + 4n UR \frac{x - K \lg a}{Rr} \lg A \cos a + 4n UR \frac{x - K \lg a}{Rr \cos a} \lg A \quad (V).
\end{aligned}$$

Ich hätte diese Formel auch auf eine andere Weise erhalten können; allein ich glaube, dass das obige Verfahren ziemlich fördersam und leicht zu verfolgen ist, weshalb ich es beibehalte.

Zieht man den gemeinschaftlichen Factor  $\frac{1}{R}$  heraus, so schreibt sich die Formel wie folgt:

$$\begin{aligned}
W = & \frac{1}{R} \left\{ 4K \lg a (x - K \lg a) \cos A \right. \\
& + 4 \frac{K(x - K \lg a)(x - 2K \lg a)}{r \cos^2 a} \cos A \\
& + 2n \frac{(x - 2K \lg a)^2 (x - K \lg a)}{r} \lg A \cos a \\
& + 2n \frac{(x - K \lg a)^2 \lg A}{r \cos a} + 4n UR \frac{x - K \lg a}{r} \lg A \cos a \\
& \left. + 4n UR \frac{x - K \lg a}{r \cos a} \lg A \right\} = \frac{Z}{R} \quad \dots \dots \dots (VI).
\end{aligned}$$

Unter dieser Form will ich daraus eine andere ableiten, welche den Werth einer Gröfse giebt, die sich leicht messen lässt. Die Fransen bilden Linien, die einem Durchmesser der Linse fast parallel sind, und es ist deren gegen-

seitiger Abstand in einer bestimmten Entfernung vom Centrum, welchen ich im Auge habe. Der Abstand zweier aufeinanderfolgender Minima dieser Fransen bestimmt sich, wenn man den Weg-Unterschied  $W$  um einen Werth gleich einer ganzen Undulation  $\lambda$  wachsen läßt. Gesetzt nämlich  $W$  sey differentiirt in Bezug auf  $x$  und der Anwuchs von  $W$  sey gleich  $\lambda$ , so wird der Anwuchs von  $x$  den Abstand zweier aufeinanderfolgender Minima geben, gemessen in Richtung  $P$  (Fig. 7 Taf. III) d. h. winkelrecht gegen die Fransen.

Differentiiren wir also das zweite Glied von (VI) in der Voraussetzung, diese Anwüchse seyen unendlich klein, oder vielmehr mit Vernachlässigung der zweiten Differenzen, so haben wir:

$$\lambda = \frac{\partial W}{\partial x} \delta x = \frac{\partial Z}{R \partial x} \quad \text{. . . . . (VII)}$$

oder

$$\delta x = R \lambda \frac{1}{\frac{\partial Z}{\partial x}} \quad \text{. . . . . (VIII)}$$

für den gegenseitigen Abstand der Fransen.

Die Größen  $A$  und  $a$  und ebenso  $K$  hängen, wegen der festen Lage des Auges, von  $x$  ab. Sey  $O$  die Höhe des Auges über der oberen Fläche der Linse, d. h. der Perpendikel, gefällt vom Auge auf die Horizontalebene, welche man sich durch  $f$  (Fig. 7) vorgestellt denken kann, und  $P$  der Abstand des Fußes dieses Perpendikels vom Punkte  $f$ , so hat man:

$$\operatorname{tg} A = \frac{P}{O}; \quad K \text{ wird } = D - \frac{x^2}{2r}$$

wenn man abermals  $\frac{1}{R}$  gegen  $\frac{1}{r}$  vernachlässigt. Substituirt man diese Werthe in unserer Formel, so wird sie beträchtlich lang, unvermeidliche Folge davon, daß die Linse oben auf liegt.

Wir haben  $x$  von  $a$  gegen  $P$  gezählt, folglich werden wir haben:

$$\frac{d \lg A}{dx} = -\frac{1}{O}; \quad \frac{\delta A}{\delta x} = -\frac{\cos^2 A}{O}; \quad \frac{d \cos A}{dx} = -\frac{\sin A \cos^2 A}{O}$$

$$\frac{d \sin A}{dx} = -\frac{\cos^2 A}{O}; \quad \frac{\delta \sin a}{\delta x} = -\frac{\cos^2 A}{nO}$$

$$\frac{d \cos a}{dx} = \frac{\sin a \cos^2 A}{nO \cos a} = \frac{\lg a \cos^2 A}{nO}; \quad \frac{\delta \lg a}{\delta x} = -\frac{\cos^2 A}{nO \cos^2 a}$$

und endlich

$$\frac{\delta K}{\delta x} = -\frac{x'}{r}$$

Die Differentiation von (VI) führt zu einer langen Reihe von Gliedern; um sie abzukürzen unterdrücke ich zunächst alle die Glieder, welche  $r^2$  im Nenner enthalten. Mit den Gliedern, worin sich  $rO$  im Nenner befindet, bedarf es mehr Behutsamkeit, weil  $O$  bei meinen Versuchen nur der dritte oder vierte Theil von  $r$  ist; deshalb habe ich diese Glieder beibehalten. Ich werde nun sectionsweise die Glieder hinschreiben, die durch Differentiation der successiven Glieder von  $W$  erhalten werden, dabei die Ordnung einhaltend, daß ich in jeder Section erst  $x$ , darauf  $K$ , dann



$$\begin{aligned}
\frac{dZ}{dx} = \frac{\delta W}{\delta x} R = & 4 K \lg a \cos A - 4 \frac{x(x-2K \lg a)}{r} \lg a \cos A \\
& + 4 \frac{K(x-K \lg a)}{O} \lg a \sin A \cos^3 A - 4 \frac{K(x-2K \lg a)}{n O \cos^3 a} \cos^4 A \dots \\
& + 4 \frac{K(2x-3K \lg a)}{r \cos^2 a} \cos A + 4 \frac{K(x-K \lg a)(x-2K \lg a)}{r O \cos^2 a} \sin A \cos^2 A \\
& + 4 \frac{K^2(3x-4K \lg a)}{r n O \cos^3 a} \cos^4 A \\
& - 8 \frac{K(x-K \lg a)(x-2K \lg a)}{r n O \cos^3 a} \lg a \cos^4 A \dots \\
& + 2n \frac{(x-2K \lg a)(3x-4K \lg a)}{r} \cos a \lg A \\
& - 2n \frac{(x-2K \lg a)^2(x-K \lg a)}{r O} \cos a \\
& + 2 \frac{(5x-6K \lg a)(x-K \lg a)}{3 O \cos^2 a} \cos^3 A \lg A \\
& + 2 \frac{(x-2K \lg a)^2(x-K \lg a)}{r O} \lg a \cos^3 A \lg A \\
& + 6n \frac{(x-K \lg a)^2}{r \cos a} \lg A - 2n \frac{(x-K \lg a)^2}{r O \cos a} \\
& + 6 \frac{K(x-K \lg a)^2}{3 O \cos^4 a} \cos^3 A \lg A - 2 \frac{(x-K \lg a)^2}{3 O \cos^2 a} \lg a \cos^3 A \lg A \dots \\
& + 4n \frac{RU}{r} \cos a \lg A - 4n \frac{RU(x-K \lg a)}{r O} \cos a \\
& + 4 \frac{KRU}{r O \cos^2 a} \cos^3 A \lg A + 4 \frac{RU(x-K \lg a)}{r O} \lg a \cos^3 A \lg A \dots \\
& + 4n \frac{RU}{r \cos a} \lg A - 4n \frac{RU(x-K \lg a)}{r O \cos a} + 4 \frac{KRU}{r O \cos^4 a} \cos^3 A \lg A \\
& - 4 \frac{RU(x-K \lg a) \lg a}{r O \cos^2 a} \cos^3 A \lg A \quad \dots \dots \dots (IX).
\end{aligned}$$

Im Ganzen 24 Glieder. Von allen Gliedern, welche aus der Differentiation von  $K$  hervorgehen, habe ich nur dasjenige aufgenommen, welches von dem ersten Gliede der Formel (VI) herkommt, weil dieses das einzige ist, welches keine Potenz von  $r$  im Nenner enthält. Die Glieder, welche  $U$  als gemeinschaftlichen Factor enthalten, können gewöhnlich vernachlässigt werden, weil man im Stande ist, einen genügenden Contact im Mittelpunkt der Gläser herzustellen.

Auch die Glieder 7, 8, 12 und 16 können vernachlässigt

Die Messung der beim Licht der beobachteten Ringe, welche in Fransen vervollständigte, gab in nach der Formel

$$\frac{1}{f} = \frac{n-1}{R} + \frac{n-1}{r} \text{ oder}$$

folgt daraus  $r = 108,1$  Centm.

Am 26. Aug. 1860 maß ich b Lampe den gegenseitigen Abstand lung des Auges, welche Fig. 7 Taf. III ist die relative Lage und der Gläser folgendermaßen: net die obere Fläche der Linse, A Auges auf deren Ebene und B die senen Minima sieht man z. B. in messer  $bd$  parallel. Zuvörderst be seitigen Abstand der Fransen in der Glase; alsdann, nachdem ich den Gl wegung von successive  $180^\circ$ ,  $90^\circ$  dabei dem Auge und der Lampe ich lassen, maß ich ..

des Abstandes nahm ich für den Abstand zweier benachbarten Minima. Der in das Protokoll der Beobachtungen eingetragene Werth von  $P$  oder  $O$  bezieht sich auf den Abstand zwischen  $O$  und dem Punkt  $e$ , genommen in der Mitte zwischen diesen beiden extremen Minimis.

Aus den Angaben der Beobachtung berechnete ich  $\delta x$  nach den Formeln (VIII) und (IX), d. h.

$$\delta x = R \lambda \frac{1}{2x}.$$

Dieser Werth muß mit dem gemessenen Abstand coincidiren. Die folgende Tafel giebt die Resultate. Alle kleinen Angaben wurden direct mit dem Zirkel aufgenommen und auf ein in 0,4 Millm. getheiltes Doppel-Decimeter übertragen.

O	P	X	K	$Ktg\alpha$	$x$	$4N$	N	$\delta x$	Diff.
27,0	26,3	1,7	0,475	0,25	1,45	1,180	0,295	0,293	0,002
27,0	25,8	2,2	0,467	0,24	1,96	0,996	0,249	0,255	— 0,006
27,0	25,0	3,1	0,444	0,22	2,88	0,792	0,198	0,196	0,004
29,0	22,0	1,6	0,476	0,20	1,40	1,192	0,298	0,331	— 0,033
29,0	21,1	2,4	0,462	0,19	2,21	1,028	0,257	0,271	— 0,014
29,0	20,4	3,1	0,446	0,18	2,92	0,768	0,197	0,205	— 0,008
29,2	9,5	3,3	0,437	0,09	3,21	1,320	0,330	0,366	— 0,039
Total — 0,093									

Alle Angaben in dieser Tafel sind Centimeter.

Der Werth von  $\lambda$  in den Berechnungen ist genommen gleich 5888 Zehntausendstel eines Millimeters für das Licht des gelben Alkohols; es ist nach Fraunhofer der Werth für den Strich D. Die beiden ersten Columnen geben die Coordinaten des Auges, bezogen als Anfang auf den Punkt, wo sich die Minima befinden. Die dritte Columnne enthält die Abscisse X des Punktes  $f$ , gezählt vom Punkte  $a$  (Fig. 7 Taf. III). Die vierte: die Dicke K der Linse an dem Ort dieser Fransen im Punkt  $c$  oder  $e$ ; die fünfte: das Product  $Ktg\alpha$  des Werthes von K in den von  $tg\alpha$  erhalten von O und P; die sechste: die Abscisse des Punktes  $e$ , welche man findet, wenn man von X die Werthe

der vorgehenden Columnne abzieht; die siebente: das Vierfache von  $N$ , directes Resultat unserer Messungen; die achte den Abstand  $N$  zweier Fransen-Minima, erhalten durch Division der Zahlen der siebenten Columnne durch 4; die neunte: diesen Abstand, berechnet mit Hülfe der Formeln (VIII) und (IX) unter Anwendung der genannten, durch die Beobachtungen gegebenen Grössen; und die letzte: den Unterschied zwischen Beobachtung und Rechnung.

Die zu meiner Verfügung stehenden Mittel verbürgten mir lange nicht die erforderliche Genauigkeit in der Bestimmung der sehr kleinen Abstände der Minima, liessen mich vielmehr in relativ sehr grosse Fehler verfallen, denen ich zum Theil die bei verschiedenen Richtungen der Linse beobachteten beträchtlichen Unterschiede zuschreiben will.

Ich enthalte mich noch mehr Beobachtungen anzuführen, hoffend dass diese, ungeachtet der nicht zu leugnenden Abweichung zwischen Beobachtung und Rechnung, dem Leser genügend erscheinen werden, die Richtigkeit der aufgestellten Erklärung zu beweisen.

Außer den Gliedern 18, 19, 20, 22, 23 und 24 der

setzt das Auge befinde sich in dem in  $O$  (Fig. 8 Taf. III) errichteten Perpendikel. Beim Lichte der monochromatischen Lampe und mit einer auf das Glas gelegten biconvergen. Linse entdeckt man die Minima leicht; allein bei Tageslicht sieht man im Allgemeinen keine Fransen in einem so gelegenen Punkt auf der Linse. Jedoch eignen sich die in Fig. 7 dargestellten Umstände, welche die Basis meiner allgemeinen Formel (IX) ausmachen, am leichtesten zur Discussion des in Rede stehenden Phänomens, hinreichender Grund, für mich, es vorzugsweise auf diese Weise zu betrachten.

Knox hat, wie mir scheint, die Fransen nicht an so gelegenen Punkten beobachtet; auch mir zeigte sich das Problem anfangs auf eine andere Weise: als die Fransen zuerst meine Aufmerksamkeit auf sich zogen, sah ich sie anderwärts.

Die Knox'schen Fransen, mit welchen ich meine Untersuchungen anfang, und welche der Leser zweifelohne auch oft gesehen hat, liegen so, wie ich oben gesagt habe; sie finden sich an Punkten wie  $f$  und  $g$  (Fig. 9 Taf. III) zu beiden Seiten und erstrecken sich noch in einer dem transversalen Durchmesser parallelen Richtung, vorausgesetzt immer,  $O$  sey die Projection des Auges und  $B$  die der Lampe. Zu ihrer Discussion versetzt man sich unter Umstände, wie sie Fig. 7 darstellt, mit der Abänderung, daß die normale Ebene durch  $ac$  (Fig. 9) ersetzt wird durch eine normale Ebene parallel mit  $ac$ , z. B. durch  $f$  gehend, wovon folgt, daß die Linse in diesem Punkt, den man nun statt  $G$  nehmen muß, nicht mehr das Glas berührt, so daß  $U$  in der Formel (IX) einen bedeutenden und immer mehr wachsenden Werth haben wird, in dem Maasse als sich die Punkte  $f$  und  $g$  den Rändern der Linse nähern.

Ich werde nun  $y$  als Ordinate längs  $Nb$  in die Formel einführen, und den neuen Werth von  $U$  durch  $\frac{y^2}{2R} + U$  ersetzen, wo  $U$  immer, wie zuvor, den Mangel des Contacts der beiden Gläser, im Centro, ausdrückt. Ueberdies

werde ich  $x = 0$  nehmen, wie wir es zu thun haben, für die Fransen die dicht am transversalen Durchmesser vorbeigehen. Ich werde endlich die sehr kleine Verringerung von  $r$  und  $R$  vernachlässigen, obwohl man sie streng genommen in Rechnung ziehen müßte, weil sie nicht mehr Radien eines größten Kreises sind, sondern eines Parallels, der von dem Centrum der Kugel, welche sie repräsentiren, sehr wenig entfernt ist. So transformirt, wird die Formel (IX):

$$\begin{aligned} \frac{\partial Z}{\partial x} = \frac{\partial W}{\partial x} R = & 4K \lg a \cos A - 4 \frac{K^2 \lg^2 a}{r O} \sin A \cos^3 A \\ & + 8 \frac{K^2 \lg a}{n O \cos^3 a} \cos^4 A \dots - 12 \frac{K^2 \lg a}{r \cos^2 a} \cos A \\ & + 8 \frac{K^2 \lg^2 a}{r O \cos^3 a} \sin A \cos^2 A - \frac{14 K^2 \lg a}{r n O \cos^3 a} \cos^3 A \\ & + 16 \frac{K^2 \lg^2 a}{r n O \cos^3 a} \cos^4 A \dots + 16 n \frac{K^2 \lg^2 a}{r} \cos a \lg A \\ & + 8 n \frac{K^2 \lg^2 a}{r O} \cos - 12 \frac{K^2 \lg^2 a}{r O \cos^2 a} \cos^3 A \lg A \\ & - 8 \frac{K^2 \lg^4 a}{r} \cos^3 A \lg A \dots + 6 n \frac{K^2 \lg^2 a}{r} \lg A \end{aligned}$$

mentale Drehung der Gläser um  $90^\circ$  und maß abermals genau auf dieselbe Weise. Ich machte jede Messung vier Mal; so daß bei der Berechnung des Mittels aus den Werthen, die in den vier unter sich rechtwinkligen Richtungen erhalten wurden, das Resultat auf sechszehn Beobachtungen beruhte. Ich bestimmte den Abstand der beiden ersten, dann der zweiten und dritten Minima dies- und jenseits des transversalen Durchmessers. Die Zahlen finden sich in der folgenden Tafel vereint; in dem Maasse als die Krümmung der Fransen schwächer ward und ein mehr oder weniger vollkommener Parallelismus sich einzustellen schien, nahm ich für den Abstand der beiden centralen Fransen das Mittel aus drei und selbst aus fünf auf angegebene Weise gemessenen Abständen.

P	D	y	L	L <sub>2</sub>	nN	N	$\delta x$	Diff.
26,5	32,0	1	0,480	0,22	1,153	0,384	0,392	- 0,08
26,5	32,0	1,5	0,475	0,22	1,074	0,358	0,367	- 0,09
26,5	32,0	2	0,467	0,21	1,006	0,335	0,336	- 0,001
26,5	32,0	3	0,443	0,20	1,419	0,284	0,271	+ 0,013
26,5	32,0	3,5	0,428	0,20	1,297	0,259	0,241	+ 0,018
								Total + 0,013

y bedeutet die schon genannte Ordinate; L ist nichts anderes als K in den Formeln; N ist der gemessene Abstand,  $\delta x$  der berechnete; nN bedeutet den von den Beobachtungen gelieferten Werth, er ist zuweilen der gegenseitige Abstand der zweiten Minima dies- und jenseits des transversalen Durchmessers und zuweilen der der dritten. Durch Vergleichung der Zahlen dieser Columnne mit denen der folgenden, ersieht man zunächst, ob n den Werth drei oder fünf hat. Die übrigen Columnnen sind schon bekannt.

Die Uebereinstimmung zwischen Beobachtung und Rechnung ist ziemlich genügend, wenn man die totale Summe der Differenzen befragt. Die negativen Abweichungen für die kleineren Werthe von y rühren davon her, daß die Krümmung der Fransen desto merklicher ist als diese dem Centre näher liegen, was für den Werth des Abstandes

der ersten Minima dieß und jenseits des transversalen Durchmessers etwas mehr giebt als das Drittel des Abstands der zweiten Minima. Der Werth von  $U$  für diese Beobachtungen ist 0,0000122 Millm.

Für etwas beträchtliche Werthe des Winkels  $A$  oder  $\alpha$  bieten die Tafeln eine genügende Uebereinstimmung zwischen Beobachtung und Rechnung dar und beweisen die Richtigkeit der Formeln, allein für kleinere Werthe von  $A$  fürchte ich, daß die Formeln immer mangelhafter werden. Verlangte man genauere Formeln, so müßte man, scheint mir, darauf Rücksicht nehmen, daß das Licht (Fig. 9 Taf. III) welches, nachdem es eine dreifache Reflexion erlitten hat, von  $k$  gegen das Auge des Beobachters geht, zum ersten Male an einem gewissen Punkte  $h$  reflectirt worden ist, der so liegt, daß  $hi$  gleich  $ki$  sey, bis auf die Correctionen. Der Winkel  $lih$  wäre  $\frac{2\sqrt{y^2+x^2}}{r \sin \alpha}$ . Der Winkel der beiden Flächen der Linse im Punkte  $i$  und in der Richtung  $ih$  würde sich leicht berechnen, indem man die Linie  $ih$  verlängerte und das Perpendikel  $Mo$  fällt, welche den



aus eine vollkommene Coincidenz der beiden Bilder entsteht. Dazu kommt die wegen Schwäche des Lichts erforderliche Nähe der Flamme, welche macht, daß eine Bewegung des Auges rechts oder links nichts hilft, um ein das gesuchte Bild überragendes Stück zu erblicken. In diesem für die Rechnung so einfachen Falle ist also die Beobachtung und um so mehr die Messung der geradlinigen Fransen beim Lichte des gesalzenen Alkohols unmöglich. Dies hindert jedoch nicht, in diesem Falle Fransen von derselben Natur, die dem Durchmesser  $bd$  fast parallel sind, in Punkten wie  $f$  und  $g$  (Fig. 9 Taf. III) zu beobachten. Diese Fransen sind indess anderer Art, als die man suchte. Sie entstehen auf die in Fig. 10 Taf. III abgebildete Weise und rühren von den durchgelassenen Ringen her, wie die bisher betrachteten Fransen aus den zurückgeworfenen Ringen entspringen. Man gewahrt leicht ein sehr helles und vergrößertes Bild der Flamme, welches durch innere Reflexion an der concaven Fläche  $EHF$  erzeugt wird; dies übertrifft an Intensität um Vieles dasjenige, welches ich bei meinen ersten Beobachtungen sah, weil es etwas weniger vergrößert ist, besonders aber weil es zum größeren Theil seinen Ursprung Strahlen verdankt, die nur eine einfache Reflexion erlitten haben. Daher auch das veränderte Ansehen der Minima dieser Fransen, welche wie noch ziemlich helle Striche das Netz der beiden Ringssysteme durchziehen, so daß scheint, man habe ein Phänomen von ganz anderer Natur vor sich.

Für diese anderen Fransen ist an unserer Formel (IX) durchaus nichts zu ändern; nur erlaube ich mir hier nicht mehr die Größe  $\alpha$  in meinen Rechnungen zu vernachlässigen, obgleich die beobachteten Fransen dem Fall der zweiten Tafel entsprechen. Ich bin dazu gezwungen durch die Betrachtung, daß der Werth von  $N$ , den man mittelst Division der angegebenen Werthe von  $3N$  und  $5N$  durch 3 usw. erhält, nicht mehr genau  $\alpha = 0$  entsprechen kann, was mich vermuthen läßt, daß die großen Abweichungen zwischen Beobachtung und Rechnung in der erwähnten Tafel

wohl zum Theil dieser etwas willkürlichen Annahme zugeschrieben werden könnten. Um  $x$  aus  $X$  durch Subtraction von  $E \operatorname{tg} \alpha$  abzuleiten, muß man  $E$ , die Dicke des Glases, kennen, welche ich  $= 9,2$  Mllm. fand.

Ich will nur eine Beobachtung vom 16. Aug. 1860 anführen. Die übrigen mußte ich verwerfen, weil sie, trotz, der vom Calcül angezeigten Rectification, so ungeheure Abweichungen gaben, daß ich sie einerseits den Unvollkommenheiten des Glases und andererseits den Fehlern in der Neigung  $A$  zuschreiben mußte, zu welchen letzteren oft eine Bewegung des Kopfes und die wenig genaue Art die Lage desselben zu bestimmen Veranlassung gaben. Ein Fehler in der Neigung aber kann sehr bedeutende in dem berechneten Werthe von  $\delta x$  herbeiführen, wie sein Einfluß sich gewiß schon in den vorhergehenden Tafeln bemerklich macht.

$O$	$P$	$y$	$X$	$E \operatorname{tg} \alpha$	$x$	$L \operatorname{tg} \alpha$	$6N$	$N$	$\delta x$	Diff.
31,5	20,0	2,0	0,55	0,34	0,21	0,17	2,204	0,367	0,390	— 0,023

Im Tageslicht experimentirend stellte ich mich drei oder vier Meter von dem halbgeöffneten Fensterladen auf und betrachtete die Gläser unter großer Neigung; während die Glasplatte den Obertheil des Paares bildete, bewegte ich den Kopf nach der Rechten oder Linken, so daß ich einen Theil beobachtete, der das von der inneren Reflexion an der oberen Fläche des Glases entstehende Bild überrandete. Auf diese Weise entdeckte ich Ueberreste von Fransen, die von dieser Reflexion herrühren und die überdies durch ihren vollständigen Parallelismus vollkommen erkennbar sind, Allein wie wenig ich auch die Lage meines Kopfes änderte, stieß ich doch wieder auf die von den durchgelassenen Ringen herrührenden Fransen, welche die ganze Oberfläche des Glases in der Umgegend des Durchmessers  $bd$  einnahmen.

Die Glieder 1, 5, 9, 17 und 21 der Formel (IX) sind

vorwaltend in der Rechnung; ersetzt man demnach  $U$ , wie ich es schon in der Formel (X) gethan, so erhält man eine Gleichung von dieser Form:

$$\frac{\partial W}{\partial \omega} R = A + Bx + Cx^2 + Dy^2$$

in welcher, wenn man nach einer rohen Schätzung für meine Beobachtungen  $A = 25$   $B = 30$   $C = 15$   $D$  nähme, sich eine leidlich richtige Idee von dem relativen Werth der Coëfficienten machen würde.

Gleichergestalt ließe die Formel (V) sich so schreiben:

$$W = \alpha + \beta x + \gamma x^2 + \delta \omega^2 + (\epsilon x + \zeta)y^2$$

oder, wenn man die aus unseren Beobachtungen gezogenen approximativen Werthe substituirt:

$$W = (n - 0,5)\lambda = -\mu + 5\mu x + 0,2\mu x^2 + 0,5\mu x^3 \\ + (0,6\mu x - 0,15)y^2 \quad (\text{XI})$$

wo  $\mu$  statt  $\frac{4K^2 \eta^2}{R} \cos A$  gesetzt ist. Daraus folgt, daß  $\beta$  fünf Mal so groß ist als  $\alpha$ , daß  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\epsilon$  höchstens drei Viertel und  $\zeta$  nur ein Siebentel desselben ist;  $n$  ist die Ordnungszahl des beobachteten Minimums. Diese Curve repräsentirt nun im Allgemeinen die Form unserer Fransen; geht man von der einen zur andern über, so muß man  $W$  um  $\lambda$  vergrößern. Ist  $y$  sehr groß gegen  $\omega$ , so giebt sie Rücksicht von den fast geradlinigen Fransen, welche gegen die Axe der  $y$ , d. h. gegen den Durchmesser  $bd$  convergiren. Ist dagegen  $x$  groß in Bezug auf  $y$ , wenn auch in geringerem Grade, so giebt sie gerade Linien parallel der Axe der  $y$ ; wenn endlich weder das eine noch das andere sehr klein ist, jedoch  $y$  zwei oder drei Mal größer als  $x$ , so hat sie viele Aehnlichkeit mit dem oberen Zweige einer Conchoide, die  $bd$  zur Directrix hat.

In der That erwägen wir zunächst, daß wenn  $x$  klein gegen  $y$  ist, die Formel wird:

$$W = \alpha + \beta x + (\epsilon x + \zeta)y^2$$

was giebt

$$x = \frac{W - \alpha - \zeta y^2}{\beta + \epsilon y^2} \quad \dots \quad (\text{XII}).$$

Die Abscisse wird also desto kleiner, je größere Werthe  
Poggendorff's Annal. Bd. CXXIII.

man der Ordinate  $y$  beilegt, und unsere Fransen in den Punkten  $f$  und  $g$  sind folglich gerade Linien, welche sich desto mehr dem Durchmesser  $ba$  nähern, je entfernter  $f$  und  $g$  vom Centrum liegen.

Wenn  $x$  und  $y$  ein solches Größenverhältnis haben, daß das Glied  $(\epsilon x + \zeta)y^2$  vernachlässigt werden kann, so hat man

$$W = \alpha + \beta x$$

was in der Umgegend von  $e$  (Fig. 8 Taf. III) gerade, und parallele Linien giebt.

Alle Glieder beibehalten, ist unsere Formel:

$$W = \alpha + \beta x + \gamma x^2 + \delta x^3 + (\epsilon x + \zeta)y^2$$

während die Gleichung der Conchoïde, die  $bd$  zur Axe der  $y$  und zur Directrix, so wie  $ca$  zur Axe der  $x$  hat, sich schreibt:

$$x^2 y^2 = (a + x)^2 (b^2 - x^2)$$

oder reducirt:

$$x^2 y^2 = a^2 b^2 - a^2 x^2 + 2ab^2 x - 2ax^2 + b^2 x^2 - x^4$$

oder, wenn man, den Anfangspunkt verlegend,  $x$  durch  $x + c$  ersetzt:

$$(x + c)^2 y^2 = (a + c + x)^2 [b^2 - (x + c)^2]$$

und wiederum reducirt:

$$\begin{aligned} (x^2 + 2cx + c^2)y^2 &= (a + c)^2 b^2 + (a + c)^2 c^2 \\ &+ b^2 - 2(a + c)b^2 x - 2(a + c)c^2 x - 2(a + c)^2 cx \\ &+ [b^2(a + c)^2]x^2 - 4(a + c)cx^2 - 2(a + c)x^3 \\ &- 2cx^3 - x^4. \end{aligned}$$

Kurz die Gleichung der Conchoïde nimmt die Form an:

$$(x^2 + 2cx + c^2)y^2 = N + Mx + Ox^2 + Px^3 + x^4$$

und wenn man  $x^2$  in dem Factor von  $y^2$ , so wie  $x^4$  im zweiten Theile vernachlässigt:

$$(2cx + c^2)y^2 = N + Mx + Ox^2 + Px^3$$

ein Ausdruck, welcher durch seine Aehnlichkeit mit unserer Formel, die Aehnlichkeit der Fransen, die man in einer mittleren Richtung zwischen  $Ma$  und  $Mb$  (Fig. 8 Taf. III) ziemlich nahe beim Centrum beobachtet, mit den Conchoïden erklärt.

Außer dem Licht des Tages und dem des gesalzenen

Alkohols wandte ich noch das einer Kerze zur Beobachtung der Fransen an. Diese ist vielleicht die beste Lichtquelle, um die Fransen noch deutlich gefärbt zu sehen und sie zugleich unter kleinem Neigungswinkel zu erblicken, was ihren gegenseitigen Abstand sehr vergrößert. Bei diesem Kerzenlichte und indem ich meine Gläser unter einer kleinen Neigung, möglichst der Verticalen nahe, betrachtete, gewahrte ich noch ein System von dichter zusammenliegenden Minimis, solchergestalt, daß sich drei Minima dieses neuen Systems auf einem schwarzen Streifen des ersten Systems zeigten. Ich habe mich nicht weiter mit demselben beschäftigt. Es ist bei einem so zusammengesetzten Lichte wie das einer Kerzenflamme zu schwierig diese Fransen zu erkennen, und andrerseits ist kein Zweifel, daß sie sich durch eine noch verwickeltere Reflexion des einfallenden Lichtes erklären lassen.

Knox hat sehr oft beim Lichte einer gewöhnlichen Lampe beobachtet und daher sah er immer die Fransen gefärbt. Die Beobachtung ist leichter als beim Tageslicht. Beim Lesen der Knox'schen Abhandlung erkennt man bald, daß er ein Glas auf eine concav-convexe Linse legte<sup>1)</sup>. Er entdeckte solchergestalt die Fransen, welche durch Reflexion des primären Ringsystems gegen die obere Fläche des Glases erzeugt worden, und der Versuch mußte ihm bei Anwendung einer Lampe leicht gelingen. Man sieht also, daß sich das Phänomen ab initio dem Knox unter der einfachsten Form darbot, während es sich mir unter der verwickeltsten Gestalt zeigte. Knox fand die Fransenstrenge geradlinig, in voller Uebereinstimmung mit unserer Formel (V), aus der alle Glieder bis auf das erste verschwinden, sobald  $r$  unendlich wird. Ich dagegen beobachtete mit meiner oben aufgelegten biconvexen Linse krumme und gegen die Ränder convergirende Fransen, welche die Berechnung aller Glieder der Formeln (V) und (IX) erforderten. Das Gelingen des Knox'schen Versuchs schreibe ich vor Allem dem Umstand an, daß kein vergrößertes

1) A. N. O. S. 63 u. ff.

Bild (was mir immer hinderlich war), seine Versuche störte, weil die untere Fläche seiner Linse concav, und überdies durch eine vollständige Schwärzung des größeren Theils ihrer Reflexionsvermögens beraubt war; auch hatte er den Vortheil, daß das von ihm angewandte Glas von geringerer Dichte war.

Endlich bleibt noch eine dritte Modification unserer Fransen übrig, diejenige, wo, bei einer obenauf gelegten concav-convexen Linse, der Werth von  $r$  in den Formeln (V) und (IX) negativ wird. Unter der mir zu Gebote stehenden Sammlung von Linsen, fand ich eine concav-convexe, die ganz gut anwendbar war. Ich legte sie, mit der concaven Seite nach oben, auf eine Glasplatte und erblickte diese dritte Form von Fransen sogleich bei Tageslicht. Man kann also nach Belieben unter diesen drei Fällen wählen. Die obere ebene Fläche giebt geradlinigte Fransen, die convexe: krumme, gegen die Ränder convergirende Fransen, und die concave: krumme, gegen die Ränder divergirende Fransen, gemäß der Formel, in welcher  $r$  negativ genommen ist, wodurch die Coëfficienten der

Erassen vorkommen in den Durchschneidungen der Ringe eines ersten Systems mit einem andern, in welchen es eingreift; und besonders in den Durchschneidungen der hellen Ringe des ersten Systems mit den hellen des zweiten und der dunklen des ersten mit den dunklen des zweiten. Man muß diese von den Maximis verstehen, d. h. von hellen Fransen mit farbigen Streifen. Unsere Minima dagegen finden sich an den Durchschnittspunkten der dunklen Ringe des ersten Systems mit den hellen des zweiten, und umgekehrt; daher das gezahnte Aussehen, welches sie zeigen, besonders näher am Mittelpunkt der Gläser. Die Minima erfordern eine ungerade, die Maxima eine gerade Anzahl von halben Undulationen zum Unterschied für die interferirenden Strahlen wie für die einander kreuzenden Ringe. Die Bemerkung also, durch welche KNOX ihre Lage bestimmt, ist eine unmittelbare und ganz natürliche Folgerung aus unserer Theorie.

Deventer, 8. August 1863.

IV: *Neue Methode, den Brechungsindex von Flüssigkeiten zu messen; von Ch. Montigny.*

(Ans d. Bull. de l'acad. roy. de Belgique Ser. II, T. XVIII vom Hrn. Verf. übersetzt.)

Die Wirkung der Gase und Flüssigkeiten auf das durchdringende Licht hängt nur von der Natur dieser Substanzen ab, weil der Einfluß der Structur sich im flüssigen Zustande, eliminirt findet; es ist daher nützlich die Beobachtungsmittel zu vervielfältigen, welche gestatten die Wirkungsweise der flüssigen und gasigen Substanzen auf das Licht zu studiren. Aus diesem Grunde beehre ich mich, der Akademie eine Methode zur Messung der Lichtbrechung der Flüssigkeiten vorzulegen, welche ich für neu halte.

Das Verfahren hat zunächst den Vorzug, daß es den Lichtstrahl aus der freien Oberfläche der Flüssigkeit in die

Luft übertreten läßt, d. h. ohne ihn zu zwingen, durchsichtige Seitenwände eines Gefäßes, welches die Flüssigkeit enthält, zu durchdringen, wie das der Fall ist bei den gewöhnlichen, zuerst von Biot angewandten Methode des *Flaschen-Prismas*<sup>1)</sup>, so wie bei dem Verfahren des *Refractometers* der HH. F. Bernard und Pichot, welches auf dem Phänomen der Seitenverschiebung beruht. Man weiß aber, wie schwer es hält sich Gläser mit vollkommen parallelen Flächen zu verschaffen, die zu beiden Methoden nothwendig sind. Zwar kam man bei mangelndem Parallelismus zuvor bestimmte Correctionen an den Resultaten anbringen, allein sie sind nicht gegen Zweifel gesichert im Fall z. B. die Flüssigkeit und das Gefäß erheblichen Temperaturveränderungen ausgesetzt werden.

Zu dieser Betrachtung will ich noch hinzufügen, daß es nicht ganz unmöglich ist, daß die Wirkung, welche die der Austrittsfläche sehr nahe liegenden Schichten auf den Lichtstrahl ausüben, merklich verschieden sey, je nachdem diese Schichten ganz frei sind oder in Contact stehen mit einem andern Mittel z. B. Glas, welches auf sie eine Capillarwirkung ausübt.

Die von mir vorgeschlagene Methode, welche in zwei gesonderte Processe zerfällt, hat zum Ausgangspunkt das bekannte Phänomen der scheinbaren Verschiebung, welches das Bild eines in einer durchsichtigen Flüssigkeit untergetauchten Körpers erfährt, wenn die ins Auge gelangenden Strahlen schief gegen die horizontale Oberfläche der Flüssigkeit austreten. Folgendes ist die erste Verfahrungsweise. Gesetzt, man habe auf den vollkommen horizontalen Boden eines leeren Gefäßes ein kleines Glaslineal R gelegt (Fig. 11 Taf. III) auf welchem eine Gerade in Millimeter getheilt ist. In der durch diese Gerade gehenden Verticalebene, welche auch die Ebene der Figur ist, stelle man einen getheilten Kreis, versehen mit Fernrohr und Fadenkreuz auf, z. B. einen Zenithalkreis. Man regulire wie gewöhnlich die Stellung dieses Instruments, neige das Fern-

1) *Traité de physique de Biot* T. III p. 220.



rohr um einen Winkel  $\alpha$ , gerechnet von der Verticale des Centrums des Kreises, so daß man einen Theilstrich  $A$  auf dem Lineal am Boden des leeren Gefäßes genau im Kreuzpunkt der Fäden des Fernrohrs erblickt. Gießt man nun langsam eine Flüssigkeit in das Gefäß bis zu einer gewissen Höhe über dem Lineal, das nicht verschoben werden darf, so wird offenbar das Auge den Theilstrich  $A$  des Lineals nicht mehr hinter den unverrückt gebliebenen Kreuzpunkt der Fäden erblicken, sondern einen anderen Theilstrich  $A'$ , welcher der Verticale des graduirten Kreises näher liegt. Bemerken wir, daß während dieses Versuchs der Neigungswinkel  $\alpha$  des Fernrohrs, welcher auch der Austrittswinkel des Strahls ist, sich nicht verändert hat.

Kennten wir den Brechungswinkel  $\alpha'$ , so würde der Werth des Index  $n$  bestimmt seyn durch die Relation  $n = \frac{\sin \alpha}{\sin \alpha'}$ . Diese Bestimmung ist aber leicht zu machen, wenn man erwägt, daß man successive hat:

$$\operatorname{tg} \alpha' = \frac{Am}{em} = \frac{Am - AA'}{em} \quad \text{und} \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{Am}{om}.$$

Bezeichnen wir mit  $d$  die scheinbare Verschiebung  $AA'$  und mit  $e$  die Dicke der flüssigen Schicht über der Platte, so haben wir

$$\operatorname{tg} \alpha' = \operatorname{tg} \alpha - \frac{d}{e} \quad . \quad . \quad . \quad (1).$$

Wir erhalten den unmittelbaren Ausdruck für den Index  $n$  in Function der Größen  $\alpha$ ,  $d$ ,  $e$ , wenn man den Nenner der Formel  $n = \frac{\sin \alpha}{\sin \alpha'}$  mit  $\frac{\cos \alpha}{\cos \alpha'}$  multiplicirt, so daß man anfangs hat:

$$n = \frac{\sin \alpha}{\operatorname{tg} \alpha'} \sec \alpha'$$

dann endlich mittelst des Ausdrucks (1)

$$n = \sin \alpha \sqrt{1 + \frac{1}{\left(\operatorname{tg} \alpha - \frac{d}{e}\right)^2}} \quad . \quad . \quad (2).$$

Was die Brechkraft der Flüssigkeit betrifft, so hat sie zum Ausdruck:

$$n^2 - 1 = \frac{\sin^2 \alpha}{\left(\lg \alpha - \frac{d}{e}\right)^2} - \cos^2 \alpha \quad (3).$$

Für die Leichtigkeit der Rechnung mittelst dieser Formeln ist zu bemerken, daß, für eine Versuchsreihe mit einer und derselben Flüssigkeit,  $\sin \alpha$  und  $\lg \alpha$  constante Werthe behalten, sobald die Neigung  $\alpha$  des Fernrohrs unveränderlich bleibt <sup>1</sup>).

Beim Experimentiren legt man das getheilte Lineal, nicht unmittelbar auf den horizontalen Boden des Gefäßes, denn dieser könnte zufälligerweise verschoben werden, sondern auf einen winkelförmigen Bügel  $abc$  (Fig. 12 Taf. III), welcher von einer äußeren Stütze  $A$  getragen wird und seinerseits das Lineal in einer gewissen Entfernung vom Boden hält. Der Bügel  $abc$  ist aus Metalldraht gebildet oder besser aus einer gebogenen Glasöhre um ihn gegen jeden chemischen Angriff seitens der Flüssigkeit sicher zu stellen. Der Scheitel  $b$  des Winkels ist drehbar am Kopf der Stütze befestigt: und an dem Schenkel  $bc$  ist eine kleine Schraube angebracht, die in eine an der Stütze befestigte Mutter eindringt; sie dient dazu, dem Bügel eine langsame Drehung um den Punkt  $b$  zu geben, damit man das getheilte Lineal in eine vollkommen horizontale Lage bringen könne. Zu dem Ende stellt man auf dieses eine Libelle, die durch drei zarte Glasfüße oberhalb der Flüssigkeit getragen wird, wie es die Figur zeigt. Das obere Ende des Fußes  $t$  ist eingelassen nicht in die Bodenplatte der Libelle sondern in eine Messingschraube, welche diese Platte durchsetzt. Diese

- 1) Der Parallelismus der flüssigen Oberfläche  $BE$  mit dem, als vollkommen horizontal vorausgesetzten Lineal  $R$  nähert die beschriebene Methode der des Refractometers, wo das flüssige Mittel von zwei parallelen Ebenen begrenzt ist. Bei letzterer Methode wird der Werth des Indexes mittelst eines Ausdrucks bestimmt, der sich leicht auf die Form (2) zurückführen läßt, aber in welchem die außerhalb gemessene und mit  $d$  des gegenwärtigen Processes verglichene Verschiebung, gleich kommt  $d \cos \alpha$ , wenn die Dicke der Flüssigkeit  $= e$  und der Austrittswinkel des Lichtstrahls  $= \alpha$ . Die scheinbare Verschiebung erhält dadurch bei dieser Methode einen geringeren Werth als der von  $d$ , gemessen auf dem in der Flüssigkeit untergetauchten Lineal.

Schraube dient dazu, im Voraus die Horizontalität der Libelle auf die gewöhnliche Weise zu ajustiren. Es ist zweckmäßig die Libelle bei gewissen Versuchen wo sie aus der absoluten Horizontalität abgelenkt werden könnte, auf dem Lineale stehen zu lassen.

Der getheilte Kreis und das Fernrohr werden, wie man gesehen, in die durch die getheilte Linie des Lineals gehende Vertical-Ebene gestellt, in einem Abstand von dieser Linie, die der Brennweite des Fernrohrs angemessen ist. Es ist gut sich bei der ganzen Messung eines Instrumentes zu bedienen, das gestattet, den Winkel  $\alpha$  bis auf eine Minute zu messen. Hat man einen repetirenden Zenithalkreis zu seiner Verfügung, so läßt sich der Winkel  $\alpha$  durch den Process der Repetition mit großer Genauigkeit bestimmen, wobei man den Theilstrich  $A$  als Ausgangspunkt nimmt.

Die Dicke  $e$  der flüssigen Schicht über dem getheilten Lineal mißt sich mit großer Genauigkeit mittelst eines Kathetometers, unter dessen Fernrohr man vertical einen zugespitzten Stift von Metall oder besser von Glas angeschraubt hat. Der Abstand zwischen den beiden Lagen des Fernrohrs an der lothrechten Säule des Instruments, wenn die Spitze des Stifts die Oberfläche der Flüssigkeit in dem Gefäße ohne Capillarität, und darauf die obere Seite des Lineals berührt, ist genau die Dicke  $e$  der flüssigen Schicht über dem Lineal.

Wenn man, um eine größere Genauigkeit zu erreichen, das Lineal mit einer sehr feinen Theilung, wenigstens einer von Millimetern, versehen hat, so wird bei großer Schiefe des Fernrohrs die Ablesung schwierig. Dieser Uebelstand wird indess vermieden, wenn man es so einrichtet, daß nicht nur der Theilstrich  $A$ , welchen man im Leeren sieht, sondern auch irgend ein anderer Theilstrich  $A'$ , den man durch Refraction erblickt, genau im Kreuzpunkt der Fäden erscheint, nachdem die Flüssigkeit in das Gefäß gegossen ist. Der Abstand  $d$  der Theilstriche  $A, A'$  wird dann genau durch eine ganze Anzahl von Millimetern geschätzt

seyn. Die Coincidenz mit dem Theilstrich  $\mathcal{A}$  lässt sich leicht durch Zusatz oder Wegnahme einer kleinen Menge der Flüssigkeit, vor der Messung der Dicke  $b$ , herstellen oder besser noch, indem man einen Glascylinder mehr oder weniger tief in die Flüssigkeit eintaucht.

Aber, kann man fragen: muß sich nicht die Wahl der dem Neigungswinkel  $\alpha$  zu gebenden GröÙe auf einen gewissen Werth werfen, welcher jeden in der Ablebung des Winkels  $\alpha$  oder den Messungen von  $d$  und  $e$  begangenen Fehler auf seinen geringsten Einfluß reducirt? Die Rechnung beweist, daß in dem einen und dem anderen Fall das Verhältniß zwischen dem Fehler, der daraus für  $n^2 - 1$  hervorgeht, und dem Beobachtungsfehler desto geringer ist als der Winkel  $\alpha$  größer. Die Schwierigkeit, die Theilstriche der Skale unter einer großen Schiefe abzulesen, muß die GröÙe des Winkels  $\alpha$  zwischen  $40^\circ$  und  $60^\circ$  begrenzen, um diese andere Fehlerquelle in der Schätzung von  $d$  zu vermeiden.

Das zweite Verfahren zur Messung des Index einer Flüssigkeit ist einfacher als das vorhergehende, weil es überhebt, ein getheiltes Lineal in die Flüssigkeit zu legen.

Ehe man die Flüssigkeit in das Gefäß gießt, läßt man in letzteres den am Fernrohr des Kathetometers angebrachten verticalen Stift herab, indem man den beweglichen Schlitten, der das ganze trägt, längs der graduirten Säule des Instruments, das wir übrigens als wohl ajustirt in seiner Stellung annehmen, herunterschiebt. Man hält damit ein im Moment, wo das Bild der Spitze des Stifts zusammenfällt mit dem Fadenkreuz im Fernrohr des getheilten Kreises, welches, wie vorhin, unter einem Winkel  $\alpha$  geneigt ist. Sey  $a$  (Fig. 13 Taf. III) der Ort wo sich alsdann in einer gewissen Entfernung vom Boden des Gefäßes, die Spitze in der Richtung  $aOC$  der Axe des geneigten Fernrohrs befindet. Gießt man nun die Flüssigkeit in das Gefäß bis ihr Niveau mehrere Millimeter über der Spitze befindlich ist, so wird das Bild dieser Spitze, wegen der Brechung, welche die Flüssigkeit auf den ganzen von der Spitze

ausgehenden Lichtstrahl ausübt, nicht mehr mit dem Fadenkreuz zusammenfallen, sondern sich schief gegen die Austrittsfläche der Flüssigkeit darstellen. Man stellt nun die scheinbare Coincidenz des Fadenkreuzes mit dem Bilde wieder her, indem man die Spitze, mittelst des beweglichen Schlittens am Kathetometer, senkrecht aus seiner ersten Stellung herabläßt. Die neue Coincidenz stellt sich ein, wenn die Spitze die Stellung  $\alpha'$  erreicht, für welche der von diesem Ort ausgehende Lichtstrahl, außerhalb der Flüssigkeit, zusammenfällt mit der Verlängerung  $C\phi$  der Axe des Fernrohrs, indem er die gebrochene Richtung  $\alpha' \phi C$  auf seiner Bahn einschlägt.

Es ist leicht den Werth  $n$  des Index in Function des Austrittswinkels  $\alpha$  zu bestimmen, so wie die Größen  $e\alpha$ ,  $e\alpha'$  um welche sich die Spitze, unterhalb des Niveau  $BE$  der Flüssigkeit befindet, wenn die beiden successiven Coincidenzen in  $\alpha$  und  $\alpha'$  stattfinden. In der That bezeichnet  $\alpha'$  den Brechungswinkel, so haben wir:

$$e\alpha : e\alpha' :: \cot \alpha : \cot \alpha'.$$

Aus dieser Proportion und der bekannten Relation  $n = \frac{\sin \alpha}{\sin \alpha'}$  leiten wir ab

$$n = \frac{e\alpha' \cdot \cos \alpha}{e\alpha \cdot \cos \alpha'}.$$

Bezeichnen wir respective mit  $e$  und  $e'$  die Abstände  $e\alpha$  und  $e\alpha'$ , erheben die vorstehende Gleichung ins Quadrat, ersetzen darauf  $\cos^2 \alpha$  durch  $1 - \sin^2 \alpha$ , und  $\cos^2 \alpha'$  durch  $1 - \frac{\sin^2 \alpha}{n^2}$  so erhalten wir:

$$n^2 = \frac{e'^2 \sin^2 \alpha + e^2 \cos^2 \alpha}{e^2}$$

und endlich

$$n = \sqrt{\sin^2 \alpha + \frac{e'^2}{e^2} \cos^2 \alpha} \quad (3).$$

Die Brechkraft anlangend, so hat sie zum Ausdruck:

$$n^2 - 1 = \cos^2 \alpha \frac{e'^2 - e^2}{e^2} \quad (4).$$

70  
Nathometers ajustirt worden Punkt, welchen auf der den Stift tragende bewege das Bild der in das leere Gradfadencrenz im Fernrohr der auf giesse man Flüssigkeit hindens nicht mehr existirt, so dem man die Spitze durch die Flüssigkeit versenkt. Man zweite Lage. Endlich schiel hinauf so weit, dass die Spaltung der Flüssigkeit, die Oberstände der beiden ersten S dieser dritten, geben genau  $d$  und  $d'$ . Wohl verstanden man ersten Stellungen genau in bleiben.

Die Rechnung zeigt, dass, bei in der Ablesung des Winkels weniger Einfluss auf den Wert der Winkel kleiner ist, und dasselbe ist, desto weniger die Beobachten in der Art.

Vergleichen wir die beiden beschriebenen Verfahrensarten, so scheint die zweite den Vorzug zu verdienen, theils wegen ihrer grösseren Einfachheit, theils weil sie nicht erfordert, dass ein getheiltes Lineal an einem besonderen Apparat horizontal in der Flüssigkeit aufgehängt sey.

Jede dieser beiden Methoden besitzt den schätzbaren Vortheil, dass sie Bestimmungen der Brechung einer Flüssigkeit unter gleichen Umständen in unbegrenzter Zahl gestattet, entweder indem man successiv die Dicke der flüssigen Schicht, oder die Grösse des Austrittswinkels von einer Versuchsreihe zur andern bei derselben Flüssigkeit abändert. Ich gebe hier folgende mit destillirtem Wasser bei Winkeln von  $50^\circ$  und  $60^\circ$  erhaltene Mittelwerthe, um zu zeigen, wie sie nach beiden Methoden unter sich und mit andern schon bekannten Resultaten übereinstimmen, wobei indeß Rücksicht zu nehmen ist auf die ungünstigen Umstände, unter welchen die folgenden Werthe bestimmt wurden.

Brechungsindex des destillirten Wassers,		
nach der		
Austrittswinkel	ersten Methode	zweiten Methode
$60^\circ$	1,334872	1,334950
$50^\circ$	1,336010	1,336101

Die in der ersten Zeile angegebenen Resultate wurden im Mittel mit Wasser von  $17^\circ,55$  C. Temperatur erhalten. Bei den zwei bei  $50^\circ$  angestellten Versuchsreihen blieb die Temperatur der Flüssigkeit beinahe auf  $16^\circ 70$ .

Die Resultate stimmen beinahe mit einander, und weichen, besonders in ihrem Mittel 1,335493, wenig ab von dem Index der Linie E, welcher nach Fraunhofer bei  $18^\circ 75$  C. gleich 1,335851 ist. Diese Linie liegt an der Gränze des Gelben und Grünen. Wenn die Ueberein-

ersten Methode oder der Spitze des Stäbchens nach der zweiten Methode leide. Bei den Beobachtungen, die bei  $50^\circ$  mit Schwefeläther und Schwefelkohlenstoff angestellt wurden, habe ich keine Spur von Irri- rung an den Theilstrichen oder der Spitze wahrgenommen, obgleich diese Flüssigkeiten, besonders die letztere, ein großes Dispersionsver- mögen besitzen.

stimmung dieser Resultate, vorausgesetzt bei derselben Temperatur erhalten, vollkommen wäre, würden sie den mittleren Index des Wassers vorstellen, weil sie anscheinend ohne Dispersions-Effect erhalten wurden. Allein diese Werthe zeigen kleine Unterschiede, welche Erläuterungen bedürfen, um die Anwendung der vorgeschlagenen Methoden vollständig zu rechtfertigen.

Die Hauptursache dieser Abweichungen entspringt unzweifelhaft aus der Mangelhaftigkeit des von mir als Kathetometer angewandten Instruments. Es ist zuvörderst wichtig zu bemerken, daß die Werthe von  $e$  und  $e'$  mit großer Genauigkeit gemessen werden müssen, und man Fehler bei ihnen noch mehr zu vermeiden hat als bei dem Winkel  $\alpha$ . In der That, nimmt man an, der Winkel sey wohl bestimmt und bleibe bei einer Beobachtungsreihe mit derselben Flüssigkeit constant, so sind die Größen  $e$  und  $e'$  deren Quadrate in den erwähnten Formeln vorkommen, die einzigen Variablen. Wenn die Messung der einen oder aller beiden fehlerhaft ist, so werden die Werthe von  $n$  bei einer und derselben Versuchsreihe merklich verschieden seyn, ungeachtet der Genauigkeit der Messung des Winkels  $\alpha$ . Fügen wir hinzu, daß die nach der zweiten Methode erhaltenen Resultate mehr ausgesetzt sind, von den Fehlern der Graduation des Kathetometers afficirt zu werden, als die nach der ersten Methode erlangten, weil die Messungen von  $e$  und  $e'$  aus drei Lagen des beweglichen Schlittens an der Säule des Kathetometers abgeleitet werden; während bei der ersten Methode die Messung von  $e$  nur von zwei Lagen des Schlittens abhängt und die Bestimmung von  $d$ , wie man oben gesehen, ganz unabhängig ist von der Genauigkeit des Kathetometers.

Diese allgemeinen Andeutungen zeigen, wie nöthig es ist, daß die kathetometrischen Messungen mit Genauigkeit gemacht seyen. Dieser Bedingung vermochte ich nicht zu genügen, weil das Instrument, welches ich in Ermangelung eines Kathetometers anwandte, von kleinen Dimensionen war und keineswegs alle Bürgschaft der gewünschten Ge-



nauigkeit darbot, namentlich in Betreff des Verniers. Bei diesen ungünstigen Umständen halte ich mich für berechtigt, die Abweichungen zwischen den angeführten Resultaten den Mängeln der Construction und nicht der Unvollkommenheit der vorgeschlagenen Methoden zuzuschreiben. Ich bin überzeugt, daß meine Resultate ohne den Mangel eines zweckmäßigen Instruments vollkommen übereinstimmend seyn würden.

Was das Instrument betrifft, mit dem ich den Austrittswinkel maß, so war es ein vortrefflicher Theodolith, der Verticalwinkel bis auf 30" messen ließ und rectificirt worden war. Ihm kann man also nicht die bezeichneten Abweichungen zuschreiben, obgleich sie bei den Messungen die unter verschiedenen Winkeln gemacht wurden, etwas größer sind als zwischen den bei einem und demselben Winkel erhaltenen Werthen <sup>1)</sup>).

- 1) Es ist wichtig hier bemerkt zu machen, daß es unmöglich ist, mittelst der Beobachtungen über die Brechung der Flüssigkeit selber, den constanten Fehler  $x$  zu berechnen, welcher, sobald der Kreis nicht vollkommen regulirt wäre, die Messung des Austrittswinkels nach der zweiten Methode afficiren würde, wenn auch die Messungen der Dicke der flüssigen Schicht mittelst eines guten Kathetometers genau erhalten wären.

Sey  $\alpha$  der fehlerhafte Winkel, welcher mit den genauen kathetometrischen Messungen von  $e$  und  $e'$  zur Berechnung der Brechung der Flüssigkeit dienen soll. Kennt man den constanten Fehler  $x$ , der aus mangelhafter Regulirung des Kreises entspringt, so würde das Brechungsvermögen mittelst der, der zweiten Methode angehörigen Formel (4) zu berechnen seyn, und man würde, ohne zuvörderst den absoluten Werth des Zeichens von  $x$  festzustellen, genau haben:

$$n^2 - 1 = \left( \frac{e'^2 - e^2}{e^2} \right) \cos^2(\alpha + x).$$

Für eine zweite Beobachtung an derselben Flüssigkeit unter einem anderen, mit dem Fehler  $x$  behafteten Winkel  $\alpha'$ , dem die genauen kathetometrischen Messungen  $e$  und  $e'$  entsprechen, hätten wir ebenso genau:

$$n^2 - 1 = \left( \frac{e'^2 - e^2}{e^2} \right) \cos^2(\alpha' + x).$$

Diese beiden Ausdrücke sind streng gleich, weil darin die Winkel  $\alpha$ ,  $\alpha'$  mit derselben Berichtigung vorkommen und weil die kathetometrischen Messungen genau sind; wir haben also

Ungeachtet der Vorsichtsmaassregeln, über welche ich mich so eben verbreitete, sind die beschriebenen Methoden, scheint mir, einer grösseren Genauigkeit fähig, als die mit dem Flaschen-Prisma, da man dabei zwei Winkel zu messen hat, den am Scheitel des Prismas und den Winkel des Ablenkungs-Minimum während der Beobachtung. Nun geben die Instrumente, deren man sich hierzu bedient, z. B. das Babinet'sche Goniometer, häufig die Winkel nur bis auf eine Minute an. Bei den beschriebenen Methoden ist nur eine einzige Winkelmessung zu machen, und die Genauigkeit derselben kann, wie vorhin gesagt, mit einem Repetitions-kreise so weit wie möglich getrieben werden. Da überdies die Brechung an der freien Oberfläche der Flüssigkeit geschieht, so bedürfen die erhaltenen Resultate keiner Correction wegen mangelnder Gleichheit in der Dicke der Glasplatten oder wegen nicht vollkommenen Parallelismus der Gläser, die ein Mittel mit parallelen Flächen begränzen.

$$\cos(\alpha + x) = \cos(\alpha' + x) \frac{e}{a} \sqrt{\frac{a'^2 - a^2}{e'^2 - e^2}}$$

Bezeichnen wir mit  $q$  den Factor

$$\frac{e}{a} \sqrt{\frac{a'^2 - a^2}{e'^2 - e^2}}$$

dessen numerischer Werth genau bekannt ist, und entwickeln  $\cos(\alpha + x)$  und  $\cos(\alpha' + x)$ , so erhalten wir leicht:

$$\tan x = \frac{\cos \alpha - q \cos \alpha'}{\sin \alpha - q \sin \alpha'}.$$

Je nachdem der hieraus abgeleitete Zahlenwerth von  $\tan x$  positiv, negativ oder Null ist, wird die constante Berichtigung  $x$  additiv, subtractiv oder ganz Null seyn. Im letzteren Fall wären die Bestimmungen von  $\alpha$  und  $\alpha'$  genau.

Wenn man, zur grösseren Sicherheit in der Bestimmung von  $x$ , die Elemente einer dritten Beobachtung mit denen der ersten oder der zweiten combinirt, und man findet genau oder sehr nahe denselben Werth von  $\tan x$ , so ist der Fehler  $x$  in der That bei allen drei Beobachtungen constant gewesen. Im entgegengesetzten Fall muß man schliessen, daß der Fehler schwankte oder daß unter den kathetometrischen Messungen fehlerhafte vorkamen. Diese besondere Rechnung bietet also ein schätzbares Mittel, den Ursprung der Abweichungen zwischen den bei einer selben Substanz erhaltenen Resultaten aufzufinden.

Erinnern wir noch daran, daß, da die Anzahl der Bestimmungen des Index der Flüssigkeit unter gleichen Bedingungen unbegrenzt ist, je nachdem man successiv den Winkel  $\alpha$  oder die Dicke  $e$  verändert, die erhaltenen speciellen Resultate nach der Methode der kleinsten Quadrate behandelt werden können, um den Werth des Endresultats strenge festzusetzen.

Allein die theoretische Speculation ist zu einem Einwurf gegen die neuen Methoden berechtigt, indem es sich fragt, auf welche Farbe des Spectrums ein Index zu beziehen sey, der mittelst Prozesse bestimmt worden ist, bei welchen anscheinend keine Dispersion auftritt? Sind nicht die Vorzüge, welche ich geltend zu machen suchte, gleichsam illusorisch gegenüber den merkwürdigen Arbeiten der HH. Kirchhoff und Bunsen über die Spectrallinien, die, schon früher als Merkzeichen zur Festsetzung des Index brechender Substanzen benutzt, dadurch eine erhöhte Wichtigkeit erlangt haben? Dieser Einwurf verliert viel von seiner Bedeutung durch einen Kunstgriff, den mir Hr. Plateau gütigst angab zur Beseitigung einer Schwierigkeit, die er selbst zuerst erhob, als ich ihn zu Rathe zog, um mich zu überzeugen, ob meine erste Methode schon vorgeschlagen worden sey. Das sehr wirksame Mittel welches dieser Physiker mir angab, besteht darin das in der Flüssigkeit befindliche getheilte Lineal zu beleuchten, dadurch, daß man eine oder die andere Farbe des Spectrums auf dasselbe wirft. Man begreift nämlich, daß, wenn, bei der ersten Methode, der Theilstrich  $A$  des Lineals bei Beleuchtung mit weißem Licht mit dem Fadenkreuz zusammenfällt, dies nicht mehr der Fall seyn wird, wenn man, ohne den Winkel  $\alpha$  oder die Dicke der flüssigen Schicht zu ändern, das rothe oder violette Licht des Spectrums auf diesen Theilstrich fallen läßt. Im ersten Fall wird die Coincidenz diesseits des Theilstrichs  $A$  in Bezug auf den Theilstrich  $A$  stattfinden, weil die rothen Strahlen weniger gebrochen werden; und im zweiten Fall wird, wegen der größeren Brechbarkeit der violetten Strahlen, die Coincidenz

jenseits dieses Striches eintreten. Bei Anwendung der zweiten Methode nimmt man einen ähnlichen Konstrukt zu Hilfe indem man den Stiel des Kathetometers zuvor eine Spitze von weißem Porcellan giebt, und diese bei den Versuchen successiv mit den verschiedenen Farben des Spectrums beleuchtet.

Als spezielle Anwendungen der neuen Methoden will ich schließlich noch hinweisen auf die Untersuchungen über den Einfluß der Temperatur oder den der Beimischung verschiedener Substanzen auf die Brechung von Flüssigkeiten genommen in Massen. Diese wichtigen Gegenstände sind schon von mehreren Physikern bearbeitet worden allein innerhalb gewisser Gränzen, die gegenwärtig leicht zu überschreiten seyn werden. Es wird auch leichter seyn, die Brechkraft von Substanzen zu bestimmen, welche wie Wachs, Fette, Stearinsäure, Schwefel usw., im geschmolzenen Zustande, nahe beim Schmelzpunkt und innerhalb gewisser Gränzen von Dicke, eine hinreichende Durchsichtigkeit besitzen, um auf sie die zweite Methode

Ich zweifle daran, weil hier die Oberflächen zweier dieser übereinander gelagerter Flüssigkeiten nicht vollkommen frei sind beim Contact mit der Luft. Es finden dann zwischen den unendlich dünnen Schichten, welche den Trennungsflächen nahe liegen, Anziehungen von der Ordnung der Capillarwirkungen statt, und diese Anziehungen sind, ungeachtet der Nicht-Adhärenz der Flüssigkeiten, nicht streng denen gleich, welche an der freien Oberfläche einer dieser Flüssigkeiten ausgeübt werden. Es ist nicht ganz unmöglich, scheint mir, daß diese Wirkungen die Dichte der besagten flüssigen Schichten verschiedentlich abändern, bis zu dem Grade, daß diese schwachen Modificationen durch ihren Einfluß auf das gebrochene Licht experimentell nachgewiesen werden können.

---

*V. Ueber den Einfluss der atomistischen Zusammensetzung C, H und O-haltiger flüssiger Verbindungen auf die Fortpflanzung des Lichtes;  
von H. Landolt.*

---

Die vorliegende Abhandlung enthält die Resultate, welche sich aus den früher (diese Annalen Bd. 117, S. 353 und Bd. 122, S. 545) mitgetheilten Bestimmungen der Brechungsexponenten und specifischen Gewichte organischer Körper ableiten lassen.

**Einfluss der Dichte auf den Brechungsindex.**

Die bei mehreren Substanzen für eine Reihe verschiedener Temperaturgrade ermittelten Brechungsexponenten benutzte ich zunächst, um die Formeln zu prüfen, welche bis dahin über den Zusammenhang zwischen der Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes in einem Mittel und dessen Dichtigkeit aufgestellt worden sind.

Die Emanationstheorie hatte, wie bekannt, eine Relation zwischen Brechungsindex  $n$  und Dichte  $d$  unter dem als *spezifisches Brechungsvermögen* bezeichneten Ausdruck:

$$\frac{n^2 - 1}{d}$$

gegeben. Diese schon seit langer Zeit vielfach angewandte aber auch oft wieder verworfene Formel ist in letzter Zeit aufs Neue in Betracht gezogen worden und zwar von Schrauf in seiner Abhandlung über die Abhängigkeit der Fortpflanzung des Lichtes von der Körperdichte <sup>1)</sup>. Den Refraktionscoefficienten  $A$  der Cauchy'schen Formel  $\mu = A + \frac{B}{\lambda^2}$  zu Grunde legend, sucht er hauptsächlich aus den von Dale und Gladstone <sup>2)</sup> mitgetheilten Bestimmungen der Brechungsindices einer Anzahl von Flüssigkeiten die Constanz von  $\frac{A^2 - 1}{d}$  bei verschiedenen Temperaturgraden nachzuweisen, und stellt außerdem für den Einfluß der Dichte auf die Dispersion die Formel  $\frac{B}{d^2}$  auf.

Aus den Untersuchungen von Biot und Arago, sowie

Obgleich meine eigenen Messungen sich nur innerhalb geringer Temperaturgränzen bewegen, so sprechen sie doch wie aus der nachfolgenden Tabelle I hervorgeht, unverkennbar für die größere Gültigkeit der Formel  $\frac{n-1}{d}$ . Ich führe für einige Flüssigkeiten die Werthe von  $\frac{\mu_n-1}{d}$  und  $\frac{A-1}{d}$  sowie der Schrauf'schen Formeln  $\frac{A^2-1}{d}$  und  $\frac{B}{d^2}$  bei verschiedenen Temperaturgraden an. Zur Berechnung der Dichtigkeiten, welche sich auf Wasser von 0° als Einheit beziehen, wurden die von Kopp gegebenen Ausdehnungsformeln benutzt.

Tabelle I.

t°	d	$\mu_n$	A	B	$\frac{\mu_n-1}{d}$	$\frac{A-1}{d}$	$\frac{A^2-1}{d}$	$\frac{B}{d^2}$
----	---	---------	---	---	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------

1) Propionsäure  $d_0 = 1,0168$ .

18	0,9970	1,3654	1,3772	0,9534	0,3866	0,3784	0,8994	0,3555
20	0,9948	1,3646	1,3764	0,3521	0,3866	0,3764	0,8991	0,3558
22	0,9926	1,3638	1,3756	0,3534	0,3866	0,3784	0,8988	0,3587
24	0,9905	1,3630	1,3747	0,3534	0,3867	0,3783	0,8984	0,3609
26	0,9882	1,3622	1,3740	0,3538	0,3867	0,3785	0,8984	0,3623
28	0,9861	1,3614	1,3732	0,3524	0,3868	0,3785	0,8981	0,3624
18	—	—	—	—	+	+	—	+
28	0,0109	0,0040	0,0040	0,0010	0,0002	0,0001	0,0013	0,0069

2) Aethyl-Alkohol  $d_0 = 0,8156$ .

12	0,8054	1,3638	1,3564	0,3170	0,4517	0,4426	1,0427	0,4887
14	0,8037	1,3630	1,3557	0,3160	0,4517	0,4426	1,0425	0,4892
16	0,8020	1,3622	1,3549	0,3150	0,4516	0,4425	1,0421	0,4897
18	0,8003	1,3613	1,3540	0,3170	0,4515	0,4423	1,0413	0,4949
20	0,7986	1,3605	1,3532	0,3163	0,4515	0,4423	1,0408	0,4944
22	0,7969	1,3598	1,3525	0,3120	0,4515	0,4424	1,0406	0,4913
24	0,7952	1,3590	1,3517	0,3120	0,4514	0,4423	1,0401	0,4934
26	0,7934	1,3582	1,3510	0,3106	0,4515	0,4424	1,0400	0,4934
28	0,7917	1,3574	1,3502	0,3103	0,4514	0,4423	1,0396	0,4951
12	—	—	—	—	—	—	—	+
28	0,0137	0,0064	0,0062	0,0067	0,0003	0,0003	0,0031	0,0064

$\Delta$	16	—	—	—
	26	0,0076	0,0039	0,00:

4 )

6	0,7982	1,3379	1,330
8	0,7956	1,3367	1,328
10	0,7931	1,3356	1,327
12	0,7904	1,3344	1,326
14	0,7877	1,3332	1,325
16	0,7850	1,3321	1,3245
18	0,7823	1,3309	1,3234
20	0,7797	1,3298	1,3223

$\Delta$	6	—	—	—
	20	0,0185	0,0081	0,0077

5) Bitter

16	1,0496	1,5412	1,5113
18	1,0477	1,5402	1,5101
20	1,0457	1,5392	1,5094
22	1,0439	1,5381	1,5085
24	1,0421	1,5371	1,5075
26	1,0401	1,5361	1,5065
$\Delta$	16	—	—
	26	0,0095	0,0051
			0,0048

Wie man bei sämtl

...



net, betrifft, so kann dieses wohl kaum als eine von der Temperatur unabhängige Constante angesehen werden.

Für die Folge bleibe ich bei der Formel

$$\frac{n-1}{d}$$

für das *specifische Brechungsvermögen* stehen. Ob dieselbe das wirkliche den Einfluss der Dichte auf die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes bestimmende Gesetz ausdrückt oder nicht, lasse ich dahin gestellt; ich erwähne nur, daß sie bei Wasser nicht in allen Fällen Gültigkeit haben kann, ebenso wenig wie die Formel  $\frac{n^2-1}{d}$ , indem mit beiden die bekannte, zuerst von Jamin <sup>1)</sup> festgestellte Thatsache, daß bei dieser Flüssigkeit <sup>2)</sup> der Brechungsindex auch unterhalb der Temperatur von 4° noch eine Zunahme zeigt, durchaus nicht in Einklang zu bringen ist.

Bei den nachstehenden Untersuchungen wende ich noch eine weitere Formel an, nämlich das Product aus Atomgewicht *P* und specifischem Brechungsvermögen:

$$P\left(\frac{n-1}{d}\right)$$

1) *Compt. rend.* XLIII p. 1191. *Pogg. Ann.* Bd. 100 S. 478.

2) Die Brechungsexponenten des Wassers sind kürzlich von Van der Willigen (*Pogg. Ann.* Bd. 122. S. 191) neu gemessen worden, und zwar mittelst eines Meyerstein'schen Spectrometers unter Anwendung von Sonnenlicht. Die Resultate stimmen vollkommen mit denjenigen überein, welche ich früher (*Pogg. Ann.* Bd. 117 p. 360) mitgetheilt hatte, und die mit Benutzung des Wasserstoffspectrums und der Natriumlinie erhalten worden waren. Da die rothe Wasserstofflinie  $\alpha$  mit *C*, die Natriumlinie mit *D*, und die grüne Wasserstofflinie  $\beta$  mit *F* coïncidirt, so ist eine Vergleichung der betreffenden Brechungsindices möglich. Van der Willigen giebt für die Temperatur 19°,5 folgende Zahlen:

<i>C</i>	<i>D</i>	<i>F</i>
1,33123	1,33307	1,33720
während ich bei 19° gefunden hatte:		
<i>H<math>\alpha</math></i>	<i>Na</i>	<i>H<math>\beta</math></i>
1,33120	1,33281	1,33723

Man sieht demnach daß das Wasserstoffspectrum mit vollständiger Sicherheit statt des Sonnenspectrums zur Bestimmung von Brechungsexponenten angewandt werden kann.

177  
Für die Untersuchung  
Zusammensetzung aus d  
der Verbindungen auf  
zunächst die isomeren Ko  
Frage ob eine verschied  
Atome in den Molecülen  
vermögen bestimmend ei  
mehrmals erörtert worden.  
sowie besonders Delffs  
von gleicher Zusammense  
Dichte auch annähernd g  
sitzen. Schrauf \*) berec  
und Dichte das specifische  
und polymerer Substanzen  
stellte den Satz auf, dafs d.  
Körper identisch sey und  
mische Formel, nicht die ra  
hältnisse in Betracht falle.  
hielten bei Isomeren aus der  
Kohlenwasserstoffen  $n(C, H_4$   
nahe übereinstimmende theil.

weilen weit verschieden, in vielen Fällen aber, besonders wenn ihre chemische Constitution eine analoge ist, auch identisch seyn können.

Zu einer sichern Entscheidung der Frage war offenbar das bisher vorhandene Beobachtungsmaterial noch zu ungenügend. Man weiß nicht ob die manchmal sehr beträchtlichen Differenzen, die im specifischen Brechungsvermögen isomerer Körper erhalten wurden, bloßen Beobachtungsfehlern, herrührend von Unreinheit der Substanz, zuzuschreiben sind, oder in der Natur der Sache liegen. Um über die Gränze der Unsicherheit ein Urtheil zu gewinnen habe ich daher von den meisten Verbindungen mehrere Präparate untersucht, und hierbei hat sich ergeben, daß die Differenzen, welche ein und derselbe Körper im specifischen Brechungsvermögen  $\frac{\mu_a - 1}{d}$  zeigte, nie den Werth 0,004 überstiegen, selbst in dem Falle nicht, wo entschieden unvollkommen reine Substanzen in Vergleichung gezogen wurden <sup>1</sup>). Stellt man dagegen die von verschiedenen Be-

1) Ich führe für einige Substanzen die bei verschiedenen Präparaten erhaltenen Resultate an:

Präp.	$d$	$\mu_a$	$\frac{\mu_a - 1}{d}$	$p \frac{\mu_a - 1}{d}$
<b>Essigsäure.</b>				
I	1,0525	1,3709	0,3524	21,15
II	1,0567	1,3718	0,3518	21,11
III	1,0516	1,3701	0,3519	21,11
IV	1,0514	1,3699	0,3518	21,11
V	1,0620	1,3738	0,3520	21,12
VI	1,0592	1,3718	0,3510	21,06

größte Differenz: 0,0014

Die Präparate I bis IV wurden von mir untersucht, V von Sauber (Pogg. Ann. Bd. 117 S. 577) und VI von Dale und Gladstone.

**Buttersaures Methyl.**

I	0,8948	1,3825	0,4275	43,60
II	0,8964	1,3842	0,4286	43,72
III	0,8969	1,3854	0,4296	43,82
IV	0,8970	1,3862	0,4306	43,92
V	0,8976	1,3869	0,4311	43,97

größte Differenz: 0,0036

denen Gruppen derselben er  
eifische Brechungsvermögen u  
zusammen.

**Tabel**

Formel	
	<b>A Meta</b>
$C_3 H_6 O_2$ $P=74$	{ Propionsäure Essigsaures Methyl Ameisensaures Aethyl
$C_4 H_8 O_2$ $P=88$	{ Buttersäure Essigsaures Aethyl
$C_5 H_{10} O_2$ $P=102$	{ Valeriansäure Buttersaures Methyl
$C_6 H_{12} O_2$ $P=116$	{ Capronsäure Valeriansaures Methyl Buttersaures Aethyl Ameisensaures Amyl

Das Präparat I ist, wie die fri  
zeigt, entschieden unrein

*d*

Formel		$d$	$\mu_n$	$\frac{\mu_n - 1}{d}$	$P \frac{\mu_n - 1}{d}$
$C_7 H_{14} O_2$ $P=130$	Oenanthylsäure	0,9175	1,4192	0,4569	59,40
	Valeriansäures Aethyl	0,8674	1,3950	0,4554	59,20
	Essigsäures Amyl	0,8574	1,4017	0,4685	60,90
$C_4 H_{10} O$ $P=74$	Butylalkohol	0,8074	1,3940	0,4879	36,11
	Aethyl-Aether	0,7166	1,3511	0,4900	36,26


## B Polymerien.

$C_2 H_4 O$	Aldehyd	0,7810	1,3298	0,4222	18,58
$C_4 H_8 O_2$	Buttersäure	0,9610	1,3955	0,4116	36,22
$C_3 H_6 O$	Aceton	0,7931	1,3572	0,4503	26,12
$C_6 H_{12} O_2$	Capronsäure	0,9252	1,4116	0,4449	51,61
$C_5 H_{10} O$	Valeral	0,7995	1,3861	0,4830	41,54
$C_{10} H_{20} O_2$	Valeriansäures Amyl	0,8581	1,4098	0,4775	82,14

Aus der vorstehenden Tabelle zeigt sich zunächst daß metamere Körper, trotzdem dieselben oft erheblich verschiedene Brechungsexponenten und Dichten besitzen, doch in ihrem specifischen Brechungsvermögen sich einander meist sehr nähern. Hier, sowie anschließend auch im Refractionsäquivalent, findet man zum Theil nur geringe Abweichungen, die sich durch die Beobachtungsfehler vollkommen erklären lassen, in einigen Fällen aber auch dieselben stark überragende. Da die zusammengesetzten Aether, wie schon früher erwähnt, Körper sind, welche sich nur schwierig ganz rein erhalten lassen, so ist durch dieselben die obwaltende Frage nicht sicher endgültig zu entscheiden, in jedem Falle geht aber aus den erhaltenen Zahlen hervor, daß wenn die Gruppierung der Atome auf das Brechungsvermögen einen Einfluß hat, dieser nur ein geringer seyn kann.

Bei den polymeren Substanzen ergibt sich, daß während Brechungsindex und Dichte für die Verdoppelung der C, H und O-Atome sich vermehren, daß specifische Brechungsvermögen dagegen in allen Fällen eine kleine Verminderung erfährt. Die Refractionsäquivalente polymerer Körper werden daher nicht genau in multipeln Verhältnisse zu einander stehen.

von andern Substanzen in g  
darstellen. Zeigt ein solches  
Refraktionsvermögen wie die  
dung, so ist offenbar bloß  
Elemente, nicht aber die vers  
auf die optischen Eigenschafte  
Flüssigkeiten der erwähnt  
bei homologen Reihen, indem  
ferner Glieder die Zusammens  
genden haben kann z. B.



Ferner wird sich eine Flüss  
mentaranalyse denselben Gehal  
würde wie das Glycerin  $C_3 H_8$   
halten lassen:



von der Zusammensetzung der Methylsalicylsäure  $C_8H_8O_3$  dargestellt werden:



Ich habe diese Mischungen nach den angegebenen Aeq.-Verhältnissen dargestellt und ihre Brechungsindices sowie die spezifischen Gewichte bei der Temperatur  $20^\circ$  bestimmt. Es ergaben sich dabei folgende Zahlen (Tab. III), welche ich mit den Beobachtungen für die wirklichen chemischen Verbindungen, deren Zusammensetzung das Gemenge hat sowie für dessen Componenten in Vergleichung stelle.

Tabelle III.

	$d$	$\mu_a$	$\mu_\beta$	$\mu_\gamma$	$\frac{\mu_a - 1}{d}$	$P\left(\frac{\mu_a - 1}{d}\right)$
1 Aeq. Essigsäure	1,0514	1,3699	1,3765	1,3802		
1 Aeq. Buttersäure	0,9610	1,3955	1,4025	1,4065		
Mischung	0,9930	1,3851	1,3918	1,3956	0,3878	28,69
Propionsäure	0,9963	1,3846	1,3913	1,3951	0,3860	28,57
3 Aeq. Methylalkohol	0,7964	1,3279	1,3332	1,3362		
1 Aeq. Amylalkohol	0,8135	1,4057	1,4128	1,4169		
Mischung	0,8038	1,3640	1,3700	1,3735	0,4528	20,83
Aethylalkohol	0,8011	1,3605	1,3667	1,3700	0,4501	20,70
2 Aeq. Aethylalkohol	0,8011	1,3605	1,3667	1,3700		
1 Aeq. Amylalkohol	0,8135	1,4057	1,4128	1,4169		
Mischung	0,8065	1,3822	1,3887	1,3925	0,4738	28,43
Propylalkohol	0,8042	1,3794	1,3858	1,3893	0,4717	28,30
1 Aeq. Aethylalkohol	0,8011	1,3605	1,3667	1,3700		
2 Aeq. Amylalkohol	0,8135	1,4057	1,4128	1,4169		
Mischung	0,8104	1,3961	1,4028	1,4068	0,4887	36,17
Butylalkohol	0,8074	1,3940	1,4007	1,4045	0,4879	36,11
1 Aeq. Propionsäure	0,9963	1,3846	1,3913	1,3951		
1 Aeq. Wasser	1,0000	1,3311	1,3371	1,3404		
Mischung	1,0220	1,3856	1,3925	1,3964	0,3773	34,71
1 Aeq. Aethylalkohol	0,8011	1,3605	1,3667	1,3700		
1 Aeq. Ameisensäure	1,2211	1,3693	1,3764	1,3804		
Mischung	0,9602	1,3610	1,3675	1,3710	0,3760	34,59

	$d$	$\mu_\alpha$	$\mu_\beta$	$\mu_\gamma$	$\frac{\mu_\alpha - 1}{d}$	$P\left(\frac{\mu_\alpha - 1}{d}\right)$
1 Aeq. Methylalkohol	0,7964	1,3279	1,3332	1,3362		
1 Aeq. Essigsäure	1,0514	1,3699	1,3765	1,3802		
Mischung	0,9606	1,3594	1,3656	1,3692	0,3741	34,42
Glycerin	1,2615	1,4706	1,4785	1,4828	0,3731	34,32
1 Aeq. Bittermandelöl	1,0474	1,5391	1,5624	1,5775		
1 Aeq. Ameisensäure	1,2211	1,3693	1,3764	1,3804		
Mischung	1,0876	1,4900	1,5089	1,5210	0,4505	68,48
Methylsalicylsäure	1,1824	1,5302	1,5521	1,5672	0,4484	68,16

Ein Blick auf die obige Tabelle III zeigt, dass das spezifische Brechungsvermögen und somit auch das Refractionsäquivalent der chemischen Verbindungen in überraschendem Grade zusammenfällt mit demjenigen der gleich zusammengesetzten Gemenge. Diefs ist am auffallendsten bei den Glycerinmischungen, wo die Atomgruppierung eine vollständig verschiedene ist, und auch Dichte und Brechungsindices der einzelnen Gemenge erheblich von einander abweichen. Es darf jedoch nicht übersehen werden, dass in allen Fällen eine gewisse, wenn auch nur kleine Differenz zwischen dem spezifischen Brechungsvermögen der Mischung und Verbindung auftritt, indem bei der erstern die Zahlen constant etwas gröfser sind als bei der letztern <sup>1)</sup>. Eine vollständige Identität findet also in obiger Beziehung nicht statt, wohl aber stets eine grofse Annäherung.

Es ergibt sich somit auch bei diesen Flüssigkeiten, wie früher bei den eigentlichen isomeren Substanzen, dass das spezifische Brechungsvermögen hauptsächlich bedingt ist durch das Aequivalentverhältnifs der Elemente, die Atomgruppierung dagegen nur einen geringen Einfluss auf dasselbe ausübt. Dass ein solcher aber dennoch in gewissen Fällen vorhanden ist, geht aus den nachfolgenden Untersuchungen über homologe Reihen hervor.

1) Bei Anwendung der Formel  $\frac{n^2 - 1}{d}$  statt der oben benutzten ergeben sich ganz die nämlichen Resultate.



## Homologe Reihen.

Berthelot <sup>1)</sup> hat zuerst Betrachtungen über das spezifische Brechungsvermögen der Glieder homologer Reihen angestellt. Auf Grund noch sehr beschränkten Versuchsmaterials fand er, daß Körper, deren chemische Formeln um  $n \cdot \text{CH}_2$  verschieden sind, eine Differenz von  $n \cdot 18$  Einheiten in der Größe  $P\left(\frac{n^2-1}{d}\right)$  zeigen. Schrauf <sup>2)</sup> sucht aus Beobachtungen von Delffs nachzuweisen, daß bei der Reihe  $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_2$  das Refraktionsäquivalent  $P\left(\frac{n^2-1}{d}\right)$  eines Gliedes das Mittel ist aus den Refraktionsäquivalenten zweier gleich weit von demselben entfernter Glieder, und stellt den Satz auf, daß bei homologen Reihen die optischen Eigenschaften der Glieder eine homologe Bildungsweise besitzen sollen. Dale und Gladstone <sup>3)</sup> begnügen sich darzuthun, daß für das Increment  $\text{CH}_2$  das spezifische Brechungsvermögen  $\frac{n-1}{d}$  stets zunimmt.

Unter den von mir untersuchten Substanzen findet sich eine größere Anzahl Körper, welche homologe Reihen mit der Zusammensetzungsdifferenz  $\text{CH}_2$  bilden. Ich stelle in der nachfolgenden Tabelle IV die für dieselben erhaltenen Zahlenresultate zusammen:

1) *Ann. de chim. et de phys.* [3] T. XLVIII, p. 312

2) *Pogg. Ann.* Bd. 119, S. 461.

3) *Phil. Transact.* 1863, p. 317.

Tabelle IV.

Formel	P	d	$\mu_a$	$\frac{\mu_a - 1}{d}$	Diff.	$P \left( \frac{\mu_a - 1}{d} \right)$	Diff.
I. Säuren $C_n H_{2n} O_2$ .							
Ameisensäure . . . .	46	1,2211	1,3693	0,3024	0,0494	13,91	7,20
Essigsäure . . . .	60	1,0514	1,3699	0,3518	0,0342	21,11	7,46
Propionsäure . . . .	74	0,9963	1,3846	0,3860	0,0256	28,57	7,65
Buttersäure . . . .	88	0,9610	1,3955	0,4116	0,0203	36,22	7,83
Valeriansäure . . . .	102	0,9313	1,4022	0,4319	0,0130	44,05	7,56
Capronsäure . . . .	116	0,9252	1,4116	0,4449	0,0120	51,61	7,79
Oenanthylsäure . . . .	130	0,9175	1,4192	0,4569		59,40	
II. Alkohole $C_n H_{2n+2} O$ .							
Methylalkohol . . . .	32	0,7964	1,3279	0,4117	0,0384	13,17	7,53
Acetylalkohol . . . .	46	0,8011	1,3605	0,4501	0,0216	20,70	7,60
Propylalkohol . . . .	60	0,8042	1,3794	0,4717	0,0162	28,30	7,81
Butylalkohol . . . .	74	0,8074	1,3940	0,4879	0,0108	36,11	7,78
Amylalkohol . . . .	88	0,8135	1,4057	0,4967		43,89	

III. Zusammengesetzte Aether C <sub>n</sub> H <sub>2n</sub> O <sub>2</sub> .									
{	Essigs. Methyl . . .	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>	74	0,9053	1,3592	0,3967	0,0143	29,36	6,81
	Essigs. Aethyl . . .	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>	88	0,9015	1,3705	0,4110		36,17	
{	Butters. Methyl . . .	C <sub>5</sub> H <sub>10</sub> O <sub>2</sub>	102	0,8976	1,3869	0,4311	0,0113	43,97	7,35
	Butters. Aethyl . . .	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>2</sub>	116	0,8906	1,3940	0,4424		51,32	
{	Valerians. Methyl . . .	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>2</sub>	116	0,8809	1,3927	0,4458	0,0096	51,71	7,49
	Valerians. Aethyl . . .	C <sub>7</sub> H <sub>14</sub> O <sub>2</sub>	130	0,8674	1,3950	0,4554		59,20	
{	Ameisens. Aethyl . . .	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>	74	0,9078	1,3580	0,3944	0,0166	29,18	6,99
	Essigs. Aethyl . . .	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>	88	0,9015	1,3705	0,4110		36,17	
{	Butters. Methyl . . .	C <sub>5</sub> H <sub>10</sub> O <sub>2</sub>	102	0,8976	1,3869	0,4311	0,0147	43,97	7,74
	Valerians. Methyl . . .	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>2</sub>	116	0,8809	1,3927	0,4458		51,71	
{	Butters. Aethyl . . .	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>2</sub>	116	0,8906	1,3940	0,4424	0,0130	51,32	7,88
	Valerians. Aethyl . . .	C <sub>7</sub> H <sub>14</sub> O <sub>2</sub>	130	0,8674	1,3950	0,4554		59,20	
{	Benzoës. Methyl . . .	C <sub>9</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>	136	1,0882	1,5116	1,4701	0,0075	63,94	7,70
	Benzoës. Aethyl . . .	C <sub>9</sub> H <sub>10</sub> O <sub>2</sub>	150	1,0491	1,5010	0,4776		71,64	
{	Aldehyd . . . . .	C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> O	44	0,7810	1,3298	0,4222	0,0281	18,58	7,54
	Aceton . . . . .	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O	58	0,7931	1,3572	0,4503		26,12	

Aus Tabelle IV läßt sich Folgendes ergeben:

1. Die Brechungsindices der Glieder homologer Reihen nehmen mit steigender Anzahl der C und H-Atome zu <sup>1)</sup>. Es können jedoch auch Fälle vorkommen, wo das Umgekehrte eintritt, so zeigt z. B. das benzoësaure Aethyl  $C_8H_{10}O_2$  einen kleineren Brechungsindex als das benzoësaure Methyl  $C_8H_8O_2$  <sup>2)</sup>.

1) Interesse hat es noch, die Brechungsexponenten der Glieder homologer Reihen bei der Temperatur ihrer Siedepunkte oder in gleichen Abständen davon zu vergleichen. Da das spezifische Brechungsvermögen  $\frac{n-1}{d} = R$  eine bei allen Temperaturen gleich bleibende Constante seyn soll, so muß, wenn das spezifische Gewicht einer Flüssigkeit bei ihrem Siedepunkte ( $d_s$ ) bekannt ist, wenigstens annähernd der Brechungsindex für diese Temperatur ( $\mu_s$ ) sich aus:

$$\mu_s = 1 + R \cdot d_s$$

ergeben. Für diejenigen Säuren der Reihe  $C_nH_{2n}O_2$ , deren Ausdehnung von Kopp bestimmt worden war, ist nachstehend diese Berechnung in Bezug auf  $\mu_s$  (Col. I) ausgeführt; die spezifischen Gewichte wurden bezogen auf Wasser von 0° als Einheit und für  $R$  die aus den Beobachtungen bei 20° erhaltene Constante benutzt. Ähnliche Zahlen

2. Das specifische Brechungsvermögen vergrößert sich stets mit dem Steigen der Reihe. Die Differenzen für das Increment  $\text{CH}_2$  bleiben sich nicht gleich, sondern werden um so kleiner, je mehr die Zahl der C und H-Atome in den Gliedern wächst.

3. Das Refractionsaequivalent  $P\left(\frac{n-1}{d}\right)$  nimmt in allen Fällen für die Zusammensetzungsdifferenz  $\text{CH}_2$  um eine ziemlich gleich bleibende GröÙe zu. Für diese kann im Mittel die Zahl 7,60 gesetzt werden.

Anstatt Reihen von Körpern zu bilden, deren chemische Formeln um  $\text{CH}_2$  von einander abweichen, kann man auch solche von andern Zusammensetzungsdifferenzen combiniren, und erhält auch hier in den Refractionsaequivalenten wieder bestimmte Unterschiede. Es tritt dabei aber meist der Fall ein, daß Substanzen zusammen gelangen, die obgleich in ihren empirischen Formeln die nämliche Differenz zeigend, doch durchaus nicht homolog sind, sondern in sehr verschiedenen chemischen Beziehungen zu einander stehen. Bei solchen Zusammenstellungen ist es nun oft möglich, bis zu einem gewissen Grade mit Bestimmtheit einen Einfluß der ungleichartigen chemischen Constitution der Körper auf das Licht nachzuweisen, und zwar mit Hülfe der Formel  $P\left(\frac{n-1}{d}\right)$ . Man erkennt nämlich daß Körper von gleicher Zusammensetzungsdifferenz nur dann in den Refractionsaequivalenten einen ganz übereinstimmenden Unterschied zeigen, wenn sie stets in derselben chemischen Relation zu einander sich befinden. Die Ursachen der Uebereinstimmung oder Abweichung in den betreffenden Zahlen werden klar, sowie man rationelle chemische Formeln zu Grunde legt, und zwar geben hierbei die typischen vollkommenen Aufschluß.

während ab, und dasselbe ist der Fall bei den zusammengesetzten Aethern  $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_2$ . Bei den Alkoholen von der allgemeinen Formel  $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}\text{O}$  bemerkt man dagegen eine stetige Vermehrung der Dichte für die Zunahme an Kohlenstoff und Wasserstoff.

Unter dem vorhandenen Beobachtungsmaterial befinden sich z. B. mehrere Verbindungen, deren empirische Formeln die Differenz  $\text{C H}_2 \text{O}$  zeigen. Dieselben lassen sich in drei Gruppen einteilen, in denen je in zwei Körper, wie aus ihren typischen Formeln hervorgeht, in analogem chemischen Verhältnisse zu einander stehen. Vergleicht man die Differenzen in den Refraktionsäquivalenten, so stellen sich dieselben als beinahe vollkommen identisch heraus bei Körpern von der gleichen Gruppe, zwischen den verschiedenen Gruppen bemerkt man dagegen, wenn auch nur kleine, doch unverkennbar hervortretende Unterschiede

Tabelle V Zusammensetzungsdifferenz  $\text{C H}_2 \text{O}$ .

	Empirische Formel	Typische Formel	$P\left(\frac{\mu_L-1}{d}\right)$	Diff.
{ Aldehyd	$\text{C}_2 \text{H}_4 \text{O}$	$\text{C}_2 \text{H}_4 \begin{matrix} \text{O} \\ \text{H} \end{matrix} \}$	18,58	9,99
{ Propionsäure	$\text{C}_3 \text{H}_6 \text{O}_2$	$\text{C}_3 \text{H}_4 \begin{matrix} \text{O} \\ \text{H} \end{matrix} \} \text{O}$	28,57	

	Empirische Formel	Typische Formel	$P\left(\frac{\mu_n-1}{d}\right)$	Diff.
{ Bittermandelöl	$C_7 H_6 O$	$C_7 H_5 \begin{smallmatrix} O \\ H \end{smallmatrix}$	54,56	9,38
{ Benzoes. Methyl	$C_8 H_8 O_2$	$C_7 H_5 \begin{smallmatrix} O \\ CH_3 \end{smallmatrix} \} O$	63,94	
{ Salicylige Säure	$C_7 H_6 O_2$	$C_7 H_4 \begin{smallmatrix} O'' \\ H_2 \end{smallmatrix} \} O$	58,90	8,70
{ Methylsalicylsäure	$C_8 H_8 O_2$	$C_7 H_4 \begin{smallmatrix} O'' \\ CH_3 \cdot H \end{smallmatrix} \} O_2$	68,16	

Wie wir früher gesehen haben, besitzen isomere Verbindungen nahe übereinstimmende Refraktionsäquivalente, sie werden daher einander in Bezug auf die eben angeführten Verhältnisse ersetzen können. Substituiert man z. B. in Tabelle IV bei der Reihe der Säuren  $C_n H_{2n} O_2$  ein Glied, durch eine mit demselben isomere Aetherart, so zeigt diese doch mit den angrenzenden Gliedern im Refraktionsäquivalent wieder ungefähr die Differenz 7,6 für  $CH_2$ . In Tabelle V sieht man, dass Aceton und Buttersäure dieselbe Differenz für  $CH_2 O$  geben, wie Aldehyd und Propionsäure oder Valeral und Capronsäure, obschon die chemische Relation zwischen den zwei erstern Körpern nicht ganz genau die nämliche ist, wie bei den beiden andern Paaren. An Stelle des Acetons  $C_3 H_6 O \begin{smallmatrix} O \\ CH_3 \end{smallmatrix}$  müsste Propylaldehyd  $C_3 H_6 O \begin{smallmatrix} O \\ H \end{smallmatrix}$  stehen; die chemische Constitution dieser zwei mit einander isomeren Körper ist indess eine ähnliche, sie gehören beide dem Typus  $\begin{smallmatrix} H \\ H \end{smallmatrix}$  an, und so werden ihre Refraktionsäquivalente so nahe übereinstimmen, dass eine gegenseitige Vertretung möglich ist. Bis zu einem gewissen Grade übt also die verschiedene Atomlagerung keinen merklichen Einfluss auf die angeführten Beziehungen, nämlich dann, wenn die einander ersetzenden isomeren Substanzen sich auf den nämlichen chemischen Typus beziehen; sie äußert sich aber, wie die Tabelle V zeigt

sogleich, sowie das typische Verhältniß zweier Körper gegenseitig ein anderes wird.

Ganz die nämlichen Erscheinungen lassen sich noch vielfach erkennen, wenn man Körper von gleichen chemischen Formeldifferenzen zusammenstellt, falls nur die Beobachtungen die nöthige Genauigkeit besitzen. Von solchen Betrachtungen führe ich als die am meisten Interesse darbietenden noch diejenigen an, welche sich auf die Ermittelung der Refraktionsäquivalente der Elemente C, H, O selbst beziehen. In der nachfolgenden Tabelle VI sind je zwei Körper combinirt, deren Formeln bloß eine Differenz von 1 Atom C zeigen, während die Atomzahl der übrigen Elemente dieselbe bleibt; Tabelle VII enthält Substanzen von der Zusammensetzungsdifferenz  $H_2$ , und Tabelle VIII endlich Körper, von welchen der eine stets 1 Atom O mehr enthält als der andere. Diejenigen Körper, welche in dem nämlichen typischen Verhältniß zu einander stehen, sind jedesmal in eine Gruppe zusammengefaßt. Die sehr stark brechenden Substanzen wurden aus einem später zu erörternden Grunde von den übrigen aus-



Tabelle VI. Zusammensetzungsdifferenz 1 Atom C.

	Empirische Formel	Typische Formel	$d$	$\mu_\alpha$	$\frac{\mu_\alpha - 1}{d}$	$P\left(\frac{\mu_\alpha - 1}{d}\right)$	Diff.
{ Methylalkohol Aldehyd	C H <sub>4</sub> O	C $\begin{matrix} \text{H}_3 \\ \text{H} \end{matrix} \left\{ \begin{matrix} \text{O} \\ \text{O} \end{matrix} \right.$	0,7964	1,3279	0,4117	13,17	5,41
	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> $\left\{ \begin{matrix} \text{O} \\ \text{H} \end{matrix} \right.$	0,7810	1,3298	0,4222	16,58	
{ Aethylalkohol Aceton	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> $\left\{ \begin{matrix} \text{O} \\ \text{H} \end{matrix} \right.$	0,8011	1,3605	0,4501	20,70	5,42
	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> $\left\{ \begin{matrix} \text{O} \\ \text{CH}_3 \end{matrix} \right.$	0,7931	1,3572	0,4563	26,12	
{ Butylalkohol Valeral	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O	C <sub>4</sub> H <sub>2</sub> $\left\{ \begin{matrix} \text{O} \\ \text{H} \end{matrix} \right.$	0,8074	1,3940	0,4879	36,11	5,43
	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O	C <sub>4</sub> H <sub>2</sub> $\left\{ \begin{matrix} \text{O} \\ \text{H} \end{matrix} \right.$	0,7995	1,3861	0,4830	41,54	
{ Aethylenalkohol Propionsäure	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> $\left\{ \begin{matrix} \text{O}_2 \\ \text{H}_2 \end{matrix} \right.$	1,1092	1,4253	0,3834	23,77	4,80
	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> $\left\{ \begin{matrix} \text{O} \\ \text{H} \end{matrix} \right.$	0,9963	1,3846	0,3860	28,57	
{ Milchsäure Essigsäureanhydrid	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O <sub>3</sub>	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> $\left\{ \begin{matrix} \text{O}_3 \\ \text{O}^{\sim} \end{matrix} \right.$	1,2427	1,4392	0,3534	31,81	4,75
	C <sub>4</sub> H <sub>6</sub> O <sub>3</sub>	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> $\left\{ \begin{matrix} \text{O} \\ \text{O} \end{matrix} \right.$	1,0636	1,3883	0,3584	36,56	

Formel	$d$	$\mu_a$	$\frac{\mu_a - 1}{d}$	$P\left(\frac{\mu_a - 1}{d}\right)$	Diff.
$\left\{ \begin{array}{l} \text{O} \\ \vdots \end{array} \right\}$	1,0722	1,5445	0,5076	47,73	6,63
$\left\{ \begin{array}{l} \text{O} \\ \vdots \end{array} \right\}$	1,0474	1,5391	0,5147	54,56	

Einsetzungsdifferenz 2 Atome H.

$\left\{ \begin{array}{l} \text{O} \\ \vdots \end{array} \right\}$	0,7810	1,3299	0,4222	16,58	2,12
$\left\{ \begin{array}{l} \text{O} \\ \vdots \end{array} \right\}$	0,8011	1,3605	0,4501	20,70	
$\left\{ \begin{array}{l} \text{O} \\ \vdots \end{array} \right\}$	0,7931	1,3572	0,4503	26,12	2,18
$\left\{ \begin{array}{l} \text{O} \\ \vdots \end{array} \right\}$	0,8042	1,3794	0,4717	28,30	
$\left\{ \begin{array}{l} \text{O} \\ \vdots \end{array} \right\}$	0,7995	1,3861	0,4830	41,54	2,35
$\left\{ \begin{array}{l} \text{O} \\ \vdots \end{array} \right\}$	0,8135	1,4057	0,4987	43,89	

	Empirische Formel	Typische Formel	$d$	$\mu_a$	$\frac{\mu_a - 1}{d}$	$P\left(\frac{\mu_a - 1}{d}\right)$	Diff.
{ Essigsäure	$C_2 H_4 O_2$	$C_2 H_3 O \left\{ \begin{array}{l} O \\ H \end{array} \right.$	1,0514	1,3699	0,3518	21,11	2,66
	$C_2 H_6 O_2$	$C_2 H_4'' \left\{ \begin{array}{l} O_2 \\ H_2 \end{array} \right.$	1,1092	1,4253	0,3834	23,77	
{ Milchsäure	$C_3 H_6 O_3$	$C_3 H_4 O'' \left\{ \begin{array}{l} O_2 \\ H_2 \end{array} \right.$	1,2427	1,4392	0,3534	31,81	2,51
	$C_3 H_8 O_3$	$C_3 H_5''' \left\{ \begin{array}{l} O_2 \\ H_2 \end{array} \right.$	1,2615	1,4706	0,3731	34,32	
Glycerin							

Tabelle VIII. Zusammensetzungsdifferenz 1 Atom O.

{ Aldehyd	$C_2 H_4 O$	$C_2 H_3 O \left\{ \begin{array}{l} O \\ H \end{array} \right.$	0,7810	1,3298	0,4222	18,58	2,53
	$C_2 H_4 O_2$	$C_2 H_3 O \left\{ \begin{array}{l} O \\ H \end{array} \right.$	1,0514	1,3699	0,3518	21,11	
{ Aceton	$C_3 H_6 O$	$C_2 H_3 O \left\{ \begin{array}{l} O \\ CH_3 \end{array} \right.$	0,7931	1,3572	0,4503	26,12	2,45
	$C_3 H_8 O_2$	$C_3 H_5 O \left\{ \begin{array}{l} O \\ H \end{array} \right.$	0,9963	1,3846	0,3860	28,57	
{ Propionsäure							2,51
{ Valeral	$C_5 H_{10} O$	$C_5 H_9 O \left\{ \begin{array}{l} O \\ H \end{array} \right.$	0,7995	1,3861	0,4830	41,54	2,51
	$C_5 H_{10} O_2$	$C_5 H_9 O \left\{ \begin{array}{l} O \\ H \end{array} \right.$	0,9313	1,4022	0,4319	44,05	
Valeriansäure							

normal	$d$	$\mu_{12}$	$\frac{\mu_{12}-1}{d}$	$p\left(\frac{\mu_{12}-1}{d}\right)$	Diff
$\left\{ \begin{array}{l} 0 \\ 0_1 \end{array} \right\}$	0,8011	1,3605	0,4501	28,70	3,07
	1,1092	1,4253	0,3834	23,77	
$\left\{ \begin{array}{l} 0 \\ 0_1 \end{array} \right\}$	0,9983	1,3846	0,3868	28,57	3,24
	1,2427	1,4392	0,3534	31,81	
$\left\{ \begin{array}{l} 0 \\ 0_1 \end{array} \right\}$	1,0474	1,5391	0,5147	54,56	4,35
	1,1893	1,5647	0,4829	58,91	
$\left\{ \begin{array}{l} 0 \\ 0_1 \end{array} \right\}$	1,0882	1,5116	0,4701	63,94	4,22
	1,1924	1,5302	0,4484	68,16	


Betrachtet man zunächst die Körper, welche sich durch 1 Atom C von einander unterscheiden, so ergibt sich Folgendes: Dichte und auch in den meisten Fällen der Brechungsexponent, nehmen für das Zutreten des Kohlenstoffatoms um eine geringe GröÙe ab. Das specifische Brechungsvermögen  $\frac{n-1}{d}$  zeigt keine Regelmäßigkeit, es erleidet bald eine kleine Vermehrung bald Verminderung. Bestimmte Beziehungen treten dagegen in den Refractionsaequivalenten hervor, indem sich ergibt, daß dieselben für den Zuwachs an 1 Atom C bei jeder Gruppe um einen stets sehr nahe übereinstimmenden Werth zunehmen.

Körper, welche in ihrer Zusammensetzung um 2 Atome H sich unterscheiden, lassen erkennen, daß für das Zutreten dieses Elements sich Dichte, Brechungsexponent und specifisches Brechungsvermögen stets erhöhen, und ebenso im Refractionsaequivalent eine bestimmte Vermehrung eintritt.


Ein Zuwachs von 1 Atom O bewirkt endlich stets eine Vergrößerung der Dichte und des Brechungsexponenten, dagegen eine Verminderung des specifischen Brechungsvermögens. Das Refractionsaequivalent nimmt auch hier um Werthe zu, welche bei den verschiedenen Gruppen von Körpern sich einander sehr nähern.

Weiter benutzbare Resultate liefert bei diesen Zusammenstellungen bloß das Refractionsaequivalent  $P \left( \frac{n-1}{d} \right)$ . Es zeigt dasselbe für das Zutreten jedes Elementes stets eine bestimmte Vergrößerung, die aber wie sich leicht nachweisen läßt, wieder beeinflusst wird von der chemischen Constitution der Substanzen. Man erkennt nämlich, daß je zwei Körper, welche sich um ein gleiches Atom unterscheiden, stets dann eine beinahe vollkommen identische Differenz im Refractionsaequivalente zeigen, wenn die chemischen Typen von welchen sich dieselben ableiten, gegenseitig immer die nämlichen bleiben. So ergibt sich z. B. aus Tabelle VI in Bezug auf die 1 At. C entsprechenden Differenzen im Refractionsaequivalent, daß diese den über-

einstimmenden Werth 5,41 bis 5,43 annehmen, wenn die beiden Körper einatomig sind, und der eine davon sich stets auf den Typus  $\begin{smallmatrix} \text{H} \\ \text{H} \end{smallmatrix} \text{O}$ , der andere auf den Typus  $\begin{smallmatrix} \text{H} \\ \text{H} \end{smallmatrix}$  bezieht. Z. B.



Methylalkohol



Aethylalkohol




Aldehyd



Aceton

usw.

Die Differenz wird dagegen sogleich eine andere (4,75 bis 4,80) bei Combination von einatomigen mit zweiatomigen Verbindungen, welche folgenden beiden Typen angehören:



z. B.



That kann dieselbe schon sehr verringert werden, wenn bei den Rechnungen statt des Brechungsexponenten ( $\mu$ .) der Refractionscoefficient  $A$  der Cauchy'schen Formel  $\mu = A + \frac{B}{\lambda^2}$  zu Grunde gelegt wird. Ganz verschwinden indess auch hierbei die Unregelmäßigkeiten nicht, was erklärlich ist, da auf diese Substanzen, wie in der ersten Abhandlung erwähnt, die Cauchy'sche Formel sich nicht mehr in genügendem Grade anwenden läßt.

Ich bemerke noch, daß sämtliche der vorhergehenden Rechnungen auch mit Zugrundelegung der Formel  $A^2 = \frac{1}{\lambda^2}$  ausgeführt worden sind, und daß hierbei in Bezug auf den Einfluß der chemischen Constitution den Obigen sich ganz analoge Resultate herausgestellt haben.

#### Refractionäquivalente der Elemente.

Aus den in Tabelle VI, VII und VIII gegebenen Zusammenstellungen haben sich Zahlen ableiten lassen, die man als die Refractionäquivalente, welche den Elementen C, H und O in ihren flüssigen ternären Verbindungen zukommen, betrachten kann. Bei jedem Elemente ergaben sich für gewisse Gruppen seiner Verbindungen constante Werthe, die nicht modificirt wurden durch die Atomzahl der übrigen Elemente, welche mit demselben verbunden waren. So resultirte z. B. für den Kohlenstoff in einatomigen Körpern übereinstimmend die Zahl 5,4, gleichgültig aus welchen C, H und O-haltigen Verbindungen dieselbe berechnet wurde. Dagegen zeigte sich ein Einfluß der chemischen Constitution, in der Art, daß man annehmen muß, daß die Refractionäquivalente der Elemente C, H, O in einatomigen Verbindungen etwas andere Werthe besitzen als in mehratomigen.

Sieht man ab von diesem Einfluß der chemischen Constitution, welcher immerhin nur ein sehr geringer ist, und nimmt außerdem bloß auf die schwächer brechenden Körper Rücksicht, so bewegen sich die gefundenen Refractions-

aequivalente für 1 Atom C, H, O zwischen folgenden Grenzen:

	Mittel
C = 4,75 bis 5,43	5,09
H = 1,06 bis 1,33	1,20
O = 2,45 bis 3,24	2,85

Mit diesen übereinstimmende Werthe lassen sich noch auf folgendem Wege erhalten:

Aus den frühern Betrachtungen über homologe Reihen hat sich ergeben, daß der Zusammensetzungsdifferenz  $n\text{CH}_2$  ein mittlerer Unterschied von  $n7,60$  im Refractionsaequivalente entspricht.

Zieht man zunächst von den Refractionsaequivalenten der Säuren  $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_2 = n\text{CH}_2 + \text{O}_2$  die Werthe für  $n\text{CH}_2$  ab, so bleibt als Rest für  $\text{O}_2$  im Mittel die Zahl 6,00, also  $\text{O} = 3,00$ .

Das Refractionsaequivalent des Wasserstoffs ergibt sich indem von den Refractionsaequivalenten der Alkohole  $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}\text{O} = n\text{CH}_2 + \text{H}_2 + \text{O}$  die Werthe für  $n\text{CH}_2 + \text{O}$  abgezogen werden. Es resultirt im Mittel  $\text{H}_2 = 2,60$ , oder  $\text{H} = 1,30$ .

Die Differenz  $\text{CH}_2 - \text{H}_2 = 7,60 - 2,60$  liefert endlich das Refractionsaequivalent für  $\text{C} = 5,00$ .

Für die Folge behalte ich die auf dem letztern Wege festgestellten Refractionsaequivalente bei, nämlich:

$$\begin{aligned}\text{C} &= 5,00 \\ \text{H} &= 1,30 \\ \text{O} &= 3,00\end{aligned}$$

Es fragt sich nun, wie diese Zahlen sich verhalten zu den Refractionsaequivalenten, welche den Elementen in ihrem freien Zustande angehören. Leider sind aber die vorhandenen, zu deren Berechnung erforderlichen Beobachtungen, namentlich in Bezug auf den Diamanten, noch zu wenig sicher, um dieselben genau feststellen zu können. Benutzt man folgende Daten:



That kann dieselbe schon sehr verringert werden, wenn bei den Rechnungen statt des Brechungsexponenten ( $\mu$ ,) der Refractionscoëfficient  $A$  der Cauchy'schen Formel  $\mu = A + \frac{B}{\lambda^2}$  zu Grunde gelegt wird. Ganz verschwinden indess auch hierbei die Unregelmäßigkeiten nicht, was erklärlich ist, da auf diese Substanzen, wie in der ersten Abhandlung erwähnt, die Cauchy'sche Formel sich nicht mehr in genügendem Grade anwenden läßt.

Ich bemerke noch, daß sämmtliche der vorbergehenden Rechnungen auch mit Zugrundelegung der Formel  $\frac{A^2 - 1}{d}$  ausgeführt worden sind, und daß hierbei in Bezug auf den Einfluß der chemischen Constitution den Obigen sich ganz analoge Resultate herausgestellt haben.

#### Refractionsäquivalente der Elemente

Aus den in Tabelle VI, VII und VIII gegebenen Zusammenstellungen haben sich Zahlen ableiten lassen, die man als die Refractionsäquivalente, welche den Elementen C, H und O in ihren flüssigen ternären Verbindungen zukommen, betrachten kann. Bei jedem Elemente ergaben sich für gewisse Gruppen seiner Verbindungen constante Werthe, die nicht modificirt wurden durch die Atomzahl der übrigen Elemente, welche mit demselben verbunden waren. So resultirte z. B. für den Kohlenstoff in einatomigen Körpern übereinstimmend die Zahl 5,4, gleichgültig aus welchen C, H und O-haltigen Verbindungen dieselbe berechnet wurde. Dagegen zeigte sich ein Einfluß der chemischen Constitution, in der Art, daß man annehmen muß, daß die Refractionsäquivalente der Elemente C, H, O in einatomigen Verbindungen etwas andere Werthe besitzen als in mehratomigen.

Sieht man ab von diesem Einfluß der chemischen Constitution, welcher immerhin nur ein sehr geringer ist, und nimmt außerdem bloß auf die schwächer brechenden Körper Rücksicht, so bewegen sich die gefundenen Refractions-

$$\frac{N^2 - 1}{D} P = \frac{n^2 - 1}{d} p + \frac{n_1^2 - 1}{d_1} p_1 + \dots$$

wo  $N$  der Brechungsindex,  $D$  die Dichte und  $P$  das Gewicht der Mischung, ferner  $nn_1, \dots; dd_1, \dots; pp_1, \dots$  die entsprechenden Werthe für die Bestandtheile bedeuten, bei Veränderung in:

$$\frac{N^2 - 1}{D} P = \frac{n^2 - 1}{d} p + \frac{n_1^2 - 1}{d_1} p_1 + \dots \quad (I)$$

mit den Beobachtungen in einer sehr vollständigen Weise in Uebereinstimmung steht. Ich benutze zum Nachweis für die Brauchbarkeit dieser letztern, bei Flüssigkeiten bisher noch nicht angewandten Formel, einige der früher in Tabelle III angegebenen Mischungen, und berechne die Brechungsindices derselben in nachstehender Tabelle IX aus der Gleichung:

$$N = 1 + \frac{\frac{n^2 - 1}{d} p + \frac{n_1^2 - 1}{d_1} p_1}{p + p_1}$$

Die Rechnung wurde in Bezug auf den Brechungsindex  $N$  ausgeführt.

	P	beobachtet		berechnet
		d	$\mu_a$	$\mu_a$
Aethylalkohol	46	0,8011	1,3605	
Ameisensäure	46	1,2211	1,3693	
Mischung	92	0,9602	1,3610	1,3612
Bittermandelöl	106	1,0474	1,5391	
Ameisensäure	46	1,2211	1,3693	
Mischung	152	1,0676	1,4900	1,4900

Wie wir in den früheren Kapiteln gesehen haben, ist das spezifische Brechungsvermögen einer aus C, H und O bestehenden Verbindung wesentlich bloß abhängig von der durch die empirische Formel ausgedrückten Zusammensetzung derselben; der Einfluß der chemischen Constitution erwies sich als ein verhältnißmäßig sehr geringer. Es ist daher erlaubt, die für die Mischungen gefundenen Regeln auch auf die chemischen Verbindungen überzutragen, und zu versuchen die Brechungsindices derselben aus den Elementen abzuleiten <sup>1)</sup>).

Ist die Zusammensetzung einer chemischen Verbindung durch eine empirische Formel ausgedrückt, so ergibt sich bekanntlich das Gewichtsverhältniß der Elemente durch Multiplication der Atomgewichte  $g, g', \dots$  derselben mit der Zahl  $m, m', \dots$  der Atome. Die frühere Gleichung (I) wird daher:

$$\frac{N-1}{D} P = \frac{n-1}{d} g m + \frac{n'-1}{d'} g' m' + \frac{n''-1}{d''} g'' m'' + \dots \quad (II)$$

wo  $P = g m + g' m' + g'' m''$  das Atomgewicht der Verbindung darstellt.

Die Producte aus spezifischem Brechungsvermögen  $\frac{n-1}{d}$  und Atomgewicht, also die Werthe:

$$\frac{N-1}{D} P = R; \quad \frac{n-1}{d} g = r; \quad \frac{n'-1}{d'} g' = r', \text{ usw.}$$

haben wir früher als Refraktionsäquivalente bezeichnet. Sind diese für die verschiedenen Elemente festgestellt, so

1) Vergl. Schrauf, Pogg. Ann. Bd. 119 S. 461 und 553.

hat man daher zur Berechnung des Refraktionsäquivalents  $R$  einer Verbindung, welche aus  $m$  Atomen eines ersten Elements,  $m_1$  Atomen eines zweiten und  $m_2$  Atomen eines dritten besteht, einfach die Gleichung:

$$R = m r + m_1 r_1 + m_2 r_2$$

d. h. das Refraktionsäquivalent einer Verbindung wird erhalten durch Bildung der Summe der Refraktionsäquivalente der sie constituirenden Atome. Es berechnet sich also das Refraktionsäquivalent auf dieselbe Weise wie das chemische Äquivalent.

Für die drei Elemente C, H, O wurden im vorhergehenden Kapitel die Refraktionsäquivalente in Bezug auf den Brechungsindex  $\mu_a$  ermittelt, und es ergaben sich dabei folgende Zahlen, welche ich mit den Atomgewichten, die ihnen zu Grunde liegen, zusammenstelle:

	Atomgewicht.	Refraktionsäquivalent
C	12	5,00
H	1	1,30
O	16	3,00

$$n = 1 + \frac{R}{P} D.$$

Mittelst der obigen drei sehr einfachen Zahlen lassen sich für eine Menge aus C, H und O bestehender flüssiger Verbindungen die Brechungsindices bezogen auf die rothe Wasserstofflinie mit sehr befriedigender Annäherung berechnen, und zwar passen die gegebenen Constanten sowohl auf ein- als auch mehratomige Verbindungen; der Einfluss der chemischen Constitution bleibt also unberücksichtigt. Bloß auf stark lichtbrechende Substanzen können, wie aus früher angegebenen Gründen folgt, dieselben nicht mehr angewandt werden.

In der nachfolgenden Tabelle X sind für eine größere Anzahl Körper die Brechungsexponenten aus der chemischen Zusammensetzung abgeleitet. Die Tabelle enthält nächst der für die Substanz ermittelten Dichte  $d$  das berechnete Refractionsäquivalent zusammengestellt mit dem aus den Beobachtungen abgeleiteten, und ferner den berechneten Brechungsindex in Parallele mit dem gefundenen:

Tabelle X.

	Formel	$d$	$P \left( \frac{\mu_a - 1}{d} \right)$		$\mu_a$	
			berechnet	beobachtet	berechnet	beobachtet
Methylalkohol	C H <sub>4</sub> O	0,7964	13,20	13,17	1,328	1,328
Aethylalkohol	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O	0,8011	20,80	20,70	1,362	1,361
Propylalkohol	C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O	0,8042	28,40	28,30	1,381	1,379
Butylalkohol	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O	0,8074	36,00	36,11	1,393	1,394
Amylalkohol	C <sub>5</sub> H <sub>12</sub> O	0,8135	43,60	43,89	1,403	1,406
Ameisensäure	C H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	1,2211	13,60	13,91	1,361	1,369
Essigsäure	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O <sub>2</sub>	1,0514	21,20	21,11	1,371	1,370
Propionsäure	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub>	0,9963	28,80	28,57	1,388	1,385
Buttersäure	C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>	0,9810	36,40	36,22	1,397	1,396
Valeriansäure	C <sub>5</sub> H <sub>10</sub> O <sub>2</sub>	0,9313	44,00	44,05	1,402	1,403
Capronsäure	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>2</sub>	0,9252	51,60	51,61	1,412	1,412
Oenanthylsäure	C <sub>7</sub> H <sub>14</sub> O <sub>2</sub>	0,9175	59,20	59,40	1,418	1,419
Essigsaures Methyl	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O <sub>2</sub>	0,9053	28,80	29,36	1,352	1,359
Ameisens. Aethyl		0,9076	28,80	29,18	1,353	1,356
Essigsaures Aethyl		0,9021	36,40	36,17	1,373	1,371

	Formel	$d$	$P\left(\frac{n-1}{d}\right)$		$n_d$	
			berech- net	beob- achtet	berech- net	beob- achtet
Buttersaures Methyl	$C_4 H_{10} O_2$	0,8976	44,00	43,97	1,387	1,387
Ameisens. Amyl	$C_6 H_{12} O_2$	0,8816	51,60	52,09	1,392	1,396
Butters. Aethyl		0,8906	51,60	51,32	1,396	1,394
Valerians. Methyl		0,8809	51,60	51,71	1,392	1,393
Valerians. Aethyl	$C_7 H_{14} O_2$	0,8674	59,20	59,20	1,393	1,395
Valerians. Amyl	$C_{10} H_{20} O_2$	0,8581	82,00	82,14	1,409	1,410
Aldehyd	$C_2 H_4 O$	0,7810	18,20	18,58	1,326	1,330
Aceton	$C_3 H_6 O$	0,7941	25,80	26,12	1,353	1,357
Valeral	$C_5 H_{10} O$	0,7995	41,00	41,54	1,381	1,386
Aethyläther	$C_4 H_{10} O$	0,7166	36,00	36,26	1,349	1,351
Essigsäureanhydrid	$C_4 H_6 O_3$	1,0838	36,00	36,56	1,391	1,388
Aethylenalkohol	$C_2 H_6 O_2$	1,1092	23,80	23,77	1,426	1,425
Glycerin	$C_3 H_8 O_3$	1,2615	34,40	34,32	1,472	1,471
Milchsäure	$C_3 H_6 O_4$	1,2427	31,80	31,81	1,439	1,439

Einige weitere chemisch interessante Folgerungen welche sich aus den obigen Resultaten ableiten lassen, gedenke ich in einer nächsten Mittheilung in Betracht zu ziehen.

zu bestimmen sucht und dieselbe in der *specifischen Wärme* der Körper ausdrückt. Seitdem haben Forbes <sup>1)</sup> und Neumann <sup>2)</sup> zu demselben Behufe Methoden veröffentlicht, die aber beide von der meinigen ganz und gar verschieden sind. Das Problem hat also eine mehrfache Lösung gefunden und die Uebereinstimmung der auf verschiedenen Wegen erlangten Resultate dürfte eine gute Controlle für die Richtigkeit derselben abgeben.

Was indess die von mir vorgeschlagene Methode, meiner Meinung nach, besonders charakterisirt ist:

1, daß man ganz und gar unabhängig ist von der *Temperatur des umgebenden Mediums*;

2, daß man bei der Berechnung nicht auf eine *einzige* Temperaturablesung beschränkt ist, sondern *allen innerhalb der Periode angestellten Beobachtungen ein zugehöriges Stimmrecht* ertheilt;

3, daß man sich *unabhängig macht von dem Scalenwerth der angewandten Thermometer*;

4, daß man durch Veränderung der Länge der Periode nicht nur das erlangte Resultat *controliren* kann, sondern auch die *Methode eben so anwendbar macht auf kurze Stäbe wie sie es ist auf lange*;

5, daß diese Methode sich nicht bloß auf *starre Körper*, sondern auch auf *flüssige* mit Vorthail anwenden läßt. (Siehe §. 4).

## §. 2.

Der Leser wird sich erinnern, daß die in Rede stehende Methode in periodischen Erhitzungen und Erkältungen besteht, welche, an dem einen Ende des Stabes bewerkstelligt, sich wellenartig in diesem Stabe fortpflanzen. Durch gleichzeitige in jeder Minute gemachte Temperaturbeobachtungen an zwei in einem gegebenen Abstand von einander in den Stab versenkten Thermometern erhält man Kenntniß von der Verbreitung der Wärme in dem Stabe. *Alle innerhalb der Periode gemachten Temperaturbeobachtungen*

1) *Edinb. Transact. Vol. XXIII p. 133.*

2) *Ann. de chim. et de phys. Ser. III T. LXVI. p. 183.*

werden nach der Methode der kleinsten Quadrate behandelt, und somit erhält man die Temperatur für *jeden* Punkt des Stabes ausgedrückt durch eine Reihe von der Form:

$$u = m + A \sin \left( 2\pi \frac{t}{T} + \alpha \right) + B \sin \left( 4\pi \frac{t}{T} + \beta \right) \\ + C \sin \left( 6\pi \frac{t}{T} + \gamma \right) \quad (1)$$

aus deren Constanten alsdann das Leitungsvermögen bestimmt wird.

Die Anwendbarkeit der Methode muß Jedem, der mit ähnlichen Aufgaben etwas vertraut ist, scheint mir, leicht verständlich seyn. Da es sich aber gezeigt, daß wirklich Mißverständnisse entstehen können; so mag es mir erlaubt seyn, hier einige Erläuterungen zu geben, welche die Frage auf ihren richtigen Standpunkt stellen.

Bei den periodischen Erhitzungen und Erkältungen eines Metallstabes müssen natürlich, in dem Maasse als diese regelmäßig vor sich gehen, alle Glieder der obigen Reihe unmerklich werden, mit Ausnahme des ersten:

$$A \sin \left( 2\pi \frac{t}{T} + \alpha \right)$$

und folglich ist es nur der Coëfficient  $A$  und das Argument  $\alpha$  für jeden Beobachtungspunkt des Stabes, welche im Allgemeinen bei der Berechnung mit Vorthail angewandt werden können. Die folgenden Glieder müssen, wegen ihrer Kleinheit, natürlicherweise höchst unzuverlässige Werthe für das gesuchte Leitungsvermögen geben. Nun aber ist es ja ferner allgemein bekannt, daß, wenn man mittelst der Methode der kleinsten Quadrate dieses aus den  $A$  und  $\alpha$  des ersten Gliedes berechnet, man dazu *alle* innerhalb der ersten Periode gemachten Beobachtungen anwendet, ebenso wie *alle* zur Berechnung aus den  $B$  und  $\beta$  des zweiten Gliedes, falls es hinzugezogen wird, angewandt werden usw. woraus also ersichtlich, daß die Genauigkeit der berechneten Coëfficienten in keiner Weise darauf beruhen kann, daß mehr oder weniger Glieder hinzugezogen werden.

Aus diesem Grunde habe ich auch bei Berechnung mei-



meiner Versuche im Allgemeinen nur das besagte erste Glied benutzt. Eine Ausnahme davon habe ich zwar bei einer Beobachtungsreihe gemacht <sup>1)</sup>, aber bloß um die Richtigkeit der Relation zu controliren, welche die Theorie als stattfindend zwischen den Constanten der verschiedenen Glieder in der Reihe (1) nachweist.

Es ist nämlich natürlich, daß sich auch hier bestätigen muß, was ich schon vor 13 Jahr rücksichtlich der Wärmefluctuationen in den obersten Erdschichten unter der periodischen Einwirkung der Sonne nachgewiesen habe <sup>2)</sup>, daß jedes Glied der Reihe (1) betrachtet werden kann als eine Wärmewelle, die sich je nach der Länge der Periode mit verschiedener Geschwindigkeit fortpflanzt, und daß diese Glieder, nicht bloß *jedes für sich*, einen vollständigen Werth von  $\frac{k}{c}$  geben, sondern auch daneben in einer bestimmten *mathematischen Abhängigkeit von einander* stehen, so daß die einen Constanten und Argumente aus den anderen berechnet werden können.

Die Beobachtungsreihe <sup>3)</sup>, mittelst welcher ich nun den eben genannten Satz verificiren will, hat ungewöhnlich *große* Amplituden, und aus diesem Grunde kann sowohl das zweite, als das dritte Glied angewandt werden, um die mathematische Abhängigkeit zwischen den Gliedern nachzuweisen. Dabei erhält man:

$$\begin{array}{ll} f = 1,6046 & \Delta\alpha = 24^\circ 48',7 \\ f' = 1,9425 & \Delta\beta = 36 \quad 38,5 \\ f'' = 2,0654 & \Delta\gamma = 42 \quad 4,5 \end{array}$$

und nach der Formel sollte man haben:

$$f = f'^{\frac{1}{\sqrt{2}}} = f''^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \quad . \quad . \quad . \quad (a)$$

so wie

$$\Delta\alpha = \frac{\Delta\beta}{\sqrt{2}} = \frac{\Delta\gamma}{\sqrt{3}} \quad . \quad . \quad . \quad (a')$$

1) Pogg. Ann. Bd. CXIV S. 525.

2) *Mém. sur la temperature de la terre* (Nova Acta R. Soc. Sc. Upsal. Ser. III Vol. I. p. 210.

3) Pogg. Ann. Bd. CXIV S. 525.

Hierbei hat sich jedoch ein Fehler eingeschlichen, auf welchen ich erst bei Lesung des Berichts von meinen Versuchen in den *Annales de chimie et de physique* aufmerksam gemacht wurde <sup>1</sup>). In der Formel (4) habe ich nämlich die Gröfsen  $g$  und  $g'$  gleich grofs in *allen* Gliedern angenommen <sup>2</sup>), obwohl deren Werthe repräsentirt werden müssen durch:

$$g = \sqrt{V \sqrt{\frac{\pi^2}{K^2 T^2} + \frac{H^2}{4 n^2 K^2}} + \frac{H}{2 n K}}$$

und

$$g' = \sqrt{V \sqrt{\frac{\pi^2}{K^2 T^2} + \frac{H^2}{4 n^2 K^2}} - \frac{H}{2 n K}}$$

Die Gröfsen  $f$ ,  $f'$  und  $f''$  müssen also eigentlich den Gleichungen genügen:

$$f = f' \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \cdot e^{(g_1 - g_2)'} = f'' \frac{1}{\sqrt[3]{3}} \cdot e^{(g_1 - g_2)'} \quad \dots (b).$$

Die numerischen Werthe wären nach Gleichung (a):

$$f = 1,6046; \quad f' \frac{1}{\sqrt[3]{2}} = 1,5994; \quad f'' \frac{1}{\sqrt[3]{3}} = 1,5201$$

würden aber nach (b)

$$f = 1,6046;$$

$$f' \frac{1}{\sqrt[3]{2}} e^{(g_1 - g_2)'} = 1,5994 \times 1,0086 = 1,6131$$

$$f'' \frac{1}{\sqrt[3]{3}} e^{(g_1 - g_2)'} = 1,5201 \times 1,0113 = 1,537.$$

Ebenso müssen die Argumente den Gleichungen genügen:

$$\Delta \alpha = \frac{\Delta \beta}{\sqrt[3]{2}} \cdot e^{(g_1 - g_2)'} = \frac{\Delta \gamma}{\sqrt[3]{3}} \cdot e^{(g_1 - g_2)'} \quad \dots (b)'.$$

Nach (a)' hatte ich gefunden:

$$\Delta \alpha = 24^\circ 48',7; \quad \frac{\Delta \beta}{\sqrt[3]{2}} = 25^\circ 55'; \quad \frac{\Delta \gamma}{\sqrt[3]{3}} = 24^\circ 19'$$

1) *Ann. de chim. et de phys. Sér. III T. LXVII p. 379.*

2) *Pogg. Ann. Bd. CXIV S. 516.*

Nach (b) erhalte ich:

$$\Delta\alpha = 21^{\circ} 48',7$$

$$\frac{\Delta\gamma}{\gamma^2} \cdot e^{(g_1 - g_2)'} = 25^{\circ} 55' \times 0,9862 = 25^{\circ} 37'$$

$$\frac{\Delta\gamma}{\gamma^3} \cdot e^{(g_1 - g_2)'} = 24^{\circ} 19' \times 0,9851 = 23^{\circ} 58'.$$

Hieraus ergibt sich also: 1) daß die Voraussage der Theorie über den mathematischen Zusammenhang zwischen den Constanten der verschiedenen Glieder sich so genau bewährt als man billigerweise fordern kann, und 2) daß die von mir bei der früheren Berechnung angewandte Formel, obwohl nicht vollkommen correct, sich doch als hinreichend approximativ betrachten läßt, da der Unterschied zwischen den nach der einen oder anderen Weise erhaltenen Werthen innerhalb der Gräzen der Beobachtungsfehler liegt.

Handelte es sich ferner darum, den Werth von  $\frac{k}{c}$  aus den höheren Gliedern zu berechnen, so müßte — da der Unterschied zwischen der älteren und neueren Formel sich darauf beschränkt, daß in der einen  $H$  steht und in der anderen statt dessen  $\frac{H}{n}$ , auch daß  $H$  in dem Schlusswertb von  $\frac{k}{c}$  fortfällt, — *identisch* dasselbe Resultat erhalten werden, welche der Formeln man auch anwenden möge.

Veranlassung zu diesen Bemerkungen, welche wahrscheinlich für die Meisten, welche einige Kenntnisse von den hier vorkommenden Theorien besitzen, vollkommen überflüssig gewesen wären, habe ich erhalten durch eine in den „*Fortschritten der Physik*“<sup>1)</sup> erschienene Recension meiner Abhandlung.

Nach dem Recensenten ist die Uebereinstimmung der angeführten Werthe  $f$ ,  $f'$  und  $f''$  »nur ein merkwürdiger Zufall« und er beruft sich darauf, daß eine unrichtige Formel angewandt sey. Allein, daß diese eine ganz falsche Behauptung ist, ersieht man aus dem schon Angeführten. Er

1) Fortschritte der Physik im J. 1861, Jahrg. VII, S 403.

erklärt ferner den berechneten Werth von  $\frac{k}{c}$  für unrichtig und zwar aus folgenden Gründen:

1) Sagt der Hr. Recensent, daß eine fehlerhafte Formel angewendet sey. Hierbei hilft es nichts, daß die fehlerhaften Glieder *niemals angewendet wurden*, und daß sie sogar, *wenn* sie angewendet werden, wie oben erwähnt, einen richtigen Werth von  $\frac{k}{c}$  geben.

2) Behauptet der Hr. Recensent, daß es »durchaus« nicht erlaubt sey, das Glied zu vernachlässigen, welches darauf beruht, daß der Stab nicht unendlich lang ist. Hierauf ist die Antwort, daß es immer Gebrauch war und auch »durchaus« erlaubt ist, Glieder zu vernachlässigen, welche auf das Resultat der Berechnung keinen Einfluß ausüben. Nun war bei den kurzen Stäben der Abstand zwischen den von der Wärmequelle entfernteren Thermometer und dem Ende des Stabes ungefähr 400<sup>mm</sup>. Man kann nun die Größe der Amplituden am Ende des Stabes bestimmen und sodann mit dieser Amplitude zurückgehen zu den Beobachtungspunkten; so findet man leicht, daß die Glieder, welche wachsen mit dem Abstand von der Wärmequelle, unmerklich seyn müssen an den beiden Beobachtungspunkten des Stabes. Auch wenn man keine solche Berechnung aufstellen will, kann man schon daraus, daß die erhaltenen Werthe von

$$\frac{p}{c \delta}$$

übereinstimmten für Perioden, deren Länge von 12 bis 24 Minuten variirten, den Schluß ziehen, daß die Temperatur an dem Ende des Stabes keinen schädlichen Einfluß auf die Genauigkeit der Resultate gehabt hat. Uebrigens kann man immer, wie schon im Vorhergehenden gesagt worden, für die Perioden eine solche Länge wählen, daß die Wärmefluctuationen so schnell abnehmen, daß sie an dem Ende des Stabes ganz unmerklich werden.

3) Endlich bemerkt der Hr. Recensent, daß ich bloß drei Glieder der Reihe (1) berechnete und dies wenig

genau wäre. Aus dem Vorhergehenden erhellt jedoch, daß ich im Allgemeinen nicht drei Glieder berechnete, sondern nur ein einziges, und daß die Genauigkeit in den Werthen der Constanten dieses ersten Gliedes, aus denen sodann  $\frac{k}{c}$  bestimmt wurde, nicht zuwimmt, auch wenn man die Constanten der folgenden Glieder berechnet. Der Hr. Recensent scheint die Bedeutung des Ausdrucks »kleinste Quadratmethode« mißverstanden zu haben, da er annimmt, die Anwendung derselben leite hier zu anderen Resultaten als die bekannte Methode durch gewisse bestimmte Integrale. Daß dies nicht der Fall ist, davon kann der Hr. Recensent sich überzeugen durch Bessel's Abhandlung: »*Ueber die Bestimmung des Gesetzes einer periodischen Erscheinung*«<sup>1)</sup>.

### §. 3.

Ein Einwand, welcher möglicherweise gegen die Genauigkeit der Beobachtungsmethode erhoben werden und auf dem ersten Blick als von Gewicht erscheinen kann, ist: daß die angewandten Stäbe von ziemlicher Dicke waren; die Differentialformeln setzen nämlich *einerlei* Temperatur in dem ganzen Querschnitt voraus, und die konnte hier streng genommen nicht stattfinden, da die Stäbe von größeren Dimensionen waren.

Die erwähnte Differentialformel ist indess von weitreichender Gültigkeit. Schon bei den von Despretz über die Wärmefortpflanzung in Wasser angestellten Versuchen zeigte es sich, daß die Resultate der Beobachtungen dem Gesetze von der Abnahme der Temperatur nach einer geometrischen Reihe Genüge leisteten, obwohl die Temperatur in jedem Querschnitt vom Centrum nach der Peripherie abnahm, weshalb auch für den Fall, wo diesem Gesetze nicht genügt wird, die Ursache hiervon nicht in den Dimensionen der Stäbe gesucht werden kann. Im Allgemeinen, wenn man sich zwei Querschnitte in dem Stabe denkt muß der Unterschied der Wärmemenge, welche dieselben

1) Schumacher's Astronom. Nachrichten Bd. VI, S. 333

durchströmt, gleich seyn der Wärmemenge, welche von der dazwischen liegenden Oberfläche ausstrahlt. Ist nun die Temperatur der Oberfläche nicht gleich der Mitteltemperatur des Querschnitts, so muß sie doch zu derselben in einem bestimmten Verhältniß stehen, und die Zahl, welche dieses Verhältniß ausdrückt, muß auch für den zweiten Punkt des Stabes kleineren Variationen unterworfen seyn als es mit  $H$  selbst der Fall ist. In der Differentialformel braucht man sich also bloß  $H$  mit einer Constanten multiplicirt zu denken, damit die Formel auch für den Fall gelte, wo die Temperatur an der Oberfläche nicht vollkommen gleich ist der im Centrum des Querschnitts. Mit anderen Worten: die GröÙe  $H$  möge bedeuten was sie wolle, wenn sie nur ihren Werth innerhalb der Periode unverändert behält, so hat sie auf die Berechnung von  $\frac{k}{c}$  keinen Einfluß, weil sie schließlic aus der Gleichung herausfällt. Um direct hierüber Gewißheit zu erlangen, habe ich Versuche mit einem Kupferstabe angestellt, dessen Oberfläche ein Mal vollkommen blank, und das andere Mal mit einer dicken Kienrusschicht überzogen war. Die aus diesen beiden Versuchen erhaltenen Werthe von  $k$  waren identisch gleich.

Bei den Beobachtungen habe ich in die Stäbe versenkte Thermometer angewandt, statt des zuerst von Langberg und später von Wiedemann und Franz benutzten thermoelektrischen Elements, welches von ihnen an die Oberfläche angelegt ward. Ich sehe nicht, daß ihre Beobachtungsweise einen wesentlichen Vorzug vor der alten besitze. Zwar kann man dabei dünne Stäbe anwenden, und die Temperatur kann deshalb weniger im Querschnitt variiren; allein durch Anlegung des thermo-elektrischen Elements entstehen andere Fehlerquellen, welche möglicherweise von größrer Bedeutung sind und in dem Maasse größrer als die Stäbe von kleinen Dimensionen sind.

Schon in der früheren Abhandlung habe ich nämlich

gezeigt<sup>1)</sup>, daß man beim Uebergang der Wärme von einem Metall zum anderen dieselben Formeln für die Uebergangsfläche hat, wie bei der Elektricität:

$$u = u'$$

$$k \frac{du}{dx} = k' \frac{du'}{dx} \dots 1).$$

Eine Folge aus diesen Formeln ist: daß wenn man einen schlechten Leiter, wie Wismuth oder Antimon, an einen Metallstab von besserem Leitungsvermögen anlegt, eine Steigerung der Temperatur in den Contactpunkten stattfindet, eine in demselben Maasse größere als der Unterschied zwischen dem Leitungsvermögen der Körper groß ist. Hierin liegt auch der Grund, weshalb die von Wiedemann und Franz angewandte Methode sich unbrauchbar erweist zur Bestimmung des Wärme-Uebergangs von einem Metall zum andern.

1) *Recherches sur la conductibilité des corps pour la chaleur* (Nouv. Acta R. Soc. Sc. Upsal Ser. III T. III, p. 60).

2) Unter den Resultaten, zu welchen ich in der genannten Abhandlung gelangt bin, mag es mir erlaubt seyn, folgende als von allgemeinerem Interesse anzuführen.

Wenn sich Wärme fortpflanzt von einem Leiter zu einem andern, als unendlich lang angenommen, und die Ausbreitung der Temperatur in dem ersten wird repräsentirt durch:

$$u = a(e^{-nx} + ye^{nx})$$

so bleibt der Werth von  $y$  derselbe, bloß mit vertauschten Zeichen die Wärme mag sich von dem besseren zum schlechteren fortpflanzen oder umgekehrt. Ferner ist es möglich, bloß aus den Veränderungen welche die Wärmefortpflanzung in dem ersten Stabe durch den Contact mit dem zweiten erleidet (d. h. aus dem Werthe von  $y$ ) das Leitungsvermögen des letzteren zu berechnen.

Mein geehrter Recensent, Hr. D. findet auch in dieser Abhandlung vieles zu tadeln (*Fortschritte der Physik*, Jahrg. XVI, S. 384). Unter anderem hält er die berechneten Zahlen für „in außerordentlichem Grade durch die Beobachtungsfehler afficirt“ und er schlägt deshalb vor die Differentialcoefficienten  $\frac{du}{dx}$  und  $\frac{du'}{dx}$  durch Interpolation zu berechnen. Diese seine Methode ist gewiß bewundernswerth einfach, aber sie hat doch einen wesentlichen Fehler, — sie ist falsch.

## §. 4.

Im letzt verflossenen Winter habe ich gesucht, die Wärmeleitung des *Quecksilbers* zu bestimmen, und ich benutze hier die Gelegenheit, das dabei gefundene Resultat mitzutheilen.

In ein Glasrohr von 37<sup>mm</sup>,6 Durchmesser und 0<sup>mm</sup>,9 Wanddicke wurden zwei Thermometer mit 2<sup>mm</sup>,6 dicken cylindrischen Behältern eingesetzt. Das Rohr wurde in lothrechter Stellung befestigt, mit Quecksilber gefüllt und dessen oberste Schicht in Contact gesetzt mit einem zur Seite gebogenen Metallcylinder, den man abwechselnd 12 Minuten lang mittelst einer Gaslampe erhitzte während anderer 12 Minuten durch Umrühren abkühlte. Die Thermometer wurden abwechselnd eine um die andere Minute beobachtet und nach Beendigung des Versuches wurde der gegenseitige Abstand derselben mittelst eines Kathetometers beobachtet; dieser ergab sich zu 48<sup>mm</sup>,37.

Als Beweis vom Grade der Regelmäßigkeit, mit welcher die Temperatur der Quecksilbersäule sich während der Periode veränderte, will ich die Beobachtungen für die drei Perioden anführen, welche den Berechnungen zum Grunde liegen.



Thermometer A.

	1 <sup>m</sup>	3 <sup>m</sup>	5 <sup>m</sup>	7 <sup>m</sup>	9 <sup>m</sup>	11 <sup>m</sup>	13 <sup>m</sup>	15 <sup>m</sup>	17 <sup>m</sup>	19 <sup>m</sup>	21 <sup>m</sup>	23 <sup>m</sup>
	48,50	44,35	38,90	33,40	28,50	24,50	24,66	28,27	33,27	38,53	44,22	48,57
	8,50	4,60	9,30	3,75	8,00	4,62	4,70	8,30	3,33	8,85	4,16	(8,40)
	8,22	4,57	9,16	3,66	8,50	4,50	4,60	8,23	3,33	8,77	4,18	8,52
Mittel:	48,41	44,51	39,12	33,60	28,63	24,54	24,65	28,27	33,31	38,72	44,19	48,50

Thermometer B.

	4 <sup>m</sup>	6 <sup>m</sup>	8 <sup>m</sup>	10 <sup>m</sup>	12 <sup>m</sup>	14 <sup>m</sup>	16 <sup>m</sup>	18 <sup>m</sup>	20 <sup>m</sup>	22 <sup>m</sup>	24 <sup>m</sup>	26 <sup>m</sup>
	58,20	57,63	56,50	55,00	53,37	52,22	51,80	52,25	53,27	54,70	56,27	57,32
	7,90	7,50	6,40	4,97	3,80	2,15	1,75	2,20	3,20	4,62	6,12	7,22
	7,80	7,40	6,30	4,83	3,25	2,05	1,72	2,15	3,20	4,63	6,20	7,22
Mittel:	57,90	57,57	56,37	54,93	53,30	52,14	51,77	52,22	53,23	54,65	56,19	57,27

Ich habe jede Reihe so niedergeschrieben, daß sie mit Maximum-Temperaturen anfängt, weshalb — wie man aus den darüberstehenden Beobachtungszeiten ersieht — die Zahlenwerthe für das Thermometer B einer drei Minuten späteren Zeit angehören als die entsprechenden für A in derselben Columnne; ferner sind die für B angegebenen Mittelwerthe auf die Weise berechnet, welche in dem

Aufsatz über das Leitungsvermögen des Kupfers und Eisens bei verschiedenen Temperaturen angegeben worden ist ').

Aus den berechneten Mittelwerthen erhält man für

Thermometer *A*  $11,817 \sin(30n + 104^\circ 3',3)$

" *B*  $3,029 \sin(30n + 43^\circ 18',5)$

wobei der Winkel unter dem Sinuszeichen für *B* um  $46^\circ$  verringert wurde.

Nun war überdies, das Verhältniß zwischen den Thermometerscalen ein solches, daß

$$\log n_A' = \log n_B' = 0,05557$$

woraus

$$\log f = 0,53553; \Delta \alpha = 60^\circ 44',8$$

und folglich, wenn man annimmt:

$$\log \delta c = 9,65611$$

erhält man für das Quecksilber

$$k = 1,061 \text{ bei } +50^\circ \text{ C.}$$

Der somit erhaltene Zahlenwerth für das Wärme-Leitungsvermögen des Quecksilbers stimmt ganz gut mit dem von mir früher gefundenen Werth derselben Constante für Kupfer und Eisen überein, vorausgesetzt, daß man annimmt, die

VII. *Ueber Mohr's Hageltheorie;*  
*von A. Krönig.*

---

**M**eine meteorologischen Kenntnisse sind viel zu gering als daß ich wagen möchte, die neue Hageltheorie Mohr's ihrem ganzen Umfange nach einer Beurtheilung zu unterziehen. Es kommen jedoch in der betreffenden Abhandlung <sup>1)</sup> einige Zahlen vor, welche außerordentlich geeignet sind, sehr falsch aufgefaßt zu werden. Diese Zahlen auf ihre richtige Bedeutung zurückzuführen, ist der Zweck der nachfolgenden Zeilen.

Mohr sagt auf Seite 93 seiner Abhandlung: „1 Grm. oder gleichbedeutend 1 Cubikcentimeter Wasser nimmt bei 100° C. und 760<sup>mm</sup> Barometerstand ein Volumen von 1696 Cubikcentimetern, oder in runder Zahl das 1700fache Volumen ein. Bei jeder niederen Temperatur ist das Volumen bedeutend größer, zum Beispiel bei 0° C. 182323 hoch, bei 20° C. 58224 hoch <sup>2)</sup>“. Hieraus schließt nun Mohr mit vollem Rechte, daß zum Beispiel bei dem Uebergange des gesättigten Wasserdampfes von 0° C. in flüssiges Wasser der Inhalt von 182323 Cubikfuß sich zu 1 Cubikfuß verdichte, daß also bei dieser Condensation von Wasserdampf „eine ganz ungeheure Raumverminderung“ stattfinde.

Allein die obigen Werthe beziehen sich nur auf *reinen* Wasserdampf oder überhaupt auf Wasserdampf, der unter dem Drucke des gesättigten reinen Wasserdampfes steht. Berücksichtigt man, daß bei der Aufstellung einer Hageltheorie offenbar nur die Verhältnisse des mit Luft gemengten Wasserdampfes zu betrachten sind, so stellen sich für die Volumenverminderung bei der Condensation des Wasserdampfes ganz andere Werthe heraus und zwar aus zwei Gründen.

1) Pogg. Ann. Bd. 117, S. 89.

2) J. Müller, Lehrbuch der Physik, 1853. Bd. II, S. 503.

Erstens ist der mit Luft gemengte Wasserdampf selbstverständlich nicht rein. Um nicht einer zu großen Allgemeinheit die Klarheit zu opfern, will ich mich zunächst auf gesättigten Wasserdampf von  $0^{\circ}$  C. beziehen, der unter dem Druck einer Atmosphäre sich befindet. Der Druck dieses Wasserdampfes würde, wenn er rein wäre, nach den Zahlen von Magnus <sup>1)</sup>  $\frac{1}{168}$  Atmosphäre betragen. Ich glaube nun in einem früheren Aufsätze nachgewiesen zu haben <sup>2)</sup>, daß jeder luftförmige Körper unter jedem Drucke, mag dieser nun durch feste oder flüssige oder auch durch andere luftförmige Körper hervorgebracht seyn, dem Mariotte'schen Gesetze unterworfen bleibt. Demgemäß muß Wasserdampf, der aus dem Druck von  $\frac{1}{168}$  Atmosphäre übergeht, auf  $\frac{1}{168}$  seines früheren Volumens zusammenge-drückt werden. Es nimmt also solcher Wasserdampf, wenn er unter dem Druck einer Atmosphäre steht, nicht 182323, sondern 1085 Mal soviel Raum ein wie das aus seiner Condensation entstehende Wasser.

Zweitens aber kann man, um die wirkliche Raumverminderung bei der Condensation des mit Luft gemengten

20° C. beträgt  $\frac{1}{3}$  Atmosphäre. Die Luft, welche bei 20° C. unter dem Druck einer Atmosphäre mit Wasserdampf gesättigt ist, besteht aus einem Gemenge von 43 Maafs Luft, und 1 Maafs Wasserdampf. Nimmt man an, daß bei der Condensation des letzteren sein Volumen ganz verschwindet, so verwandeln sich 44 in 43 Maafs. Die von Mohr angenommene Verdichtung von 58224 zu 1 ist also nahe 57000 Mal so groß, wie ihr wirklicher Werth.

Nach der oben citirten Stelle fährt Mohr fort: »Der gesättigte Wasserdampf dehnt sich bei abnehmendem Druck, nach dem Mariott'schen Gesetze aus; bei zunehmendem Druck verdichtet sich ein Theil Wasser und die Dichtigkeit des Dampfes bleibt ungeändert«. Auch diese Worte müssen mit Vorsicht aufgefaßt werden, wenn sie sich nicht aus Wahrheit in Irrthum verwandeln sollen. Es ist wahr, daß gesättigter Wasserdampf von 0° C., welcher, mit Luft von derselben Temperatur gemengt, unter dem Druck einer Atmosphäre steht, sobald man das Gemenge bei ungeänderter Temperatur auf das doppelte Volumen bringt, wobei sein Druck auf  $\frac{1}{2}$  Atmosphäre sich erniedrigt, dem Mariotte'schen Gesetze gemäß sich ausdehnt. Aber es ist nicht zu vergessen, daß der Wasserdampf dabei nicht gesättigt bleibt. Ein bestimmter Raum kann bei einer bestimmten Temperatur im Maximum eine bestimmte Menge von Wasserdampf aufnehmen. Wenn 1 Liter Luft, welche bei 0° C. und unter dem Druck einer Atmosphäre mit Wasserdampf gesättigt ist, zu 2 Litern sich ausdehnt, so können diese 2 Liter jetzt auch zweimal soviel Wasserdampf aufnehmen, wie vorher das eine Liter.

Mohr fährt fort: »Bei einer Höhe, wo der Barometerstand nur mehr als die Hälfte des normalen, also 380"" beträgt, hat der Wasserdampf die doppelte Ausdehnung der oben genannten Zahlen, also für 100° C. die 3400fache, für 0° die 364646 fache, für 20° C. die 116448 fache«. Von diesen drei Angaben ist also wieder nur die erste richtig. Dagegen findet bei der Condensation von Wasserdampf, welcher unter dem Druck einer halben Atmo-

sphäre die halbe Dichtigkeit des bei 0° gesättigten Wasserdampfes hat, nicht eine Volumenverminderung von 364646 zu 1 Maafs, sondern wieder die schon oben gefundene Volumenverminderung von 168 zu 167 Maafs statt. Man kann sich dies leicht *a priori* klar machen. Man kann sich aber auch der in meinem früheren Aufsatz abgeleiteten Gleichung

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{C_1}{C_2}$$

bedienen. Betrachtet man hier, wie auch in den folgenden Berechnungen, die Luft immer als erste, den Wasserdampf als zweite Luftart, so hat man

$$p = C_1 + C_2 = \frac{1}{2},$$

$$C_2 = \frac{1}{168,2};$$

die Volumenveränderung wird also ausgedrückt durch das Verhältniss

$$\frac{v_1 + v_2}{v_1} = \frac{C_1 + C_2}{C_1} = \frac{168}{167}.$$

Durch Berücksichtigung des von dem gebildeten Gase

$$\frac{v_1 + v_2}{v_1} = \frac{p}{p - C_2} = \frac{84}{83}.$$

Bei 20° C. dagegen ist das Verhältniß des Volumens von Luft und gesättigtem Wasserdampf zu dem Volumen der Luft gleich  $\frac{7}{11}$ .

Man kann zwar allerdings innerhalb des Temperaturintervalls von 0° bis 20° C. eine etwas beträchtlichere Volumenverminderung herausrechnen, wenn man außer der Condensation des Wasserdampfs die gleichzeitige Zusammenziehung der Luft bei ihrer Abkühlung berücksichtigt. Vermittelst der in meiner früheren Abhandlung über die Concentration der Luftarten entwickelten Formeln kann man leicht folgende Aufgabe lösen.

Es seyen gegeben  $g_1$  Gramme Luft. Diese seyen unter dem Drucke  $p$  und bei der Temperatur  $t''$ , welcher das Concentrationsmaximum  $C''_2$  des Wasserdampfs entspricht, mit Wasserdampf gesättigt, und das Volumen dieses Luftgemenges betrage  $v''$  Liter. Nunmehr werde das Luftgemenge bei gleich bleibendem Drucke auf die Temperatur  $t'$  abgekühlt, welcher das Concentrationsmaximum  $C'_2$  des Wasserdampfs entspricht; sein Volumen betrage jetzt  $v'$  Liter, wobei das Volumen des condensirten Wasserdampfs zu Null angenommen wird. Man sucht den Werth des Quotienten  $\frac{v''}{v'}$ .

Bezeichnet man bei dem ersten Luftgemenge von der Temperatur  $t''$  die Concentration der Luft durch  $C''_1$ , so hat man

$$C''_1 = \frac{g_1}{g_2 v''} : \frac{d_1}{p_2 (1 + \alpha t'')},$$

folglich

$$v'' = \frac{g_1 p_2 (1 + \alpha t'')}{g_2 d_1 C''_1} = \frac{g_1 p_2 (1 + \alpha t'')}{g_2 d_1 (p - C''_2)}.$$

Ebenso findet man für das zweite Luftgemenge von der Temperatur  $t'$

$$v' = \frac{g_1 p_2 (1 + \alpha t')}{g_2 d_1 (p - C'_2)}$$

und endlich

$$\frac{v''}{v'} = \frac{(1 + \alpha t'') (p - C'_2)}{(1 + \alpha t') (p - C''_2)}.$$

auf 0° abgekühlt wird  
von nahe 11 Maafs z  
Setzt man aber p  
gen Werthe ungeände

$$\frac{v''}{v'}$$

Wenn also eine gegeb.  
Druck einer halben Atm  
erdampf gesättigt ist,  
Drucke auf 0° abgeküh  
minderung von nahe 10

Wenn aber alle We  
Condensation des Wass  
minderung aniebt, auf  
bei der Regen- und Hage  
derselbe Vorwurf auch  
Mohr'schen angegebenen  
Atmosphäre kein fremder  
weder dem der Luft beigem  
auch beiden Gemengtheilen  
vermag. Bedenkt man, daß  
Entstehung von Regen od  
Temperatur



immer eine Volumenvergrößerung eintritt. Ich denke, es kann mir nicht schwer werden, die Richtigkeit dieser Behauptung außer Zweifel zu setzen.

Um diesen Nachweis zu führen, will ich mit der Lösung einiger einfacher Aufgaben beginnen. Es seyen gegeben  $g_1$  Gramme Luft von der Temperatur  $t_1$  und unter dem Druck einer Atmosphäre. Dieser Luft sollen  $Q$  Wärme-Einheiten zugeführt werden. Welche Volumenvermehrung wird die Luft dadurch erleiden?

$g_1$  Gramme Luft von normaler Dichtigkeit nehmen einen Raum von  $\frac{g_1}{g_0}$  Liter ein, wenn  $g_0$  das Gewicht eines Liters Luft von normaler Dichtigkeit bedeutet. Bei der Temperatur  $t_1$  und unter dem Druck einer Atmosphäre nimmt dieselbe Luft den Raum  $\frac{g_1}{g_0} (1 + \alpha t_1)$  ein. Die in dieser Luft enthaltene Wärmemenge, von  $0^\circ$  C. aus gerechnet, beträgt  $g_1 t_1 s_1$  Wärme-Einheiten, wenn  $s_1$  die spezifische Wärme der Luft bei gleich bleibendem Druck vorstellt. Werden nun dieser Luft  $Q$  Wärme-Einheiten zugeführt, so ist ihre Wärmemenge  $g_1 t_1 s_1 + Q$ . Bezeichnet man ihre jetzige Temperatur durch  $t_1$ , so ist

$$g_1 t_1 s_1 = g_1 t_1 s_1 + Q$$

folglich

$$t_1 = \frac{t_1 + Q}{g_1 s_1}$$

und das Volumen der Luft beträgt jetzt

$$\frac{g_1}{g_0} (1 + \alpha t_1) = \frac{g_1}{g_0} \left( 1 + \alpha t_1 + \frac{\alpha Q}{g_1 s_1} \right).$$

Die gesuchte Volumenvermehrung der Luft ist demnach gleich  $\frac{\alpha Q}{g_1 s_1}$ . Dieselbe ist also von der Menge der Luft, welcher die Wärme  $Q$  zugeführt wurde, sowie auch von der Anfangstemperatur der Luft unabhängig.

Es seyen ferner gegeben  $g_2$  Gramme Wasserdampf von der Temperatur  $t_2$  und unter dem Druck einer Atmosphäre. Diesem Wasserdampf sollen  $Q$  Wärme-Einheiten zugeführt werden. Welche Volumenvermehrung wird der Wasserdampf dadurch erleiden?

Nun ist  $s_1 = \frac{1}{7}$   
 durch seinen Wert  
 zunahme der Luft c  
 ten  $\frac{1}{7} \cdot \frac{\alpha Q}{g_0}$ , die Vo  
 unter denselben Um

ein Gemenge von L  
 einer Atmosphäre, s  
 durch Zuführung vo  
 $\frac{10}{7} \cdot \frac{\alpha Q}{g_0}$  Litre vergröß

Wir wollen weite  
 Raum ist, welcher ent  
 von  $100^\circ \text{ C.}$  unter de  
 ser oder Eis condensirt  
 das entstandene flüssige  
 einnimmt. Der gegeb  
 $\frac{8(1 + 100\alpha)}{5g_0}$  Liter. Ebe  
 die Condensation des W  
 Hatte aber der zu cond.  
 Druck einer Atmosphär  
 $100^\circ \text{ C.}$ , so ist der L.

dampf unter dem Druck einer Atmosphäre und von einer Temperatur, die niedriger als  $100^{\circ}$  C. ist. Aus diesem Gemenge soll 1 Gramm Wasserdampf verschwinden. Wieviel Wärme-Einheiten müssen dem zurückbleibenden Gemenge zugeführt werden, wenn das Volumen des resultirenden Gemenges dem Volumen des anfänglichen Gemenges gleich seyn soll?

Damit die geforderte Bedingung erfüllt werde, muß die Volumenvermehrung, welche durch die Zuführung der gesuchten  $Q$  Wärme-Einheiten entsteht, und die wir durch  $\frac{100Q}{8g_0} + \frac{x}{g_0}$  bezeichnen können, gleich seyn dem durch das Verschwinden von 1 Gramm Wasserdampf entstehenden leeren Raum, welchen wir gleich  $\frac{8(1+100a)}{6g_0} - \frac{y}{g_0}$  setzen. Hierin bedeuten dem Obigen gemäß  $x$  und  $y$  positive Größen. Setzen wir die beiden Volume einander gleich, so ergibt sich, daß  $Q$  kleiner als 178 ist.

Nun wissen wir aber, daß das luftförmige Wasser eine gewisse latente Verdampfungswärme besitzt, ohne deren Freiwerdung es nicht condensirt werden kann; wir wissen ferner, daß diese Verdampfungswärme jedenfalls viel größer als 178 ist. Hieraus können wir schließen, daß bei jeder Condensation von Wasserdampf innerhalb der Atmosphäre in Folge der dabei frei werdenden Wärme eine nicht unbeträchtliche Volumenvermehrung eintreten muß.

Ueber den eben gefundenen Werth von  $Q$  will ich noch bemerken, daß derselbe offenbar unabhängig ist von der bei seiner Ableitung gemachten Voraussetzung, nach welcher die betrachteten luftförmigen Körper sich unter dem Druck einer Atmosphäre befinden sollten. Denn bei Verminderung des Druckes vermehren sich alle diese Volume nach demselben Verhältnisse. Hieraus ergibt sich jedoch zugleich, daß die bei der Condensation von 1 Gramm Wasserdampf in Folge des Ueberschusses seiner latenten Wärme über 178 eintretende Volumenvermehrung mit abnehmendem Drucke wächst.

die ich jetzt für über-  
flüssig, auf die  
welche Mohr aus der  
bildung bei der Cond-  
dampfs abgeleitet hat  
welchem diese Conse-  
Consequenzen selbst  
stehen, so liegt einig  
Schlußweise, vermittelt  
sind, eine unrichtige ge-  
Berlin am 26. Febru.

VIII. *Ueber eine E  
Farbenglas*

(Aus d. Sitzungsber. d. K.  
vom Hr

die anscheinend zu demselben Centrum gehören, wie die vollen Ringe. Diese Halbkreise sind abwechselnd helle und dunkle; nur wenn man ein sehr dünnes Blättchen nimmt, lassen sich an denselben Farben unterscheiden. Ich sehe von hellen Halbkreisen bei den mir zu Gebote stehenden Farbengläsern acht bis zwölf, innerhalb dieser Grenzen bewegt sich auch die Zahl der im Tageslichte sichtbaren Newton'schen Ringe. Durch ein rothes Glas hindurch sieht man mehr Halbkreise, so wie mehr Ringe.

Die Distanz der Halbkreise vom Centrum der Newton'schen Ringe ist um so größer, je dicker das Glimmerblättchen. Bei einem Blättchen von 0,015 Millim. Dicke sehe ich diese Halbkreise an meinem Farbenglas in einer Distanz von 17,5 Millim. vom Centrum der Newton'schen Ringe. Im homogenen Lichte der Natriumflamme sehe ich bis zu dieser Distanz 26 schwarze Ringe. Ich verwende bei den Versuchen Glimmerblättchen bis zu 0,05 Millim. Dicke, ein solches giebt die Halbkreise bereits am Rande meines Farbenglases.

Bestimmt man die Radien für die mittleren der Halbkreise, welche bei verschieden dicken Blättchen auftreten, so findet man das Gesetz, daß sich die Radien verhalten wie die Quadratwurzeln aus den Dicken der Blättchen. Diese Bestimmung wurde so gemacht, daß ein Blättchen in mehrere zerschnitten wurde, und zuerst ein Blättchen, dann zwei, dann drei über einander gelegte vor das Auge gebracht wurden.

Bringt man zwei Blättchen vor das Auge so, daß ein Theil der Pupille von dem einfachen, ein Theil von dem doppelten Blättchen bedeckt ist, ein Theil aber frei bleibt, so sieht man zwei Systeme von Halbkreisen, ein System welches der Dicke des einfachen Blättchens entspricht, ein weiter entferntes System, das dem doppelten Blättchen angehört. Man kann auch noch mehr Systeme sehen, aber schon schwer.

Bedeckt man die Pupille ganz mit einem Blättchen, und schiebt ein anderes zur Hälfte darüber vor die Pupille, so

sieht man natürlich nur ein System, wie es das letztere Blättchen allein liefert.

Um die Halbkreise zu sehen, braucht man das Glimmerblättchen nicht unmittelbar vor das Auge zu halten, man kann es auch von demselben entfernt anbringen, wenn es nur in das Strahlenbüschel, welches von der Stelle, wo die Halbkreise entstehen sollen, in das Auge gelangt, von der Seite eingeschoben wird. Hält man das Blättchen nahe am Farbenglase, so entstehen keine Halbkreise mehr, sondern nur Segmente, wenn das Glimmerblättchen nicht einer Dicke entsprechende kreisförmige Begrenzung hat. Es muß nämlich das Blättchen nicht etwa bloß über die Hälfte des Farbenglases, sondern bis zur Stelle eingeschoben werden, an welcher die Halbkreise entstehen können.

Zur Erzeugung dieser Halbkreise tragen nur die Strahlen bei, welche von jenen Stellen des Farbenglases kommen, an welchen die Halbkreise entstehen. Die sichtbaren Newton'schen Ringe haben dabei nichts zu schaffen. Denn man kann diese auch mit einem undurchsichtigen Körper

schiebt, vorausgesetzt, daß das Gesichtsfeld des Polarisationsapparates groß genug sey. Sieht man schief durch einen Nicol gegen eine beleuchtete Fläche, so wird das Gesichtsfeld von einem blauen oder bräunlich gelben Bogen durchsetzt, je nach der Richtung, in welcher man durch den Nicol sieht. An der äußern Seite des gelben Bogens sieht man eine Reihe von Interferenzstreifen, welche bei geeigneter Stellung des Prismas gegen die Licht aussendende Fläche außerordentlich lebhaft werden können. Fixirt man diese und schiebt dann von der innern Seite des Prismas ein Glimmerblättchen, so gewahrt man in weiterer Entfernung gegen den Rand des Gesichtsfeldes hin eine Reihe heller und dunkler Streifen, die aber meistens sehr matt sind, so daß sie nicht so leicht gesehen werden können, wie die Halbkreise am Newton'schen Glase.

---

*IX. Ueber die erhöhte Wärmestrahlung einer mit kohlensaurem Natron überzogenen Platinplatte; vom Fürsten Salm-Horstmar.*

---

Die wichtigen Versuche von Professor Magnus über Wärmestrahlung einer mit kohlensaurem Natron überzogenen Platinplatte veranlassen mich auf folgenden Gesichtspunkt aufmerksam zu machen, welcher vielleicht zur Erklärung dieser Versuche beitragen kann.

Ich stelle die Frage: »Ob die Sache sich nicht leichter erklären lassen würde, wenn man eine Eigenschaft berücksichtigt, welche den meisten farblosen nicht-flüchtigen durchsichtigen Körpern mehr oder weniger zukommt; nämlich die Eigenschaft, in der Temperatur, welche wir Glühhitze nennen, weniger leuchtende Strahlen auszusenden, als die undurchsichtigen Körper? — «

Das Extrem dieser Eigenschaft besitzt bekanntlich das

Dieser Gedan  
rechtfertigt, als b  
*weniger Wärme* u  
hierauf sehr einfa  
tende Strahlen au  
*weniger Wärme* d  
sichtigen Körpern

Auch durch die  
Vermuthung gerech  
beitskraft, welche  
Maafsgabe *ihrer Gr*  
äufseren Aether. V  
leuchtende Strahlen  
sie wohl in der Ver  
tenden Wellen der  
den bei solchen Kör


Das Spectrum s  
der glühenden Perle  
interessant seyn, da  
wenn sich finden so

Bei dieser Gelegen



*X. Einfaches Mittel, um den Ort eines optischen Bildes zu bestimmen; von A. Krönig.*

Wenn man mit einem Auge nach zwei Punkten sieht, die um den Gesichtswinkel Null oder doch nur um einen kleinen Gesichtswinkel von einander abstecken, so läßt sich leicht bestimmen, ob einer der beiden Punkte vom Auge weiter entfernt ist, als der andere, und welcher der entferntere ist. Man braucht nämlich nur, indem man fortfährt, nach den beiden Punkten zu sehen, das Auge senkrecht gegen die Richtung seiner Axe zu bewegen und die zugleich eintretende scheinbare Bewegung jener beiden Punkte zu beobachten. Derjenige Punkt, welcher sich in gleichem Sinne mit dem Auge bewegt, ist vom Auge am weitesten entfernt. Es sey *A* in beistehender Figur das



Auge, welches nach den beiden Punkten *P* und *Q* hinsieht. *A*, *P* und *Q* mögen in einer Geraden liegen. Nun werde das Auge von *A* nach *B* bewegt. Die beiden Punkte *P* und *Q* entfernen sich dabei um den Winkel *PBQ* von einander, und zwar scheint sich *Q* in derselben Richtung wie das Auge (etwa nach rechts) zu bewegen, *P* aber in entgegengesetzter Richtung. Umgekehrt wenn *Q* in derselben Richtung wie das Auge sich zu bewegen scheint, so folgt daraus, daß *Q* vom Auge weiter entfernt ist als *P*.

Es sey nun ein optischer Apparat gegeben, welcher ein objectives Bild irgend eines Gegenstandes entwirft. Wenn nun das Bild nicht lichtstark genug ist, um auf einem Schirm aufgefangen werden zu können, so giebt der Satz, daß von zwei ungleich weit entfernten Punkten der ent-

in dem Sinne wie das  $\epsilon$   
weiter entfernt, als der  
gesetzter Richtung mit  $\alpha$   
ves Verschieben der Na  
auf, an welchem die Na  
Auges mit dem betrachte  
denz bleibt. Dies ist zu  
die Nadelspitze, nachden  
dem brechenden Apparat  
noch immer dem Auge ent  
dafs das betrachtete Bild  
jectivis ist.

Um dasselbe Verfahre  
nen, hätte man wohl zuer  
zuweisen, dafs das von ei  
den bisher angenommenen  
könnte zu diesem Zweck  
vertical gespannte Fäden i  
gel ohne Rand so einstell  
einen Fadens mit den dire  
ren Fadens bei jeder Stel  
Linie zusammenfällt

Bild des leuchtenden Punktes mit einem Punkte des betrachteten Bildes zur Deckung gelangt. Ein Gehülfe muß den leuchtenden Punkt so lange verschieben, bis das gespiegelte und das gebrochene Bild bei jeder Bewegung des Auges sich nicht mehr gegeneinander bewegen. Dann ist die direct meßbare Entfernung des gespiegelten Punktes von der planparallelen Platte gleich der gesuchten Entfernung des durch den optischen Apparat hervorgebrachten subjectiven Bildes von derselben Platte.

Berlin, am 29. November 1864.

## XI. *Geißler's Maximumthermometer.*

Bereits im vorigen Jahre zeigte Prof. Dove der Akademie das vom Mechanikus Geißler hierselbst construirte neue Maximumthermometer vor und gab darüber in den Monatsberichten von 1863 folgende Notiz.

• Das von Casella in London construirte Minimumthermometer, bei welchem das Quecksilber sich bei der Zunahme der Wärme in ein birnförmiges in einer capillären Oeffnung endigendes Gefäß, welches in einen Nebencanal der Hauptröhre mündet, ausdehnt, bei Wärmeabnahme hingegen in der Hauptröhre sich zusammenzieht, hat Hrn. Geißler veranlaßt, dieses ingeniöse Princip auf die Construction eines Maximumthermometers anzuwenden <sup>1)</sup>. Denkt man sich ein gewöhnliches Thermometer in der Nähe der Kugel zerschnitten und beide getrennte Enden in feine Capillaröffnungen ausgezogen, die, ähnlich wie bei dem Bunsen'schen Barometer, durch einen weiteren angeschmolzenen Cylinder dann wieder vereinigt werden, so dehnt sich bei horizontaler Lage des Instruments das Quecksilber in

<sup>1)</sup> Verschieden von dem von Negretti und Zambra construirten (Ann. Bd. XCIX, S. 336).

der langen Thermometerröhre aus, verläßt aber bei der Zusammenziehung diese nicht, sondern bleibt in der konischen Verengung haften, wodurch das andere Ende des Quecksilberfadens das stattgefundene Maximum anzeigt.

Zur näheren Erläuterung dieser Construction sind beide Instrumente auf Taf. I abgebildet worden. Fig. 9 zeigt das Casella'sche Minimumthermometer, Fig. 10 das Geißler'sche Maximumthermometer. Hinzugefügt mag seyn, daß Hr. Geißler im Laufe der Zeit an seinem Instrumente eine kleine Abänderung angebracht hat, da es, wenigstens an einigen Exemplaren vorgekommen ist, daß sie, nachdem sie ihren Dienst längere Zeit hindurch vortrefflich erfüllt hatten, denselben aus unerklärlichem Grund versagten, indem das Quecksilber sich beim Sinken der Temperatur nicht an der capillaren Stelle trennte und folglich in der Röhre zurückging. Er bringt nämlich oberhalb der besagten Stelle eine kugelförmige Erweiterung an, die bis auf ein mikroskopisches Luftbläschen mit Quecksilber gefüllt ist, biegt den Hals der Kugel herab, und zieht denselben etwa in der Mitte so aus, daß daselbst der Quecksilberfaden nur ungefähr halb so dick ist wie in dem übrigen Theil der Röhre. Bei dieser Einrichtung soll der genannte Uebelstand nicht so leicht vorkommen. Es versteht sich übrigens von selbst, daß nach jedem beobachteten Maximum, das Thermometer aufgerichtet werden muß, damit das an der verdickten Stelle getrennte Quecksilber sich wieder vereinige.

## **XII. *Musikalische Töne, erzeugt durch Kohle.***

**E**in Glasstab, an einen Faden aufgehängt und mit einem Hammer geschlagen, giebt bekanntlich einen schönen Ton. Dasselbe ist, nach des Dr. T. L. Phipson's Beobachtung

gen <sup>1)</sup>), der Fall mit Phonolith, verschiedenen Arten Feuerstein, und einigen anderen Mineralien. Unter den elementaren Körpern ist in dieser Beziehung keiner merkwürdiger als das Aluminium. Ein Stab desselben, an einem Faden hängend, giebt auf einen Hammerschlag einen musikalischen Ton wie Glas. Dasselbe ist der Fall mit compacter homogener Holzkohle. Am besten gelang der Versuch mit einem Stück von 11 Zoll Länge, 0,5 Zoll Dicke und 82,05 Grm. Gewicht. Es gab das hohe C. Wie es scheint hat sich vor einigen Jahren in Astley's Theater ein Künstler auf einem Instrumente hören lassen, das aus aufgehängten Kohlenstücken von verschiedenen Dimensionen bestand <sup>2)</sup>).

### XIII. *Lithionreiche Mineralquelle,*

In der Nähe von Redrute in Cornwall ist neuerlich eine heisse Mineralquelle entdeckt, die wohl die reichste an Lithion seyn dürfte, welche man bisher kennt. Ihr Wasser bricht aus einer Tiefe von etwa 230 Faden hervor, besitzt eine Temperatur von 50° C. sowie eine Dichte von 1,007 bei 15° C., und liefert innerhalb 24 Stunden ungefähr 400 Kilogramm. Chlorkalium.

Nach der Analyse des Prof. W. A. Miller enthält das Wasser in einem Gallon (4,543 Liters):

1) *Report of the 33<sup>th</sup> meeting of the British Association etc. Notices p. 50.*

2) Es mag hiebei auch an die alte von Lémery entdeckte und von Réaumur bestätigte Thatsache erinnert seyn, daß selbst das Blei, wenn es die Gestalt einer plan-convexen Linse (etwa von 3 Zoll Durchmesser und 4 bis 5 Linien Dicke) hat und mit der convexen Fläche aufliegt, beim Daranschlagen einen musikalischen Ton giebt (*Mém. de l'acad. de Paris 1726, p. 243.*) P.

nebst Spuren von Chloro  
und Thonerde. Dieselbe Q  
Kubikzoll Gas bestehend au  
stoff und 5,30 Stickstoff. (   
XXV, S. 443),


---

# **Namenregister**

**zum**

**Jahrgang 1864.**

---





(Die Bände 121, 122, 123 sind durch I, II, III bezeichnet.)

**A.**

Alluard, Ueber d. Siedpunkt einig. binär. Gemische v. Flüssigk., die einander in allen Verhältnissen lösen, III, 190.

Ångström, A. J., Neue Bestimm. d. Länge d. Lichtwellen, nebst Methode, auf opt. Wege d. Beweg. d. Sonnensystems zu bestimmen, III, 489. — Nachtr. z. Aufs.: Neue Meth. d. Wärmeleitungsvermög. d. Körper z. bestimmen, III, 628.

Aubert, H., Ueber Augenmaass u. opt. Täuschungen, II, 178.

Avenarius, M., Ueber elektr. Differenzen der Metalle b. verschiedn. Temp. II, 193.

Bohn, C., Einige Bemerkk. üb. d. Bestimm. d. specif. Wärme aus Mischversuchen, II, 289.

Breithaupt, A., Ueb. d. Quarz v. Euba u. üb. opt. Zweiaxigkeit tetragonal u. hexagonal. Krystall. I, 326.

Brodie, B. C., Ueb. die Superoxyde d. Radicale organ. Säuren, I, 372.

Brunner, C., Ueb. d. Einwirk. d. Wasserstoffgases auf d. Lös. einig. Metallsalze, II, 153.

Buchner, O., Die Meteoriten in Sammlungen, II, 317.

Bunsen, R., Thermokette von gross. Wirksamkeit, III, 506.

**C.**

**B.**

Bezold, W. v., Beob. über die Dämmerung, III, 240.

Bischof, C., Ueber ein. neue Erde II, 646.

Böttger, R., Anwend. d. Zeiodelits, II, 496.

Claudet, A., Ueber d. Astro-Chromateskop, III, 382.

Clausius, R., Ueb. d. Concentrat. v. Wärme- und Lichtstrahlen und d. Grenzen ihrer Wirk. I, 1 — Ueb. d. Unterschied zw. gewöhnl. und activ. Sauerstoff, I, 250 und 330.

d. Castore u d. Petalite.  
— Ueb. d. Doppelbrei  
Krystallf des Amblyg  
182.

Dewille, s. Saint-Cl  
ville.

Dibbits, H. C., Ueb. d.  
d. Flammen einig. Gase

Dondera, F. C., Zur H  
der Vocale, III, 527.

Dove, H. W., Ueb. d. Un  
d. auf d. Palette d. Maler

Mischfarben u. d. auf d.  
kreisel hervortretenden,

— Ueb. c. polarisirend.  
II, 18. — Ueb. d. opt. Eig

d. Carthamins, II, 454. —  
Quarzes von Euba, II, 46

## E.

Edland, E., Ueb. d. Bilt  
Eises im Meere I, 613 und

— Ueb. d. Wärme-Entw  
galvan. Inductionströme u

Verhältn. dieser Entwickl.  
dabei verbrauchten mecha

beit, III, 183.

**Jolly, P. G.**, Temperaturbestimm. in d. Tiefe enig. bayerisch. Gebirgseen, II, 659.

**Jungk, C. G.**, Einiges z. Erklär. der Erschein. bei Durchgang der Wärmestrahlen durch rauhe und trübe diathermane Körper, III, 148.

## K.

**Kesselmeier, P. A.**, Aelteste Nachricht über d. Meteorsteinfall zu Ensisheim, I, 333. — Meteorsteinfall zu Tirlemont und über d. angebl. Meteorsteinfall b. Brest, II, 186. — Ueber zwei vermeintl. Meteorsteine in Griechenland, II, 494. — Der Meteorsteinfall von Orgueil und Nohic bei Montauban, II, 654.

**Kessler, F.**, Bemerkk. z. Lessen's Aufsatz: Hr. Kessler u. d. Oxydations- und Reductions-Erscheinungen I, 615.

**Kirchhoff, G.**, Zur Theorie d. Entlad. einer Leydener Flasche, I, 551.

**König, R.**, Beitr. z. Wheatstone's Theorie d. Klangfiguren, II, 238. — Ueber e. Mittel, den wechselnd. Dichtigkeitszustand d. Luft in tönend. Orgelpfeifen sichtbar zu machen II, 242 und 660. — Neuer Apparat, um Schwingungen mit geringem Verlust ihrer Intensität v. tönend. Körper z. Ohre zu leiten, II, 473.

**Kremers, P.**, Ueb. d. relative Atomgewicht d. unzerlegt. Körper, I, 566. — Ueb. d. Aggregatzustände d. unzerlegten Körper, II, 99. — Ueb. d. relative Atomvolum der unzerlegten Körper, II, 245. — Ueber d. Wärmecapacität d. unzerlegt. Körper, II, 588.

**Krönig, A.**, Ueber e. Kautschukventil z. Ersatz der Sicherheitsröhre u. üb. e. Apparat z. intermitt. Entwickl. v. Schwefelwasserstoffgas, II, 170. — Ueber d. Theorie der Davy'schen Sicherheitslampe, II, 173. — Ueb. die

vortheilhafteste Reihe v. Gewichtsstücken und deren Anwend. II, 593. — Ueb. d. Concentration d. Luftarten III, 299. — Ueb. Mohr's Hageltheorie, III, 641. — Einf. Mittel, um d. Ort e. opt. Bildes zu bestimm. III, 655.

**Kundt, A.**, Ueb. Depolarisation III, 385. — Ueb. d. Doppelbrech. d. Lichts in tönend. Stäben, III, 541.

## L.

**Landolt, H.**, Ueber d. Einfluss d. atomist. Zusammensetzung C-, H- und O-haltiger flüssiger Verbindd. auf d. Fortpflanz d. Lichts II, 545 und III, 595.

**Landsberg, K.**, Ueb. d. physikal. Vorgänge bei der gleitenden Reibung fest. Körper, I, 283.

**Lang, V. v.**, Ueb. d. Kreuz, das gewisse organ. Körper im polarisirt. Lichte zeigen und über die Haidinger'schen Farbenbüschel III, 140.

**Lessen, s. Kessler.**

**Levoir, L. C.**, Ueb. d. Anfertigung astat. Nadelpaare, III, 384.

**Liebig, G. v.**, Der Wirbelsturm am 9. und 10. April 1858 in der Adaman-See, II, 418.

**Lindig, F.** Ueber d. Abänderungen d. elektromotor. Kräfte durch d. Wärme, III, 1.

**Listing, J. B.**, Ueb. e. von Korsakoff in Russland beobachteten Sonnenhalo, nebst Bemerkk. über d. krystallisirte Wasser, II, 161.

**Lorenz, L.** Ueber d. Theorie d. Lichts, I, 579.

## M.

**Magnus, G.**, Ueb. d. Verdicht. v. Dämpfen an d. Oberfläche fester Körper, I, 174. — Ueber d. Einfluss d. Condensation b. Versuchen üb. Diathermansie, I, 186. — Ueb. d. Beschaffenheit d. Sonne I, 510.

Körper I, 459  
 Mohn, H., Bewölk. in 4  
 I, 656  
 Mohr, F., Eiswasser-I  
 Raufrost. I, 637  
 Montigny, Ch., Neue B  
 Brechungsindex von Flä  
 messen, III, 581  
 Mos, G., Ueb. e. Pendel  
 chere Erklärung d. Lissaj  
 Schallfiguren I, 645.  
 Most, Mathemat. Theorie  
 stellen elektr. Ströme II,  
 Müller, W., Ueb. die I  
 d. Sumpfgases u. d. ölbi  
 auf Metalloxyde b. erhöht  
 perator, II, 139.  
 Müttrich, A., Bestimmu  
 Krystallsyst. u. d. opt. C  
 d. weinsteins. Kali Natrons  
 d. Temp. auf seine optische  
 stanten, u. Bestimm. d. Bre  
 quotienten d. Röhre u. d  
 luten Wassers bei verschie  
 Tempp. I, 193 u. 398.

#### N.

Nickles, Ueber die Spectra  
 d. Thalliums, I, 336.  
 Nordenskjöld, A. E., Ueb  
 talitarius m.

**Recknagel, G.** Thermomet. Versuche, III, 115.

**Regnault, V.**, Bemerkk. über d. zur Bestimmung d. spec. Wärme fester Körper angewendeten Verfahren, II, 257.

**Reichenbach, K. v.**, Die Sternschnuppen in ihrer Beziehung z. Erdoberfläche, III, 368.

**Reusch, E.**, Beiträge zur Lehre vom Eise, I, 573. — Ueb. d. Agat III, 94.

**Ries, P.**, Der Nebenstrom im Schließungsdraht d. Leydener Batterie, I, 613. — Ueber d. Einfluss von Metallhüllen auf d. Magnetisirung durch den elektr. Entladungsstrom, II, 304.

**Robbins, J.**, Neue Darstellungsweise d. Sauerstoffs, II, 256.

**Rose, G.**, Ueber die chemische Zusammensetzung d. Braunitz u. Hausmannits, und d. Isomorphie d. Mangansuperoxyds mit d. Kieselsäure, I, 318. — Ueber d. angebliche Meteoriten von Pompeji in der Chladni'schen Meteoriten-samml. III, 374.

**Rose, H.**, Sein Tod, I, 192.

**Rüdorff, F.**, Ueb. Kältemischungen, II, 337.

## S.

**Sainte - Claire - Deville und Troost, L.**, Ueber d. Permeabilität d. Eisens in hoher Temp. II, 331.

**Salm-Horstmar, Fürst**, Versuche üb. Schmelzung d. Eises mittelst concentrirter Sonnenstrahlen, II, 189. — Ueb. d. z. Fruchtbildung d. Weizens specifisch nothwend. anorgan. Stoffe, III, 377. — Ueb. d. erhöhte Wärmestrah. e. mit kohlen. Natron überzog. Platinplatte, III, 653.

**Schabus, J.** Ueber. d. Pulshammer, II, 175.

**Scheerer, Th.**, Ueb. d. Astrophyllit u. sein Verhältn. z. Augit u. Glimmer im Zirkonsyenit, nebst

Bemerkk. üb. d. plutonische Entstehung solcher Gebilde. II, 107.

**Schröder v. der Kolk, H. W.**, Ueb. d. mechan. Energie d. chem. Wirkungen II, 439 und 658.

**Simmler, R. Th.** Gelegentl. Beob. über d. Fluggeschwindigkeit des Adlers, I, 331.

**Sirks, A.**, Sonnenhof, beob. auf d. Rhede v. Surabaya, I, 650.

**Soret, J. L.**, Ueber d. volumetr. Verhalt. d. Ozons, I, 268.

**Sprengel, H.**, Ueb. d. Erkenn. d. Salpetersäure, I, 188.

**Stefan, J.**, Ueber d. Dispersion d. Lichts durch Drehung der Polarisationsebene im Quarz II, 631.

— Ueber Interferenz-Erscheinungen im prismat. u. im Beugungsspectrum, III, 509, — Ueber e. Erschein. am Newton'schen Farbenspecter, III, 650.

**Steinheil, K. A.**, Wie vollständige Uebereinstim. in d. Spectral-Apparate leicht zu erlangen sey, II, 167.

**Stokes, G. G.**, Ueber das lange Spectr. d. elektr. Lichts III, 30 und 472.

**Stratingh, S. E.**, Ueb. d. mehrfach. Bilder in ebenen Glaspiegeln II, 462.

**Stricker, W.**, Eine akust. Beobacht. I, 335.

## T.

**Troost, L.**, s. Sainte - Claire - Deville.

## V.

**Vogelsang, H.**, Ueber d. mikroskop. Structur d. Schlacken und d. Beziehh. d. Mikrostruktur zur Genesis der krystallinischen Gesteine, I, 101.

**Vogt, C.**, s. Matthiessen.

## W.

Waltenhofen, A. v., Ueber die Coërcitivkraft verschiedn. Stahl-sorten, I, 431.

Weber, Rud., Ueber d. isomeren Modificatt. d. Zinnsäure, II, 358. — Ueber die Verbindd. der Schwefelsäure mit chlorsalpetriger, salpetriger und Unter-Salpetersäure, III, 333. — Ueb. d. Verbindd. d. chlorsalpetrig. Säure mit nicht-flücht. Chlormetallen, III, 347.

Weyl, W., Ueber Metall-Ammonium-Verbindd. I, 601. — Ueb. d. Bildung d. Ammoniums und einiger Ammonium-Metalle, III, 350.

Wiedemann, G., Ueber d. Einfluß der Temperaturverändr. auf d. Magnetism. d. Eisens und Stahls II, 346.

Wiederhold, E., Versuche z. Bildung von festem Wasserstoffantimon, II, 487.

Wild, H., Ueber ein neues Saccharimeter, II, 626.

Wilbelmy, L., Ueb. d. Abhängigk. d. Capillaritäts-Coëfficienten der Flüssigkeiten von ihrer Zusammensetzung I, 44. — Do. Do. von d. chem. Beschaffenheit und Gestalt d. festen Wand, II, 1. — Sein Tod. II, 1.

Willigen, S. M. van der, Brechungscoëfficienten d. destillirten Wassers, II, 191. — Ueber ein System v. geradlinigen Fransen, welche gleichzeit. mit den Newton'schen Ringen zu beob. sind, III, 558.

Wöhler, F., Ueber d. Färbende im Smaragd, II, 492.

## Z.


Zinken, gen. Sommer, Ueb. d. Berechn. d. Bildkrümm. b. opt. Apparaten II, 563.

Zirkel, F., Syenit- und Granulit-Analyse II, 621.










*Fig. 9*



*Fig. 11*







1.





5

A'


B

1

2









PHYSICS

53015

A613

V. 123

1864.

